

[Zum 1. Teil \(S. 381\)](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

38. DE SERIERUM SUMMIS ET DE QUADRATURIS PLAGULAE QUINDECIM

Oktober 1674 und [Anfang 1678 – Ende 1679]

Die folgenden Stücke sind von Leibniz zu einer Gruppe zusammengefaßt worden, in der er bogenweise durch Überschriften fünfzehn (recte: sechzehn) Teile unterscheidet; die Überschrift Pars quarta erscheint doppelt. Der letzte Bogen enthält zusätzlich ein Einlegeblatt und trägt keine Überschrift. Die ersten drei Bögen sind mit dem Datum Oktober 1674 versehen.

In Hannover hat Leibniz einen Umschlag hinzugefügt, der eine erweiterte Überschrift und das Datum Oktober 1674 der Stücke trägt. Das Wasserzeichen des Umschlagbogens ist für die Jahre 1678/1679 belegt.

38<sub>1</sub>. UMSCHLAG

[Anfang 1678 – Ende 1679]

**Überlieferung:** L Konzept: LH 35 V 4 Bl. 1+37. 1 Bog. 2°. Hannoversches Papier. 6 Zeilen auf Bl. 1 r°. Bl. 1 v° u. 37 r° leer. Auf Bl. 37 v° gegenläufig Notiz von Leibniz: „Gelieferte aber noch nicht bedungene bucher“. Cc 2, Nr. 775 A tlw.

Octob. 1674.

De serierum summis et de quadraturis plagulae quindecim.  
In his multa notabilissima, inter alia hic de trochoide  
parabolica hic primum inventa plag. 10. 11.  
Et de curva ellips. et hyperbolae; plag. 13. et modus hic  
primum a me et meo marte inventus exhibendi valorem  
radicis quadraticae per seriem infinitam eadem  
plagula 13.

---

20 plаг. 10. 11.: N. 38<sub>12–13</sub>. 21 plаг. 13.: N. 38<sub>15</sub>. 21f. hic primum: Die Reihenentwicklung von Quadratwurzeln behandelt Leibniz auch in den wohl bereits kurz zuvor im Sommer 1674 entstandenen N. 32 (s. dort) und N. 33.

## 382. DE SERIERUM SUMMIS ET DE QUADRATURIS PARS PRIMA

**Überlieferung:** L Konzept: LH 35 V 4 Bl. 2–3. 1 Bog. 2°. 4 S. Datum und Überschrift oben ergänzt.  
Cc 2, Nr. 775 A tlw.

Octob. 1674.

5

Schediasma de serierum summis, et seriebus quadraticibus item curv.  
ellips. et hyperb. Et notabilissima extractio radicis quadraticae  
irrationalis per seriem infinitam plagula 13.

$$\square \text{hyp. } \underbrace{\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} + \frac{1}{13} - \frac{1}{14}}_{\begin{array}{ccccccc} \frac{1}{2} & \frac{1}{12} & \frac{1}{30} & \frac{1}{56} & \frac{1}{90} & \frac{1}{132} & \frac{1}{182} \\ \frac{1}{1} & \frac{1}{6} & \frac{1}{15} & \frac{1}{28} & \frac{1}{45} & \frac{1}{66} & \frac{1}{91} \end{array}} \quad [dupli]$$

10

sunt triangulares per saltum. Nam series triangularium, est:

$$\begin{array}{cccccccccc} \frac{1}{1} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{10} & \frac{1}{15} & \frac{1}{21} & \frac{1}{28} & \frac{1}{36} & \frac{1}{45} & \frac{1}{55} & \frac{1}{66} & \frac{1}{78} & \frac{1}{91}. \\ \text{Ergo} & & & & & & & & & & & & \end{array}$$

residua scilicet, pendent etiam a quadratura hyperbolae seu

15

$$\frac{1}{1 \ 3} - \frac{1}{2 \ 5} + \frac{1}{3 \ 7} - \frac{1}{4 \ 9}. \quad \text{Quae fiunt ex hac serie:}$$

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{5} + \frac{1}{3} - \frac{1}{7} + \frac{1}{4} - \frac{1}{9}, \quad \text{seu reducendo ad originem:}$$

6 quadraticibus (1) aliae hic miscentur de quadraturis figurarum, de trochoide parabolica etc.  
plag. 10. 11. (2) item L 11 dimidii L ändert Hrsg. 15 hyperbolae (1). Fiunt au (2) seu L

---

16 hac serie: Richtig wäre  $1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{2}{5} + \frac{1}{3} - \frac{2}{7} + \frac{1}{4} - \frac{2}{9}$  etc. Der Fehler und ähnliche, die Leibniz in den S. 387 Z. 1; S. 388 Z. 1–3 u. S. 388 Z. 9 f. unterlaufen, beeinträchtigen die weitere Überlegung nicht.


$$\frac{b}{1} - \frac{b^3}{3} + \frac{b^2}{2} - \frac{b^5}{5} + \frac{b^3}{3} - \frac{b^7}{7} + \frac{b^4}{4} - \frac{b^9}{9}, \text{ quorum formulam indagabimus ita:}$$

$$\frac{b}{1} + \frac{b^2}{2} + \frac{b^3}{3} \quad \text{etc.} \quad \text{fit ex summa omnium } \frac{1}{1-y}, \text{ et}$$

$$\frac{b^3}{3} + \frac{b^5}{5} + \frac{b^7}{7} \quad \text{etc. fit ex summa [omnium]} \frac{y^2}{1-y^2}.$$

Cuius aliunde scio dimensionem ex hyperbolae quadratura pendere vel ideo duobus

- modis sumendo eius momentum semper redditur ad quadraturam hyperbolae nempe multiplicando per  $1+y$ , et per  $1-y$ . Unde inter ea duo momenta differentia est cylinder figurae.



[Fig. 1]

Differentia ergo inter duo spatia hyperbolica aequatur cylindro figurae  $\frac{1}{1-y^2}$ , nam

- momentum eius multiplicati per  $1+y$ , est  $\frac{1}{1-y}$  momentum figurae  $BDEC$  ex  $AF$ .

Si multiplicetur per  $1-y$ , fit  $\frac{1}{1+y}$  momentum figurae  $BCDE$  ex  $DE$ , ponendo  $AB$ .

$1 - \frac{b^9}{9}$ , (1) quae fiunt ex (a) hac div (b) divisione huius formulae :  $x \sqcap \frac{y}{a+}$  (2) quorum  $L$   
 3 omnium erg. Hrsg. 3 f.  $\frac{y^2}{1-y^2}$ . (1) Cuius ut obiter dicam dimensio pendet ex quadratura hyperbolae, nam addendo  $\frac{1}{1-y^2}$ , idem est ac si adderetur 1, et (a) caetera, (b)  $\frac{y^2}{1-y^2}$  duplicaretur (aa).  
 Iam (bb) quia  $\frac{1}{1-y^2}$  est  $\sqcap$  ipsi (2) Cuius  $L$

$BD \sqcap 1$ . Denique multiplicando per  $y$  fiet:  $\frac{y^3}{1-y^2}$  momentum eiusdem figurae  $BDCE$  ex  $BC$ . Unde:  $y^3 + y^5 + y^7$  [etc.]

Sed ut ad rem redeamus[, iungantur inter se hae duae figurae:  $\frac{1}{1-y}$  et  $\frac{y^2}{1-y^2}$  auferendo seu fiat  $\frac{1}{1-y} - \frac{y^2}{1-y^2}$ , sive reducendo ad communem denominatorem fiet:

$\frac{1+y-y^2}{1-y^2} \sqcap x$ . quae figura proinde pendet ex quadratura hyperbolae, reducendo fiet: 5

$1+y-y^2 \sqcap x-y^2x$ . et ut quaeratur valor ipsius  $y$  fiet:

$$y^2 \frac{+y}{x-1} + \frac{1}{4x^2-8x+4} \sqcap \boxed{\frac{x-1}{x-1}} 1 + \frac{1}{4x^2-8x+4} \text{ sive } \sqcap \frac{4x^2-8x+5}{4x^2-8x+4}. \text{ Unde}$$

$$y + \frac{[1]}{2x-2} \sqcap \frac{\sqrt{4x^2-8x+5}}{2x-2}. \text{ sive } y \sqcap \left[ \frac{\sqrt{4x^2-8x+5}-1}{2x-2} \right]. \text{ quae pendet ex quad. hyp.}$$

Etiam ut licet radicibus irrationalibus, aliquando, ut si consentiat radix numerato-  
ris et denominatoris, e. g.  $\frac{\sqrt{1-y^2}}{1-\sqrt{1-y^2}}$  et summa proveniet rationalibus irrationalibus 10  
mixta, v. g.  $\sqrt{1-y^2}$  (circulus)  $+1-y^2 + \underbrace{1-y^2}_{\sqrt{1-y^2}+1-y^2}, \underbrace{1-y^2}_{\sqrt{1-y^2}}$  [etc.] atque  
ita rationales atque irrationales habebuntur per intervalla unius interstitii. Eodem modo  
radices cubicae tractari possunt.

Sed si radices numeratoris et nominatoris non consentiant, vel si radix non sit in  
utroque, utique patet seriem totam fieri irrationalem. Omnes autem rationales sunt sem-  
per paraboloides. 15

Nemo usus est hactenus hyperboloidibus in dividendo, cum tamen res non minus  
succedat: sed nec adhibitae sunt divisiones; in quibus ipsi producti habent denominatores,

2 etc. erg. Hrsg. 3 redeamus[, (1) patet hanc figuram (2) iungantur  $L$  8  $y+$  |  $\frac{y}{2x-2}$   
 $\ddot{a}ndert$  Hrsg. |  $\sqcap \frac{\sqrt{4x^2-8x+5}}{2x-2}$ . (1) abiecto iam triangulo  $y$ , residua figura dabit  $y \sqcap (2)$  sive  $y \sqcap$   
 $|\frac{\sqrt{4x^2-8x+5}}{2x-1}$   $\ddot{a}ndert$  Hrsg. |. quae  $L$  9 aliquando, ut erg.  $L$  10 proveniet (1) rationalis,  
dividendo (2) rationalibus  $L$  11 etc. erg. Hrsg. 12 interstitii (1), quia radix quadratica, si (2).  
Eodem  $L$  15 patet (1) utrobique (2) seriem  $L$  15 rationales (1) in casu praesenti (2) sunt  $L$

nec adhibitae sunt irrationales. Imo non nisi unicum exemplum datum est; quod attulit Mercator. Methodus mea revocandi ad progressiones geometricas, commodior est altera Mercatoris per divisionem; quia, ita series qualescumque propositae etiam irregulares satis nec ordine procedentes, ad figuram convenientem, revocantur, qualis ista est:  $\frac{b}{1} - \frac{b^3}{3} + \frac{b^2}{2}$

5 etc. Variae aliae coniunctiones institui possunt, ut ista:

$$\underbrace{\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4}}_{\textcircled{1}} + \underbrace{\frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8}}_{\textcircled{2}} + \underbrace{\frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12}}_{\textcircled{3}} \text{ [etc.]}$$

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{6} + \frac{3}{40} - \frac{1}{42} + \frac{3}{108} - \frac{1}{110} \text{ etc.}$$

Et ita semper novae erui possunt figurae. Sumtis seriebus fractionum quadraticarum unitate deminutarum:

$$10 \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{8} + \frac{1}{15} + \frac{1}{24} + \frac{1}{35} + \frac{1}{48} + \frac{1}{63} + \frac{1}{80} + \frac{1}{99} + \frac{1}{120} + \frac{1}{143} + \frac{1}{168} + \frac{1}{195} + \frac{1}{224} \text{ [etc.]}$$

$$\cdot \quad \square \quad \cdot \quad \square$$

$$\circ \qquad \circ \qquad \circ \qquad \circ \qquad \circ \qquad \circ$$

$$\wedge \qquad \wedge \qquad \wedge \qquad \wedge \qquad \wedge$$

15  $\infty \qquad \infty \qquad \infty \qquad \infty \qquad \infty$

Omnium terminorum punctatorum habetur summa; item omnium terminorum  $\square$  notatorum; ac proinde et totius seriei; sed termini circulo notati pendent ex quad. circuli, termini  $\wedge$  notati ex quad. hyperb.

$$20 \quad \text{Sed quid termini } \frac{1}{3} \quad \frac{1}{24} \quad \frac{1}{63} \quad \frac{1}{120} \text{ [etc.], sane sunt: } \frac{1}{1^\wedge 3} \quad \frac{1}{4^\wedge 6 \sqcap 3^\wedge 8} \quad \frac{1}{7^\wedge 9}$$

$$\frac{1}{10^\wedge 12} \text{ [etc.]}$$

6–387,2 etc. erg. Hrsg. fünfmal 17 notatorum; (1) item tot (2) ac L 17 seriei; (1) item (2) sed L

2 Mercator: *Logarithmotechnia*, 1668, prop. XIV–XVII S. 28–33 [Marg.]. 10–13 Vgl. u. a. *LSB* III, 1 N. 39 S. 166 Z. 3–9 u. *LQK* prop. XLII S. 88. 16f. Omnium . . . seriei: vgl. N. 15 S. 180 Z. 6 – S. 181 Z. 8.

$$\frac{1}{1 \hat{\wedge} 3} + \frac{1}{4 \hat{\wedge} 6} \left[ +\frac{1}{7 \hat{\wedge} 9} \right] + \frac{1}{10 \hat{\wedge} 12} \text{ etc. Unde } 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} \left[ +\frac{1}{7} - \frac{1}{9} \right] + \frac{1}{10} - \frac{1}{12}$$

[etc.]

$$\text{Unde } \frac{b}{1} - \frac{b^3}{3} + \frac{b^4}{4} - \frac{b^6}{6} + \left[ \frac{b^7}{7} - \frac{b^9}{9} \right] + \frac{b^{10}}{10} - \frac{b^{12}}{12} \text{ etc. Ex summa omnium:}$$

$$1 - y^2 + y^3 - y^5 [+y^6 - y^8] + y^9 - y^{11} \text{ etc. Iam summa omnium}$$

$$1 + y^3 [+y^6] + y^9 \text{ etc. fit ex } \frac{1}{1 - y^3}. \text{ Et summa omnium:}$$

$$y^2 \quad y^5 \quad [y^8] \quad y^{11} \text{ etc. fit ex } \frac{y^2}{1 - y^2}.$$

$$\text{Iam } 1 - y^2 \hat{\wedge} 1 + y \sqcap 1 \left[ -y^2 + y^2 \right] - y^3. \text{ Fiet ergo } \frac{1 - y^2 - y^4}{1 - y^3} \sqcap x. \text{ aequatio figurae,}$$

$$\text{cuius series quadratrix est: } \frac{1}{3} \quad \frac{1}{24} \quad \frac{1}{63} \text{ etc.}$$

$$\text{Eodem modo investigabitur figura, cuius series quadratrix: } \frac{1}{8} \quad \frac{1}{35} \quad \frac{1}{80} \text{ [etc.]}$$

$$\text{Restat investiganda series } \frac{1}{15} \quad \frac{1}{63} \quad \frac{1}{143} \quad \frac{1}{255} \text{ quae vadit etiam per saltus tertianos,}$$

cuius terminos in serie ita notavi:  $\infty$ . Denominatores ita resolventur:

$$\frac{1}{3 \hat{\wedge} 5} \quad \frac{1}{7 \hat{\wedge} 9} \quad \frac{1}{11 \hat{\wedge} 13} \quad \frac{1}{15 \hat{\wedge} 17} \text{ [etc.] Unde fit series praeparata:}$$

$$10 \quad \ddot{U}ber \quad \frac{1}{15} \quad \frac{1}{63} \quad \frac{1}{143}: \quad \begin{matrix} 4 & 4 \\ 4 & 8 & 12 \end{matrix}$$

$$1 + \frac{1}{7 \hat{\wedge} 9} \text{ erg. Hrsg.} \quad 1 + \frac{1}{7} - \frac{1}{9} \text{ erg. Hrsg.} \quad 3 + \frac{b^7}{7} - \frac{b^9}{9} \text{ erg. Hrsg.} \quad 4 + y^6 - y^8 \text{ erg. Hrsg.}$$

5  $+y^6$  erg. Hrsg. 6  $y^8$  erg. Hrsg. 9 etc. erg. Hrsg. 10f. tertianos (1) et eius figura pendet ex quadratura circuli et hyperbolae iunctis (2), cuius  $L = 12$  etc. erg. Hrsg.

$$1 \quad 1 - \frac{1}{3}: \text{ Richtig wäre } \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{8} - \frac{1}{12} + \frac{1}{14} - \frac{1}{18} + \frac{1}{20} - \frac{1}{24} \text{ etc.; s. o. Erl. zu S. 383 Z. 16.} \quad 6 \quad \frac{y^2}{1 - y^2}: \quad$$

Richtig wäre  $\frac{y^2}{1 - y^3}$ . Leibniz rechnet mit dem Wert weiter und erhält als Folge weiterer Rechenfehler

$$\frac{1 - y^2 - y^4}{1 - y^3} \text{ statt } \frac{1 - y^2}{1 - y^3}.$$

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{13} + \frac{1}{15} - \frac{1}{17} \text{ etc. Cuius origo est:}$$

$$\frac{b^3}{3} - \frac{b^5}{5} + \frac{b^7}{7} - \frac{b^9}{9} + \frac{b^{11}}{11} - \frac{b^{13}}{13} + \frac{b^{15}}{15} - \frac{b^{17}}{17} \text{ etc. facta ex summis omnium:}$$

$$y^2 - y^4 + y^6 - y^8 + y^{10} - y^{12} + y^{14} - y^{16} \text{ etc. } \sqcap \frac{y^2}{1+y^2}.$$

Quoniam autem series

$$5 \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{15} \quad \frac{1}{35} \quad \frac{1}{63} \quad \frac{1}{99} \quad \frac{1}{143} \text{ etc. a me inventa est; et series}$$

$$\frac{1}{3} \quad \frac{1}{35} \quad \frac{1}{99} \quad \text{etc. pendet ex quadratura circuli, itaque series}$$

$$\frac{1}{15} \quad \frac{1}{63} \quad \frac{1}{143} \text{ [etc.] etiam pendebit ex quadratura circuli.}$$

$$\frac{1}{3} \quad \frac{1}{35} \quad \frac{1}{99} \quad \text{[etc.] resoluta dant:}$$

$$\frac{1}{1^{\wedge} 3} \quad \frac{1}{5^{\wedge} 7} \quad \frac{1}{9^{\wedge} 11} \quad \text{etc., cuius seriei origo est}$$

$$10 \quad \frac{b}{1} - \frac{b^3}{3} + \frac{b^5}{5} - \frac{b^7}{7} + \frac{b^9}{9} - \frac{b^{11}}{11} \quad \text{etc. facta ex summis omnium:}$$

$$1 - y^2 + y^4 - y^6 + y^8 - y^{10} \quad \text{etc.}$$

Idem plane evenit, examinatis duabus alteris ad hyperbolam seriebus,  $\propto$  et  $\curvearrowright$ ; ut non sit opus immorari. Videamus quid fiat, ademtis:

$$3 \text{ f. } \frac{y^2}{1+y^2}. (1) \text{ Eodem modo sumatur series, alia per saltus tertianos, quam ita notavi } \propto \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{35}$$

$$\frac{1}{99} (2) \text{ Quoniam autem (a) constat seriem (3) series } L = 7-389,6 \text{ etc. erg. Hrsg. fünfmal } 7 \text{ f. circuli.}$$

$$(1) \text{ Miror autem eandem ex una quam ex altera serie prodire figuram. Nam (2) } \frac{1}{3} L = 9 \text{ etc., (1) unde}$$

$$(2) \text{ quorum (3) cuius } L = 13 \text{ fiat, (1) additis | vel ademtis erg. } L, \text{ streicht Hrsg. | (2) ademtis } L$$

$$1-3 \quad \frac{1}{3} - \frac{1}{5}: \text{ Richtig wären } \frac{1}{6} - \frac{1}{10} + \frac{1}{14} - \frac{1}{18} \text{ etc., } \frac{b^3}{6} - \frac{b^5}{10} + \frac{b^7}{14} - \frac{b^9}{18} \text{ etc. und } \frac{y^2}{2} - \frac{y^4}{2} + \frac{y^6}{2}$$

etc.  $= \frac{y^2}{2(1+y^2)}$ ; s. o. Erl. zu S. 383 Z. 16. 5 inventa: N. 15 S. 180 Z. 6 – S. 181 Z. 8; vgl. auch LSB

$$\text{III, 1 N. 39 S. 166 Z. 6 u. } LQK \text{ prop. XXXVI S. 82. } 9 \text{ origo: Richtig wären } \frac{1}{2} \left( \frac{b}{1} - \frac{b^3}{3} + \frac{b^5}{5} \text{ etc.} \right)$$

$$\text{und } \frac{1}{2} (1 - y^2 + y^4 \text{ etc.}); \text{ s. o. Erl. zu S. 383 Z. 16.}$$

$$\begin{array}{ccccccccc} \frac{1}{3} & \frac{1}{8}, & \frac{1}{35} & \frac{1}{48}, & \frac{1}{99} & \frac{1}{120}, & \frac{1}{195} & \frac{1}{224}, & [\text{etc.}] \\ \frac{5}{24} & & \frac{13}{35} & \frac{21}{48} & & & & & \text{etc.; auferatur} \\ \frac{1}{24} & & \frac{1}{35} & \frac{1}{48} & & \frac{1}{99} & \frac{1}{120} & & [\text{etc.}] \text{ fiet:} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & & \frac{1}{35} & \frac{1}{4} & & \frac{1}{99} & \frac{1}{6} & \text{etc., cuius seriei momentum ex vertice, pendet} \end{array}$$

ex summa seriei quadratricis circuli. Unde patet seriem summaticem huius ipsius seriei 5

$$\frac{1}{3} \frac{1}{2} \frac{1}{35} \frac{1}{4} [\text{etc.}] \text{ ex quad. circuli summandam esse.}$$

$$\begin{array}{ccccccccc} & \frac{1}{1} & & \frac{1}{5} & & \frac{1}{9} & & \\ & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ & \frac{1}{24} & & \frac{1}{35} & \frac{1}{48} & & \frac{1}{99} & \frac{1}{120} & . \end{array}$$

Unde series quadratrix differentiarum inter circulum et hyperbolam, est:

$$\begin{array}{ccccccccc} \frac{5}{1, 2, 3, 4} & \frac{13}{5, 6, 7, 8} & \frac{21}{9, 10, 11, 12} & \text{etc.} & \text{Unde si auferatur,} \\ \odot \frac{3}{1, 2, 3, 4} & \frac{3}{5, 6, 7, 8} & \frac{3}{9, 10, 11, 12} & \text{etc.} & \text{restabit:} \\ \frac{2}{1, 2, 3, 4} & \frac{10}{5, 6, 7, 8} & \frac{18}{9, 10, 11, 12} & \text{etc., vel} \\ \mathbb{D} \frac{2}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{4} & \frac{2}{6} \frac{1}{7} \frac{1}{8} & \frac{2}{10} \frac{1}{11} \frac{1}{12} & \text{etc.} \end{array}$$

Atqui habetur summa huius seriei:

$$\frac{1}{1, 2, 3} \frac{1}{2, 3, 4} \frac{1}{3, 4, 5} \frac{1}{4, 5, 6} \frac{1}{5, 6, 7} \frac{1}{6, 7, 8} \text{ etc.}$$

10

15


Hinc patet rursus iri per saltus tertianos ut series habeatur quaesita. Series autem huius quoque seriei habetur in

$$\frac{1}{1, 2, 3, 4} \frac{1}{2, 3, 4, 5} \frac{1}{3, 4, 5, 6} \frac{1}{4, 5, 6, 7} \frac{1}{5, 6, 7, 8} [\text{etc.}] \text{ unde rursus per saltus}$$

tertianos ut series habeatur quaesita.

5 patet (1) differentias seriei summaticis eius (2) seriem  $L$  9 series (1) differentiarum inter quad. circuli (2) quadratrix  $L$  16 ut ... quaesita erg.  $L$  18 etc. erg. Hrsg.

Si series ⊕ triangulo-triangularium ducatur in distantias a vertice, 1, 5, 9. fient respondentes saltus tertiani pyramidalium; et si Δ ducatur in distantias a vertice fient respondentes saltus triangularium.



[Fig. 2]

5             $\frac{C}{\varphi} \frac{1}{1,2}$      $\frac{D}{3,4}$      $\frac{E}{5,6}$      $\frac{F}{7,8}$      $\frac{1}{9,10}$      $\frac{1}{11,12}$     etc. pendent a quadratura hyperbolae. Ducantur in distantias a vertice,  $A$ , nempe 2.4.6.8.10.12. (vel quod eodem reddit, duplicando productum, 1.2.3.4) fiet:  $1 \frac{1}{3} \frac{1}{5} \frac{1}{7}$  etc. momentum seriei ex  $A$ . Ducantur in distantias a  $B$ , fiet:  $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{10}$ , seu [duplum]  $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{5}$  etc.

10        Unde sequitur, quod et patet, differentiam duorum momentorum aequari seriei summae.

Esto series:     $\frac{C}{\wp} \frac{2}{2,3,4}$      $\frac{D}{6,7,8}$      $\frac{E}{10,11,12}$      $\frac{F}{14,15,16}$     etc.

1 Si (1) figura (2) series ⊕ | triangulo-triangularium erg. | ducatur  $L$     2 si (1) saltus pyrami (2)  
 $\Delta L$     8 6  $L$  ändert Hrsg.    9 seu (1) dimi (2) duplum (3) | dimidium ändert Hrsg. |  $\frac{1}{1} L$

Si ducantur in 2.4.6.8. etc. distantias a vertice  $A$ , fiet haec series:

$\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{6} - \frac{1}{7} + \frac{1}{10} - \frac{1}{11} + \frac{1}{14} - \frac{1}{15}$ , etc. quae pendent ab his:  
 $\frac{b^2}{2} - \frac{b^3}{3} + \frac{b^6}{6} - \frac{b^7}{7}$  etc. seu summa omnium,  $y - y^2 + y^5 - y^6 + y^9 - y^{10}$  etc. seu  
 $y + y^5 + y^9$  etc. demta  $y^2 + y^6 + y^{10}$  etc. Quarum prior fit ex figura, cuius ordinata  
est:  $\frac{y}{1-y^4}$ , posterior ex figura, cuius ordinata est:  $\frac{y^2}{1-y^4}$ . Unde figura totalis  $\frac{y-y^2}{1-y^4}$ ,  
quae dividi potest per  $1-y$ ; fiet:  $\frac{y}{y^3+y^2+y+1}$ , cuius figurae series quadratrix est  
 $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{6} - \frac{1}{7}$  etc.

Hac arte comparari possunt eiusdem figurae series quadratrices diversae, prout scilicet instituitur divisio diverso modo. Deinde methodo geometrica cum figurae diversae  
ex se invicem pendeant hinc rursus multae series quadratrices diversae inter se conferri  
possunt.

Notabile est hoc loco theorema:  $y^3 + y^2 + y + 1$ . ducta in  $y - 1$ , dant  $y^4 - 1$ .

Unde patet momentum eiusmodi figurae cuius ordinata  $y^3 + y^2 + y + 1$ . absolute  
haberi posse ex axe aequilibrii transeunte per punctum quod sit infra punctum a quo  
incipit  $y$ , recta constante.

#### 7 Nebenrechnung:

$$\frac{1-y^4}{1-y} \sqcap \frac{-y^3+y^3}{y-1} \quad \frac{-y^2+y^2}{y-1} \\ \frac{y^4-1}{y-1} \quad \frac{y^3-1}{y-1} \quad \frac{y^2-1}{y-1} \quad \frac{y-1}{y-1}$$

1 fiet (1): dimidium huius seriei (2) haec  $L$       15 ex (1) puncto quod (2) axe  $L$       15 punctum  
(1) verticis recta (2) quod  $L$

13 theorema: Sluse gibt eine allgemeine Formulierung und das Beispiel  $(y^3 - x^3) : (y - x) = y^2 + yx + x^2$  im Nachtrag zu seiner Tangentenregel, die Leibniz S. 415 Z. 26 erwähnt; s. *Philosophical Transactions* VIII Nr. 95 vom 23. Juli 1673 S. 6059.

Hinc, si ducatur idem in  $y$ ; fiet  $y^4 + y^3 + y^2 + y$ , cuius figurae solidae summa, differet a cylindro figurae  $y^3 + y^2 + y + 1$ . per cylindrum figurae  $y^4 - 1$ . sub recta constante quam appellamus 1. Cylinder autem figurae  $y^4 - 1$ . habetur absolute seu cubari potest. Ergo figura  $y^4 + y^3 + y^2 + y$ . pendet a figura  $y^3 + y^2 + y + 1$ . adeoque a figura  $y^3 + y^2$ . Sed etsi haec iam tum habeantur haec tamen inquisitio ad alia quoque imo et ad ista de seriebus demonstranda, in numeris quoque utilis esse potest.

Porro si series ipsarum ♀ C.D.E.F. ducatur in 1.3.5.7. fiet:  $\frac{1}{3,4} \quad \frac{1}{7,8} \quad \frac{1}{11,12}$  [etc.]

Quorum duorum momentorum  $\frac{1}{6} \quad \frac{1}{42} \quad \frac{1}{[110]}$  etc. et  $\frac{1}{12} \quad \frac{1}{56} \quad \frac{1}{132}$  [etc.] differentia

aequatur cylindro seriei. At eorundem summa aequatur seriei  $\frac{1}{2,3} \quad \frac{1}{3,4} \quad \frac{1}{6,7} \quad \frac{1}{7,8}$

<sup>10</sup>  $\frac{1}{10,11} \quad \frac{1}{11,12}$  [etc.]

Differentia autem inter summam et differentiam aequatur duplo minoris, et summa summae et differentiae aequatur duplo maioris.

Quod si interstitiola inter CD, DE, non tantum in 2, sed in 4 partes subdividantur, ut una partium v. g. sit BM vel NA, ponderando ab N, ex serie ♀ fiet aliud momentum

<sup>15</sup> nempe  $\frac{1}{[1 \hat{\wedge} 2]} \quad \frac{1}{3 \hat{\wedge} 4} \quad \frac{1}{5 \hat{\wedge} 6}$  [etc.] quod rursus a prioribus cylindro figurae certo modo sumto differt. Omnium serierum, quae in distantias ab aequilibrii axe ductae summarri possunt, etiam series summatrices summarri possunt.

$\frac{1}{1} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{9} \quad \frac{1}{16}$  etc. Habentur autem  $\frac{1}{4-1} \quad \frac{1}{9-1} \quad \frac{1}{16-1}$ . Unde summa harum:  
 $\frac{4}{4-1} \quad \frac{9}{9-1} \quad \frac{16}{16-1}$ . Habentur  $\frac{4+1}{4-1} \sqcap^{2+1}$  [bricht ab]

11f. Nebenrechnungen:  $-a + b + b + a$   
 $a + b - b + a$

1 si (1) recta alia suma (2) ducatur L 1 solidae erg. L 2 a (1) summa (2) cylindro L

7-15 etc. erg. Hrsg. viermal 8 99 L ändert Hrsg. 9 seriei (1) supra expositae ♀  $\frac{1}{1,2} \quad \frac{1}{3,4}$

(2)  $\frac{1}{2,3} L$  13 tantum in (1) 4, sed in 8 (2) 2, L 15 2  $\hat{\wedge}$  3 L ändert Hrsg. 16 differt. (1)

Quandocunque (2) Omnium L 16 ductae (1) quadrari (2) summarri L

## 383. DE SERIERUM SUMMIS ET DE QUADRATURIS PARS SECUNDA

**Überlieferung:** *L* Konzept: LH 35 V 4 Bl. 4–5. 1 Bog. 2<sup>o</sup>. 4 S. Datum u. Überschrift auf Bl. 4 r<sup>o</sup> oben ergänzt.  
Cc 2, Nr. 775 A tlw.

Octob. 1674.

5

De serierum summis et seriebus quadraticibus, pars 2<sup>da</sup>.

Urgenda sunt quae de seriebus summandis, et figuris ea ratione quadrandis, a me dicta sunt.

Habetur series ista:

$$(1) \quad \frac{1}{4-1} \quad \frac{1}{9-1} \quad \frac{1}{16-1} \quad \frac{1}{25-1} \quad [\text{etc.}] \quad 10$$

ut alibi a me demonstratum est.

$$\text{Auferatur, a } (2) \quad \frac{4}{4-1} \quad \frac{9}{9-1} \quad \frac{16}{16-1} \quad \frac{25}{25-1} \quad [\text{etc.}]$$

restabit:  $1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad [\text{etc.}]$

Hinc in terminis finitis, saltem facile ope seriei 1, habetur series 2.

Addantur series 1, et 2, fiet:

$$(3) \quad \frac{4+1}{4-1} \quad \frac{9+1}{9-1} \quad \frac{16+1}{16-1} \quad \frac{25+1}{25-1} \quad \text{etc.}$$

Auferatur adhuc alia series

$$(4) \quad \frac{4}{4-1} \quad \frac{6}{9-1} \quad \frac{8}{16-1} \quad \frac{10}{25-1} \quad \text{etc.}$$

fiet:  $(5) \quad \frac{4-4+1}{4-1} \quad \frac{9-6+1}{9-1} \quad \frac{16-8+1}{16-1} \quad \frac{25-10+1}{25-1} \quad [\text{etc.}]$

et dividi poterunt omnes per

$$(6) \quad 2-1 \quad 3-1 \quad 4-1 \quad 5-1 \quad [\text{etc.}]$$

15

10–394,6 etc. erg. Hrsg. siebenmal 11 f. est. (1) Habetur (2) Auferatur *L* 12 f.  $\frac{25}{25-1}$

| restabit: streicht Hrsg. | restabit *L* 16 f. etc. (1) sive (2) sive divisis omnibus per 2 – 1 fiet (3) addatur (4) Auferatur *L* 18 f. etc. (1) Cuius seriei ut obiter dicam habetur summa, quia pendet a (2) fiet *L*

11 alibi: N. 15 S. 180 Z. 6 – S. 181 Z. 8; vgl. *LQK* prop. XLI S. 88.

fietque series ab unitatibus harmonicae differens

$$(7) \quad \frac{2-1}{2+1} \quad \frac{3-1}{3+1} \quad \frac{4-1}{4+1} \quad \frac{5-1}{5+1} \quad \text{etc.}$$

Si addas seriem 4, fiet:

$$(8) \quad \frac{4+4+1}{4-1} \quad \frac{9+6+1}{9-1} \quad \frac{16+8+1}{16-1} \quad \frac{25+10+1}{25-1} \quad [\text{etc.}]$$

5 et divisis omnibus per

$$(9) \quad \frac{2+1}{2-1} \quad \frac{3+1}{3-1} \quad \frac{4+1}{4-1} \quad \frac{5+1}{5-1} \quad [\text{etc.}]$$

fiet series etiam ex harmonica pendens

$$\frac{2+1}{2-1} \quad \frac{3+1}{3-1} \quad \frac{4+1}{4-1} \quad \frac{5+1}{5-1} \quad \text{etc.}$$

Momentum seriei  $\frac{y^2+1}{y^2-1}$  seu series ducta in  $y-1$  dat  $\frac{y^2+1}{y+1}$ , quae pendet ex serie

10 harmonica, nam  $\frac{y^2+1+2y}{y+1} \sqcap y+1$ . Unde patet si seriei  $\frac{y^2+1}{y+1}$  addatur series ex harmonica pendens:  $\frac{2y}{y+1}$  fieri seriem finite summabilem.

Momentum eiusdem seriei seu  $\frac{y^2+1}{y^2-1}$  ductum in  $y+1$ , est  $\frac{y^2+1}{y-1}$ , differentia autem inter:  $\frac{y^2+1}{y+1}$  et  $\frac{y^2+1}{y-1}$  erit  $\frac{y^2+1}{y-1} - \frac{y^2+1}{y+1}$ , seu  $\frac{y^3+y^2+y+1-y^3-y^2-y+1}{y^2-1}$  seu  $\frac{2y^2+2}{y^2-1}$ .

13 Nebenrechnung:

$$\begin{array}{r} y^2 + 1 \\ y - 1 \\ \hline y^3 + y - y^2 - 1 \end{array}$$

1 series (1) harmonica (2) ab  $L$  8 f. etc. (1) Si a serie 4. dimidiata auferas seriem 1. duplicatam, fiet series harmonica pura, seu naturalis. Nam  $\frac{2}{4-1} - \frac{1}{4-1}$  (2) Momentum  $L$  9 seu series erg.  $L$

12  $y+1$ , (1) dat  $y$  (2) est  $L$

Sed hinc video ex ipso semper in his calculo patere, quod differentia momentorum aequetur [cylindro] seriei, nec proinde quicquam inde magnopere duci posse.

$\frac{y^2 - 1}{y^2 - 1} \sqcap 1$ . Habetur  $\frac{1}{y^2 - 1}$  ergo et habetur  $\frac{y^2}{y^2 - 1}$ . Ad  $\frac{y^2}{y^2 - 1}$  cognitam addatur  $\frac{y}{y^2 - 1}$ , fiet:  $\frac{y^2 + y}{y^2 - 1} \sqcap \frac{y}{y[-]1}$ . Ergo si inveniatur  $\frac{y}{y^2 - 1}$ , invenietur et series harmonica. Hinc patet  $\frac{y}{y^2 - 1}$  pendere ex serie harmonica.

5

$\frac{1}{z^2 + 2z}$ , est series quadratorum unitate diminutorum ponendo  $y \sqcap z + 1$ , cuius seriei manifestum est haberi summam, cum sit triangularis.

Iam pro  $\frac{y}{y^2 - 1}$  faciamus  $\frac{z + 1}{z^2 + 2z}$ . Patet in duas dissolvi series,  $\frac{1}{z + 2}$ , et  $\frac{1}{z^2 + 2z}$ , ex quibus posterioris habetur summa, prior est harmonica.

$$\frac{1}{a+z} \quad \frac{1}{a+2z} \quad \frac{1}{a+3z} \quad \frac{1}{a+4z} \quad \frac{1}{a+5z}.$$

10

$$\frac{1}{z} [-] \frac{1}{z+1} \sqcap \frac{z+1-z}{z^2+z} \sqcap \frac{1}{z^2+z}. Ducantur differentiae in  $z$  fiet: [bricht ab]$$

1 in his erg.  $L$       2 cylindro erg. Hrsg.      2f. posse. (1) Sed hoc notabile est, quod diff (2)


$\frac{y^2 - 1}{y^2 - 1} L$       3  $\frac{y^2}{y^2 - 1}$ . (1) Si (a) a serie  $\frac{y^2 + 2y + 1}{y + 1}$ , auferatur (b) seriei  $\frac{y^2 + 2y + 1}{y + 1}$ , addatur  $\frac{-4y}{y + 1}$

fiet: (2) Ad  $\frac{y^2}{y - 1}$  | cognitam erg. | addatur  $L$       4 +  $L$  ändert Hrsg.      4f. harmonica. (1) Sed

$\frac{y}{y + 1} \hat{\wedge} y - 1 \sqcap y$  (2) Quaerendae sunt duae quantitates b et c, ita ut b,  $\hat{\wedge} y + 1, -, c \hat{\wedge} y - 1 \sqcap y$

(3) Hinc  $L$       9f. harmonica. (1)  $\frac{1}{z + 1} \quad \frac{1}{z + 2} \quad \frac{1}{z + 3} \quad \frac{1}{z + 4}$  (2)  $\frac{1}{a + z} L$       11 – erg. Hrsg.

11 differentiae erg.  $L$       11 z | vel in  $z + 1$  gestr. | fiet:  $L$



[Fig. 1]

Notabile est in serie harmonica, quod altitudo  $HC$  in diff.  $\beta$  in  $C\beta$  in  $\beta$  seu in 1.

$$\text{Ergo } HC \sqcap \frac{C\beta - 1}{\beta}.$$

Datur momentum seriei harmonicae ex vertice; quod si iam et quadrata terminorum

5 huius seriei dentur  $\frac{1}{1}, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}, \frac{1}{25}$  dabitur centrum gravitatis cuiusdam portionis.


Semiquadrata abscissarum ducta in differentias aequantur figurae momento ex vertice. Momentum autem seriei harmonicae ex  $A$ , est rectangulum: semiquadrata abscissa-

2 altitudo erg.  $L$     2 diff. erg.  $L$     3 f.  $\frac{C\beta - 1}{\beta}$ . (1) Datur autem summa omnium  $HC$ , ergo et omnium  $\frac{1}{z}$  divisorum per  $\frac{1}{z^2 + z}$  (2) Datur  $L$     4 vertice; (1) datur et (2) quod  $L$

2 diff.  $\beta$ : Leibniz bezeichnet mit diff.  $\beta$  die Ordinatendifferenz, anschließend mit  $\beta = 1$  die Abszisdifferenz.

rum sunt  $\frac{y^2}{2}$  fiet:  $\frac{y^2}{2} \sim \frac{1}{y^2 + y}$  sive  $\frac{y}{2y + [2]}$ . Quorum haberi potest summa. Eodem modo abscissae ductae in ordinatas [et differentias] aequantur ordinatarum semiquadratis.

Sed ne erremus in duabus istis regulis sane maximi momenti ad sequentia futuris.



[Fig. 2]

In figura hic exposita patet

5

- (1) momentum seriei ex vertice  $AE$ , aequari summae ordinatarum  $bc$ , in unitatem  $cd$ , et distantiam a vertice  $AE$ , seu abscissam ductarum.
- (2) Patet etiam momentum seriei ex axe  $AF$  aequari summae ipsarum  $bc$ , semiquadratorum in unitatem  $cd$  ductorum. Iam ex punctis  $c$ , ducantur in axem  $AE$ , aliae rectae  $cf$  punctis designatae. Unde patet

10

---

4 Unter Fig. 2: NB. In hac figura utile est fingi  $AE \sqcap cd$ , seu unitati.

1 1  $L$  ändert Hrsg. 2 in (1) ordinatarum differentias aequantur (2) unitatem (3) ordinatas | et differentias erg. Hrsg. | aequantur  $L$  8 ex (1) vertice (2) axe  $L$  8 summae erg.  $L$

- (3<sup>to</sup>) momentum seriei ex vertice, aequari summae solidorum quae fiunt ex semiquadratis abscissarum  $cf \sqcap bA$  in differentias ordinatarum  $cd$  ductis. Patet et  
 (4<sup>to</sup>) momentum seriei ex axe, aequari summae solidorum, quae fiunt ex ordinatis, abscissis, et differentiis ordinatarum.

5 Sed video adhuc aliquid subesse difficultatis. Sume rectangulum  $LGHM$ . Eius momentum ex ipsa  $LM$ , est eius dimidium prisma, seu  $LGHM$ , ductum in dimidiā unitatem, seu posita unitate  $\sqcap b$ . et  $GH \sqcap x$ . erit  $\frac{xb^2}{2}$ . Ergo momentum eius ex  $AE$ , erit  $Ab$  abscissa, in ipsum rectangulum ducta, ipsa  $\frac{xb^2}{2}$  [minuta]: seu  $yxb - \frac{xb^2}{2}$ , seu  $y - \frac{b}{2}$  in  $xb$ .

Ergo

- 10 (1) momentum seriei ex vertice componitur solidis ex rectangulo unitatis seu differentiae abscissarum et ordinatae ducto [in] abscissam dimidia unitate seu dimidia abscissarum differentia minutam.  
 Et pari iure  
 (2) momentum seriei ex axe, componitur solidis ex rectangulo differentiae ordinatarum et abscissae ducto in ordinatam dimidia ordinatarum differentia minutam. Deinde  
 15 (3) momentum seriei ex axe componitur solidis ex semiquadratis ordinatarum, in unitatem seu differentiam abscissarum. Et pari iure  
 (4) momentum seriei ex vertice, componitur solidis ex semiquadratis abscissarum in differentiam ordinatarum. Ergo  
 20 (5) summa solidorum quae fiunt ex rectangulis sub unitate seu differentia abscissarum et ordinata; in abscissam dimidia unitate minutam ductis aequatur summae solidorum quae fiunt ex semiquadratis abscissarum in differentias ordinatarum.

1 summae erg.  $L$     3 axe, (1) fieri ex (a) du (b) solidis (2) aequari  $L$     8  $\frac{xb^2}{2}$  | aucta ändert  
*Hrsg.* |: (1) seu  $yxb + \frac{xb^2}{2}$ , seu  $y + \frac{b}{2}$  (2) seu  $L$     10 vertice | (1) demta sequenti ordinata (2) demto  
 rectangulo sequentis ordinatae in praesentem abscissam erg. u. gestr. | (a) est (aa) rect (bb) solidum ex  
 rectangulis (b) componitur  $L$     10f. seu differentiae abscissarum erg.  $L$     11 ordinatae (1) ducta in  
 dimidium (2) ducto | in erg. *Hrsg.* | abscissam  $L$     12 differentia (1) auctam (2) minutam.    14 axe,  
 (1) est solidum ex rectangulis et differentiae ordinatarum et abscissae ductum (2) componitur  $L$   
 15 differentia (1) auctam (2) minutam  $L$     16 axe (1) est solidum (2) componitur  $L$     18 vertice, (1)  
 est solidum ex semiquadratis ordinata (2) componitur  $L$     20 (5) (1) solidum ex rectangulo unitatis  
 seu differentiae (2) summa  $L$     21 unitate (1) auctam (2) minutam  $L$

- (6) Summa solidorum quae fiunt ex rectangulis sub differentia ordinatarum et abscissa, in ordinatam dimidia ordinatarum differentia minutam; aequatur summae solidorum quae fiunt ex semiquadratis ordinatarum in unitates seu differentias abscissarum.
- (7) Summa rectangulorum sub abscissis et differentiis ordinatarum, aequatur summae rectangulorum sub ordinatis et unitatibus vel differentiis abscissarum sive aequatur summae seriei. 5

Series numerorum figuris geometriae in eo sunt intractabiles, quod in numeris non licet mutare abscissam in ordinatam et viceversa; nec alium pro alio axem sumere, saltem regulariter.

Esto iam e.g.  $AG \sqcap y$ , et  $GH \sqcap \frac{1}{y}$  et ita de caeteris. Differentia ordinatarum 10  
 erit  $\frac{1}{y} - \frac{1}{y+1} \sqcap \frac{1}{y^2+y}$ . Momentum seriei ex axe, erit summa omnium  $\frac{1}{2y^2}$ ; quae ae-  
 quabitur summae omnium:  $y, \frac{1}{y^2+y}, \frac{1}{y} - \frac{1}{2y^2+2y}$ , fiet:  $\frac{1}{y+1} - \frac{1}{y} - \frac{1}{2y^2+2y} \sqcap$   
 $\frac{2y(+2-1)+1}{2y^2+2y} \sim \frac{1}{y+1} \sqcap \frac{y}{2y^2+2y} - \frac{1}{y+1} + \frac{1}{2y^2+2y} \sqcap \frac{1}{2y^2+4y+2} + \frac{1}{2y^2+2y}$ .  
 Quorum summa aequari debet summae omnium  $\frac{1}{2y^2}$ .

Sed iam video aliquid ad nostras regulas addendum esse; nimis differentiarum 15  
 ordinatarum summae.

Imo video duas priores, et per consequens et 5<sup>ta</sup> 6<sup>ta</sup> plane vacillare. Videamus tamen: Manifestum est momentum rectanguli  $LAE$  esse ipsum rectangulum ductum in abscissam, 1, dimidiata. Et momentum rectanguli  $GLM$  ex  $AE$ , esse rectangulum

2 differentia (1) auctam (2) minutam  $L = 4$  (7) (1) Abscissae in differentias ordinatarum, (2) Summa  $L = 5-7$  aequatur (1) portioni fig (2) summae seriei. (a) Nota: in seriebus (b) Series  $L = 7$  in numeris erg.  $L = 8$  sumere, (1) nisi qui sit dato parallelus (2) saltem  $L = 10$  f. caeteris. | Differentia (1) abscissarum (2) ordinatarum, erit  $\frac{1}{y} - \frac{1}{y+1} \sqcap \frac{1}{y^2+y}$ . erg. | Momentum (a) figurae (b) seriei  $L = 12$  summae (1) horum solidorum, x  $\hat{\wedge}$  (2) omnium:  $L = 15 \frac{1}{2y^2}$ . (1) Proba quaedam veritatis ita statim haberi potest, si duo prima absolute aequentur. Quod cum non fiat, patet errorem esse in regulis, qui sic corrigetur. Si primum momentum  $\frac{1}{y^2}$ , aequetur (2) Sed  $L$

17 Imo video: vgl. aber unten S. 400 Z. 13.

*GLM*, ductum in rectam *AL*, abscissam suam unitate minutam, et praeterea ipsum rectangulum in dimidiā unitatem ductum. Appellando ergo abscissam *y*, ordinatam *x*, fiet:  $xb, \wedge y - b, , + \frac{b^2x}{2} \sqcap xyb - \frac{b^2x}{2}$ . Ita momentum figurae *ALGHME* est  $\frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{4} \sqcap \frac{5}{4}$  ex aequilibrii axe scilicet *AE*.

5 Item momentum, rectanguli *LE*, ex *AE*, librati, fit etiam ex differentia ordinatarum *e* hoc loco  $\frac{1}{2}$ , [ducta] in semiquadratum abscissae *AL*  $\sqcap y, \frac{y^2}{2}$ , fit  $\frac{y^2}{4}$  addito praeterea eodem semiquadrato *AL* in minimam ordinatarum *LM* ducto.

Si spatium propositum sit, brevius: abscissae semiquadratum ducitur in differentias ordinatarum, et si nulla sequitur, in minimam ordinatam, quia enim nulla sequitur[,], ipsa 10 differentia est inter se ipsam et nihil, quod sequitur. Hinc *ALGHME* momentum fit ex  $MN \sqcap \frac{1}{2} \text{ in } \frac{b^2}{2} \sqcap \frac{1}{2}$  seu  $\frac{1}{4}$ ; et praeterea  $GH \sqcap \frac{1}{2}$ , ducta in 2, semiquadratum ipsius *AG* quod est  $\frac{1}{2}$ , unde 2 in  $\frac{1}{2}$  dat 1[,], fit ergo  $\frac{1}{4} + 1$ . seu  $\frac{5}{4}$ . ut ante.

Regulae ergo 6 superiores verae sunt absolute, nec opus habent correctione modo illud intelligatur; ultimam ex differentiis ordinatarum, esse ipsam ordinatam ultimam, 15 minimam, si a vertice decrescit, aut maximam si crescit. Eodem modo inter differentias abscissarum, ultra unitates esse abscissam primam, quae scilicet revera est unitas, ut *Ed*, quando ad axem aequilibrii assurgit figura. Itaque in semiquadratis ordinatarum haec nihil turbant.

Illud tantum notandum est, quod dixi differentiis ordinatarum connumerandam esse 20 ultimam ordinatam, id verum esse simpliciter non tantum de earum semiquadratis.

Nunc calculum resumamus: Momentum figurae nostrae ex axe, est  $\frac{1}{2y^2}$ , summa scilicet semiquadratorum ordinatarum. Quod aequatur summae horum:

2 ergo (1) ordinatam *y*, abscissam (2) abscissam *L*      4 ex (1) axe rect (2) aequilibrii *L*  
 5 momentum, (1) fit ex semiquadrato abscissae ducto (2) rectanguli *L*      5f. differentia (1)  
 abscissarum (2) ordinatarum *L*      6 ductam *L ändert Hrsg.*      14 ultimam, erg. *L*  
 15 modo (1) ultimam ex differentiis (2) inter *L*      16 abscissam (1) minimam uni (2) primam, *L*  
 17 quando (1) ad verticem sci (2) ad *L*      18f. turbant. (1) His ita positis resumendus est calculus,  
 nempe in casu nostro, momentum figurae ex axe, est summa omnium  $\frac{1}{2y^2}$ . seu semiquadratorum in  
 unitatem: Idem vero momentum etiam est summa (2) Illud *L*      20 ordinatam erg. *L*

$\left[ \frac{1}{y} - \frac{1}{y+1} \right] \frac{1}{y^2+y}$ ,  $\sim y$ ,  $\sim \frac{1}{y} - \frac{1}{2y^2+2y}$ , sive  $\frac{1}{y^2+y}$ ,  $\sim \frac{1}{1} - \frac{1}{2y+2}$ . Iam  $1 - \frac{1}{2y+2} \sqcap$   
 $\frac{2y+2-1}{2y+2} \sqcap \frac{2y+1}{2y+2}$ , fiet,  $\frac{1}{y^2+y}$ ,  $\sim \frac{2y+1}{2y+2}$ , sive  $\left[ \frac{1}{y^2+y} \sim \frac{y}{2y+2} \right] \frac{1}{2y^2+4y+2}$ , +  
 $\frac{1}{y^2+y} \sim \frac{y+1}{2y+2}$ , sive denique  $\frac{1}{y+1, \square, \sim 2} + \frac{1}{y^2+y, \sim 2}$ .  
Quod si ergo summae omnium  $\frac{1}{y+1, \square, \sim 2} + \frac{1}{y^2+y, \sim 2}$  addatur novissimae ordinatae  $\frac{1}{y}$  semiquadratum  $\frac{1}{2y^2}$  in novissimam abscissam ductum, seu  $\frac{1}{2y}$  habebitur quantitas 5  
aequalis summae omnium  $\frac{1}{2y^2}$ . Quod si verum est dabitur modus inveniendi summam fractionum quadraticarum, etiam infinitarum.

Sumamus:  $\underbrace{\frac{1}{1} \frac{1}{4} \frac{1}{9} \frac{1}{16}}_{820},$  quorum dimidium  $\frac{410}{576}$ , sed relinquamus totum.

8–402,3 Nebenrechnungen:

$$\begin{array}{r}
16 \quad 16 \quad 16 \quad 9 \quad & 576 \quad 144 \\
9 \quad 9 \quad 4 \quad 4 & 144 \quad 64 \\
\hline 144 \quad 144 \quad 64 \quad 36 & 64 \quad 36 \\
4 \quad 1 \quad 1 \quad 1 & 36 \quad \overline{244} \\
\hline 576 \quad 144 \quad 64 \quad 36 & 820 \\
820 & \overline{244} \\
\hline 576 \sqcap 1 + \frac{244}{576} & \\
& \frac{2}{\cancel{100}} \quad \frac{2}{\cancel{1525}} \quad \frac{2}{\cancel{14400}} \quad \frac{2}{\cancel{3600}} \\
4) \quad \cancel{444} & \quad \cancel{144} & \quad \cancel{44} \\
& \hline & 1669
\end{array}$$

5 semiquadratum (1) in (a) diff (b) abscissam novi (2)  $\frac{1}{2y^2} L$  5 habebitur (1) series (2) sum  
(3) quantitas  $L$

6 dabitur: Die Folgerung ist nicht richtig.

Iam et summam ineamus omnium  $\frac{1}{[y] + 1, \square}$ , seu  $\frac{1}{4} \frac{1}{9} \frac{1}{16} \frac{1}{25}$ .  
 $\frac{244}{576} \overbrace{\frac{61}{144}}^4$ , addatur  $\frac{1}{25}$ , fiet:  $\frac{25 \cdot 61 + 144}{144 \cdot 25} \sqcap \frac{1669}{3600}$  addantur  $\frac{1}{y^2 + y}$  seu  $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12}$   
 $+ \frac{1}{20}$  id est differentia inter 1 et  $\frac{1}{5} \sqcap \frac{4}{5}$ .

---

2 Nebenrechnungen zur Stufe (1) der Lesart, gestrichen:

$$\begin{array}{cccccc} 2 & 5 & 2 & 2 & 2 & 850 \\ 5 & 10 & 10 & 5 & 5 & 340 \\ \hline 10 & 50 & 20 & 10 & 10 & 170 \\ 10 & 17 & 17 & 17 & 100 & 100 \\ \hline 100 & 850 & 340 & 170 & & 1460 \\ & & & & & \\ & 17 & & & & \\ & \hline & 1700 & & & \end{array}$$

2 f. Nebenbetrachtung, gestrichen:  $\frac{1}{y} - \frac{1}{y+1} \sqcap \frac{y+1-y}{y^2+y}$

$$\begin{array}{ccccc} \frac{1}{1} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \\ & & & & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & \frac{1}{12} & \frac{1}{20} & \\ & & & & \\ 1 & 3 & 6 & 10 & 15 \\ 1 & 4 & 10 & 20 & 35 \end{array}$$

1  $y^2 L$  ändert Hrsg.  $2 \frac{1}{2} + (1) \frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{17}$ . Ergo  $\frac{1669}{3600} + \frac{1460}{1700} \sqcap \frac{820}{1700}$  (2) Hinc addatur novissimae  $\frac{1}{4}$  quadratum  $\frac{1}{16}$  in novissimam abscissam (3)  $\frac{1}{6} L$

---

1+3 seu  $\frac{1}{4} \frac{1}{9} \frac{1}{16} \frac{1}{25}$ : Leibniz summiert mit  $\frac{1}{25}$  und im folgenden mit  $\frac{1}{20}$  jeweils einen Term zuviel auf und verfehlt dadurch die Verifikation; er erkennt die Fehlerhaftigkeit der Rechnung, klärt aber die Ursache nicht.

Denique addatur novissimae ordinatae  $\frac{1}{4}$ , quadratum  $\frac{1}{16}$  in novissimam abscissam 4, ductum, fiet  $\frac{1}{4} \sqcap \frac{900}{3600}$ , fiet  $\frac{2569}{3600}$ .

Error in calculo haud dubie. Sed nihil ista inquisitio ad rem pertinet, quia nihil contribuit ad summas quadratorum.

$$\frac{1}{y+1} \sqcap \frac{1}{y} - \frac{1}{y^2} + \frac{1}{y^3} - \frac{1}{y^4} + \frac{1}{y^5}.$$

5

Methodus ista Mercatoris ad summas numerorum non aequa facile ac ad summas linearum accommodari potest.

$$\frac{y}{1+y} \sqcap + y - \left[ y^2 + y^3 - y^4 + \frac{y^5}{1+y} \right].$$

Si subtractiones et additiones alternae continuuntur in infinitum, et  $y$  sit numerus, patet duarum infinitarum serierum differentiae dari posse numerum fractum aequalem si

10

$y$  sit fractio ut  $\frac{\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}}$   $\sqcap \frac{1}{2}$  [– etc.], idem intelligi potest, et series quaelibet tam affirmativa

quam negativa erit decrescens.

$$8 y^3 + y^4 - y^5 + \frac{y^6}{1+y} L ändert Hrsg. \quad 11 - \text{etc. erg. Hrsg.}$$

6 Mercatoris: *Logarithmotechnia*, 1668, prop. XIV – XVII S. 28–33 [Marg.].


## 384. DE SERIERUM SUMMIS ET DE QUADRATURIS PARS TERTIA

**Überlieferung:** L Konzept: LH 35 V 4 Bl. 6–7. 1 Bog. 2°. 3 S. — Auf Bl. 7 v° verworfene Nebenbetrachtung zu N. 385.  
Cc 2, Nr. 775 A tlw.

5 Octob. 1674

Pars 3<sup>tia</sup> schediasmatis de summis serierum.

Videndum est an quaedam transformationes geometricae applicari possint seriebus numerorum, praeter centrobarycas iam explicatas.



[Fig. 1]

10 Exposita serie instar figurae iungantur puncta extremitatum, ductis quasi quibusdam tangentibus seu polygoni lateribus. Ordinatae  $bc_{[,]}$  differentiae earum  $cd$ , latera polygoni

dd. Ducantur perpendiculares ut  $GH$ , dum axi  $AF$  producto si opus occurrat in  $G$ . Cum  $GHN$  sit rectus, erit triangulum  $GLH$  simile  $\nabla^{\text{lo}} NMH$ , nam recta  $MP$  ipsi  $GH$  parallelia. Ergo angulus  $M$  aequalis angulo  $G$ , ergo et angulus  $MHN$  aequalis angulo  $LHG$ .

Hinc  $\frac{LH}{GL} \sqcap \frac{MH}{MN}$ . Ergo  $LH \wedge MN \sqcap GL \wedge MH$ . Sed  $LH$  perpetuo differentiis ordinatarum ut  $MN$ , in axe ut  $EQ$  sumtis applicatae dant triangulum rectangulum semiquadratum quale est  $AER$ . Unde summa omnium  $LH \wedge MN$  aequatur semiquadrato maxima  $LH$ , modo inde summa omnium semiquadratillorum ipsarum  $TS \sqcap SR \sqcap MN$  auferatur. Quare semper haberi poterit summa omnium  $GL$ , modo et quadrata differentiarum seriei datae haberi possint.

Sumamus exemplum in quo quadrata differentiarum habentur. Sit figura proposita trilineum concavum parabolicum arithmeticum, quod procedit, ut quadrata, differentiae procedunt ut triangula, seu ut numeri impares, horum ergo quadratorum haberi poterit summa. Ordinatae v. g.  $y^2$ , differentiae duarum ordinatarum  $\boxed{y^2} + 2y + 1 \boxed{-y^2}$  unde series differentiarum  $2y + 1$ . Iam  $GL \sqcap \frac{LH \wedge MN}{1} \sqcap 2y + 1, \wedge y^2$ . Horum ergo habetur summa.

In serie harmonica differentiae  $\frac{1}{y^2 + y}$ , ducantur in  $\frac{1}{y}$  fiet:  $\frac{1}{y^3 + y^2}$ , cuius quantitatis summa pendet a quadratis triangularium. Unde patet, si hinc summae ipsarum  $GL \wedge MH$ , illinc seriei ipsarum  $LH \wedge MN$ , addantur semiquadratilla differentiarum, fieri ex his triangulum, ex illis seriem absolute triangulo aequali. Ideoque regulam generalem hanc

5  $GL \wedge MH$ . (1) Hinc summa (2) Sed  $L = 7$  omnium (1)  $GL \wedge MH$ , (2)  $LH \wedge MN$  aequatur (a) rectangu (b) triangu (c) semiquadrato  $L = 18$  triangularium. (1) Et summa (2) Unde  $L = 20$  illis (1) quantitatem (2) seriem  $L$

---

20 regulam generalem: Der folgende Satz entspricht der Formel  $\sum_{i=0}^{n-1} x_i(x_{i+1} - x_i) + \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{2}(x_{i+1} - x_i)^2 = \frac{1}{2}(x_n^2 - x_0^2)$ . Leibniz setzt stillschweigend den Anfangswert  $x_0 = 0$  voraus. In den anschließenden Beispielrechnungen übersieht er, daß bei der Differenzenbildung auf Vorzeichen zu achten ist; weitere Flüchtigkeitsfehler beeinträchtigen die Überlegungen bis S. 406 Z. 14. In N. 387 S. 438 Z. 9 nimmt Leibniz die Betrachtung wieder auf.

condere possum. In qualibet serie si differentiae terminorum in ipsos terminos respondentes ducantur factis addantur differentiarum semi quadrata; summa omnium erit aequalis termini maximi semi quadrato.

5 Ideo haec series  $\frac{1}{y^3 + y^2} + \frac{1}{y^4 + 2y^3 + y^2} + \frac{1}{2b^2}$  ponendo  $b$  esse maximam  $y$  seu  $\frac{y^2 + y + y}{y^5 + 2y^4 + y^3} + \frac{y + 2}{y^4 + 2y^3 + y^2}$  cuius seriei habetur summa. Tractabiliores hoc casu series erunt si pro  $\frac{1}{y^2 + y}$  sumatur  $\frac{1}{y^2 - y}$ .

Ex hac regula et haec sequitur pari iure:

Si unitates in abscissas respondentes ducantur factis addantur unitatum semiquadrata; summa omnium erit aequalis abscissae maximae semiquadrato.

Sed hoc dudum notum per se.

Si faciamus  $\frac{1}{y-1} - \frac{1}{y}$ , fiet:  $\frac{\boxed{y-y} + 1}{y^2 - y}$ , ducatur in  $\frac{1}{y-1}$  fiet:  $\frac{1}{y^2 - 2y + 1, \wedge y}$ , ad datur  $\frac{1}{y^2 - 2y + 1, \wedge y^2}$  fiet:  $\frac{y+1}{y^2 - 2y + 1, \wedge y^2}$ . Huius vel superioris seriei, quarum datur summa, figuratas geometricas quaeramus:  $\frac{2}{1\boxed{-2+2}, \wedge 1} + \frac{3}{\boxed{4-4} + 2, \wedge 2} + \frac{4}{\boxed{9-6} + 2, \wedge 3}$ .

15 Notandum hic ut obiter dicam, satis difficile fore propositam numerorum seriem: v. g. hoc loco  $\frac{2}{1} + \frac{3}{4} + \frac{4}{15}$  etc. revocare ad regulam seu aequationem. Esset haec quasi portio quaedam artis faciendi hypotheses sive artis decyphrandi.

Investigemus paulo accuratius quot modis fieri possit, ut seriei cuiusdam differentiae dent alias series.

20 Sit:  $\frac{y\veebar}{\veebar y} - \frac{y+1\veebar}{y+1\veebar}$ , unde  $\frac{y\veebar, \wedge y+1\veebar, \dots, -\dots, y\veebar, \wedge y+1\veebar}{\veebar y, \wedge y+1\veebar}$ .

6 summa (1) si ad  $\frac{y^2 + 2y}{y^5 + 2y^4 + y^3}$  adiecerissem (2). Tractabiliores  $L = 7f. \frac{1}{y^2 - y}$ . (1) Eodem modo si un (2) Ex  $L = 9$  ducantur (1) summae (2) factis  $L = 13f.$  datur (1) quadratura, (2) summa  $L = 17f.$  decyphrandi. (1) Nunc tantum dicam: (2) Investigemus  $L$

$\vee$  significat regulam qua  $y$  tractanda est,  $\wedge$  significat aliam regulam. Casus quosdam percurramus. Primus esto, cum nullus extat denominator, et fiet:  $y\vee - y + 1\wedge$ . Eo casu  $y\vee$  vel continet signa radicalia in quibus sit  $y$  vel [non] continet, si nulla contineat signa radicalia in quibus sit  $y$ , tunc etiam differentia non habebit incognitam neque in denominatore, neque in vinculo, atque ita differentia componetur ex meris paraboloidibus inter se compositis, quarum cum habebitur summa, non est ut huic casui immoremur; si radicem ingrediatur incognita et simplicem quidem v. g. si sit  $\sqrt{y\vee} - \sqrt{y + 1}, \vee \sqcap z$ . fiet:

5

$$y\vee - 2\sqrt{y\vee}, \sqrt{y + 1}, \vee + y + 1, \vee \sqcap z^2, \text{ sive } -2\sqrt{\dots} \sqcap z^2, -y\vee, -y + 1, \vee. \text{ Unde}$$

fiet:

$$4, \sqrt{y\vee} \sqrt{y + 1\vee} \sqcap z^4 - 2z^2y\vee - 2z^2 \sqrt{y + 1\vee} + y\vee^2 + 2y\vee, \sqrt{y + 1\vee} + y + 1, \vee^2.$$

Caeterum ut  $\vee$ , non nihilo distinctius explicetur, ponendum est notatos esse a nobis casus, quibus tractatio variat, ut cum  $y$  est in denominatore, et cum est in vinculo, caetera explicabuntur per expressas potestates, v. g.

15

$$ay^3 + by^2 + cy + d + n\sqrt{ey^3 + fy^2 + gy + h} + p\sqrt{ky^2 + ly + m} + q\sqrt{ry + s} \sqcap x.$$

Unde pro differentia ponendo  $y + \beta$  in locum  $y$  habetur differentia generalis, et nunc has nunc illas literas, ponendo aequales nihilo, aut datae quantitati, variae figurae aut series speciales habentur quarum data sit series; vel quadratura.

Sed ne prolixo nimis calculo nos induamus suffecerit neglectis caeteris, hanc sumi 20 seriem unius tantum irrationalis, et denominatore carentem nempe:

$$\left. \begin{array}{lllll} \boxed{-ay^3} & \boxed{-by^2} & \boxed{-cy} & \boxed{-d} & -n\sqrt{ey^3 + fy^2 + gy + h} \\ \boxed{+ay^3} & \boxed{+by^2} & \boxed{+cy} & \boxed{+d} & +n\sqrt{ey^3 + fy^2 + gy + h} \\ ..3ay^2\beta & +2b\beta y & +c\beta & & +3ey^2\beta + 2f\beta y + g\beta \\ ..3a\beta^2y & + b\beta^2 & & & 3ey\beta^2 + f\beta^2 \\ ..a\beta^3 & & & & e\beta^3 \end{array} \right\} \sqcap z. \quad 25$$

Hinc statim patet, universaliter verum esse in figuris geometricis, quod termini in quibus  $\beta$  assurgit ad quadratum et ultra reici possint: nam si dicas fieri posse, ut servari

3 non erg. Hrsg. 4 in ... y erg. L 13 nihilo (1) rectius (2) distinctius L 13 est (1) totos (2) notatum (3) notatos L 16 v. g. (1) omnia signa  $y^3 + (2) ay^3 L 24+27 \sqcap z$ . (1) Subscribamus denominatorem sed radice carentem: (2) Hinc L 28  $\beta$  (1) excedit (2) assurgit L

debeant  $\beta^2$ , quia omnes  $\beta$  simplices evanescant; respondeo tunc *a. b. c.* fore, quodlibet  $\sqcap 0$ . ergo et  $\beta^2$  et  $\beta^3$  evanescere. In seriebus autem arithmeticis servari debent. Nunc [ordinanda] aequatio est, ut tolli possint radices, sed antequam hoc faciamus, fingamus simplicioris calculi causa, primum *a. b.* esse nihil, fiet:

$$\begin{aligned}
 5 & \quad [n^2ey^3][+n^2fy^2][+n^2gy][+n^2h] + 2n^2ey^3 + 2n^2fy^2 + 2n^2gy + 2n^2h - z^2 \sqcap \\
 & \quad n^23ey^2\beta + n^2f\beta y + n^2g\beta + 2c\beta z \\
 & \quad n^23ey\beta^2 + n^2f\beta^2 - \beta^2c^2 \\
 & \quad n^2e\beta^3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 10 & \quad +2n^2\sqrt{[e^2y^6][efy^5][fey^5][f^2y^4][gey^4][gfy^3][hey^3][hfy^2]} \\
 & \quad [3e^2y^5\beta][2ef\beta y^4][3fey^4\beta][+2f^2\beta y^3][3gey^3\beta][2gf\beta y^2][3hey^2\beta][+2hf\beta y] \\
 & \quad [3e^2y^4\beta^2][ef\beta^2y^3][3fey^3\beta^2][+f^2\beta^2y^2][3gey^2\beta^2][gf\beta^2y][3hey\beta^2][+hf\beta^2] \\
 & \quad [e^2y^3\beta^3][egy^4][fe\beta^3y^2][fgy^3][gey\beta^3][g^2y^2][he\beta^3][+hgy] \\
 & \quad [eg\beta y^3][fg\beta y^2][g^2\beta y][ghy][hg\beta] \\
 & \quad [ehy^3][fh\beta y^2]
 \end{aligned}$$

15 Ergo quadrando prius aequationis latus, fiet:

2 f. debent. (1) Nunc ut per partes eamus (2) Nunc | ordinata ändert Hrsg. | (a) aequatione fiet:  
 (b) aequatio *L*

$4n^4e^2y^6$	$8n^4efy^5$	$8n^4egy^4$	$- 4n^2z^2ey^3$	$4n^4f^2y^4$	$8n^4fhy^2$
$12n^4e^2y^5\beta$	$12n^4efy^4\beta$	$12n^4egy^3\beta$	$- 6n^2z^2ey^2\beta$	$+8n^4f^2y^3\beta$	$8n^4fhy\beta$
$12n^4e^2y^4\beta^2$	$12n^4efy^3\beta^2$	$12n^4egy^2\beta^2$	$- 6n^2z^2ey\beta^2$	$4n^4f^2y^2\beta^2$	$\underline{\underline{4n^4fh\beta^2}}$
$4n^4e^2y^3\beta^3$	$4n^4efy^2\beta^3$	$4n^4egy\beta^3$	$- 2n^2z^2e\beta^3$	$4n^4f^2y^2\beta^2$	$-4n^2fy^2z^2$
$9n^4e^2y^4\beta^2$	$8n^4efy^4\beta$	$4n^4egy^3\beta$	$+ 8n^2cey^3z\beta$	$4n^2f^2y\beta^3$	$-4n^2fyz^2\beta$
$18n^4e^2y^3\beta^3$	$8[12]n^4efy^3\beta^2$	$6n^4egy^2\beta^2$	$+12n^2cey^2z\beta^2$	$n^4f^2\beta^4$	$-2n^2fz^2\beta^2$
$6n^4e^2y^2\beta^4$	$12n^4efy^2\beta^3$	$6n^4egy\beta^3$	$+12n^2ceyz\beta^3$	$8n^4fgy^3$	$+8n^2fcy^2z\beta$
$9n^4e^2y^2\beta^4$	$4n^4efy\beta^4$	$2n^4eg\beta^4$	$+ 4n^2cez\beta^4$	$8n^4fgy^2\beta$	$+8n^2fcyz\beta^2$
$6n^4e^2y\beta^5$	$4n^4efy^3\beta^2$	$8n^4ehy^3$	$- 4n^2ec^2y^3\beta^2$	$4n^4fg[y\beta^2]$	$+4n^2fcz\beta^3$
$\underline{n^4e^2\beta^6}$	$6n^4efy^2\beta^3$	$12n^4ehy^2\beta$	$- 6n^2ec^2y^2\beta^3$	$4n^4fg[y^2\beta]$	$-4n^2c^2fy^2\beta^2$
	$6n^4efy\beta^4$	$12n^4ehy\beta^2$	$- 6n^2ec^2y\beta^4$	$4n^4fg[y\beta^2]$	$-4n^2c^2fy\beta^3$
	$[2]n^4ef\beta^5$	$4n^4eh\beta^3$	$- 2n^2ec^2\beta^5$	$2n^4fg\beta^3$	$-2n^2c^2f\beta^4$
	$4n^4g^2y^2$	$4n^4h^2$	$z^4$		
	$4n^4g^2y\beta$		$-4n^2hz^2$	$-4z^3c\beta$	
	$\underline{n^4g^2\beta^2}$		$+8n^2hc\beta$	$+2z^2c^2\beta^2$	
	$8n^4ghy$		$\underline{-4n^2hc^2\beta^2}$	$4c^2\beta^2z^2$	
	$\underline{\underline{4n^4gh\beta}}$			$-4c^3\beta^3z$	
	$-4n^2gyz^2$			$+ \beta^4c^4$	
	$-2n^2g\beta z^2$				
	$+8n^2cgyz\beta$				
	$+4n^2cgz\beta^2$				
	$-4n^2c^2y\beta^2$				
	$-2n^2c^2g\beta^3$				

9  $\beta^3$  L ändert Hrsg.      12 2 erg. Hrsg.

Unde patet omnes terminos irrationales evanescere post quadrationem.

Et habetur tabula generalis serierum, et si omnia per  $\beta^2$  et ultra multiplicata  
destruantur, figurarum quadrabilium, quae variant, pro varia explicazione cognitarum.

Termini pro figuris geometriae excerpti sequenti plagula parte schediasmatis huius  
5 quarta continebuntur. Omittendi et in quibus  $z$ . ascendit ultra quadratum.

Retinendi termini  $z^2$ .  $\beta^2$ .  $z\beta$ . NB. caeteris omnibus reiectis.

2 et ultra erg.  $L$       5 ascendit (1) ad (2) ultra  $L$

## 385. DE SERIERUM SUMMIS ET DE QUADRATURIS PARS QUARTA

**Überlieferung:** L Konzept: LH 35 V 4 Bl. 8–9. 1 Bog. 2°. 4 S. — Auf Bl. 7 v° verworfene Nebenbetrachtung. 2/5 S.  
Cc 2, Nr. 775 A tlw.

Pars IV<sup>ta</sup> schediasmatis de seriebus et summis quadraturisque. 5

Ex tabula proposita excerptantur iam termini geometrici. Nullus autem reperitur terminus in quo sit  $z$ . simplex sine  $\beta$ . et  $\beta$ . simplex sine  $z$ : Ideo retentis terminis  $z^2, \beta^2, z\beta$ . caeteri omnes reiciantur, et pro  $\beta$ . substituatur  $a$ , velut unitas, vel etiam  $\beta^2$ , plane ascribi negligatur, fiet:

$$\left. \begin{aligned} & 9n^4e^2y^4 + 12n^4efy^3 + 6n^4egy^2 - 4n^2ec^2y^3 + 4n^4f^2y^2 \left\{ \begin{aligned} & + [8]n^4fgy \\ & - 4n^2c^2gy \end{aligned} \right. - 4n^2c^2fy^2 \\ & [-4n^2ec^2y^3] - 4n^2fz^2y^2 - 4n^2gzy^2 - 4n^2hz^2 + 8n^2cey^3z + 8n^2fcy^2z \\ & + 8n^2cgyz + 8n^2hc^2 + n^4g^2 - 4n^2hc^2 \end{aligned} \right\} \sqcap 0. \mathbb{D} \quad 10$$

Quod si iam ponamus  $e \sqcap 0$ . evanescet  $y^4$ . et  $y^3$ . et ponendo praeterea  $n^4g^2 - 4n^2hc^2 \sqcap 0$ . restabit:

$$\begin{aligned} & 4n^4f^2y^2 + [8]n^4fgy - 4n^2c^2fy^2 - 4n^2fz^2y^2 - 4n^2gzy^2 - 4n^2hz^2 + 8n^2fcy^2z + 8n^2cgyz + \\ & - 4n^2c^2g.. \end{aligned} \quad 15$$

$8n^2hc^2$ . cui formulae rursus quaedam adimere possemus, ut ponendo  $4n^4f^2y^2 - 4n^2fz^2y^2 \sqcap 0$ . nullus restabit terminus  $y^2$ . Si vero potius  $f$ . ponas  $\sqcap 0$ . fiet:

$-4n^2c^2gy - 4n^2gzy^2 - 4n^2hz^2 + 8n^2cgyz + 8n^2hc^2$ . cuius figurae quadratrix erit:

$$cy + \sqrt{gy + \frac{g^2}{4c^2}} \sqcap x. \quad 20$$

6 geometrici (1), restabit: (2). Nullus  $L$  8 reiciantur, (1) ita fiet: (2) et  $L$  8 unitas, (1) habebimus: (2) vel  $L$  10 4  $L$  ändert Hrsg. 11  $+4n^4ez^2y^3$   $L$  ändert Hrsg. 11  $\mathbb{D}$  erg.  $L$  15 4  $L$  ändert Hrsg. 18 f. fiet: (1)  $-4n^2gzy^2 - 4n^2hz^2 + 8n^2cgyz + 8n^2hc^2$ . et divisum omnibus per  $4n^2z$ , restabit:  $-gzy - hz + 2cgy + 2hc \sqcap 0$ . quae aequatio est ad hyperbolam, et quia (a)  $g^2$ , posuimus (b)  $h$  posuimus  $\sqcap \frac{g^2}{4c^2}$ , substituendo eius valorem: fiet  $-\cancel{gzy} - \frac{\cancel{g^2}}{4c^2}z + 2cgy + \frac{2g^2}{4c} \sqcap 0$ . Unde si nullus insit error calculo habebitur quadratura hyperbolae. (2)  $-4n^2c^2gy$   $L$

11  $\mathbb{D}$ : Von hier Verweisstrich zu S. 420 Z. 1 – S. 422 Z. 2. 19 quadratrix: Leibniz setzt wie in der Lesart zu Z. 18 f.  $h = \frac{g^2}{4c^2}$  sowie  $n = 1$ .

Quod an verum sit statim examinare possumus. Nam differentia duarum  $x$ , erit:

$$\boxed{cy} + c\beta + \sqrt{gy + g\beta + \frac{g^2}{4c^2}} \boxed{-cy} - \sqrt{gy + \frac{g^2}{4c^2}} \sqcap z.$$

$$\text{Unde } 2gy + g\beta + \frac{2g^2}{4c^2} \boxed{+gy} \boxed{+\frac{g^2}{c^2}} - z^2 + 2c\beta z - c^2\beta^2 \sqcap 2\sqrt{\boxed{g^2y^2} \boxed{+g^2\beta y} \boxed{+\frac{g^3\beta}{4c^2}}} \\ \left[ \boxed{+\frac{2g^3}{4c^2}} \dots \boxed{+\frac{g^4}{16c^4}} \right]$$

$$5 \quad \sqcap = \begin{cases} [z] & 1, \square, , +2gy + g\beta. \\ -[c\beta] & \frac{2g^2}{4c^2} \end{cases}$$

Et quadrando posterior aequationis pars dabit:

$$\cancel{x^4} - \cancel{4x^3c\beta} + \cancel{6x^2c^2\beta^2} - \cancel{4x^3\beta^3} + \cancel{4\beta^4}, \quad -4gy \quad z^2 \quad \cancel{-2g\beta} \hat{\wedge} \quad z^2 \\ -2c\beta z \quad \cancel{-2c\beta z} \\ +c^2\beta^2 \quad \cancel{+c^2\beta^2} \\ -\frac{4g^2}{4c^2} \quad z^2 \quad \boxed{+4g^2y^2} \quad \boxed{+4g^2\beta y} \quad +g^2\beta^2; \\ -2c\beta z \quad \boxed{+8\frac{g^3}{[4]c^2} \dots} \quad \boxed{+4\frac{g^3\beta}{[4]c^2}} \\ +c^2\beta^2 \quad \boxed{+\frac{4g^4}{[16]c^4}}$$

et delendo  $+g^2\beta^2 - \frac{4g^2}{4c^2} = c^2\beta^2$ . quae figura est rationalis simul ac quadrabilis et dabit:

$$15 \quad y \sqcap \frac{-\frac{g^2}{c^2}z^2 + \frac{2g^2}{c}z}{z - c, \square, , \hat{\wedge} [4g]}, \text{ et [dividendo] per } \frac{g^2}{c} \sim [4g]. \text{ fiet } y \sqcap \frac{-\frac{z^2}{c} + 2z}{z - c, \square}, \text{ et multiplicando}$$

$$4 \left[ \boxed{+\frac{2g^2}{c^2}} \dots \boxed{+\frac{g^4}{4c^4}} \right] L \text{ ändert Hrsg.} \quad 5 z^2 L \text{ ändert Hrsg.} \quad 6 c\beta z L \text{ ändert Hrsg.} \quad 12 4$$

erg. Hrsg. zweimal 13 16 erg. Hrsg. 14 delendo (1)  $+g^2\beta^2$ , contra (2)  $+g^2\beta^2 - \frac{4g^2}{4c^2} = c^2\beta^2$

(a) divisisque omnibus (b). quae  $L$  15  $-4g L \text{ ändert Hrsg. zweimal}$  15 multiplicando  $L \text{ ändert Hrsg.}$

per  $c$ , fiet:  $y \sqcap \frac{-z^2 + 2cz}{z - c, \square}$ , auferatur  $\frac{c^2}{z - c, \square}$ , quae figura est quadrabilis. Iam quadrabilis

addita quadrabili dat quadrabilem, erit ergo quadrabilis:  $y \sqcap \frac{-z^2 + 2cz - c^2}{z - c, \square}$ , et fit  $y \sqcap$

–1. Unde patet nos nihil magnopere egisse quadrando hanc figuram cum sit hyperbola cubica. Calculi interea veritatem quodammodo comprobavimus.

Aliam eodem plane modo formulam fieri operae pretium est pro seriebus irrationali  
carentibus, sed contra habentibus fractionem; ubi hoc etiam commodi habebimus, quod  
litera  $z$ . non assurget ultra simplicem exponentem.

$$\begin{aligned} & - cy^4 - dy^3 - ey^2 - fy - g, \quad hy^4 + ly^3 + my^2 + ny + p \} \sqcap z. \\ & + cy^4 + dy^3 + ey^2 + fy + g \quad hy^4 + ly^3 + my^2 + ny + p \} \\ & 4c\beta y^3 + 3d\beta y^2 + 2e\beta y + f\beta \quad 4h\beta y^3 + 3l\beta y^2 + 2m\beta y + n\beta \\ & 6c\beta^2 y^2 + 3d\beta^2 y + e\beta^2 \quad 6h\beta^2 y^2 + 3l\beta^2 y + m\beta^2 \\ & 4c\beta^3 y + d\beta^3 \quad 4h\beta^3 y + l\beta^3 \\ & + c\beta^4 \quad + h\beta^4 \end{aligned}$$

Et multiplicando per crucem, fiet:

15

$chy^8$	$cly^7$	$cmy^6$	$cny^5$	$cpy^4$
$4ch\beta y^7$	$4cl\beta y^6$	$24cm\beta y^5$	$34cn\beta y^4$	$4cp\beta y^3$
$6ch\beta^2 y^6$	$6cl\beta^2 y^5$	$36cm\beta^2 y^4$	$6cn\beta^2 y^3$	$6cp\beta^2 y^2$
$4ch\beta^3 y^5$	$4cl\beta^3 y^4$	$4cm\beta^3 y^3$	$4cn\beta^3 y^2$	$4cp\beta^3 y$
$ch\beta^4 y^4$	$cl\beta^4 y^3$	$cm\beta^4 y^2$	$cn\beta^4 y$	$cp\beta^4$
$dhy^7$	$dly^6$	$dmy^5$	$dny^4$	$dpy^3$
$3dh\beta y^6$	$3dl\beta y^5$	$3dm\beta y^4$	$23dn\beta y^3$	$3dp\beta y^2$
$3dh\beta^2 y^5$	$3dl\beta^2 y^4$	$3dm\beta^2 y^3$	$3dn\beta^2 y^2$	$3dp\beta^2 y$
$dh\beta^3 y^4$	$dl\beta^3 y^3$	$dm\beta^3 y^2$	$dn\beta^3 y$	$dp\beta^3$
$ehy^6$	$ely^5$	$emy^4$	$eny^3$	$epy^2$
$2eh\beta y^5$	$2el\beta y^4$	$2em\beta y^3$	$2en\beta y^2$	$2ep\beta y$

20

25

1  $\frac{-z^2 + 2cz}{z - c, \square}$ , (1) et mutatis signis:  $y \sqcap \frac{z \wedge z - c}{z - c, \square}$ . Ergo  $y \sqcap \frac{z}{z - c}$ : (2) addatur (3) auferatur  $L$

3f. cum ... cubica erg.  $L$       5 pro (1) curvis ratio (2) seriebus  $L$

	$eh\beta^2y^4$	$el\beta^2y^3$	$em\beta^2y^2$	$en\beta^2y$	$ep\beta^2$
	$\boxed{fhy^5}$	$\boxed{fly^4}$	$\boxed{fmy^3}$	$\boxed{fnny^2}$	$\boxed{fpy}$
	$\boxed{fh\beta y^4}$	$\boxed{fl\beta y^3}$	$\boxed{fm\beta y^2}$	$\boxed{fn\beta y}$	$\boxed{fp\beta}$
	$\boxed{\underline{\underline{ghy^4}}}$	$\boxed{\underline{\underline{gly^3}}}$	$\boxed{\underline{\underline{gmy^2}}}$	$\boxed{\underline{\underline{gny}}}$	$\boxed{\underline{\underline{(gp)}}}$
5	$- hcy^8$	$- hd\beta y^7$	$- hey^6$	$- hf\beta y^5$	$- hg\beta y^4$
	$- 4hc\beta y^7$	$- \boxed{4}hd\beta y^6$	$- 2\boxed{4}he\beta y^5$	$- 4hf\beta y^4$	$- 4hg\beta y^3$
	$- 6hc\beta^2 y^6$	$- 3\boxed{6}hd\beta^2 y^5$	$- 6he\beta^2 y^4$	$- 6hf\beta^2 y^3$	$- 6hg\beta^2 y^2$
	$- 4hc\beta^3 y^5$	$- 3\boxed{4}hd\beta^3 y^4$	$- 4he\beta^3 y^3$	$- 4hf\beta^3 y^2$	$- 4hg\beta^3 y$
	$- hc\beta^4 y^4$	$- hd\beta^4 y^3$	$- he\beta^4 y^2$	$- hf\beta^4 y$	$- hg\beta^4$
10	$\boxed{lcy^7}$	$\boxed{ldy^6}$	$\boxed{ley^5}$	$\boxed{lfy^4}$	$\boxed{lgy^3}$
	$- 3lc\beta y^6$	$- 3ld\beta y^5$	$- \boxed{3}le\beta y^4$	$- 2\boxed{3}lf\beta y^3$	$- 3lg\beta y^2$
	$- 3lc\beta^2 y^5$	$- 3ld\beta^2 y^4$	$- 3le\beta^2 y^3$	$- 3lf\beta^2 y^2$	$- 3lg\beta^2 y$
	$- lc\beta^3 y^4$	$- ld\beta^3 y^3$	$- le\beta^3 y^2$	$- lf\beta^3 y$	$- lg\beta^3$
15	$\boxed{mcy^6}$	$\boxed{mdy^5}$	$\boxed{mey^4}$	$\boxed{mfy^3}$	$\boxed{mgy^2}$
	$- 2mc\beta y^5$	$- 2md\beta y^4$	$- 2me\beta y^3$	$- \boxed{2}mf\beta y^2$	$- 2mg\beta y$
	$- mc\beta^2 y^4$	$- md\beta^2 y^3$	$- me\beta^2 y^2$	$- mf\beta^2 y$	$- mg\beta^2$
	$\boxed{ncy^5}$	$\boxed{ndy^4}$	$\boxed{ney^3}$	$\boxed{nfy^2}$	$\boxed{ngy}$
	$- nc\beta y^4$	$- nd\beta y^3$	$- ne\beta y^2$	$- nf\beta y$	$- ng\beta$
	$\boxed{pcy^4}$	$\boxed{pdy^3}$	$\boxed{pey^2}$	$\boxed{pfy}$	$\boxed{pg}$

20 Dividenda per factum ex duobus denominatoribus:

$$\begin{array}{ccccc}
 h^2y^8 & lhy^7 & mhy^6 & nh\beta y^5 & phy^4 \\
 4h^2\beta y^7 & 4lh\beta y^6 & 4mh\beta y^5 & 4nh\beta y^4 & 4ph\beta y^3 \\
 6h^2\beta^2 y^6 & 6lh\beta^2 y^5 & 6mh\beta^2 y^4 & 6nh\beta^2 y^3 & 6ph\beta^2 y^2 \\
 4h^2\beta^3 y^5 & 4lh\beta^3 y^4 & 4mh\beta^3 y^3 & 4nh\beta^3 y^2 & 4ph\beta^3 y \\
 25 \quad h^2\beta^4 y^4 & lh\beta^4 y^3 & mh\beta^4 y^2 & nh\beta^4 y & ph\beta^4 \\
 & hly^7 & l^2y^6 & mly^5 & nly^4 & ply^3 \\
 & 3hl\beta y^6 & 3l^2\beta y^5 & 3ml\beta y^4 & 3nl\beta y^3 & 3pl\beta y^2 \\
 & 3hl\beta^2 y^5 & 3l^2\beta^2 y^4 & 3ml\beta^2 y^3 & 3nl\beta^2 y^2 & 3pl\beta^2 y
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc}
 \underline{hl\beta^3y^4} & \underline{l^2\beta^3y^3} & \underline{ml\beta^3y^2} & \underline{nl\beta^3y} & \underline{pl\beta^3} \\
 hmy^6 & lmy^5 & m^2y^4 & nmy^3 & pmy^2 \\
 2hm\beta y^5 & 2lm\beta y^4 & 2m^2\beta y^3 & 2nm\beta y^2 & 2pm\beta y \\
 hm\beta^2 y^4 & lm\beta^2 y^3 & m^2\beta^2 y^2 & nm\beta^2 y^3 & pm\beta^2 \\
 hny^5 & lny^4 & mny^3 & n^2y^2 & pny \\
 hn\beta y^4 & ln\beta y^3 & mn\beta y^2 & n^2\beta y & pn\beta \\
 hpy^4 & lpy^3 & mpy^2 & npy & p^2
 \end{array}$$

5

Unde iam excerptendo eas tantum quantitates, quae ad figuras geometricas notandas servire possint, et proinde abiectis illis omnibus in numeratore, in quibus  $\beta$ . assurgit ad quadratum et ultra, et abiectis omnibus in nominatore in quibus est  $\beta$ , fiet formula 10 reformata  $\odot$ .

$$\begin{array}{cccccc}
 cly^6 & +2cm y^5 & 3nc y^4 & 4cp y^3 & & \\
 -hd.. & dm.. & 2dn.. & 3dpy^2 & & \\
 -2he .. & -el.. & * & en.. & 2epy & \\
 & [-3fh..] & -2fl.. & -mf.. & * & fp \\
 & & -4gh.. & -3gl.. & [-]2gm.. & [-]ng \\
 \hline
 h^2y^8 & 2 hl y^7 & 2hmy^6 & 2hny^5 & 2hpy^4 & \\
 & l^2.. & 2lm.. & 2ln.. & 2pl y^3 & \\
 & & m^2.. & 2mn.. & 2mpy^2 & \\
 & & & n^2.. & 2npy & \\
 & & & & p^2 &
 \end{array}
 \left. \right\} \Pi z. \odot \quad 15 \quad 20$$

12–21 Nota huius seriei progressus in numeratore multipli ipsarum *c. d. e. f. g.* per numeros arithmeticæ progressionis multiplicati sunt, v. g. multipli ipsius *e.* per  $-2 - 1 \mp 0 + 1 + 2$ .

Videndum an inde regula duci possit, quae serviat ad regressum item, an etiam ad series arithmeticæ quiddam tale applicare liceat, quia illis regula Slusiana accommodari non potest.

9 omnibus | in (1) denominatore (2) numeratore *erg.* |, in  $L = 10$  ultra, (1) fiet (a) regula reformat  
(b) formula reformata  $\odot$  (2) et  $L = 15 - 3fh..$  *erg.* *Hrsg.* 16 – *erg.* *Hrsg. zweimal*

Figurae ergo omnes, quarum aequatio ex cognitarum huius formulae generalis explicatione nasci potest, quadrari possunt. Possunt autem explicaciones ita institui, ut numerator et nominator per divisores communes deprimantur.

Sed et termini quidam literaeve quaedam possunt poni nihilo aequales vel quantitatibus datae. Si e. g. ponas  $h$ , et  $l$  et  $c \equiv 0$ . et  $m \equiv 0$ . [fiet:]

$$\begin{aligned} & \boxed{dny^4} + 2dny^3 + 3dp\ y^2 + 2ep\ y - fp \\ & \quad en \dots \boxed{[-]2gm} \dots \boxed{[-ng]} \\ & \quad \boxed{+ mf} \dots \\ & \hline & n^2y^2 + 2npy + p^2 \end{aligned}$$

□ z.

10

Tentandum ergo an ita explicari possit numerator iste, ut dividi possit per  $ny + p$ , quo dividi potest nominator,

9 NB. quando geometrice quaeruntur differentiae, semper notandum est in denominatore differentiae, sumendum tantum nominatoris figurae cuius differentiae sunt quadratum.

1 omnes, (1) quae huius formul (2) quarum  $L = 1$  f. explicatione (1) fieri (2) nasci  $L = 5-9$  et  
1 (1)  $\equiv 0$ . (2) et  $c \equiv 0$ . (a) fiet: (b) et  $m \equiv 0$ . | fiet: erg. Hrsg. | ... □ z.  $L = 7 + L$  ändert Hrsg.  
7 ng  $L$  ändert Hrsg. 14 nominatoris erg.  $L$

415,26 regula Slusiana: s. *An Extract of a Letter from the Excellent Renatus Franciscus Slusius, Philosophical Transactions VII Nr. 90 vom 20./30. Jan. 1672/1673 S. 5143–47* (Nachtrag in VIII Nr. 95 vom 23. Juni/3. Juli 1673 S. 6059). Leibniz hat einen Auszug aus diesem Artikel angefertigt, *Methodus ducendi tangentes ad omnis generis curvas* (Cc 2, Nr. 616). 5 Si ... ponas: Leibniz vereinfacht in zwei Schritten. Im ersten setzt er  $h = l = c = 0$  und schreibt die Gleichung an. Im zweiten setzt er auch  $m = 0$  und umrahmt die zu eliminierenden Terme.

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r}
 2dn^2y^3 + 3dpn^2y^2 \\
 + en.. \\
 \hline ny + p
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 + 2epy \\
 fp \\
 [-]ng
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c} f \\ \vdash \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 2dy^2 \\
 + \boxed{3}dpy \\
 + en.. \\
 \hline n
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 + \boxed{2}epn \\
 - dp^2 \\
 \hline enp
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 n^2
 \end{array}
 \end{array}$$

5

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r}
 ny + p \\
 \boxed{3dpn^2y^2} \\
 + en.. \\
 - 2dp.. \\
 \hline n
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 \boxed{(3)dp^2y} \\
 + enp.. \\
 \hline \cancel{- 2dp^2..}
 \end{array}
 \end{array}$$

10

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r}
 ny + p \\
 \cancel{\boxed{3dpn^2y^2}} \\
 \cancel{+ en..} \\
 \cancel{- 2dp..} \\
 \hline n
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 \cancel{+ dp^2y} \\
 \cancel{+ enp..} \\
 \cancel{\cancel{- 2dp^2..}}
 \end{array}
 \end{array}$$

15

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r}
 ny + p \\
 \cancel{\boxed{3dpn^2y^2}} \\
 \cancel{+ en..} \\
 \cancel{- 2dp..} \\
 \hline n
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 \cancel{epn..} \\
 \cancel{dp^2..} \\
 \hline n
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 \boxed{ep^2n} \\
 \cancel{- dp^3} \\
 \hline n^2
 \end{array}
 \end{array}$$

20

Unde iam patet ut divisio exacte procedere possit, tantum poni debere

2 – erg. Hrsg.

---

1–21 Leibniz markiert die Streichungen im zweiten Rechenschritt teilw. mit hier nicht wiedergegebenen Zählstrichen.

$2dn^2y^2 + dpny + epn$   
 $f(p) \sqcap \frac{ep^2n - dp^3[+]n^3g}{n^2p}$  et fiet:  $\frac{+en^2 .. - dpp}{[n^2, ny + p]}$   $\sqcap z$ . Quae aequatio est ad hyperbolam, siquidem ulterius deprimi non potest, quod superest ut experiamur, hoc modo:

$$\begin{array}{r}
 2dn^2y^2 \quad dpny \quad (epn) \quad f \quad +2dny + dp + en - 2dp \\
 en^2 .. \quad -dp^2 \\
 \boxed{ny \quad + \quad p} \\
 -2dnp .. \\
 \boxed{\begin{array}{r} ny + \\ -dp^2 \\ (-enp) \\ +2dp^2 \end{array}}
 \end{array}$$

10

$$\begin{aligned}
 & 2 f(p) \sqcap (1) \frac{ep^2n - dp^3}{n^2p}, \text{ sive } fn \sqcap en - dp \text{ sive } f \sqcap \frac{en - dp}{n} \text{ et fiet: } 2dy^2 + (2) \\
 & \frac{ep^2n - dp^3| - ändert Hrsg. |n^3g}{n^2p} (a) \text{ et ponendo e (b) et } L = 2 n^2y + p \text{ } L ändert Hrsg. \quad 4 +en (1) \\
 & -2dnp (2) -2dp L \quad 11 (1) +2dnp^2 (2) +2dp^2 L
 \end{aligned}$$

Unde patet divisionem procedere et fieri aequationem ad lineam rectam, quare nihil inde pro hyperbola duci potest.

1 *Kontrollbetrachtung zur Lesart, nicht gestrichen:*

$$\text{Methodo Slusii } 3dy^2t + 2eyt \left\{ \begin{array}{l} enp^2 t (+g) \sqcap my^2x + nyx + px \\ - dp^3 .. \\ + n^2g .. \\ np \end{array} \right.$$

5

ponendo  $t$ . intervallum tangentis ab ordinata. Iam ut  $t$  ad  $x$ , ita  $\beta$  ad  $z$ . Erit  $z \sqcap \frac{tx}{\beta}$ .

$$\text{Iam } t \sqcap \frac{my^2x + nyx + px}{3dy^2 + 2ey \left\{ \begin{array}{l} +enp^2 \\ -dp^3 + n^2g \\ np \end{array} \right.}. \text{ Ergo } z \sqcap \frac{my^2x^2 + nyx^2 + px^2}{3dy^2 + 2ey \left\{ \begin{array}{l} +enp^2 \\ -dp^3 + n^2g \\ np \end{array} \right.}. \text{ pro } x. \text{ ponendo}$$

$$\frac{dy^3 + ey^2 \left\{ \begin{array}{l} enp^2 y + g \\ - dp^3 .. \\ + n^2g .. \\ n \end{array} \right.}{my^2 + ny + p}.$$

10

Sed haec quo minus fallamus summa cum exactitudine resumi operae pretium est.

1 divisionem (1) universaliter non procedere, nisi sit aequatio inter  $-dp^2$  et  $dp^2 - 2dnp^2$  seu inter 1 et n. Quodsi ergo nullus inest error calculo, sequetur hinc absoluta hyperbolae quadratura. Quod facile experiri licet methodo Slusii. (2) procedere  $L = 8$  ponendo ... ad z. erg.  $L$

4 Methodo Slusii: s. o. Erl. zu S. 415 Z. 26. — Leibniz vergibt auf der linken Seite der Tangentengleichung die Terme  $-2mxyt - nxt$  und übersieht außerdem, daß er zuvor bereits  $m = 0$  gesetzt hat.

In Z. 7 müßte  $z = \frac{\beta x}{t}$  stehen, der Fehler beeinträchtigt die weitere Kontrollrechnung zusätzlich. Ab Z. 8 wird  $\beta$  als „unitas constructionis“ gleich 1 gesetzt; vgl. S. 411 Z. 8. Leibniz bricht schließlich ab und nimmt die Betrachtung in N. 387 S. 432 Z. 10 wieder auf.

Tentandum an aequatio ad ellipsin vel hyperbolam  $-2az \mp \frac{a}{b}z^2 + y^2, \sqcap 0.$  per aliam

1 Nebenbetrachtung zur Lesart, nicht gestrichen:  $y^2 + z^2 - 2az \sqcap 0.$  ducatur in  $\frac{p}{a}y + qz + r.$

1–421,3 Nebenbetrachtung auf Bl. 7v<sup>o</sup>, verworfen:

Nihil deest.

$$a^2 + \frac{a}{b}\omega^2 \sqcap z^2. \text{ Ergo } p^2 \sqcap a^2 + \frac{a}{b}\omega^2 + v^2 \text{ vel } v^2 + \frac{a}{b}\omega^2 + a^2 \sqcap 0. \text{ et faciendo}$$

$$- p^2$$

$$v \sqcap x + c, \text{ et } \omega \sqcap y + d. \text{ fiet: } x^2 + 2cx + \boxed{c^2} + \frac{a}{b}y^2 + \frac{2a}{b}dy \boxed{+\frac{a}{b}d^2} + a^2 \sqcap 0.$$

$$- p^2$$

$$+ c^2$$

$$+ \frac{a}{b}d^2$$

Multiplicetur haec aequatio per aliam, scilicet per  $x + \frac{r}{a}y - s \sqcap 0.$  fiet:

$$\begin{aligned} \frac{r}{b}y^3 + x^3 + \frac{r}{a}x^2y + \frac{a}{b}y^2x + 2cx^2 + \frac{2rd}{b}y^2 + \frac{2ad}{b}xy &\sqcap 0. \\ - s.. - \frac{a}{b}s .. & \quad \frac{2rc}{a}.. \\ a \odot \left\{ \begin{array}{l} + a^2x \\ - p^2.. \\ + c^2.. \\ + \frac{a}{b}d^2.. \\ - 2cs.. \end{array} \right. & r \odot \left\{ \begin{array}{l} ray \\ - \frac{r}{a}p^2.. \\ + \frac{r}{a}c^2.. \\ + \frac{r}{b}d^2.. \\ - \frac{2a}{b}ds .. \end{array} \right. \odot as \left\{ \begin{array}{l} - sa^2 \\ + sp^2 \\ - sc^2 \\ - \frac{sa}{b}d^2 \end{array} \right. \end{aligned}$$

1 ad (1) circulum  $2az - z^2$  (2) ellipsin L

1 Tentandum: Von hier Verweisstrich auf die Gleichung D S. 411 Z. 10–12. — Vgl. auch *Schediasma de superficiebus conoeidum et sphæroeidum. Item de curva ellipsis et hyperbolae* (Cc 2, Nr. 773), datiert 3. Okt. 1674.

quandam multiplicata, qualis est  $py^2 + qy + s$ , reddi possit similis propositae formulae generali  $\mathfrak{D}$ , fiet enim

$$+ py^4 \mp \frac{pa}{b} y^2 z^2 - 2apzy^2 + qy^3 \mp \frac{aq}{b} yz^2 - 2aqyz + sy^2 \mp \frac{a}{b} sz^2 - 2azs \sqcap 0.$$

Sed video addendum esse  $+y^3$ . et aequationem ad hyperbolam vel ellipsin ponendam esse completam:  $y^2 + bz^2 + cz + dy + e \sqcap 0$ . ducendam in  $ty^3, + py^2 + qy + rz + s + \omega yz$ . Sed quia ita inevitabiliter prodit  $ty^5$ , quae in formula generali non reperitur, 5 ideo necesse est formulam generalem multiplicari per  $ly + mz + n$ . Sed cum semper quaedam difficultates sint obstiturae, ideo multiplicata formula generali per  $ly + mz + n$ . ut loca eius quantum licet repleantur; particularis ad conicam datam, multiplicanda erit per formulam completam; unde sub exitum calculi statim apparebit, quae elidi possint aut 10 conferri.

Esto  $x \sqcap \frac{bv^2}{a^2 \mp v^2}$ , sive  $a^2 x \mp v^2 x - bv^2 \sqcap 0$ , explicatis  $x$  et  $v$ , et aequatione proveniente, multiplicata per  $ly + mz + q + \omega yz$ .

Prior autem explicata stabit:  $a^2 z \mp y^2 z + byz + cy^2 + dy + e \sqcap 0$ . quae ducta in 15  $ly + mz + q + pyz$ , dabit terminos omnes praeter  $y^4$ .

Generaliter omnes figurae quarum aequationes aut earum multipli, formulae huic aut eius multiplo aequari possunt sunt quadrabiles.

Exemplo etiam opus est formulae pro figuris aequationum affectarum quadrandis.

Ope formulae  $\mathfrak{D}$ , sed ipsis  $\beta^3$  etc. nondum expunctis, haberi potest modus quo summae haberi possunt numerorum irrationalium finitorum pariter atque infinitorum, quod 20 hactenus potuit nemo.

Inquirendum est in methodum similem a priori sive per synthesin, cuius ope appareat quenaenam series habeant differentias in fine exhaustas, differentias inquam vel differentias differentiarum cuiuscunque gradus. Sane manifestum est ultimam differentiam esse 25 rectangulo homogeneam. Ergo penultima, erit triangulo, antepenultima, parabolae, et

2  $\mathfrak{D}$  erg. L 7 +n. (1) quo facto (2) Sed L 12 et v, (1) ductisque omnibus in (2) ductaque (3) et L 17f. quadrabiles. (1) Exemplum etiam opus est sive formulae pro aequationibus affectis quadrandis. Ope seriei  $\mathfrak{D}$  habentur (2) Exemplo L 25 Ergo (1) praecedens erit (2) penultima L

22 Inquirendum: Die folgende Überlegung wird in N. 387 ab S. 434 Z. 6 wieder aufgenommen, das Schema S. 422 Z. 3–17 wird in erweiterter Form wiederholt.

caeterae paraboloeidibus, patet ergo fieri non posse nisi in iis quae procedunt per potestates.

<i>E</i>					
<i>a</i>					
5 <i>F</i>					
	<i>a</i> − <i>b</i>				
<i>M</i>		<i>G</i>			
<i>b</i>		<i>a</i> − 2 <i>b</i> + <i>c</i>			
10 <i>N</i>			<i>H</i>		
	<i>b</i> − <i>c</i>		<i>a</i> − 3 <i>b</i> + 3 <i>c</i> − <i>d</i>		
	<i>P</i>			<i>L</i>	
<i>c</i>		<i>b</i> − 2 <i>c</i> + <i>d</i>		<i>a</i> − 4 <i>b</i> + 6 <i>c</i> − 4 <i>d</i> + <i>e</i>	
	<i>Q</i>				
	<i>c</i> − <i>d</i>		<i>b</i> − 3 <i>c</i> + 3 <i>d</i> − <i>e</i>		
15 <i>d</i>		<i>c</i> − 2 <i>d</i> + <i>e</i>			
	<i>d</i> − <i>e</i>				
	<i>e</i>				

Iam si ponamus ipsam seriem primarum differentiarum *E. F. G. H. L.* procedere per potestates, videndum quales inde oriantur series, ut si series:

20     *a*    *a* − *b*    *a* − 2*b* + *c*    *a* − 3*b* + 3*c* − *d*    *a* − 4*b* + 6*c* − 4*d* + *e* etc.

ponatur esse progressionis arithmeticæ, ut sit  $[a, -, a - b]$  *b*  $\sqcap$  *a* − *b*, −*a* + 2*b* − *c*, fiet *c*  $\sqcap$  0. ac proinde ista non procedunt in progressionibus decrescentibus puto tamen in ascendentibus. *a* ademta ab *a* + *b*, relinquit *b*, *a* + *b* ademta ab *a* + 2*b* + *c*, relinquit *b* + *c*. atqui non potest esse *b*  $\sqcap$  *b* + *c*. fiet enim rursus *c*  $\sqcap$  0. Ideoque ista non procedunt: 25    *a* − *a* + *b*  $\sqcap$  *b*.  $\textcircled{a}$  − *b*,  $\textcircled{-a}$  + 2*b* − *c*  $\sqcap$  *b* − *c*.  $\textcircled{a}$   $\textcircled{-2b}$   $\textcircled{+c}$   $\textcircled{-a}$  +  $\textcircled{3}b$  − 2 $\textcircled{3}c$  + *d*  $\sqcap$  *b* − 2*c* + *d*. Unde patet differentias seriei *E. F. G. H. L.* esse seriem *M. N. P. Q.*


## 386. DE SERIERUM SUMMIS ET DE QUADRATURIS PARS QUARTA BIS

**Überlieferung:** L Konzept: LH 35 V 4 Bl. 10–11. 1 Bog. 2°. 3 S. u. 4 Z. auf Bl. 11 v°.  
Überschrift ergänzt.  
Cc 2, Nr. 775 A tlw.

Pars quarta schediasmatis de seriebus et summis  
quadratricibus.

5

[Teil 1]



[Fig. 1]

Si in figura praesenti, curva  $X, Y$  ponatur esse parabola, cuius axis sit  $X, PYX, P$ ,  
et aequatio:  $2ax \sqcap y^2$ . fiet:  $2al \sqcap 2y^2$ , aut  $al \sqcap y^2$ , aut  $l \sqcap \frac{y^2}{a}$ , aut  $l \sqcap 2x$ . et quia  $pl \sqcap y^2$ , 10  
erit  $2px \sqcap y^2$ , aut  $2px \sqcap 2ax$ , aut  $p \sqcap a$ .

Quid si iam propositum sit, investigare figuram in qua  $p$ , sit recta constans,  $a$ .  
ponendo  $X, P \sqcap v$ . erit  $p \sqcap v - x \sqcap a$ . fiet:  $v^2 - 2vx + x^2 \sqcap a^2 \sqcap p^2$ , et  $y^2 \sqcap s^2 - a^2$ . vel

12 f. constans, a. (1) vocando X, P, (2) ponendo L


5 Pars quarta: Zählung wiederholt sich.

$y^2 \sqcap v^2 - 2vx + x^2 + s^2$ . Haec novissima aequatio determinanda est ad duas radices aequales utriusque incognitae  $x$ . et  $s$ . Inde pro  $s$ . habebitur eius valor. Et vero id est in quaestione, an ab ista aequatione generali curvis omnibus communi inchoari possit calculus, eaque determinari ad duas utriusque incognitae radices aequales. Id vero fieri posse non puto.

Quando ergo quaestiones adeo simplices proponuntur, ut sint ne tractabiles quidem,

mutandae sunt in compositiores. Porro  $\frac{l}{y}$  seu  $\frac{2x}{\sqrt{2ax}}$  est  $\sqcap \frac{g}{w}$ . Ergo  $\frac{w}{\beta} \sqcap \frac{\sqrt{2ax}}{2x}$ . sive  $w^2 \sqcap \frac{2ax[\beta^2]}{4x^2}$ , sive  $w^2 \sqcap \frac{a\beta^2}{2x}$ , sive pro  $w$ . ponendo  $z$ , figura ipsis  $w$ . homogenea erit:  $2z^2x \sqcap a^3$ .

Quod si iam quaeramus figuram, in qua  $w$ . valeat  $\frac{\beta\sqrt{2ax}}{2x}$ . seu  $\frac{w}{\beta} \sqcap \frac{\sqrt{2ax}}{2x} \sqcap \frac{y}{l}$ . Ergo  $\frac{2ax}{4x^2} \sqcap \frac{y^2 \sqcap pl}{l^2}$ . Unde  $\frac{a}{2x} \sqcap \frac{p}{l}$ . Sed satis ex his patet alia opus esse arte, ad regressum.



[Fig. 2]

8  $\beta^2$  erg. Hrsg. 10  $\frac{\beta\sqrt{2ax}}{2x}$ . (1) erit  $\frac{1}{y} \sqcap \frac{\sqrt{2ax}}{2x}$ . sive  $2xl \sqcap y\sqrt{2ax}$ , sive  $4x^2l^2 \sqcap 2y^2ax$ . sive  $2xl^2 \sqcap 2y^2a$ . Iam  $y^2 \sqcap pl$ . fiet:  $2xl \sqcap 2ap$  (2) seu  $L$

1 f. duas radices aequales: vgl. die Tangentenmethode von Descartes, *Geometria*, 1659, DGS I S. 40 bis 50 [Marg.] (vgl. DO VI S. 413–424). 7  $\frac{w}{\beta} \sqcap \frac{\sqrt{2ax}}{2x}$ : Leibniz geht hier stillschweigend von  $g$  zu  $\beta$  über, in S. 425 Z. 3 setzt er sie explizit gleich. 12 Fig. 2: Leibniz vertauscht in der Fig. 2 gegenüber dem Vorhergehenden die  $x$ - und  $y$ -Achse, behält aber die Parabelgleichung  $2ax = y^2$  unverändert bei. Dadurch wird die folgende Überlegung bis S. 425 Z. 12 beeinträchtigt.

Sumamus exemplum differentiarum inter ordinatas parabolae ad tangentem,  $2ax \sqcap y^2$ . Unde  $2ax \sqcap 2yl$ , sive  $l \sqcap \frac{ax}{y}$ . sive pro  $ax$  ponendo  $\frac{y^2}{2}$  fiet:  $l \sqcap \frac{y^2}{2y}$ . Ergo  $l \sqcap \frac{y}{2}$ .


Iam  $\frac{l}{x} \sqcap \frac{g \sqcap \beta}{w}$ . Erit  $w \sqcap \frac{x\beta}{l}$ , sive  $\frac{y^2\beta}{2al}$  sive  $\frac{y^2\beta}{ay}$ , sive  $\frac{y\beta}{a} \sqcap w$ . Triangulum ergo differentiis ordinatarum parabolae ad tangentem verticis homogeneum est. Sumta iam aequatione generali:  $s^2 \sqcap v^2 - 2vx + x^2 + y^2$ , est autem  $\frac{\cancel{\beta}}{\cancel{y\beta}} \sqcap \frac{y}{v-x}$ . erit  $va - xa \sqcap y^2$ , sive  $v \sqcap \frac{y^2 + xa}{a}$ , et  $v^2 \sqcap \frac{y^4 + 2y^2xa + x^2a^2}{a^2}$  et  $a^2s^2 \sqcap y^4 \left[ +2y^2xa \right] \cancel{\left[ +x^2a^2 \right]} \cancel{\left[ -2y^2xa \right]} \cancel{\left[ -2x^2a^2 \right]}$   
 $\cancel{\left[ +x^2a^2 \right]} + y^2a^2$  et fit:  $s \sqcap \frac{y\sqrt{y^2 + a^2}}{a}$ . Sed quoniam hoc modo altera ex incognitis, evanes-

cit, alia adhibenda est via, nimirum  $G, YW$ ,  $\sqcap \sqrt{\frac{\beta^2a^2 + \beta^2y^2}{a^2}}$ . Est autem  $\frac{G, YW}{\beta} \sqcap \frac{s}{y}$ .


Ergo  $s \sqcap \frac{y}{a}\sqrt{a^2 + y^2}$ , et  $s^2 \sqcap \frac{y^2a^2 + y^4}{a^2}$ , et fiet ex aequatione generali, pro  $s^2$  substituendo eius valorem, aequatio haec:  $\left[ y^2a^2 \right] + y^4 \sqcap a^2v^2 - 2vxa^2 + x^2a^2 \left[ +y^2a^2 \right]$ . et  $y^2 \sqcap \pm av \pm ax$ . Quoniam iam haec est methodus tangentium inversa, si multiplicet  $y^2$  per  $\frac{1}{2}$ , et  $x$  per 1, et  $av$  per 0, fiet:  $\frac{y^2}{2} \sqcap ax$ . sive  $y^2 \sqcap 2ax$ . Sed an hoc alias quoque succedat, videndum est. Et vero id non puto semper succedere posse.

---

2 Am Rande: Iam  $pl \sqcap x^2$ . Ergo  $\frac{py}{2} \sqcap \frac{y^4}{4a^2}$ .



[Fig. 3]



[Fig. 4]

$\frac{BC}{BD} \sqcap \frac{WL}{GW}$ . erit  $BC \wedge GW$  seu summa omnium  $BC$ , aequalis  $BD \wedge WL$  seu summae omnium  $BD$  ad basin. Summa autem omnium  $BD$  ad basin est ipsius maxima BD semiquadratum.

5 Porro manifestum est summam omnium  $WL$  esse ipsam maximam  $BD$ .

Proposita iam esto figura cuius ordinatae sunt e. g.  $\sqrt{a^2 - x^2}$ . Quaeritur figura in qua faciant functionem ipsarum  $BC$ , eius figurae ordinata erit summa omnium  $\sqrt{a^2 - x^2}$ .

Quaeritur et alia figura, in qua  $\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a}$  faciant functionem ipsarum  $WL$ . Summa earum erit  $FD$  ordinata figurae quae homogenea sit semiquadratis ipsarum  $BD$ .

10 Hinc patet momentum ipsarum  $BD$  ex axe, esse homogeneous figurae quadratrici ipsarum  $FD$ . Porro ut ad calculum veniamus, in fig. 1. patet esse:  $\frac{BD}{\sqrt{a^2 - x^2}} \sqcap \frac{GW}{WL} \sqcap \frac{\beta}{WL}$ . sive  $BD \wedge WL \sqcap \beta \sqrt{a^2 - x^2}$ .

In aequatione generali:  $BD^2 + BC^2 \sqcap CD^2$ , vel  $y^2 + BC^2 \sqcap p^2$ , substituatur pro  $BC^2$ , eius valor,  $a^2 - x^2$ , fiet:  $y^2 + a^2 - x^2 \sqcap p^2$ . determinanda ad duas radices aequales, 15 ut elidatur  $p$ .

6  $\sqrt{a^2 - x^2}$ . (1) Quod si (2) Quaeritur L 10 momentum (1) figurae (2) ipsarum  $BD$  ex axe, esse (a) homogeneous figurae  $FD$  (b) homogeneous (aa) quadratrici ipsius figurae (bb) figurae  $L$

In altera figura  $\frac{GW}{WL}$  seu  $\frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}}$   $\sqcap \frac{FD}{FM} \sqcap \frac{z}{FM}$ . et erit  $FM \sqcap z \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a}$ .

Eumque valorem inserendo in aequatione generali, fiet:  $z^2 + \frac{z^2 a^2 - z^2 x^2}{a^2} \sqcap s^2$ . ponendo

$FD \sqcap z$ . et  $FM \sqcap s$ . Est autem  $z \sqcap \frac{y^2}{2a}$ , et fiet:  $\frac{y^4}{4a^2} + \frac{y^4 a^2 - y^4 x^2}{a^2} \sqcap s^2$ . sive  $3a^2 y^4 - y^4 x^2 \sqcap 4s^2 a^4$ , et fiet:  $2sa^2 \sqcap y^2 \sqrt{3a^2 - x^2}$ .

Habemus quidem iam duas aequationes, ex quibus quaelibet est trium incognitarum, 5 sed malum est, quod in iis duae etiam incognitae  $s$ . et  $p$ .

Methodus tangentium inversa, videtur esse eadem, cum methodo inveniendi planum quod superficiem cuiusdam solidi tangat in puncto dato. Ita enim fit, ut aequatio trium incognitarum determinetur ad duas, eo ipso, quia quaelibet ex incognitis duas habet radices aequales. Verum iam video discriminum aliquod subesse a methodo tangentium inversa, quia in ea tres quidem sunt incognitae, sed duae tantum ex illis habent duos 10 valores aequales.


Methodus autem ducendi planum tangens ad superficiem, videtur coincidere cum methodo ducendi rectam tangentem ad curvam in solido quodam spatio sive extra planum constans divagantem; quam obiter innuit Cartesius, sub libri secundi finem. 15

Porro considerandum est has duas  $s \sqcap MD$ . et  $p \sqcap CD$ . plurimum habere affinitatis. Nondum tamen rationem invenio alterutram earum eliminandi. Nec vero hac quidem methodo facile eo perveniri posse arbitror.

2 f. ponendo ...  $FM \sqcap s$ . erg. L 8 ut (1) duae (2) aequatio (a) duarum incognitarum (b) trium  $L$  9 incognitis (1) du (2) tres ha (3) duas  $L$  11 ea (1) duae (2) tres  $L$  15 quam (1) sane curvam (2) obiter  $L$  16 f. affinitatis (1); quoniam etiam  $FD$  | fig. 2. erg. | sunt homogeneae ipsarum WL. fig. 1. scilicet  $\frac{P}{BC} \sqcap \frac{P}{WL \wedge a}$  (2). Nondum  $L$   
 $\beta$

15 Cartesius: *Geometria*, 1659, DGS I S. 65 f. (vgl. DO VI S. 440 f.). 16  $s \sqcap MD$ : Im Vorhergehenden benutzte Leibniz  $s = FM$ .

[Teil 2]



[Fig. 5, teilweise in Blindtechnik]

Triangula  $CBA$ , et  $DEB$  similia sunt. Angulus enim  $BDE$  insistens arcui  $BF$ , aequali arcui  $BD$  dimidius est anguli  $[BCD]$ , ideoque aequalis angulo  $BCA$ .

4 est (1) arcus (2) anguli | BD ändert Hrsg., ideoque L

[Teil 3]

$$\begin{array}{ccccccc}
 & 2 \text{ ad } 1 & & 3 \text{ ad } 2 & & 4 \text{ ad } 3 & \\
 1 & \underbrace{\frac{1}{3} \quad \frac{1}{6}}_{\frac{1}{2}} & & \underbrace{\frac{1}{10} \quad \frac{1}{15}}_{\frac{5}{30} \left(\frac{1}{6}\right)} & & \underbrace{\frac{1}{21} \quad \frac{1}{28}}_{\frac{7}{84} \left(\frac{1}{12}\right)} & \frac{1}{36} \quad \frac{1}{45} \quad \frac{1}{55} \quad \frac{1}{66} \quad \frac{1}{78} \\
 & & & 2 \text{ ad } 1 & & & \\
 & & & \underbrace{\frac{1}{4}}_{\frac{1}{4}} & & & \\
 & \underbrace{\frac{1}{3} + \frac{1}{10}}_{\frac{13}{30}} & + & \underbrace{\frac{1}{21} + \frac{1}{36}}_{\frac{57}{21 \hat{\wedge} 36}} & + & \underbrace{\frac{1}{55} + \frac{1}{78}}_{\frac{133}{66 \hat{\wedge} 78}}, & \text{etc.}
 \end{array}$$

5

auferendo 1 a numeratoribus fiet:

$$\frac{12}{30} \Big| \frac{2}{5} \quad \frac{56}{21 \hat{\wedge} 36} \Big| \frac{8}{3 \hat{\wedge} 36} \Big| \frac{2}{27} \quad \frac{12}{6 \hat{\wedge} 78} \Big| \frac{2}{78}. \quad \text{pendet}$$

a quadratura hyperbolae ni fallor.

10

3–431,10 Nebenrechnungen:

3+430,2+431,10 [Z. 13–15 in der Vorlage als Spalten geschrieben]

$$\begin{array}{cccccccccccccccc}
 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\
 1 & 3 & 6 & 10 & 15 & 21 & 28 & 36 & 45 & 55 & 66 & 78 & 91 & 105 & 120 \\
 1 & 4 & 10 & 20 & 35 & 56 & 84 & 120 & 165 & 220 & 286
 \end{array}$$

$$3 \quad \frac{28 + 21 \sqcap 49}{21 \hat{\wedge} 28} \sqcap \frac{7}{84} \Big| \frac{1}{[12]} \quad \frac{1}{6} + \frac{1}{12} \sqcap [\text{bricht ab}]$$

$$\begin{array}{r}
 9 \quad 1 \\
 132 \quad f \quad 11 \\
 122 \\
 1
 \end{array}$$

$$9 \quad \frac{2}{78}. \quad (1) \text{ Unde quadratura hyperbolae} \quad (2) \text{ pendet } L \quad 16 \quad 14 \quad L \text{ ändert Hrsg.}$$

$$\begin{array}{cccccc}
& \text{2 ad 1} & \text{3 ad 2} & \text{4 ad 3} & \text{5 ad 4} & \text{6 ad 5} & \text{7 ad 6} & \text{8 ad 7} \\
1 & \underbrace{\frac{1}{3}}_{A} \underbrace{\frac{1}{6}}_{\alpha} \underbrace{\frac{1}{10}}_{\alpha} \underbrace{\frac{1}{15}}_{\alpha} & & \underbrace{\frac{1}{21}}_{\alpha} \underbrace{\frac{1}{28}}_{\alpha} & \underbrace{\frac{1}{36}}_{\alpha} \underbrace{\frac{1}{45}}_{\alpha} & \underbrace{\frac{1}{55}}_{\alpha} \underbrace{\frac{1}{66}}_{\alpha} & \underbrace{\frac{1}{78}}_{\alpha} \underbrace{\frac{1}{91}}_{\alpha} & \underbrace{\frac{1}{105}}_{\alpha} \underbrace{\frac{1}{120}}_{\alpha} \\
& \frac{3|1}{6} & \frac{25}{150} \frac{1}{6} & \frac{49}{21 \hat{+} 28} \frac{1}{12} & \frac{81}{36 \hat{+} 45} \frac{1}{20} & \frac{121}{55 \hat{+} 66} \frac{1}{30} & \frac{169}{78 \hat{+} 91} \frac{1}{42} & \frac{225}{105 \hat{+} 120} \frac{1}{56} \\
& & & & & & & \\
5 & & \overbrace{\frac{3}{12} \frac{1}{4}}^B & & \overbrace{\frac{50}{600} \frac{1}{12}}^{\beta} & & \overbrace{\frac{98}{42 \hat{+} 56} \frac{1}{6 \hat{+} 4} \frac{1}{24}}^b & \\
& & & & & & & \\
& & & & & & \overbrace{\frac{3}{24} \frac{1}{8}}^C & \\
& & & & & & &
\end{array}$$

3 f. Nebenrechnungen:

$$\begin{array}{ccccccc}
13 & 1 & 2 & 15 & 56 & 2 & \\
13 & 78 \cancel{f} 6 & 91 \cancel{f} 7 & 7 & 42 & 98 \cancel{f} 14 & \\
\hline 39 & 13 & 13 & 105 & 98 & 77 & \\
13 & & & & & & \\
\hline 169 & & & & & &
\end{array}$$

Patet seriem  $A \cdot B \cdot C$ . esse geometricam, seriem  $A \cdot \alpha \cdot a$ . etc. esse dimidiam datae, seriem  $B \cdot \beta \cdot b$ . etc. esse dimidiam ipsius  $A \cdot \alpha \cdot a$ .

Hanc methodum, qua series fractionum triangularium abit in progressionem [geometricam] duplam invenit Hugenius. Unde deduxit fractiones triangulares aequari binario seu  $\frac{2}{1}$ . Ego cum aliter idem et praeterea invenissem, pyramidales aequari  $\frac{3}{2}$ , et triangulo-triangulares  $\frac{4}{3}$  etc. et ita pyramidales summae progressionis geometricae triplae, triangulo-triangulares quadruplae, dixi ei, videri mihi similem fieri posse in aliis quoque ad geometricas reductionem quod nunc tentabo.

$$\begin{array}{ccccccccc}
 [4 \text{ ad } 1] & [2 \text{ ad } 1] & [8 \text{ ad } 5] & [10 \text{ ad } 7] & & & & & \\
 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{10} & \frac{1}{20} & \frac{1}{35} & \frac{1}{56} & \frac{1}{84} & \frac{1}{120} & \frac{1}{165} \quad \frac{1}{220} \quad \frac{1}{286} \\
 & & \underbrace{\phantom{000}}_{\frac{[5]}{28}} & + & \frac{1}{56} \sqcap \left[ \frac{11}{56} \right] & & & & \\
 1 & [bricht ab]
 \end{array} \quad 10$$

---


$$10-12 \quad \text{Nebenrechnung, gestrichen: } \frac{3}{20} + \frac{1}{35} \sqcap \frac{105+20}{20 \wedge 35} \sqcap \frac{125}{4 \wedge 7} \mid \frac{5 \wedge 5}{4 \wedge 7} [!]$$

$$\begin{array}{lll}
 3 \text{ qua (1) res (2) series } L & 3 \text{ f. progressionem | arithmeticam ändert Hrsg. | | duplam erg. |,} \\
 |\text{ primus gestr. | invenit } L & 5 \text{ aliter ... praeterea erg. } L & 9 \ 4 \dots 7 \text{ gestr. } L, \text{ erg. Hrsg.} \quad 11 \ 25 \ L \\
 \text{ ändert Hrsg.} & 11 \ \frac{50}{56} + \frac{1}{28} \sqcap \frac{52}{56} \mid \frac{26}{28} \mid \frac{13}{14} \ L \text{ ändert Hrsg.} & 13 \ (1) \ \frac{5}{20} + \frac{3}{20} \sqcap \frac{8}{20} \mid \frac{4}{5} \ (!) \ (2) \ \frac{3}{20} \ L
 \end{array}$$

---

4 f. Hugenius: Zur Lösung von Huygens s. HO XIV S. 144–150. — Ego: vgl. N. 2 sowie die Accessio, LSB III, 1 N. 2 S. 5–9.

## 387. DE SERIERUM SUMMIS ET DE QUADRATURIS PARS QUINTA

**Überlieferung:** L Konzept: LH 35 V 4 Bl. 12–13. 1 Bog. 2°. 4 S. Geringer Textverlust durch Randschäden.  
Cc 2, Nr. 775 A tlw.

5 Pars V<sup>ta</sup> schediasmatis de seriebus et summis quadraticibus etc.

Esto  $y^3 + y^2 + y + 1 + \frac{1}{y} \sqcap z$ .

Multiplicetur per  $y$ , fiet  $y^4 + y^3 + y^2 + y + 1 \sqcap yz$ . facile ergo haberi potest summa omnium  $yz$ . Sed non ideo fateor summa omnium  $z$  habebitur.

Exemplo, formulam ⊙ denuo comprobemus, resumto calculo, ponendo *h. l. c. m.*  $\sqcap 0$ .

10 Esto figura:  $\frac{dy^3 + ey^2 + fy + g}{ny + p} \sqcap x$ . fiet:

$$\left. \begin{array}{rcl} dy^3 & + & ey^2 + fy + g \\ 3dy^2\beta & + & 2ey\beta + f\beta \\ 3dy\beta^2 & + & e\beta^2 \\ \hline -dy^3 - ey^2 - fy - g & & d\beta^3 \\ \hline ny + p & & ny + p \\ & & n\beta \end{array} \right\} \sqcap \text{ eius differentiae } z.$$

et multiplicando per crucem:

6  $+ \frac{1}{y} \mid$  omniumque summa *gestr.* |  $\sqcap z L$       10 Esto ...  $\sqcap x$ . *erg.* *L*

---

9 formulam ⊙: Leibniz nimmt die Überlegungen von N. 385 S. 415 Z. 12 u. S. 419 Z. 4–16 wieder auf.

$$\begin{array}{ccccccccc}
 (-ndy^4) & (-ney^3) & (-nfy^2) & (-gny) & (+ndy^4) & (+ney^3) & (+nfy^2) & (+ngy) \\
 (-ndy^3\beta - ney^2\beta - nfy\beta) & -gn\beta & 2(3)ndy^3\beta & +2(2)ney^2\beta & (+nfy\beta) & (+pg) \\
 (-pdy^3 - pey^2) & (-fpy) & (-gp) & 3ndy^2\beta^2 + ney\beta^2 & (+pfy) \\
 & & & \overbrace{ndy\beta^3}^{+pey^2} & +pf\beta \\
 & & & \overbrace{pdy^3}^{+2pey\beta} & \\
 & & & 3pdy^2\beta & \underline{\underline{pe\beta^2}} \\
 & & & 3pdy\beta^2 & \\
 & & & \underline{\underline{pd\beta^3}} & \\
 \\ 
 & & & 2ndy^3 + ney^2 + 2epy + pf & \\
 & & & 3pd.. & [-]ng
 \end{array}$$

$$\text{dividenda per } n^2y^2 + n^2y\beta + pn\beta. \quad \text{Unde fiet : } \frac{n^2y^2 + 2pny + p^2}{n^2y^2 + n^2y\beta + pn\beta} \quad \square z.$$

Ponamus  $f \sqcap \frac{-ep^2n - dp^3 - [n^3]g}{np}$ , dividi poterit fractio per  $ny + p$ . Nam:

$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{c}
 2ndy^3 + ne y^2 + 2epy + pf \\
 + 3pd \dots
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \text{f} \quad 2dy^2 \\
 [-] \quad ng
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \left\{ \begin{array}{l} +ne y \\ +pd \dots \end{array} \right. \\
 n
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 + 2epn \\
 -enp \\
 -dp^2
 \end{array}
 \\
 \boxed{\begin{array}{r} ny + p \\ ny + p \end{array}}
 \quad
 \boxed{-2dp \dots}
 \quad
 \boxed{ny + p}
 \end{array}$$

10 +  $L$  ändert Hrsg. 14  $n^2$   $L$  ändert Hrsg.

Unde patet, ut divisio sit exacta debere  $n^2pf[-]n^3g - ep^2n + dp^3$  esse  $\sqcap 0$ . et erit  
 $f \sqcap \frac{ep^2n - dp^3[+]n^3g}{n^2p}$ .

$$2dn^2y^2 + n^2ey + epn$$

$$\text{Recte divisus est, sed iam video productum } \frac{+ npd \quad - dp^2}{ny \quad + p[,\wedge n^2]} \sqcap z. \text{ rursus dividi}$$

5 posse per  $ny + p$ . ideoque nullam inde aequationem ad hyperbolam oriri.

Etsi nulla series habeat differentias exhaustibiles, nisi quae sit paraboloidum aut ex illis compositarum:

433,15–22 *Kontrollrechnung*: Proba haec est, multiplicando

$$\begin{array}{c} 2dy^2 \\ \hline + ney & \left\{ \begin{array}{l} + epn \\ - dp^2 \end{array} \right. \\ + pd.. & \left. \begin{array}{l} \\ - dp^2 \end{array} \right. \\ \hline n & [n^2] \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{per} \quad \begin{array}{c} n \quad y \quad + \quad p \\ \hline \end{array} \\ \text{fiet} \quad \begin{array}{c} + 2dpy^2 \\ \hline + p\cancel{ne}y & \left\{ \begin{array}{l} + ep^2n \\ - dp^3 \end{array} \right. \\ + p^2d.. & \left. \begin{array}{l} \\ - dp^3 \end{array} \right. \\ \hline n & [n^2] \end{array} \\ \left\{ \begin{array}{l} eph^2.. \\ - dp^2.. \\ \hline n \end{array} \right. \end{array}$$

[bricht ab]

433,16+434,1 + L ändert Hrsg. zweimal    2 – L ändert Hrsg.    4 , $\wedge n^2$  erg. Hrsg.    11+15 n  
L ändert Hrsg. zweimal

6 differentias exhaustibiles: Leibniz nimmt die Überlegung von N. 385 S. 421 Z. 22 – S. 422 Z. 26 wieder auf.

$E$				
$a$				
	$F$			
	$a - b$			
$M$		$G$		5
$b$		$a - 2b + c$		
	$N$		$H$	
	$b - c$		$a - 3b + 3c - d$	
		$P$		
$c$		$b - 2c + d$		10
			$a - 4b + 6c - 4d + e$	
		$Q$		
	$c - d$		$b - 3c + 3d - e$	
$d$		$c - 2d + e$		
	$d - e$		$c - 3d + 3e - f$	
$e$		$d - 2e + f$		15
	$e - f$			
$f$				

Videndum est an ipsarum differentiarum transversalium series possint exhaustibiles esse, ut  $E. F. G. H.$  et patet eam seriem non posse esse arithmeticam, foret enim  $E - F$ , seu  $\boxed{a - a} + b \sqcap F - G$ . seu  $a - b, [-a + 2b - c]$ . seu foret  $b \sqcap b[-]c$ . quod est absurdum. 20

Videamus an possit esse quadratica; tunc erit

$$\begin{aligned} & \begin{matrix} \begin{pmatrix} E - F \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} F - G \end{pmatrix} \sqcap \begin{pmatrix} G - H \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} H - L \end{pmatrix} \\ b \quad b[-]c \quad b + d - 2c \quad b - 3c + 3d - e \end{matrix} \end{aligned}$$

Sed hoc duo aequari absurdum est, et demonstratio generalis in promtu est, cur sit impossibile ullam seriem differentiarum transversalium exauriri posse, posito, seriem  $a. b. c. d.$  in infinitum extendi, quia seriei  $E. F. G. H. L.$  differentiae sunt  $M. N. P. Q.$  etc. et huius rursus, seriei sequentis termini, et ita in infinitum. 25

In progressione harmonica series  $a. b. c. d. e.$  etc. eadem seriei  $F. G. H. L.$  et per consequens etiam series  $M. N. P. Q.$  seriei  $b - c. c - d. d - e.$  etc.

434,7–435,18 compositarum: . . . (1) Differentiarum autem transversalium ut EFGH seriem imposs (2) Videndum  $L = 20 a + 2b + c$   $L ändert Hrsg. 20+23 + L ändert Hrsg. zweimal$

$$1 - \frac{1}{1} \quad 2 - \frac{1}{2} \quad 3 - \frac{1}{3} \quad 4 - \frac{1}{4} \quad \text{dant: } 0 \quad +\frac{3}{2} \quad +\frac{8}{3} \quad +\frac{15}{4} \quad +\frac{24}{5}$$

$$\frac{3}{2} \quad \frac{7}{6} \quad \frac{13}{12} \quad \frac{21}{20} \quad \text{etc.}$$

Sed talis series componitur ex duabus summabilibus: fractionum triangularium, et potestatum.

- 5 Si a serie quadam auferatur eius series summatrix sed uno gradu inferior, ut  
 $b, -a + b \quad c, -b + c \quad d, -c + d$  fiet:  
inde  $2b - a \quad 2c - b \quad 2d - c$  fiet series composita ex data  $b, c, d$ ; et  
differentiis  $b - a \quad c - b \quad d - c$  etc.

Idem est si in unum addas:

$$10 \quad a[-b, b] - c \quad \underbrace{a - 2b + c, b - 2c + d}_{a - b - c + d} \quad \underbrace{a - 3b + 3c - d, +b - 3c + 3d - e}_{a - 2b * c + 2d - e} \quad \text{etc.}$$

quorum differentiae:

$$a - c \quad -b + d \quad -b + c + d - e$$

[Hier folgt das Schema auf der gegenüberliegenden Seite.]

$$\frac{1}{y^2} - \frac{1}{y^2 + 2y + 1} \sqcap \frac{\boxed{y^2} + 2y + 1 \boxed{-y^2}}{y + 1, \hat{y}, \square} \text{ quorum habetur summa. Ergo } \frac{2y}{y + 1, \hat{y}, \square} \sqcap$$

$$A \qquad \qquad \qquad B$$

$$15 \quad \frac{2}{y + 1, \square, \hat{y}} \text{ et } \frac{1}{y + 1, \hat{y}, \square} \text{ pendent alterum ex altero.}$$

Data serie quadam videndum an ei addi vel adimi possit alia series, ita ut post ablationem vel additionem producta series sit eadem sed uno tantum gradu superior vel inferior additae[,], ademtae, tunc enim ea series erit propositae quadratrix.

$$8 \text{ differentiis erg. } L \quad 15 \text{ f. altero. (1) Addatur ad (2) Ad } \frac{2y + 1}{y + 1, y, \square} \text{ addatur } \frac{y, \square}{y + 1, \hat{y}, \square}$$

$$\sqcap \frac{1}{y + 1, \square}, \text{ fiet: } \frac{1}{y^2} \quad (3) \text{ Data } L \quad 18 \text{ additae erg. } L$$

11 \* c: c hat den Koeffizienten 0.

$$\begin{array}{rccccc}
 & & & & & \\
 & \frac{1}{1} & & & & \\
 & & \frac{3}{4} & & & \\
 & \frac{1}{4} & & \frac{88}{144} & & \\
 & & \frac{5}{36} & & & \\
 & \frac{1}{9} & & & & 5 \\
 & & \frac{7}{9 \cap 16} & & & \\
 & \frac{1}{16} & & & & \\
 & & \frac{9}{16 \cap 25} & & & \\
 & \frac{1}{25} & & & & \\
 & & \frac{11}{25 \cap 36} & & & 10 \\
 & \frac{1}{36} & & & & \\
 & & \frac{13}{36 \cap 49} & & & \\
 & \frac{1}{49} & & \frac{15}{49 \cap 64} & & \\
 & \frac{1}{64} & & & & 15 \\
 & & \frac{17}{64 \cap 81} & & & \\
 & \frac{1}{81} & & & & \\
 & & \frac{19}{81 \cap 100} & & & \\
 & \frac{1}{100} & & & & 
 \end{array}$$

Ad  $\frac{2y+1}{y+1, \hat{y}, \square}$  addatur  $\frac{1}{y+1, \hat{y}, \square} \cdot \frac{2y+2}{y+1, \hat{y}, \square}$ , fiet:  $\frac{2}{y+1, \hat{y}, y^2}$ , sive  
 $\frac{2}{y+1, \hat{y}, \hat{y}}$ .

Ita tres ergo series:  $\frac{1}{y+1, \square, \hat{y}} \cdot \frac{1}{y+1, y, \square} \cdot \frac{1}{y+1, y^2}$  pendent a se invicem, ita ut  
 una inventa et reliquae habeantur. Iam secundae momentum ex  $y$ . dat primam; eiusdem  
 5 secundae momentum ex  $y+1$ . dat tertiam. Tertia ergo differt a [prima] cylindro mediae,  
 quod et per se patet, quia et ordinatae extremarum differunt (ordinata mediae).

Fiat series, ipsarum  $p$ , ita ut  $\frac{p}{w[\square] \text{ diff. ord.}} \sqcap \frac{\text{ord.}}{1}$ , fiet  $p \sqcap \frac{\text{ord. } \hat{y} \text{ diff. ord.}}{1}$ .

Cui si addantur triangula semiquadrata [differentiarum] ordinatarum, habebitur series  
 summabilis. Unde: si ordinatae  $\frac{1}{y}$ . differentiae ordinatarum  $\frac{1}{y^2+y}$ . fiet  $p \sqcap \frac{1}{y^3+y^2} \sqcap$   
 10  $\frac{1}{y+1, \hat{y}^2}$ . addatur  $\frac{1}{y+1, y, \square, 2}$ . summa huius seriei erit [semiquadratum]. Itaque se-

3 Über  $\frac{1}{y+1, y, \square}$ , mit Hinweisstrich verbunden: Haec series media est fractionum  
 triangularium quadratarum.

10 Über addatur: Imo subtrahi debet, haec causa erroris porrecti usque ad signum  
 $\mathbb{D}$ .

436,18–438,1 quadratrix. (1) A serie (2) Differentia differentiae:  $\frac{2y+1}{y+1, \hat{y}, \square} - (3)$  Ad  $L$   
 4 Iam (1) primae (2) secundae  $L = 5$  f. a | prima ändert Hrsg. | cylindro mediae (1). Ergo summa seriei  
 $\frac{1}{y+1, \hat{y}^2} - \frac{1}{y+1, \square, \hat{y}}$  seu  $\frac{y+1-y}{y+1, \text{cub}, y^4}$  (2), quod  $L = 7 \sqcap$  erg. Hrsg. 7 f.  $\frac{\text{ord. } \hat{y} \text{ diff. ord.}}{1}$   
 (1), horum summa habetur triangulo semiquadrato ordinatae maximae (2). Cui  $L = 8$  differentiarum  
 erg. Hrsg. 8 habebitur (1) figura (2) series  $L = 10$  quadratum  $L$  ändert Hrsg.

9 si ordinatae  $\frac{1}{y}$ : Leibniz nimmt die Überlegung von 384 S. 404 Z. 5–8 wieder auf. 11 f. fractio-  
 num triangularium quadratarum: Im Nenner stehen die Quadrate der verdoppelten Dreieckszahlen; der  
 Fehler tritt in S. 439 Z. 13, in N. 388 S. 445 Z. 14 und in N. 389 S. 460 Z. 10 f. wieder auf.

ries  $\frac{1}{y^3 + y^2}$ , etiam [ex] quadratis triangularium pendet. Habemus ergo quatuor series, quarum una habita, caeterae omnes habentur, nempe:

$$\begin{array}{ccc} \frac{1}{y+1, \square, y} & \frac{1}{y+1, y, \square} & \frac{1}{y+1, y^2} \\ A & B & C \end{array}$$

$$C - A \sqcap B. \quad \frac{B}{2} + C \sqcap \underline{\underline{\underline{\underline{\text{cognito}}}}} \text{. Ergo } 2C - A \sqcap \underline{\underline{\underline{\underline{\text{cognito}}}}}.$$

5

Iam  $2A + B$  aequatur  $\underline{\underline{\underline{\underline{\text{cognito}}}}}$  per superiora.

Ergo  $C - A \sqcap \underline{\underline{\underline{\underline{\text{cognito}}}}} - 2A$ . Ergo  $C \sqcap \underline{\underline{\underline{\underline{\text{cognito}}}}} - A$ .

At idem  $A$  aequatur  $2C - \underline{\underline{\underline{\underline{\text{cognito}}}}}$ . Ergo  $C \sqcap \underline{\underline{\underline{\underline{\text{cognito}}}}} - 2C + \underline{\underline{\underline{\underline{\text{cognito}}}}}$ .

Ergo  $\underline{\underline{\underline{\underline{3|C}}}} \sqcap \frac{\underline{\underline{\underline{\underline{\text{cognito}}}}} + \underline{\underline{\underline{\underline{\text{cognito}}}}}}{3}$ . Unde sequitur has tres series repertas.

Data serie summatrice, seriei  $C$ , necesse est et seriei summaticis eius dari summam, 10 quia, momentum seriei  $C$ . ex  $y$ . datur.

Data summa seriei  $C$ , dabitur et summa omnium  $\frac{1}{y^2}$ , quod ita ostendo, momentum seriei  $C$  seu  $\frac{1}{y+1, y^2}$  ex  $y$ , habetur; est enim summa fractionum triangularium.

Momentum autem seriei  $C$ , ex  $y+1$ . est  $\frac{1}{y^2}$ . quod a priore differt cylindro seriei  $C$ .

Operae ergo pretium est, ut ista nonnihil resumamus.

15

---

#### 14 Am Rande: ፩

1 ex erg. Hrsg. 1 ergo (1) quinque (2) quatuor  $L$  9 f. repertas. (1) Reperta serie C (2)  
Data  $L$  14 cylindro (1) figurae (2) seriei  $L$

---

5  $2C - A \sqcap \underline{\underline{\underline{\underline{\text{cognito}}}}}$ : Richtig wäre  $3C - A = 2\underline{\underline{\underline{\underline{\text{cognito}}}}}$ . Leibniz rechnet konsequent weiter. Die Überlegung wird dadurch bis Z. 9 zusätzlich beeinträchtigt. 13 fractionum triangularium: s. o. Erl. zu S. 438 Z. 11 f.

$\frac{1}{y^2} - \frac{1}{y^2 + 2y + 1}$  in cognitis d  $\sqcap \frac{1}{b^2}$ . Ergo  $\frac{\boxed{y^2} + 2y + 1 \boxed{-y^2}}{y + 1, y, \square} \sqcap \frac{1}{b^2}$ . ponendo b esse minimam abscissarum,  $y_{[1]}$  et  $\frac{1}{b^2}$  maximam ordinatarum, in nostro casu.

Ergo  $\frac{2}{y + 1, \square, y} + \frac{1}{y + 1, y, \square} \sqcap \frac{1}{b^2}$ . Ad  $\frac{2y + 1}{y + 1, y, \square}$  addatur  $\frac{1}{y + 1, y, \square}$  fiet:

$$2A \qquad \qquad B \qquad \qquad 2A + B \sqcap \frac{1}{b^2} \qquad \qquad B$$

5       $2A + 2B \sqcap \frac{2y + 2}{y + 1, y, \square} \sqcap \frac{1}{b^2} + B \sqcap \frac{2}{y + 1, y^2} \sqcap 2C.$

Ergo  $\frac{1}{b^2} \sqcap 2C - B \sqcap 2A + B$ . Ergo vel una ex his tribus seriebus separatim data caeterae habentur, unde rursus patet, vel unica ex his seriebus data haberi ipsam  $\frac{1}{y^2}$ .

Sed nunc pergamus:

Sumatur iam series harmonica  $\frac{1}{y}$ , differentia ordinatarum  $\frac{1}{y} - \frac{1}{y+1} \sqcap \frac{\boxed{y} + 1 \boxed{-y}}{y^2 + y} \sqcap$   
10       $\frac{1}{y+1, y}$ . Fiat terminus seriei cuiusdam alterius qui sit,  $\frac{1}{y} \sim \frac{1}{y+1, y}$ : auferatur ab eo

$C$

semiquadratum differentiae, seu  $\frac{1}{y+1, y, \square, 2} \sqcap \frac{B}{2}$ . summa erit  $\frac{1}{2b^2}$  semiquadratum ab  
 $\frac{1}{b}$  ordinata maxima. Erit  $C - \frac{B}{2} \sqcap \frac{1}{2b^2}$ , seu  $2C - B \sqcap \frac{1}{b^2}$ , ut ante. Nondum ergo ipsa vel  
 $C$ , vel  $B$ , vel  $A$ , habetur. Superest ut ostendam ex data  $C$ , et per consequens aliqua alia,  
15      quas dixi dari  $\frac{1}{y^2}$ .

1 f. ponendo ... casu. erg. L      9 series (1)  $\frac{1}{y^2}$ , differentia ordinatarum (a)  $\frac{1}{y^2 + 2y + 1}$  (b)  $\frac{2}{y}$   
(c)  $\frac{1}{y^2} - \frac{1}{y^2 + 2y + 1} \sqcap y^2 + 2y + 1 - y^2$  (2) harmonica L      12 f. semiquadratum ... maxima erg.  
L

Nam momentum ipsius  $C$ , ex  $y$ , est  $\frac{1}{y^2 + y}$  quod est  $\pi \frac{1}{b}$ . Momentum ipsius  $C$ , ex  $y + 1$ , est  $\frac{1}{y^2}$ . Ergo differentia inter  $\frac{1}{y^2}$ , et  $\frac{1}{y^2 + y}$  erit  $C$ . Nam  $\frac{y^2 + y - y^2}{y^2 + y} = \frac{1}{y + 1, y^2}$ .  
Ergo  $\frac{1}{y^2} - \frac{1}{b} = C$ . Ergo  $\frac{1}{by^2} - \frac{1}{b^2} = \left[\frac{C}{b}\right] = \frac{1}{by^2} + B - 2C$ . Unde  $C = \frac{\frac{1}{by^2} + B}{\left[\frac{1}{b}\right] + 2}$ .

Aliquando ex hac aequationum inter summas combinatione aliquid elici poterit.


Series autem  $\frac{1}{2y^2}$  est momentum seriei  $\frac{1}{y}$  ex axe. Idem momentum vero et aliter per regulam superiorem haberi potest, (vide part. 2. huius schediasmatis et ibi fig. pag. eius plagulae 2.). Nimurum rectangula ut  $MNE$  vel  $QHP$  sub abscissa figuram compleant. Ergo

5

4 *Am Rande:* Adde infra schediasm. part. VII. pag. eius plagulae 3. sub fin.

3 Cb *L ändert Hrsg.*      3 b *L ändert Hrsg.*      7 abscissa (1) constituunt figuram, ergo (2) figuram *L*

6 vide: N. 383 Fig. 2:



8 infra: s. u. N. 389 S. 461 Z. 2–5.

et figurae momentum componitur ex rectangulorum momentis, rectanguli autem cuiusque momentum fit ex ductu ipsius rectanguli in distantiam eius centri gravitatis, ab axe  $AG$ . Nimirum ordinata  $AE$  vel  $LN$  fit rectangulum  $ALEN$  esto  $\frac{1}{1}$ , abscissa eius 1.  $AL$ . Differentia huius ordinatae a sequenti, est rectangulum  $MNE$ , sed si nulla sequatur,  
5 in computo, seu si is hic terminetur, tunc ipsa ordinata censebitur eius differentia ab ultima 0 seu zero.

Semper ergo momentum figurae v. g. [AGHMNE] ita habebitur[,] differentia ordinatarum, quae hoc loco unica est  $MN[\frac{1}{2}]$  ducatur in abscissas hoc loco in  $AL$ ,  $\frac{1}{2}$  fient rectangula ut hoc loco  $MNE \cap \frac{1}{2} \cap \frac{1}{2}$ . ducatur quodlibet rectangulum in ordinatam  
10 suam hoc loco  $MNE$  in  $LN \cap MN$ . sed dimidia  $PE$ , minutam, seu  $LN - \frac{PE}{2} \cap \frac{3}{4}$  hoc loco fiet  $\frac{3}{8}$ . Summae omnium horum solidorum addatur momentum ipsius  $GHP$  scilicet ultima ordinatarum  $GH$ , hoc loco  $\frac{1}{2}$  ducta in suam abscissam 2, fiet rectangulum  $GHP \cap 1$ . cuius momentum fit si ducatur in  $\frac{GH}{2}$  dimidiā ordinatam,  $\frac{1}{4}$  erit eius momentum,  $\frac{1}{4}$ . Addatur  $\frac{3}{8} + \frac{2}{8}$  fiet  $\frac{5}{8}$ , sive  $\frac{1}{2} + \frac{1}{8}$  quod est figurae momentum. Idem  
15 autem provenit, si sumas semiquadrata ordinatarum nempe  $\frac{1 \cap 1}{2}, + \frac{2 \cap 2}{2}$  seu  $\frac{1}{2} + \frac{1}{[8]}$ .

Sic ergo generaliter:

---


$$15 \quad Am Rande: \frac{1}{2} + \frac{1}{8}$$

2 ipsius erg.  $L \quad 3$  Nimirum (1) abscissa AE (2) ordinata AE vel LN | (a) seu rectangulum (b)  
fit rectangulum ALEN erg. | esto  $L \quad 4$  ordinatae (1) a praecedente, est ipsamē ordinata (2) a  $L$   
7 AHGMNE  $L$  ändert Hrsg. 8 loco (1) unica (2) duea (3) unica est. (a) Rectangulum MNE (b)  
MN | n erg. Hrsg. |  $\frac{1}{2}$  (aa) ductis, in (bb) et GH, ordinata ultima,  $\frac{1}{2}$  (aaa) ductis in (bbb) ducantur in  
abscissas, prior in  $AL \cap 1$ , posterior in  $AG \cap 2$ , fient rectangula  $MNE \cap \frac{1}{2}$ , et  $GHP \cap 1$  (c) ducatur  
 $L \quad 8$  f.  $AL \cap 1$  (1) eorum summa hoc loco (a) triangula (b) fient (2) fient rectangula | ut hoc loco  
erg. | MNE  $L \quad 10$  sed (1) abscissa (2) dimidia  $L \quad 11$  momentum ... scilicet erg.  $L \quad 12$  hoc loco  
erg.  $L \quad 15 \quad 4$   $L$  ändert Hrsg.

$\frac{x^2}{2} \mp ywx - \frac{yw^2}{2} + \frac{e^2 b}{2}$ , ponendo  $y$  abscissam,  $x$  ordinatam,  $w$  differentiam [ordinatarum],  $e$  ultimam ordinatam[,]  $b$  ultimam abscissam. Quae est reg. [6.] schediasm. part. 2.

Unde duci potest corollarium semper haberi summam seriei  $\frac{x^2 + yw^2 - 2ywx}{2} \mp \frac{e^2 b}{2}$ . Quod ut exemplo nostro applicemus fiet  $\frac{1}{y^2} + \frac{1}{y+1, \square, y} - \frac{2}{y^2+y} \mp e^2 b \mp \frac{1}{b}$ . Iam 5  
 $\frac{2}{y^2+y} \mp \frac{2}{b}$ . Ergo (1)  $\frac{1}{y^2} + \frac{1}{y+1, \square, y} \mp e^2 b + \frac{2}{b}$ . Iungamus duas aequationes supra in-  
*A*  
ventas: (2)  $\frac{1}{b^2} \mp 2C - B \mp 2A + B$  (3). ♀ Ergo (4)  $C \mp A + B$  et (5)  $\frac{1}{y^2} - \frac{1}{b} \mp C$ . Ergo (6)  
 $\frac{1}{y^2} - \frac{1}{b} \mp A + B$  per 5. et 4. Iam  $B \mp \frac{1}{b^2} - 2A$ . per 2. et 3. Ergo  $\frac{1}{y^2} - \frac{1}{b} \mp (\overline{A}) + \frac{1}{b^2} - \overline{(2)}A$ .  
Iam  $-A \mp \frac{1}{y^2} - e^2 b + \frac{2}{b}$  per aeq. 1. et fiet:  $\left(\frac{1}{y^2}\right) - \frac{1}{b} \mp \frac{1}{b^2} \left(+\frac{1}{y^2}\right) - e^2 b + \frac{2}{b}$ . 10

Error calculi in eo quod scilicet ordinatam primam quae differentiarum summa est, cum ultima, confudi. Aequatio, in qua ultima ordinata adhibetur ut ubi est  $e^2 b$  servit tantum ad finite productarum serierum inveniendas summas.

8 Zu ♀ am Rande:

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{y+1, \square, y} \\ B &= \frac{1}{y+1, y, \square} \\ C &= \frac{1}{y+1, y^2} \end{aligned}$$

1 Quae est reg. | 2. ändert Hrsg. | schediasm. part. 2. erg.  $L$  1 f. abscissarum  $L$  ändert Hrsg.  
10 per aeq. 1. erg.  $L$  12 ut | ut streicht Hrsg. | ubi  $L$

2 reg. [6.]: s. o. N. 383 S. 399 Z. 1–3.

Ergo appellando ordinatas inconstantes  $x$ . abscissas inconstantes  $y$ . abscissam  $b$ . maxima ordinatae,  $e$ . abscissam  $d$ . minima ordinatae,  $h$ . fient regulae:

$\frac{x^2}{2} \sqcap ywx - \frac{yw^2}{2} + \frac{d^2h}{2}$ . Et pari iure  $\frac{y^2w}{2} + \frac{d^2h}{2} \sqcap xy - \frac{x}{2} \cdot e - h \sqcap w \cdot xw \sqcap \frac{e^2}{2} - \frac{w^2}{2}$ .  
 $yw \sqcap x$ . in decrescentibus. Nam in ascendentibus, seu crescentibus  $yw \sqcap eb - x$ .

5 Variandae hae regulae nonnihil prout series crescent aut decrescent, item omitti poterat mentio minima ordinatae; intelligendo eam semper esse ultimam  $w$ . Contra ubique inseri etiam potest, ubi ipsarum  $w$ , mentio est.

Omnis series hactenus inventae per unam ex his regulis habentur; exceptis seriebus potestatum, quae habentur per differentias exhaustas. Executiendum adhuc hoc argumentum, quando in numeris mutare licet abscissam in ordinatam et contra. Ita  $x \sqcap \frac{1}{y}$ . Unde

$y \sqcap \frac{1}{x}$ . Harmonica series ab utroque latere similis, ut si semper procederet ista inversio, posset haberi summa irrationalium.

$\sqrt{y+1} - \sqrt{y} \sqcap z$ . Unde:  $\boxed{y} + 1 - \boxed{-y} - 2\sqrt{y^2 + 1} \sqcap z^2$ . Ergo  $z^4 - 2z^2\boxed{+1} \sqcap 4y^2\boxed{+1}$ . et fiet  $z\sqrt{z^2 - 2} \sqcap 2y$ . Pro  $z$ . pone  $v + \frac{1}{2}$ . fiet  $\sqrt{z^2 - 2} \sqcap \sqrt{v^2 + 1 + \frac{1}{4} - 2}$ . sive  $\sqrt{v^2 - 1 + \frac{1}{4}} \sqcap$   
15  $v - \frac{1}{2}$ , et fiet:  $v^2 - \frac{1}{4} \sqcap 2y$ . eritque  $v \sqcap \sqrt{y + \frac{1}{4}}$ . Sumta ergo serie numerorum irrationalium  $\sqrt{9} \sqrt{8} \sqrt{7} \sqrt{6} \sqrt{5} \sqrt{4} \sqrt{3} \sqrt{2} \sqrt{1}$ . et alia  $\sqrt{8 + \frac{1}{4}} \sqrt{7 + \frac{1}{4}} \sqrt{6 + \frac{1}{4}} \sqrt{5 + \frac{1}{4}} \sqrt{4 + \frac{1}{4}}$   
 $\sqrt{3 + \frac{1}{4}} \sqrt{2 + \frac{1}{4}} \sqrt{1 + \frac{1}{4}}$ . summa erit 2.  $(\sqrt{3} - \sqrt{1}) - \frac{1}{2} \sqcap \frac{3}{2}$  [bricht ab]

3 Über der ersten Gleichung: Reg. 6. plagulae 2<sup>dae</sup>.

13 Darüber: Error calculi

13–17 Der Abschnitt weist eine Reihe von Rechenfehlern auf. Leibniz ändert den Ansatz zweimal durch Überschreiben in  $\sqrt{y-1} - \sqrt{y}$  bzw.  $\sqrt{y-1} + \sqrt{y}$ , erkennt aber, daß dies nicht zum Erfolg führt. Er vermerkt die Fehlerhaftigkeit und beginnt im folgenden Teilstück von neuem. 18 Reg. 6.: s.o. N. 383 S. 399 Z. 1–3.

## 388. DE SERIERUM SUMMIS ET DE QUADRATURIS PARS SEXTA

**Überlieferung:** L Konzept: LH 35 V 4 Bl. 14–15. 1 Bog. 2°. 4 S. tlw. zweispaltig.  
Cc 2, Nr. 775 A tlw.

Schediasmatis de serierum summis pars VI<sup>ta</sup>.

Cogitandum est de summis irrationalium ineundis:  $\sqrt{y+1} - \sqrt{y}$  n. z. fiet:

5

$y + 1 + y - 2\sqrt{y^2 + y}$  n.  $z^2$ . sive  $2y + 1 - z^2$  n.  $2\sqrt{y^2 + y}$ . et rursus quadrando:

$\boxed{4y^2} + 4[y] - 4yz^2 + 1 - 2z^2 + z^4$  n.  $\boxed{4y^2} + 4y$ . et fiet:

$z^4 - 2z^2$  n.  $[-1]$ . sive  $z$  n.  $\sqrt{2y + 1 - 2\sqrt{y^2 + y}}$ .  
–  $4y$ ..

Huius seriei finitae, quoniam iniri potest summa, poterit etiam summa inveniri se- 10  
rierum aliarum finitarum, quae constant summis differentiisque aliarum serierum sum-  
mabilium cum hac.

Sed: antea videamus an haec series redi possit simpliciter, assumta tali valore ipsa-  
rum  $y$ , ut ex  $\sqrt{y^2 + y}$  extrahi possit radix seu sumtis illis tantum numeris triangularibus,  
qui sunt quadrati. Qualis est 36. 15

$\boxed{y^2} + y$ . aequandus quadrato  $\boxed{y^2} \mp 2ym + m^2$ . fiet  $y \mp 2ym$  n.  $m^2$ . et  $y$  n.  $\frac{m^2}{1 \pm 2m}$ ,  
sive ut denominator sit affirmativus et  $m$  integer,  $\frac{m^2}{1 + 2m}$  et dividendo

15 Daneben, in der Vorlage als Spalten geschrieben:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	6	10	15	21	28	36	

4 pars (1) 5<sup>ta</sup> (2) VI<sup>ta</sup> L 7 y erg. Hrsg. 8 4y – 5 L ändert Hrsg. 10 finitae erg. L

16 + $m^2$ . (1) erit  $3y$  n.  $m^2$  et  $y$  n.  $\frac{m^2}{3}$ . Sumantur ergo omnes (2) fiet L

14 numeris triangularibus: Leibniz führt die Überlegung irrtümlich für die verdoppelten Dreieckszahlen  $y^2 + y$  durch, wie er in der Anmerkung zu S. 446 Z. 4–11 erkennt, korrigiert den Text aber nicht.

$$\begin{array}{c}
 -\frac{m}{2} \\
 \boxed{2m+1} \quad * \quad * \quad f \quad \frac{m}{2} - \frac{1}{4} \\
 \boxed{2m+1}
 \end{array}$$

$\frac{m^2}{1 \pm 2m} \sqcap p$ . integro. Ergo  $\frac{m^2}{p} \sqcap 1 \pm 2m$ . Ponamus  $m \sqcap pq$ . fiet:  $\frac{p^2q^2}{p} \sqcap 1 + 2pq$ .

5 Ergo  $q^2p \sqcap 1 + 2pq$ .  $q^2p - 2pq \sqcap 1$ . Unde  $qp - 2p \sqcap \frac{1}{q}$  integer fracto, quod est impossibile.

Eodem modo:  $m^2 \sqcap p \pm 2mp$ . Ergo  $\frac{m^2}{p} \sqcap 1 \pm 2m$ . Ergo  $m^2$ , divisibilis per  $p$ . ita tamen

ut radix eius non sit divisibilis per  $p$ . Deinde  $m^2 \neq 2mp \sqcap p$ , erit  $m \neq [2]p \sqcap \frac{p}{m}$ . Ergo  $p$

divisibilis per  $m$ . Ergo resumta aequatione pro  $p$  ponendo  $mn$ , fiet:  $\frac{m^2}{1 \pm 2m} \sqcap mn$ . Ergo

$\frac{m}{1 \pm 2m} \sqcap n$ . Unde:  $m \sqcap n \pm 2mn$ , et  $m \neq 2mn \sqcap n$ . Ergo  $1 \neq 2n \sqcap \frac{n}{m}$ . Ergo  $n$ , divisibilis

10 per  $m$ . Ponamus ergo  $n \sqcap mh$ , fiet resumta aequatione  $\frac{\cancel{m}}{1 \pm 2m} \sqcap \cancel{mh}$ . et fiet  $\frac{1}{1 \pm 2m} \sqcap h$ .

Ergo si  $m$  sit integer  $h$ , necessario est fractus.

4–447,12 Valde notabilia hic dicta sunt de integris investigandis per duplum methodum.

4–11 Ex ratiocinatione ista patet impossibile esse ut numerus triangularis duplicatus fiat unquam quadratus.

5 +2pq. (1) | Sed streicht Hrsg. | non ita exitus an ita: (2)  $q^2p - 2pq L \quad 7 \ 2$  erg. Hrsg.

4  $\frac{m^2}{1 \pm 2m}$ : Leibniz hat die Rechnung bis Z. 5 zunächst mit dem Ansatz  $\frac{m^2}{1 + 2m}$  durchgeführt und nachträglich nicht durchgehend verallgemeinert.

$$\begin{array}{r}
 1 \pm 2m \wedge sm + r \sqcap m^2. \\
 \begin{array}{r}
 sm + r \\
 \hline
 r \pm 2mr
 \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{r}
 sm \pm 2sm^2 \\
 \hline
 \pm 2sm^2 \pm 2mr + r \sqcap m^2 \text{ sive } \pm 2sm^2 \pm 2rm + r \sqcap m^2. \\
 + sm \qquad \qquad \qquad + s..
 \end{array}
 \end{array}
 \quad 5$$

NB. ista dividendi methodus in numeris non ita procedit, ut in incognitis etiamsi ipsi numeri debeant esse incogniti seu generales ut hoc loco  $m$ , ponendo  $\pm s \sqcap \frac{1}{2}$  fiet:

$\boxed{m^2} \pm 2rm + r \sqcap \boxed{m^2}$ . et  $m \sqcap \frac{-r}{\pm 2r \pm \frac{1}{2}}$  sive  $m \sqcap \frac{-2r}{\pm 4r \pm 1} \sqcap \frac{2r}{\pm 4r \pm 1}$ . Invertendo  
 $\pm \frac{1}{2} ..$

$\frac{\pm 4mr \pm m}{2r}$  [n]  $1 \sqcap \pm 2m \pm \frac{m}{2r}$ . tantum ergo opus est sumi  $m$ , multiplum ipsius  $2r$ . et 10  
poterit  $m^2$ , dividi per  $1 \pm 2m$ . id est fiet:  $1 \sqcap \pm 4rt \pm t$ . et erit  $\frac{1}{\pm 4r \pm 1} \sqcap t$ . seu  $1 \sqcap \pm 4r \pm 1$ .  
Ergo  $r \sqcap 0$ . Si  $r$  debet esse integer esse debet  $m \sqcap 0$ .

Ut ergo redeamus ad scopum, quia summa haberi potest huius seriei,  $z \sqcap \sqrt{2y + 1 - 2\sqrt{y^2 + y}}$  et ponendo  $y \sqcap \frac{m^2}{1 \pm 2m}$  fit  $\sqrt{y^2 + y} \sqcap y \pm m$ . seu  $\frac{m^2}{1 \pm 2m} \pm m$ .  
fiet  $z \sqcap \sqrt{\boxed{2}y + 1 \boxed{-} y \pm m}$  sive  $z \sqcap \sqrt{\frac{m^2}{1 \pm 2m} + 1 \pm m}$  sive  $\sqrt{\frac{2m^2 + 1 \pm 2m \boxed{+} m^2}{1 \pm 2m}}$ , sive 15

---

1–12 Notabilis haec methodus habendi numeros integros, in exemplum, etsi alioquin hic exitum non dederit.

14 Neben ponendo: Error ab hoc signo  $\odot$  usque ad sequens  $\oslash$ .

5+7 +r  $\sqcap m^2$  (1) et ponendo s  $\sqcap n + 1$ . fiet:  $2nm^2$  (2) NB. L 10  $\sqcap$  erg. Hrsg.

---

14 ponendo  $y \sqcap \frac{m^2}{1 \pm 2m}$ : Der folgende Ansatz, bei dem  $m$  die natürlichen Zahlen durchläuft, ist verfehlt; Leibniz erkennt dies ab S. 451 Z. 12 und markiert den ungültigen Abschnitt. 15 fiet  $z$ : Leibniz vergißt bei der Ersetzung von  $2\sqrt{y^2 + y}$  den Faktor 2 und im Zähler des dritten Wurzelausdrucks den Term  $\pm m$ . Die Rechnung wird dadurch bis S. 448 Z. 9 beeinträchtigt, Leibniz setzt anschließend neu an.

$z \sqcap \frac{\sqrt{2m^2 \pm 2m + 1}}{1 \pm 2m}$ . Sumtis ergo  $m$  numeris naturalibus; summa quotcunque irrationalium huius naturae haberi potest. Mutando signum in  $+$ , fiet  $z \sqcap \sqrt{\frac{2m^2 + 2m + 1}{2m + 1}}$ , sive

$$z \sqcap \sqrt{\frac{2m^2}{2m + 1} + 1}.$$

Ergo  $\sqrt{\frac{2}{2+1} + 1}$      $\sqrt{\frac{8}{4+1} + 1}$      $\sqrt{\frac{18}{6+1} + 1}$      $\sqrt{\frac{32}{8+1} + 1}$  summarri possunt. Eo-

rum enim summa est differentia inter maximam seu potius proxime maiorem et minimam  $\sqrt{y}$ . Maxima est exclusa, minima inclusa.

Iam  $y \sqcap \frac{m^2}{1 \pm 2m}$  seu  $\frac{m^2}{1 + 2m}$ . fiet  $\sqrt{y} \sqcap \frac{m}{\sqrt{1 + 2m}}$ . Proxime maior ergo  $y$  est  $\frac{25}{1 + 10} \sqcap$   
 25    cuius radix  $\frac{5}{\sqrt{11}}$ . minima autem est  $\frac{1}{3}$ , seu  $\frac{1}{\sqrt{3}}$ . Ergo  $\frac{5}{\sqrt{11}} - \frac{5}{\sqrt{3}}$  aequantur summae horum quatuor irrationalium.

10 Res ob momentum sui resumenda est:

$$\frac{\frac{m+1}{3}}{\sqrt{\frac{1}{3} + 2m \frac{1}{3}}} - \frac{m}{\sqrt{1+2m}} \sqcap z.$$

$$\text{Ergo } \frac{\frac{m^2 + 2m + 1}{3}}{\frac{1}{3} + 2m \frac{1}{3}} + \frac{m^2}{1+2m} - 2 \cap \sqrt{\frac{m^2 + m}{3 + 2m + 2m + 4m^2}} \sqcap z^2.$$

15    Ergo  $\frac{m^2 + 2m + 1}{3 + 2m} + \frac{m^2}{1+2m} - z^2 \sqcap \frac{+2m^2 + 2m}{\sqrt{3 + 4m + 4m^2}}$  in quo patet esse errorem.

Resumatur res ab ovo:  $\sqrt{y+1} - \sqrt{y} = z$ .

1 numeris (1) arithmet (2) naturalibus  $L = 5$  enim (1) summa est:  $\sqrt{y+1} - \sqrt{y}$ . (a) ita mut  
 (b). Est autem (c) si (2) summa  $L = 5$  seu ... maiorem erg.  $L = 6\sqrt{y}$ . (1) Est autem maxima ex (2)  
 Maxima est (a) inclusa (b) exclusa  $L$

---

13  $+2m + 4m^2$ : Richtig wäre  $+6m + 4m^2$ . Leibniz bemerkt die Unstimmigkeit in der nächsten Zeile und setzt neu an.

Ergo  $y + 1 + y - 2\sqrt{y^2 + y} \sqcap z^2$ . Ergo  $z \sqcap \sqrt{2y + 1 - 2\sqrt{y^2 + y}}$ . Pone  $y^2 + y \sqcap y^2 - 2ym + m^2$ , fiet:  $y \sqcap \frac{m^2}{1+2m}$ . Quare resumendo fiet:  $\sqrt{\frac{m^2}{1+2m} + 1} - \sqrt{\frac{m^2}{1+2m}} \sqcap z$ . Ita NB. cum abscissae sint  $y$ , erunt quidem progressiones arithmeticæ, nam differunt unitatibus. Sed prima earum vel minima, non erit unitas, sed  $\frac{1}{1+2} \sqcap \frac{1}{3}$ . Ordinatae autem erunt harum abscissarum radices. Si  $m$  sit 4.  $\sqrt{\frac{m^2}{1+2m}}$  erit  $\frac{[4]}{3}$ .

5

$$\frac{2m^2}{1+2m} + 1 \left[ -2\sqrt{\frac{m^4}{1+4m+4m^2} + \frac{m^2}{1+2m}} \right] - 2\sqrt{\frac{m^4+m^2+2m^3}{1+4m+4m^2}} \sqcap z^2.$$

Iam ex hac quantitate signo affecta potest extrahi radix, fiet ergo  $\frac{2m^2}{1+2m} + 1 - 2 \hat{}$

$\frac{m^2+m}{1+2m} \sqcap z^2$ , fietque  $1 - \frac{2m}{1+2m} \sqcap z^2$ , sive  $\frac{1+2m-2m}{1+2m}$ . et fiet  $z \sqcap \sqrt{\frac{1}{1+2m}}$ . quod

conferendum superiori  $z \sqcap \sqrt{2y + 1 - 2\sqrt{y^2 + y}}$ , sive  $z \sqcap \sqrt{\left(\frac{2m^2}{1+2m}\right) + 1 - \left(\frac{2m^2}{1+2m}\right) - 2m}$ .

Rursus error in calculo.

10

Quem ut corrigamus videndum:  $\frac{m^2}{1+2m} + 1, \hat{\frac{m^2}{1+2m}}$ , facit  $\frac{m^4}{1+2m}, \square + \frac{m^2}{1+2m}$ ,  
vel  $\frac{m^4+m^2}{1+2m}, \square$  vel  $\frac{m^4+m^2+2m^3}{1+2m}, \square$  vel  $\frac{m^2+m}{1+2m}, \square$ .

Ergo  $-2\sqrt{\frac{[m^2]}{1+2m} + 1} \hat{\frac{m^2}{1+2m}}$  facit:  $-2\sqrt{\frac{m^2+m}{1+2m}}, \square \sqcap -2 \hat{\frac{m^2+m}{1+2m}}$ .

Ergo  $-2\sqrt{y^2+y} \sqcap \frac{-2m^2-2m}{1+2m}$  et  $\sqrt{y^2+y} \sqcap \frac{m^2+m}{1+2m}$ . Quod debet esse  $y - m$ .

seu  $\frac{m^2}{1+2m} - m$  seu  $\frac{(\underline{m^2}) - m - (\underline{2})m^2}{1+2m}$ . Sola ergo in signis differentia est. Quodsi ergo

15

ponamus  $m - y$ , fiet  $\frac{-m^2+m+2m^2}{1+2m}$  sive  $\frac{m^2+m}{1+2m}$ . Quod et faciendum est nam quia

4 vel minima erg. L      5 2 L ändert Hrsg.      13 m<sup>2</sup> + 1 L ändert Hrsg.

$y \sqcap \frac{m^2}{1+2m}$  ideo  $y$  est minor quam  $m$ . Concors ergo hoc modo fit calculus. Quia ergo  
 $\sqrt{y^2+y} \sqcap \frac{m^2+m}{1+2m}$ . ideo pro  $z \sqcap \sqrt{2y+1-2\sqrt{y^2+y}}$ . fiet:

$$z \sqcap \sqrt{\frac{2m^2}{1+2m}} + 1 \left[ -\frac{2m^2}{1+2m} \right] - \frac{2m}{1+2m}, \text{ et vel } z \sqcap \sqrt{1 - \frac{2m}{1+2m}}, \text{ sive}$$

$$z \sqcap \sqrt{\frac{1+2m-2m}{1+2m}}, \text{ sive } z \sqcap \frac{1}{\sqrt{1+2m}}.$$

5 Quod si pro  $\sqrt{y^2+y}$  ponamus radicem,  $\frac{m^2}{1+2m} - m$ , quod in nostra potestate est,  
fiet:  $z^2 \sqcap \left[ \frac{2m^2}{1+2m} \right] + 1 \left[ -\frac{2m^2}{1+2m} \right] + 2m$ , et erit  $z \sqcap \sqrt{1+2m}$ .

Hinc sequitur radices numerorum imparium supra unitatem summarri posse, quan-  
tocunque sint numero, per compendium regulae generalis.

10 Sed hinc sequeretur et diversas ipsarum  $z$ . significaciones habere summas inter  
se invicem aequales, quod est absurdum. Itaque radix  $\sqrt{y^2+y}$  non debet aequari  
quantitati negativae, alioquin, foret  $-\sqrt{y^2+y}$  additio potius quam subtractio, ac  
proinde idem ac si sumsissemus non  $\sqrt{y+1} - \sqrt{y}$  sed  $\sqrt{y+1} + \sqrt{y}$ . Posterior ergo  
acceptio non procedit, nec  $z$  valere potest  $\sqrt{1+2m}$ .

Quod si faciamus  $y^2 + y$ , a  $y^2 + 2yn + n^2$ . fiet  $y \sqcap \frac{n^2}{1-2n}$ . ac proinde ponendo  $y$  esse  
15 quantitatem affirmativam, fiet: duplum ipsius  $n$ , minus unitate et fiet  $z^2 \sqcap \left[ \frac{2n^2}{1-2n} \right] + 1$

$$\left[ -\frac{2n^2}{1-2n} \right] - 2n \text{ et } z \sqcap \sqrt{1-2n}.$$

Atque ita sumendo seriem ipsarum  $n$ , arithmeticæ progressionis, sed ita, ut maxima  
non perveniat ad  $\frac{1}{2}$ . summa earum iniri potest.

20 Ut sciamus an ope alicuius seriei haberi possit summa infinitarum eius differentiarum,  
ecce notam[:]. Si minima seriei ordinata assignari potest; tunc series differentiarum non

8 f. generalis. (1) Tantum superest experiamur, quid fiat (2) Sed  $L$

nisi finita haberri potest, v. g. si minima  $\sqrt{y}$  seu minima  $\sqrt{\frac{m^2}{1+2m}}$  ut habeatur, ponamus

$m \sqcap$  quantumlicet parvam, et postea paulo maiorem. Si ipsius  $m$  seu quantitatis naturalis, minutio minuet, auctio auget ordinatam, tunc series est crescens, et habetur minima ordinata; sin contra; series est decrescens et haberri ea non potest. Si series habet flexum contrarium, quasi duae concipiendae sunt series, inter se per flexum contrarium divisae, quantum ad nostrum scopum.

5

Nota etsi dixi 2 debere esse minus quam  $n$ , attamen si ab initio sumsissemus, non  $\sqrt{y+1} - \sqrt{y}$ , sed  $\sqrt{y+a} - \sqrt{y}$ , explicando v. g.  $a$  per 1000. seu  $\sqrt{y+1000} - \sqrt{y}$ . fiet:

$\sqrt{y+a} - \sqrt{y} \sqcap z$ . et  $2y+a-2\sqrt{y^2+ay} \sqcap z^2$ . et ponendo  $y^2+ay \sqcap y^2+2ny+n^2$ , fiet  $y \sqcap$

$\frac{n^2}{a-2n}$ . et  $-2\sqrt{y^2+ay} \sqcap -2y-2n \sqcap \frac{-2n^2}{a-2n}-2n$ . et fiet  $z^2 \sqcap \left[ \frac{2n^2}{a-2n} \right] + a - \left[ \frac{2n^2}{a-2n} \right] - 2n$ .

10

sive  $z \sqcap \sqrt{a-2n}$ . Posito ergo  $a \sqcap 1000$ , sufficit  $n$  esse infra 500.

Sed hinc iam video id fieri non posse, nam necesse est  $n$ , esse invariabiles; alioquin non

potest differentia duarum diversarum ordinatarum esse:  $\sqrt{\frac{n^2}{a-2n}-a} - \sqrt{\frac{n^2}{a-2n}}$ , idem

est supra de ipsis  $m$ . quare falsa sunt omnia quae de seriebus variabilibus  $\frac{1}{\sqrt{1+2m}}$ , vel

$\sqrt{a-2n}$ . ineundis diximus: Nec proinde valor ipsius  $y$  explicari debet et quaerendus est casus, in quo valor cuiusdam quantitatis in valorem incognitae proximae, eodem modo formatae ductus, det quadratum. Eiusque casus ope simplicium radicum haberri poterit summa:

15

Aliter ponendo  $x$  ordinatam, et  $\xi$  proxime minorem ordinatam faciendoque  $x-\xi \sqcap z$ , et  $x^2-2x\xi+\xi^2 \sqcap z^2$ . Si iam  $2x\xi$  est quadratus, vel quod vix putem eventurum destrui

20

---

## 12 Am Rande: ☺

2 f. naturalis, (1) | minutio *streicht Hrsg.* | auget (2) minutio  $L$  6 f. scopum. (1) Habemus ergo duo inventa admiranda: Compen (2) Nota  $L$  15 f. est (1) quasi (2) casus, in quo (a) ordinatae qua (b) quadratum ordinatae in quadratum ordinatae proximae ductum det quadrat (c) quan (d) formula quaedam in (e) valor (aa) quanti (bb) cuiusdam (aaa) incognitae (bbb) quantitatis  $L$  19 Aliter (1) si efficiatur ut (a)  $\sqrt{y}$  (b)  $\sqrt{x} \wedge x$  pro (2) ponendo (a)  $\sqrt{x}$  ordinatam et  $\sqrt{x+w}$  ordinatam | proximam *streicht Hrsg.*, (aa) si  $-2x+xw-2xw+x^2+$  (bb) | si sit *streicht Hrsg.* |  $x+w-x$ , (aaa) et qu (bbb)  $\sqcap z$  ( $\sqcap w$ ) | et inde *streicht Hrsg.* |  $x^2+2xw+w^2-2wx \sqcap z^2$ . (b)  $x$  ordinatam  $L$

potest, radicum simplicium haberi potest summa. Ut  $x\xi$  sit quadratus necesse est inveniri posse seriem numerorum non quadratorum, ita tamen ut quilibet ex ipsis ductus in proximum det quadratum.

$$a \quad b \quad c \quad d \quad e \\ ab \sqcap l^2 \quad bc \sqcap m^2 \quad cd \sqcap n^2 \quad de \sqcap p^2$$

Ergo  $a \sqcap \frac{l^2}{b}$ , et  $b \sqcap \frac{m^2}{c}$ , et  $c \sqcap \frac{n^2}{d}$ , et  $d \sqcap \frac{p^2}{e}$ . Ergo  $c \sqcap \frac{n^2 e}{p^2}$ , et  $b \sqcap \frac{m^2 p^2}{n^2 e}$ , et

$$a \sqcap \frac{l^2 n^2 e}{m^2 p^2}.$$

$\frac{3}{1} \quad \frac{4}{3} \quad \frac{27}{4} \quad \frac{[64]}{27} \quad \left[ \frac{27 \cap 25}{64} \right]$  etc. Eodem modo incipi poterat a  $\frac{2}{1}$  et fieret:

$$\frac{2}{1} \quad \frac{4}{2} \quad \frac{18}{4} \text{ etc.}$$

Vide partem VII<sup>am</sup> seu plag. seq.

2 ut (1) duo (2) duo (3) quilibet  $L$     8 100  $L$  ändert Hrsg.    8  $\frac{27 \cap 36}{100}$   $L$  ändert Hrsg.

## 389. DE SERIERUM SUMMIS ET DE QUADRATURIS PARS SEPTIMA

**Überlieferung:** L Konzept: LH 35 V 4 Bl. 16–17. 1 Bog. 2°. 4 S. Geringer Textverlust durch Randschäden.  
Cc 2, Nr. 775 A tlw.

Schediasmatis de serierum summis pars VII<sup>ma</sup>.

5

Esto series eiusmodi:

$$\frac{f}{y^2} \cdot \frac{y^2, \hat{y}^2 \mp 2y\beta + \beta^2}{f} \cdot \frac{f, \hat{y}^2 \mp 4y\beta + 4\beta^2}{y^2, \hat{y}^2 + 2y\beta + \beta^2}.$$

$$\frac{y^2, \hat{y}^2 \mp 2y\beta + \beta^2, \hat{y}^2 \mp 6y\beta + 9\beta^2}{f, \hat{y}^2 \mp 4y\beta + 4\beta^2}. \text{ etc.}$$

Necesse est autem  $f$  esse quantitatem non quadratam.

Si  $\mp$  significat + series crescit si  $\mp$  significet – series decrescit, contrarium evenit si ex serie exposita aliam facias invertendo terminos quoslibet, faciendo numeratorem ex nominatore et contra, ut sit:

$$\frac{y^2}{f} \cdot \frac{f}{y^2, \hat{y}^2 \mp 2y\beta + \beta^2} \cdot \frac{y^2, \hat{y}^2 + 2y\beta + \beta^2}{f, \hat{y}^2 \mp 4y\beta + 4\beta^2}.$$

$$\frac{f, \hat{y}^2 \mp 4y\beta + 4\beta^2}{y^2, \hat{y}^2 \mp 2y\beta + \beta^2, \hat{y}^2 \mp 6y\beta + 9\beta^2}.$$

Non recte formavi, ne opus sit mutare formam, seu numeros, rectius sic fiet:

$$\frac{b^2 \hat{y}^2}{f} \cdot \frac{f, \hat{y}^2 \mp 2y\beta + \beta^2}{b^2 \hat{y}^2}. \text{ Ecce duo termini quibus expositis exponitur tota series,}$$

nam intelligi debet, tertium fieri ex secundo, ut secundus fit ex primo. Sed mutanda nonnihil formula est, ut omnia comprehendat et fiet ita:

19 f. *Zur Streichung:* Error

5 f. pars (1) VI<sup>ta</sup> (2) VII<sup>ma</sup>. | Inveni tandem methodum, qua haberi possit (a) series num (b) summa seriei numerorum irrationalium, simplicium, tam finitorum quam infinitorum. *gestr.* | Esto  $L$   
14 f.  $\frac{f, \hat{y}^2 \mp 4y\beta + 4\beta^2}{y^2, \hat{y}^2 \mp 2y\beta + \beta^2, \hat{y}^2 \mp 6y\beta + 9\beta^2}$ . (1) Sit alia (2) Sint aliae (a) radices (b) series duae (3)  
| Sint aliae duae series radicum ab his terminis: *streicht Hrsg.* | (4) Imo r (5) Non  $L$  15 numeros (1)  
sufficit (2), rectius  $L$  17 primo. (1) Hoc uno tantum adiecto quod formulae ipsi commode inseri non  
potest. (2) Sed  $L$

$$\frac{A \sqcap \square}{B \sqcap \text{non } \square} \quad \frac{C \sqcap B \wedge y^2}{D \sqcap A} \quad \frac{E \sqcap D \wedge y^2 \neq 2y\beta + \beta^2}{F \sqcap C}$$

Si iam seriem continuare velis, tertius pro primo sumendus, quartus pro secundo, quintus pro tertio. Idem est, si omnes terminos invertas.

Posito seriem directam esse decrescentem, ob  $\neq$  non potest tamen decrescere in infinitum, nam infra primum  $y$  descendit non potest in numeris. Contrarium est in serie inversa.

Nunc ut veniam ad summam irrationalium, utar numeris

$$\begin{array}{cccccc} \sqrt{\frac{1}{2}} & \sqrt{\frac{2}{1}} & \sqrt{\frac{4}{2}} & \sqrt{\frac{18}{4}} & \sqrt{\frac{64}{18}} & \sqrt{\frac{450}{64}} \text{ etc.} \\ & 0 & \sqrt{\frac{1}{2}} & -\sqrt{\frac{1}{18}} & & \end{array}$$

10 Series autem differentiarum inter has radices, ita habebuntur:  $\sqrt{\frac{4}{2}} - \sqrt{\frac{2}{1}} \sqcap w$ , fiet:

$w^2 \sqcap \frac{4}{2} + \frac{2}{1} - 2 \sqrt{\frac{4}{2} \wedge \frac{2}{1}} \sqcap \frac{4}{2} + \frac{2}{1} - 4 \sqcap 0$ . Ergo  $w \sqcap \sqrt{0}$ . Eodem modo:  $\sqrt{\frac{18}{4}} - \sqrt{\frac{4}{2}} \sqcap w$ .

8–455,2 Nebenbetrachtungen und Nebenrechnungen:

8

$$\begin{array}{r} 25 \\ \underline{-18} \\ 200 \\ 25 \\ \hline 450 \end{array} \quad \begin{array}{l} 2 \\ 1800 \neq 450 \\ 44 \\ \hline \end{array}$$

9  $\frac{3}{2}\sqrt{2}, -\frac{4}{3}\sqrt{\frac{4}{2}}$

2 sumendus, (1) secundus (2) quartus  $L$     4 directam erg.  $L$     4 ob  $\neq$  erg.  $L$

$$\text{et } w^2 \sqcap \frac{18}{4} + \frac{4}{2} - 2 \sqrt{\frac{18,4}{4,2}} \hat{=} 3. \text{ Ergo } w \sqcap \sqrt{\frac{1}{2}}. \text{ Eodem modo: } w^2 \sqcap \frac{64}{18} \left( \frac{18}{4} \right) - 2 \hat{=} \\ 4 + \frac{1}{2}$$

$$4 \left( \frac{72}{18} \right) - \frac{8}{18} \sqcap \frac{1}{18}. \text{ Ergo } w \sqcap \sqrt{\frac{1}{18}}. \text{ Ita } \frac{450}{64} \left( \frac{64}{18} \right) \left( -2 \hat{=} 5 \right) + \frac{(5)}{90} - \frac{16}{18} \left( +5 \right) + \frac{130}{18} \sqcap \frac{114}{18}.$$

$$1 \quad \frac{18}{4} + \frac{4}{2} - 2 \hat{=} 3 \sqcap \frac{1}{2} \qquad \frac{64}{18} + \frac{18}{4} \sqcap \frac{64 \hat{=} 4 + 18 \hat{=} 18}{18 \hat{=} 4} \qquad \frac{64}{18} + \frac{18}{4} - 2 \hat{=} 4 \\ \frac{18}{144} \\ \frac{18}{324} \\ \frac{256}{580} \qquad \qquad \frac{72}{8} \\ \underline{576} \\ 4$$

$$2 \quad \frac{450}{64} \quad \frac{64}{18} - 2 \hat{=} 10 \sqcap \\ \begin{array}{ccccc} 450 & 64 & 64 & 8100 & 4 \\ \frac{18}{360} \times & \frac{64}{256} & \frac{18}{512} & \frac{4096}{12196} & \frac{58}{11520} \not\parallel 17 \\ \underline{45} & \underline{384} & \underline{64} & \underline{11520} & \underline{676} \\ 8100 & 4096 & 11520 & 676 & 67 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} 18 & 64 & 450 & 130 \\ 5 & 5 & 320 & 16 \\ \underline{90} & \underline{320} & \underline{130} & \underline{114} \end{array}$$

$$2 - \frac{16}{18} \dots + \frac{130}{18}: \text{ Richtig wäre } -\frac{26}{18} + \frac{130}{64} = \frac{169}{288}.$$

Generaliter  $\sqrt{\frac{f}{y^2} - \sqrt{\frac{y^2 + 2\beta y + \beta^2}{f}}}$   $\sqcap w$ . Ergo  $w^2 \sqcap \frac{f}{y^2} + \frac{y^2 + 2\beta y + \beta^2}{f}$   
 $2\sqrt{y^2 + 2y\beta + \beta^2}$  seu  $-2\sqrt{y + \beta}$ . Ergo  $w^2 \sqcap \frac{f}{y^2} + \frac{y^2 + 2\beta y + \beta^2}{f} - 2y - 2\beta$ . sive  
 $\frac{f^2 + y^4 + 2\beta y + \beta^2}{y^2 f}, -2fy^3 - 2y^2\beta f$ . Sed hinc iam video istam seriem reapse  
non esse seriem irrationalium, sed seriem rationalium, per quandam constantem  $\sqrt{f}$   
5 divisam, nam ex  $\sqrt{\frac{f^2 + y^4 + 2\beta y + \beta^2 - 2fy^3 - 2y^2\beta}{y^2 f}}$  per  $\sqrt{f}$  multiplicata,  
radix extrahi potest, fiet enim eius radix  $\frac{f, [-]y^2 + y + \beta}{y}$ .

Nondum ergo methodum video, per quam summae iniri possint irrationalium simplicium seu naturalium.

$$\frac{1}{1,2} \quad \frac{1}{2,3} \quad \frac{1}{3,4} \quad \frac{1}{4,5} \quad \frac{1}{5,6} \quad \text{etc. seu } \frac{1}{y, \hat{y} + 1}.$$

10 Momentum eorum ex  $y$ . est series omnium  $\frac{1}{y+1}$ . Momentum eorum ex  $y+1$ . est  
series omnium  $\frac{1}{y}$ . Momentum autem ex  $y+1$ . a momento ex  $y$ . differt serie in  $y$ . seu seriei  
cylindro. At series omnium  $\frac{1}{y}$  excedit seriem omnium  $\frac{1}{y+1}$  maxima  $\frac{1}{y}$ . Ergo maxima  
 $\frac{1}{y}$   $\sqcap$  seriei omnium  $\frac{1}{y, \hat{y} + 1}$ .

---

8 Am Rande, gestrichen: Hactenus nihil egi in summis irrationalium simplicibus  
investigandis. Sed iam esto series haec:  $\sqrt{2} + 2\sqrt{2}$ .

$$\sqrt{2}$$

4 quandam (1) rationalem (2) constantem  $L = 6 + L$  ändert Hrsg. 10f. series omnium erg.  
 $L$  zweimal 11 differt (1) figura (2) serie  $L = 12$  cylindro. (1) Differentia ergo inter (2) At idem  
moment (3) At  $L = 12$  maxima (1) serierum (2)  $\frac{1}{y}$ . Ergo  $L$

Eadem methodo omnium habetur dimensio quae sunt eiusmodi v.g.  
 $\frac{1}{y, \hat{y}+1, \hat{y}+2}$ . Nam momentum eorum ex  $y$ . est  $\frac{1}{y+1, \hat{y}+2}$ , momentum eorum  
ex  $y+2$ . est  $\frac{1}{y, \hat{y}+1}$ , ergo quae duo momenta differunt duplo seriei cylindro; diffe-  
runt vero et cognito seu termino seriei  $\frac{1}{y, \hat{y}+1}$ , qui non continetur in terminis seriei  
 $\frac{1}{y+1, \hat{y}+2}$ , id est primo.

5

Sed et praeterea, momentum ex  $y+1$ , est  $\frac{1}{y, \hat{y}+2}$ . Quod momentum a priori ex  
 $y+2$ . cedit figurae cylindro simplici. Quem invenimus.

Datur vero et momentum ex  $y+2$ . absolute, seu  $\frac{1}{y, \hat{y}+1}$ . Ergo datur et se-  
ries omnium  $\frac{1}{y, \hat{y}+2}$  seu  $\frac{1}{1,3} \frac{1}{2,4} \frac{1}{3,5} \frac{1}{4,6} \frac{1}{5,7}$  etc. Pro 1. pone  $\beta$  habetur series:

(1)  $\frac{1}{y, \hat{y}+\beta}$ . Et series (2)  $\frac{1}{y, \hat{y}+\beta, \hat{y}+2\beta}$  et (3)  $\frac{1}{y, \hat{y}+2\beta}$ .

10

Datur vero et series: (4)  $\frac{1}{y, \hat{y}+\beta, \hat{y}+2\beta, \hat{y}+3\beta}$ . Dabitur ergo et series:

(5)  $\frac{1}{y, *, \hat{y}+2\beta, \hat{y}+3\beta}$ , ut  $\frac{1}{1,3,4} \frac{1}{2,4,5} \frac{1}{3,5,6} \frac{1}{4,6,7}$ .  
 $\frac{1}{12} \frac{1}{40} \frac{1}{90} \frac{1}{168}$

Ex hac autem inventa rursus eodem ratiocinandi modo, datur (6)  $\frac{1}{y, \hat{y}+3\beta}$  seu  
 $\frac{1}{4} \frac{1}{10} \frac{1}{28}$  per datas 3. et 1.

15

$2 \frac{1}{y, \hat{y}+1, \hat{y}+2}$  (1)  $- \frac{1}{y^2}$  (2). Nam cylinder eorum ex (a)  $y$  est  $\frac{1}{y+1, \hat{y}+2}$ . (b)  $y+2$ . est  
 $\frac{1}{y, \hat{y}+1}$ . Cylinder eorum ex  $y+1$ . est  $\frac{1}{y, \hat{y}+2}$  (3) Cylinder eorum ex  $y+2$ . est  $\frac{1}{y, \hat{y}+1}$  (4) Nam  
(a) cylinder (b) momentum  $L = 2 \frac{1}{y+1, \hat{y}+2}$ , (1) cylinder (2) momentum  $L = 4$  et (1) recta (2)  
cognito  $L = 6$  praeterea, (1) idem mo (2) momentum  $L = 7$   $y+2$ , (1) differet (2) cedit (a) etiam  
(b) figurae  $L$

Ex data 4. eodem modo quo 5. dabitur et series  $\frac{1}{y, \hat{\gamma} y + \beta, *, \hat{\gamma} y + 3\beta}$ , seu  
 $\frac{1}{1, 2, 4} \quad \frac{1}{2, 3, 5} \quad \frac{1}{3, 4, 6}.$   
 $\frac{1}{8} \quad \frac{1}{30} \quad \frac{1}{72}$

Generaliter ergo dici potest, omnes series quarum numeratores sunt constantes, no-  
5 minatorum vero factores arithmeticè excedunt perpetua progressionè factores nominato-  
ris fractionis praecedentis, esse summabiles.

Quid ergo in hac serie	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{35}$	$\frac{1}{99}$
	$\frac{1}{1, 3}$	$\frac{1}{5, 7}$	$\frac{1}{9, 11}$
	$\frac{1}{y, \hat{\gamma} y + 2\beta}$	$\frac{1}{y + 4\beta, y + 6\beta}$	

10 cuius seriei ut investigemus summam, conemur eam reducere ad eas quas habemus.

Ut uno termino exprimamus, ponendo  $\beta$ . semper esse terminum constantem, per  
quem crescunt ipsae  $y$ . fiet:  $\frac{1}{y, \hat{\gamma} y + \frac{1}{2}\beta}$ , ponendo  $\beta$ . esse 4. sive  $\frac{2}{y, \hat{\gamma} 2y + \beta}$ , cuius dimi-  
dium  $\frac{1}{y, \hat{\gamma} 2y + \beta}$ .

Adhibeamus ergo alias series, ut:  $\frac{1}{y, \hat{\gamma} y + \frac{1}{2}\beta, \hat{\gamma} y + \beta}$ . Eius momentum ex  $y + \frac{1}{2}\beta$ .

15 datur sed caetera eius momenta non dantur.

7 Am unteren Rand, mit Verbindungsstrich zu hac serie: Mylord Brouncker dedit  
summam huius seriei:  $\frac{1}{2, 3, 4} \quad \frac{1}{4, 5, 6} \quad \frac{1}{6, 7, 8}$  in *Transact.* num. 34. pag. 646.

10 summam, (1) et  $2\beta$ . (2) conemur (a) terminos (b) eam  $L = 10$ f. habemus. (1) Pro  $2\beta$ . ponamus  
(2) Ut  $L = 11$  constantem erg.  $L = 12$  esse 4. (1) quare duplicita tota serie fiet: (2) sive  $L$   
15 datur (1). Datur et eius momentum ex (2) sed  $L$

16 Brouncker: *The Squaring of the Hyperbola, by an Infinite Series of Rational Numbers*, *Philosophical Transactions* III Nr. 34 vom 13./23. April 1668, S. 645–649.

Si figura sit:  $\frac{1}{y, \cap 2y + \beta}$  eius momentum ex  $y$ . est  $\frac{1}{2y + \beta}$ , v. g.  $\frac{1}{3} \frac{1}{5} \frac{1}{7}$ . si  $\beta$ . sit 1.  
Eius momentum ex  $2y + \beta$ , est  $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3}$ . Ipsa autem series  $\frac{1}{y, \cap 2y + \beta}$  est  $\frac{1}{3} \frac{1}{10} \frac{1}{21}$ . nempe triangulares per intervalla.

A serie  $\frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{6} \frac{1}{7}$  auferendo  $\frac{1}{3} \frac{1}{5} \frac{1}{7}$ , residuum erit figurae momentum ex  $y$ . etc.  
sed nihil hinc novi nisi hoc unum, quod series  $\frac{1}{3} * \frac{1}{10} * \frac{1}{21}$  pendeat ex quad. circuli. 5

Iam  $\frac{1}{1} \frac{1}{6} \frac{1}{15} \frac{1}{28}$  fit  $\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6}$  duplicata, quae pendet ex quadratura hyperbolae. Summa autem utriusque habetur, itaque hinc videtur sequi quadraturam circuli pendere ex quad. hyperbolae et contra. Sed hoc postea examinabimus, nunc cogitationem subortam persequar:  $\frac{1}{y, \cap y^2 + 2y\beta + \beta^2, -y^3}$  potest intelligi facta ex  $\frac{1}{y, 2y + \beta, \beta}$  ac proinde haec pendet etiam ex circuli dimensione. 10

Si sint iam series eiusmodi:  
 $\frac{1}{y^2, \cap y^2 + 2\beta y + \beta^2}$ , vel  $\frac{1}{y^2, \cap y^2 + 2\beta y + \beta^2, \cap y^2 + 4\beta y + 4\beta^2}$ , videamus. Momentum prioris ex  $y$  dat:  $\frac{1}{y, y + \beta, y + \beta}$  cuius valorem primo investigemus. Eius momentum ex  $y$

12 *Neben* videamus: Momentum prioris ex  $y + \beta$  dat:  $\frac{1}{y^2, \cap y + \beta}$  cuius dimensio pendet ex  $\frac{1}{y^2}$ .

5 f. circuli (1)  $\frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7}$  (2). Iam  $L$  6 duplicata erg.  $L$  9  $\frac{1}{y, \cap y^2 + 2y\beta + \beta^2, -y^3}$  (1) . (a)  
Haec ducta (b) Horum momen (2) potest  $L$  10 f. dimensione. (1) Ergo differentia inter (2) Si  $L$

5 pendeat: Leibniz verwechselt die Reihe  $\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7}$  etc. mit der Kreisreihe in der Form  $\frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7}$   
etc. Die Überlegung wird dadurch bis Z. 10 beeinträchtigt. 8 postea: s. u. S. 462 Z. 3.

est  $\frac{1}{y + \beta, \square}$ . Eius momentum ex  $y + \beta$ , est  $\frac{1}{y^2 + \beta y}$  quae habetur. Patet ergo has duas figuras  $\frac{1}{y, y + \beta, \square}$  et  $\frac{1}{y + \beta, \square}$  pendere ex se invicem.

Si sit series:  $\frac{1}{y, y + \beta, y - \beta}$ , momentum eius ex  $y$ . est  $\frac{1}{y^2 - \beta^2}$ , quod habetur. Momentum eius ex  $y - \beta$ . etiam habetur. Quare habetur ipsa series:  $\frac{1}{y, y + \beta, y - \beta}$ . Hinc  
5 patet ipsas  $y - \beta$ . ipsis  $y + \beta$ . tuto immisceri posse, hac serie:  $y - \beta, y, y + \beta$ . Ita enim servatur arithmeticus ordo.

Iam in seriem:  $\frac{1}{y^2 - \beta^2}$  ducatur:  $\frac{1}{y + \beta}$ , fiet  $\frac{1}{y - \beta, , \hat{y} + \beta, \square}$ , quae pendet ex ista  $\frac{1}{y^2}$ . Nam momentum eius ex  $y + \beta$ . habetur, momentum vero eius ex  $y - \beta$ . est  $\frac{1}{y + \beta, \square}$ ,  
vel  $\frac{1}{y^2}$ .  $y^2 - \beta^2 \hat{y} y^2 + \beta^2$  facit  $y^4 - \beta^4$ .  $y^2 - \beta \hat{y} y^2 + \beta$  dabit  $y^4 - \beta^2$ .

10 Videamus an non  $\frac{1}{y^2, \hat{y} y + \beta, \square}$ , possit haberi absolute, quadrata scilicet triangularium. Eius momentum ex  $y$  est  $\frac{1}{y, \hat{y} y + \beta, \square}$ , eius momentum ex  $y + \beta$ , est  $\frac{1}{y^2, y + \beta}$ . Horum differentia est cylinder seriei. Porro huius  $\frac{1}{y + \beta, \square, y}$ , momentum ex  $y + \beta$ , est series triangularis, momentum eiusdem ex  $[y]$ , est  $\frac{1}{y + \beta, \square}$ . Ergo ser.  $\Delta^{\text{lar.}} - \frac{1}{y + \beta, \square} \sqcap$   
15  $\frac{1}{y, y + \beta, \square}$ . Alterius vero:  $\frac{1}{y^2, y + \beta}$ , momentum ex  $y$  est series triang. ex  $y + \beta$ . est  $\frac{1}{y^2}$ . Ergo  $\frac{1}{y^2} - \text{ser. } \Delta^{\text{lar.}} \sqcap \frac{1}{y^2, y + \beta}$ .

1 ergo (1) momentum (2) has  $L$       9 vel  $\frac{1}{y^2}$ . (1) Momentum eius ex (2)  $y^2 - \beta^2 \hat{y} y^2 + \beta^2 L$   
13  $\frac{1}{y} L$  ändert Hrsg.      13 Ergo (1)  $\frac{1}{y, y + \beta}$  (2) ser.  $\Delta^{\text{lar.}} L$

---

10 f. quadrata . . . triangularium: s. o. Erl. zu N. 387 S. 438 Z. 11 f.

Iam, ex dictis:  $\frac{1}{y^2, y + \beta} - \frac{1}{y, y + \beta, \square} \sqcap \frac{1}{y^2 \cap y + \beta, \square}$ . Ergo substitutis valoribus:  
 $\frac{1}{y^2} - \text{ser. } \Delta^{\text{lar.}}, - \text{ser. } \Delta^{\text{lar.}} + \frac{1}{y + \beta, \square} \sqcap \frac{1}{y^2 \cap y + \beta, \square}$ . Iam supra plag. huius schediasm.  
5.  $\frac{1}{y^2} \sqcap C + \frac{1}{b}$ . et  $C \sqcap \frac{1}{2b^2} + \frac{B}{2}$ . et  $B$  est  $\frac{1}{y, y + \beta, \square}$ . Ergo  $\frac{1}{y^2} \sqcap \frac{1}{2b^2} + \frac{B}{2} + \frac{1}{b}$ . Iam  
 $\frac{1}{y^2} + \frac{1}{y + \beta, \square} \sqcap \frac{2}{y^2} - \frac{1}{b^2}$ . ergo  $B \sqcap [-]2 \text{ ser. } \Delta^{\text{lar.}} + \frac{[2]}{y^2} - \frac{1}{b^2}$ . quo in aequatione praecedente  
novissima, pro  $B$  substituto fiet:  $2 \text{ ser. } \Delta^{\text{lar.}} \sqcap \frac{2}{b}$ . quod dudum constat. Indicium ⟨calculi recti.⟩

$\frac{1}{y^2 \cap y^2 - \beta^2}$  puto haberi posse. Nam: eius momentum ex  $y + \beta$ , est  $\frac{1}{y^2, y - \beta}$ . Eius  
momentum ex  $y - \beta$ , est  $\frac{1}{y^2, y + \beta}$ . Ergo  $\frac{1}{y^2, y - \beta} - \frac{1}{y^2, y + \beta} \sqcap \frac{2}{y^2, y^2 - \beta^2}$  (1). Iam:  
 $\frac{1}{y^2, y - \beta}$  ex  $y - \beta$ , dat  $\frac{1}{y^2}$ , ex  $y$  dat  $\frac{1}{y, y - \beta}$ . Ergo  $\frac{1}{y, y - \beta} - \frac{1}{y^2} \sqcap \frac{1}{y^2, y - \beta}$  (2).  
Eodem modo:  $\frac{1}{y^2, y + \beta}$  per  $y + \beta$  dat  $\frac{1}{y^2}$ , per  $y$  dat  $\frac{1}{y, y + \beta}$ . Ergo (3)  $\frac{1}{y^2} - \frac{1}{y, y + \beta} \sqcap$  10  
 $\frac{1}{y^2, y + \beta}$ . Ergo in aeq. 1. substitutis valoribus ex aeq. 2. et 3. fiet:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{y, y - \beta} - \frac{1}{y^2} - \frac{1}{y^2} + \frac{1}{y, y + \beta} \sqcap \frac{2}{y^2, y^2 - \beta^2}, \text{ sive:} \\ & \frac{2}{y, y + \beta} + \frac{1}{b + \beta, b + 2\beta} - \frac{2}{y^2} \sqcap \frac{2}{y^2, y^2 - \beta^2}. \text{ Hinc illud saltem ducimus:} \\ & \frac{2}{y^2, y^2 - \beta^2} + \frac{2}{y^2} \left[ -\frac{2}{y, y + \beta} \right] - \frac{2}{b} \sqcap \frac{1}{b + \beta, b + 2\beta}, \text{ sive} \end{aligned}$$

7 Über haberi posse: Imo non.

4 – erg. Hrsg. 4 1 L ändert Hrsg.

2 supra: s. o. N. 387 S. 441 Z. 1–3 bzw. die Gleichungen (2) und (5) S. 443 Z. 8. 8–11 Leibniz setzt im Zähler der rechten Seite der Gleichungen (1)–(3) stillschweigend  $\beta = 1$ .

$\frac{2}{y^2, y^2 - \beta^2} + \frac{2}{y^2} \sqcap \text{cognito } \frac{1}{b + \beta, b + 2\beta} + \frac{2}{b}$ . Habemus ergo:

$\frac{2y^2, , + 2y^2, y^2 - \beta^2}{y^2, y^2 - \beta^2, y^2} \text{ seu } \frac{2, , + 2, y^2 - \beta^2}{y^2, y^2 - \beta^2} \sqcap \text{cognitae } \frac{1}{b + \beta, b + 2\beta} + \frac{2}{b}$ .

Superest, ut quae de circulo et hyperbola dicta sunt, perficiamus.

Series:  $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{35} \cdot \frac{1}{99}$ . etc. pendet ex quadratura circuli, et aequatur rationi quadrantis

5 circumferentiae ad diametrum. Ea sic enuntiabitur analytice:  $\frac{1}{y, y + \frac{1}{2}\beta}$ , ponendo,  $y$ . esse

arithmetice crescentes; et  $\beta$ . esse incrementum. Primam autem  $y$  esse  $\sqcap 1$ . et ipsam  $\beta$ .  
incrementum constans esse 4. Habita autem summa unius  $\frac{1}{y, y + \frac{1}{2}\beta}$ , secundum hanc

quam dixi explicationem, habebitur et summa cuiuslibet, quomodocunque prima seu  
minima  $y$ , et intervallum constans ipsarum  $y$ , explicentur.

10 Quod ita ostendo: series ex quadratura circuli pendens ita erit in numeris:

$$\begin{array}{ccc} \frac{1}{1, 1 + \frac{4}{2}} & \frac{1}{1 + 4, 1 + 4 + \frac{4}{2}} & \frac{1}{1 + 8, 1 + 8 + \frac{4}{2}} \text{ etc.} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{35} & \frac{1}{99} \end{array}$$

Haec series quadruplicata redibit ad hanc:

$$\frac{1}{\frac{1}{4}, \frac{1}{4} + \frac{1}{2}} \quad \frac{1}{\frac{1}{4} + 1, \frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{2}} \quad \frac{1}{\frac{1}{4} + 2, \frac{1}{4} + 2 + \frac{1}{2}}.$$

15 Quae a serie  $\frac{1}{y, y + \frac{1}{2}\beta}$  in qua prima  $y \sqcap 1$ . et  $\beta \sqcap 1$ . seu

4 aequatur (1) circumferentiae, ponendo radium esse unitatem (2) rationi  $L$  10 ostendo: (1)  
primam  $y$ , (a) voce (b) quaecunque sit vocemus (2) Unitatem appellemus  $\gamma$ . Reducamus ad unitatem,  
quam iam seriem (3) series  $L$  15 prima erg.  $L$

---

13 quadruplicata: Leibniz teilt beide Faktoren der Nenner der Folgenglieder durch vier, multipliziert  
also in Wirklichkeit mit 16. Die Überlegung wird dadurch nicht beeinträchtigt.

$$\frac{1}{1, 1 + \frac{1}{2}} \quad \frac{1}{2, 2 + \frac{1}{2}} \quad \frac{1}{3, 3 + \frac{1}{2}} \quad \text{in eo tantum differt, quod prima } y.$$

sumta est non 1. sed  $\frac{1}{4}$ . Auferantur a se invicem, sane:  $\frac{1}{y, y + \frac{1}{2}\beta} - \frac{1}{y + \frac{3}{4}, y + \frac{3}{4} + \frac{1}{2}\beta}$

fiet:

$$\begin{aligned} & \boxed{y^2} + \frac{3}{4}y \left[ + \frac{1}{2}\beta y \right] + \frac{9}{16}, \boxed{-y^2 - \frac{1}{2}\beta y} \\ & \frac{y + \frac{3}{4}, y + \frac{3}{4} + \frac{1}{2}\beta, -y, y + \frac{1}{2}\beta}{y, y + \frac{1}{2}\beta \left[ , y + \frac{3}{4} \right], y + \frac{3}{4} + \frac{1}{2}\beta} \sqcap \frac{\frac{3}{4}\dots + \frac{3}{8}\beta}{y, y + \frac{1}{2}\beta \left[ , y + \frac{3}{4} \right], y + \frac{3}{4} + \frac{1}{2}\beta} \text{ sive } 5 \\ & \frac{\frac{3}{4}y, + \frac{3}{4}y + \frac{3}{4} + \frac{1}{2}\beta}{y, y + \frac{1}{2}\beta \left[ , y + \frac{3}{4} \right], y + \frac{3}{4} + \frac{1}{2}\beta} \sqcap \frac{\frac{3}{4}}{y + \frac{1}{2}\beta \left[ , y + \frac{3}{4} \right], y + \frac{3}{4} + \frac{1}{2}\beta} + \frac{\frac{3}{4}}{y, y + \frac{1}{2}\beta \left[ , y + \frac{3}{4} \right]} \\ & \sqcap \frac{1}{y, y + \frac{1}{2}\beta} - \frac{1}{y + \frac{3}{4}, y + \frac{3}{4} + \frac{1}{2}\beta}. \end{aligned}$$

Habenda est ergo series ista:  $\frac{1}{y + \frac{1}{2}\beta, y + \frac{3}{4} + \frac{1}{2}\beta}$ . Fiet  $\frac{1}{1 + \frac{1}{2}, 1 + \frac{3}{4} + \frac{1}{2}}$  seu  $\frac{1}{\frac{9}{4} + \frac{9}{8}}$   
seu  $\frac{8}{27}$ ; et  $\underbrace{\frac{1}{2 + \frac{1}{2}, 2 + \frac{3}{4} + \frac{1}{2}}}_{\frac{5}{2}}$  sive  $\frac{1}{\frac{25}{4} + \frac{15}{8}} = \frac{8}{50 + 15}$  etc. sed haec progressio parum

tractabilis.

10

2 sane: (1)  $\frac{1}{\frac{1}{1}, \frac{1}{4} + \frac{1}{2}}$  (2) ponendo z pro y et  $\gamma$  pro  $\beta$  | quando non significant 1, fiet: *streicht Hrsg.* |  
 $\frac{1}{y, y + \frac{1}{2}\beta} - \frac{1}{z, z + \frac{1}{2}\gamma}$  (3)  $\frac{1}{y, y + \frac{1}{2}\beta} L \quad 5 \text{ f. }, y + \frac{3}{4} \text{ erg. Hrsg. fünfmal}$

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} \text{ etc. ex circulo.} \\
 & \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} \text{ [etc.] ex hyperbola. Huius duplum} \\
 & \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} \text{ etc. Ex qua auferatur praecedens ad circulum, fiet:} \\
 & * - \frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{1}{4} * - \frac{1}{6} + \frac{2}{7} - \frac{1}{8} * - \frac{1}{10} + \frac{2}{11} \text{ etc. Si contra addatur, fiet:} \\
 5 & \frac{2}{1} - \frac{1}{2} * - \frac{1}{4} + \frac{2}{5} - \frac{1}{6} * - \frac{1}{8} \text{ etc.} \\
 & \text{Si ab } 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} \text{ etc.} \\
 & \text{auferas } \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} \text{ etc.} \\
 & \text{fiet : } \frac{1}{2} - \frac{1}{12} + \frac{1}{30} - \frac{1}{56} \text{ etc.} \\
 & \text{Porro } \frac{1}{2} \frac{1}{6} \frac{1}{12} \frac{1}{20} \frac{1}{30} \frac{1}{42} \frac{1}{56} \frac{1}{72} \text{ etc. habentur.} \\
 10 & \frac{1}{2} \frac{1}{12} \frac{1}{30} \frac{1}{56} \text{ habetur ex quad. hyp.} \\
 & 1 - \frac{1}{2} \quad \frac{1}{5} - \frac{1}{6} \quad \frac{1}{9} - \frac{1}{10}.
 \end{aligned}$$

Iam 1.  $\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{9}$  etc.  $\sqcap \frac{b^1}{1} + \frac{b^5}{5} + \frac{b^9}{9} \sqcap \frac{1}{1+y^4}$ . Vid. seq. plagulam VIII.

2 etc. erg. Hrsg.

---

12  $\sqcap \frac{1}{1+y^4}$ : Leibniz will sagen, daß die Summe der  $\frac{1}{1+y^4}$  mit der linken Seite gleich ist; richtig wäre  $\frac{1}{1-y^4}$ , s. u. N. 38<sub>10</sub> S. 465 Z. 11–13.

38<sub>10</sub>. DE SERIERUM SUMMIS ET DE QUADRATURIS PARS OCTAVA

**Überlieferung:** L Konzept: LH 35 V 4 Bl. 18–19. 1 Bog. 2°. 4 S.  
Cc 2, Nr. 775 A tlw.

Schediasmatis de serierum summis pars VIII.

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{12}, \frac{1}{20}, \frac{1}{30}, \frac{1}{42}, \frac{1}{56}, \frac{1}{72}, \frac{1}{90}, \frac{1}{110}, \text{ etc. habentur absolute } \sqcap 1. \quad 5$$

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{12}, \frac{1}{30}, \frac{1}{56}, \frac{1}{90} \quad [\text{etc.}] \text{ ex quad. hyperbolae.}$$

$\frac{1}{2} - \frac{1}{12} + \frac{1}{30} - \frac{1}{56} + \frac{1}{90}$  etc. exhibent differentiam circuli et hyperbolae seu residuum quadrantis, detracto spatio hyperbolico dimidiato.

Quare si inveniretur separatim  $\frac{1}{2}, \frac{1}{30}, \frac{1}{90}$  [etc.], tunc data quad. hyperbolae, daretur circuli quadratura. Iam  $\frac{1}{2}, \frac{1}{30}, \frac{1}{90}$  etc. resolvemus in  $\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10}$  etc. Cuius seriei quadratricis quaeratur figura. Quaeramus primum figuram seriei quadratricis;  $\frac{1}{1}, \frac{1}{5}$   $\frac{1}{9}$  [etc.] sive:  $\frac{b}{1} + \frac{b^5}{5} + \frac{b^9}{9}$  etc. quae fit ex summis omnium:  $1 + y^4 + y^8 + y^{12}$  etc. quarum quaelibet aequalis huic ordinatae:  $\frac{1}{1 - y^4}$ .

Eodem modo series quadratrix  $\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{10}$  etc. originem habet  $\frac{b^2}{2} + \frac{b^6}{6} + \frac{b^{10}}{10}$  etc. quae est summa ordinatarum,  $y + y^5 + y^9$  etc.  $\sqcap \frac{y}{1 - y^4}$ . et figura cuius series quadratrix est  $\frac{1}{2}, \frac{1}{30}, \frac{1}{90}$  etc., erit  $\frac{1 - y}{1 - y^4} \sqcap x$ . Sed  $1 - y^4$ , dividi potest per  $1 - y^2$ , et  $1 + y^2$ ; et

6–12 etc. erg. Hrsg. dreimal 8f. hyperbolae | seu residuum (1) circuli (2) circumferentiae in unitatem, (3) quadrantis ... dimidiato erg.]. Quare L 13–16 ordinatae: (1)  $\frac{1}{1 + y^4} \dots y + y^5 + y^9$  etc.  $\sqcap \frac{y}{1 + y^4} \dots$  erit  $\frac{1 - y}{1 + y^4}$  (2)  $\frac{1}{1 - y^4} L$  16 per (1)  $1 - y$ , et provenit,  $1 - y^3$ , (2)  $1 - y^2$ , et (a)  $1 - y^2$  (b)  $1 + y^2 L$

$1-y^2$ , dividi potest per  $1-y$ , et fit  $1+y$ . Ergo ducendo  $1+y^2$ , in  $1+y$ , fit:  $\frac{1}{y^3 + y^2 + y + 1} \cap$

$\frac{1}{1+y^2 \cap 1+y}$ . Sed missa figura  $\frac{1}{1+y^2, 1+y}$ , videamus figuram  $\frac{1}{1-y, 1+y, \square}$ . Eius  
figurae momentum, ex  $1-y$ , est  $\frac{1}{1+y, \square}$  cuius habetur dimensio cum sit hyperbola cu-  
bica. Eius momentum ex  $1+y$ , est  $\frac{1}{1-y^2}$ . horum duorum momentorum summa aequatur

5 duplo figurae cylindro. Habetur ergo huius figurae dimensio, ex data dimensione huius  
figurae  $\frac{1}{1-y^2}$ .

Opus est ergo ut huius figurae dimensionem quaeramus, quod eadem methodo egre-  
gie fiet: nam momentum eius ex  $1+y$  dabit  $\frac{1}{1-y}$ , quod est cylinder spatii hyperbolici.

Eiusdem momentum ex  $1-y$  dabit  $\frac{1}{1+y}$ , qui est alius cylinder spatii hyperbolici, horum

10 duorum momentorum summa, dabit duplum cylindrum ipsius figurae  $\frac{1}{1-y^2}$ . Ergo ut  
omnia in unum colligamus, cylindri hyperbolici, unus  $\frac{a^3}{a-y}$  alter  $\frac{a^3}{a+y}$ , aucti cylin-  
dro hyperbolae cubicae,  $\frac{a^3}{a^2 + 2ay + y^2}$  dant cylindrum figurae  $\frac{1}{1-y, \cap 1+y, \square}$ , seu

1 *Zur Lesart, gestrichen:* Error.

Error usque ad finem paginæ.


1 ducendo (1)  $1-y^2$ , in  $1+y$ , fit: (a)  $\frac{1-y^2+y-y^3}{1-} \cap$  (b)  $\frac{1}{1-y^2+y-y^3} \cap \frac{1}{1-y^2, 1+y} \cap$   
 $\frac{1}{1-y, 1+y, \square}$ . Cuius figurae momentum, (aa) est  $\frac{1}{1-y}$  (bb) ex  $1-y$ , (2)  $1+y^2 L$  3f. hyperbola  
(1) qua (2) cubica  $L$  5 duplo erg.  $L$  10 duplum erg.  $L$  12–467,1 dant (1) summam  
(a) figurae, (b) cylindri (2) cylindrum figurae  $\frac{a^5}{a^3 + ya^2 + y^2a + y^3}$  cuius area aequatur summae  $\frac{1}{2}$   
 $\frac{1}{30} \frac{1}{90}$  etc. Ergo  $\frac{1}{1-y} + \frac{1}{1+y} + \frac{1}{1+y, \square} \cap \frac{1}{2}$  (3) cylindrum figurae (a)  $\frac{1}{1+y, \cap 1+y, \square}$ , seu  
 $\frac{1}{1+2y+y^2, +y+2y^2+y^3}$  seu  $\frac{1}{y^3+3y^2}$  (b)  $\frac{1}{1-y, \cap 1+y, \square} L$

$\frac{1}{1+2y+y^2, -y-2y^2-y^3}$  seu  $\frac{1}{-y^3-y^2+y+1}$ . (NB. Iam  $\frac{1}{y^3+y^2+y+1}$  pendet ex circulo et hyp. simul.) Addendo fiet:

$$\frac{\boxed{y^3+y^2}+y+1\boxed{-y^3-y^2}+y+1}{1+y^2 \cap 1+y \cap 1+y, \square, 1-y} \sqcap \frac{2}{1+y^2, 1+y, 1-y} \sqcap \frac{2}{1+y^2 \cap 1-y^2} \sqcap \frac{2}{1-y^4}.$$

Cum hoc sit maximi momenti, erroris vitandi causa de integro assumere operae pretium erit.

5



[Fig. 1]

Esto  $GBE$ . hyperbola, cuius centrum  $A$ . vertex  $B$ . Radius ut ita dicam  $AC$ . vel  $CB \sqcap a$ .  $CD$ . vel  $CH$ . vel  $CF \sqcap y$ .  $AD \sqcap a-y$ .  $AF$  vel  $AH \sqcap a+y$ .  $DE \sqcap \frac{a^2}{a-y}$ .  $HL \sqcap \frac{a^2}{a+y}$ . Ergo posita  $a \sqcap 1$ . erit  $DE \sqcap 1+y+y^2+y^3+y^4$  etc. et summa

---

3 Nebenrechnung:  $\frac{1}{1-y^2} + \frac{1}{1+2y+y^2} \sqcap \frac{1+2y\boxed{+y^2}, +1\boxed{-y^2}}{1-y, 1+y, \text{cub.}}$  sive  
 $\frac{2}{1-y, 1+y, \square}$ .

---

466,14 usque ad finem paginae: Bis zur Stufe (3) (a) der Lesart zu S. 466 Z. 12 – Z. 1 6 [Fig. 1]: Leibniz hat die Strecken  $HL$  und  $FG$  getrennt gezeichnet. Dem Text gemäß müßten die Punkte  $H$  und  $F$  und damit auch  $L$  und  $G$  zusammenfallen.

omnium  $DE$ , applicatarum ad  $AC$ , erit:  $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5}$  etc.  $\sqcap$  spatio in infinitum producto,  $ACBEM$ .

Sed  $HL \sqcap \frac{1}{1+y} \sqcap 1 - y + y^2 - y^3 + y^4 - y^5$  etc. et summa omnium  $HL$ . ad  $CF$ .

applicatarum erit:

$$5 \quad \underbrace{1 - \frac{1}{2}}_{\frac{1}{2}} + \underbrace{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}}_{\frac{1}{12}} + \underbrace{\frac{1}{5} - \frac{1}{6}}_{\frac{1}{30}} \text{ etc. } \sqcap \text{ spatio } CFGLB.$$

Auferatur spatium  $CFG LB$ , a spatio  $ACBEM$ , fiet:

$$\frac{1}{1} \left( -\frac{1}{1} \right) + \frac{1}{2} \left( +\frac{1}{2} \right) + \frac{1}{3} \left( -\frac{1}{3} \right) + \frac{1}{4} \left( +\frac{1}{4} \right) \text{ etc. sive } \frac{2}{2} \frac{2}{4} \frac{2}{6} \text{ etc. } \sqcap 1 \frac{1}{2} \frac{1}{3} \text{ etc. Quod}$$

satis mirabile est, et ostendit, summam ipsius seriei  $1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$ . etc. esse infinitam, et proinde  
10 et aream spatii  $ACBGM$ . quandoquidem finita  $CBGF$ , ei ademta, idem relinquit, seu nihil notabile adimit.

Hoc argumento concluditur, infinitum non esse totum; nec nisi fictionem, alioqui enim foret pars aequalis toti.

$$\text{Si ad } 1. \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4}. \text{ etc. addas } 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} \text{ etc. fiet } 2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{5} + \frac{2}{7} \text{ [etc.]}$$

15 quod aequatur spatio  $GFCAMB LG$ . Huius duplo<sub>[i]</sub> sumta scilicet et opposita hyperbola,  
 $4 + \frac{4}{3} + \frac{4}{5} + \frac{4}{7}$  etc. auferatur area circuli, cuius radius  $CF$ . quae est:  $4 - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \frac{4}{9}$   
etc. fiet inde differentia haec:  $\frac{8}{3} + \frac{8}{7} + \frac{8}{11}$  etc. et si addatur potius illi spatio area circuli  
eiusdem fiet:  $8 + \frac{8}{5} + \frac{8}{11}$  etc.

$$\text{Si diameter sit } 1. \text{ circumferentia est: } \frac{4}{1} - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} \text{ etc. Ergo si diameter } 2. \text{ seu si}$$

20 radius 1. erit circumferentia  $\frac{8}{1} - \frac{8}{3} + \frac{8}{5} - \frac{8}{7}$  [etc.] ergo semicircumferentia,  $\frac{4}{1} - \frac{4}{3} + \frac{4}{5}$  etc.

$$1 + \frac{1}{5} \text{ etc. (1) Posita (2) } \sqcap \text{ spatio } L \quad 6 \text{ ACBEM, (1) restabit: } 2 \wedge \frac{1}{2} * 2 \wedge \frac{1}{4} * 2 \wedge \frac{1}{6}, (2) \text{ fiet:}$$

$L = 14$  ad (1) spatium (2)  $1. \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4}$ . etc.  $L = 14-469,12$  etc. erg. Hrsg. sechsmal    15 sumta ...  
hyperbola, erg.  $L$

quae ducta in radium 1. dat circulum, ergo circulus  $\frac{4}{1} - \frac{4}{3} + \frac{4}{5}$  etc. ergo quadrans circuli

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} \text{ etc. Fiet: } \underbrace{1 - \frac{1}{3}}_{\frac{2}{3}} + \underbrace{\frac{1}{5} - \frac{1}{7}}_{\frac{2}{35}} + \underbrace{\frac{1}{9} - \frac{1}{11}}_{\frac{2}{99}}.$$

$$\text{Spatium } FCBG \text{ dimidietur, fiet: } \underbrace{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}}_{\frac{2}{8}} + \underbrace{\frac{1}{6} - \frac{1}{8}}_{\frac{2}{48}} + \underbrace{\frac{1}{10} - \frac{1}{12}}_{\frac{2}{120}} \text{ [etc.]}$$

$$\begin{array}{ccccccccccccccccc} \frac{1}{3} & \frac{1}{8} & \frac{1}{15} & \frac{1}{24} & \frac{1}{35} & \frac{1}{48} & \frac{1}{63} & \frac{1}{80} & \frac{1}{99} & \frac{1}{120} & \frac{1}{143} & \frac{1}{168} & \frac{1}{195} & \text{etc.} & \sqcap & \frac{3}{4}. \\ \cdot & \frac{1}{15} & \cdot & \frac{1}{35} & \cdot & \frac{1}{63} & \cdot & \frac{1}{99} & \cdot & \frac{1}{143} & \cdot & \frac{1}{195} & \text{etc.} & \sqcap & \frac{1}{2}. \\ \cdot & \frac{1}{8} & \cdot & \frac{1}{24} & \cdot & \frac{1}{48} & \cdot & \frac{1}{80} & \cdot & \frac{1}{120} & \cdot & \frac{1}{168} & \cdot & \text{etc.} & \sqcap & \frac{1}{4}. \\ \frac{1}{3} & \cdot & \cdot & \cdot & \frac{1}{35} & \cdot & \cdot & \cdot & \frac{1}{99} & \cdot & \cdot & \cdot & \frac{1}{195} & \text{[etc.]} & \sqcap & \text{semiquadranti.} \\ \cdot & \frac{1}{8} & \cdot & \cdot & \cdot & \frac{1}{48} & \cdot & \cdot & \cdot & \frac{1}{120} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \text{[etc.]} & \sqcap & \text{quartae parti} \end{array}$$

spatii *FCBG*.

$$\text{Ad } 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} \text{ [etc.]} \sqcap \text{ spatio } FCBG$$

$$\text{addatur } 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{15} \text{ etc. } \sqcap \text{ quadranti}$$

$$\text{fiet: } 2 - \frac{5}{6} + \frac{8}{15} - \frac{11}{28} \text{ etc. sed nihil inde.}$$

Auferatur, fiet:  $* - \frac{1}{6} + \frac{2}{15} - \frac{3}{28} + \frac{4}{45}$  etc. quae series proinde pendet ex iunctis circulari

et hyperbolica.

Sed omnium optima auferendi ratio haec videtur:

$2 - \frac{1}{7}$  etc. (1) Auferatur quadrans circuli | a spatio *CFGB*. *streicht Hrsg.* | (a) restabit (b) restabit

(c) restabit: (2) Fiet:  $L = 4$  (1) Hyperbola (2) Spatium *FCBG* (a) dupletur (b) dimidietur  $L$

11f. *FCBG*. (1) A ... spatio *FCBG* auferatur (2) Ad  $L = 15 + \frac{4}{45}$  etc. (1) cui si addatur (2) quae  
 $L$

Ab  $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{15} + \frac{1}{17} - \frac{1}{19}$  [etc.]  $\sqcap$  quadranti

auferatur  $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \frac{1}{14} - \frac{1}{16} + \frac{1}{18} - \frac{1}{20}$  [etc.]  $\sqcap$  dimidio spatio FCBG.

Restabit:  $\frac{1}{2} - \frac{1}{12} + \frac{1}{30} - \frac{1}{56} + \frac{1}{90} - \frac{1}{132}$  etc.

Iam  $1 - \underbrace{\frac{1}{2}}_{\frac{1}{2}} + \underbrace{\frac{1}{2} - \frac{1}{3}}_{\frac{1}{6}} + \underbrace{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}}_{\frac{1}{12}} + \underbrace{\frac{1}{4} - \frac{1}{5}}_{\frac{1}{20}} + \underbrace{\frac{1}{5} - \frac{1}{6}}_{\frac{1}{30}} + \underbrace{\frac{1}{6} - \frac{1}{7}}_{\frac{1}{42}}$  etc.

5  $\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{12}, \frac{1}{20}, \frac{1}{30}, \frac{1}{42}, \frac{1}{56}, \frac{1}{72}, \frac{1}{90}, \frac{1}{110}$  etc.  $\sqcap$  1.

Et  $1 - \underbrace{\frac{1}{2}}_{\frac{1}{2}}, \underbrace{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}}_{\frac{1}{12}}, \underbrace{\frac{1}{5} - \frac{1}{6}}_{\frac{1}{30}}, \underbrace{\frac{1}{7} - \frac{1}{8}}_{\frac{1}{56}}, \underbrace{\frac{1}{9} - \frac{1}{10}}_{\frac{1}{90}}$  etc.  $\sqcap$

$\frac{1}{2}, \frac{1}{12}, \frac{1}{30}, \frac{1}{56}, \frac{1}{90}$

spatio FCBG.

Ergo recolligendo spat. FCBG  $\sqcap \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{30} \cdot \frac{1}{56} \cdot \frac{1}{90}$  etc.

10 et quadrans  $- \frac{\text{spat. FCBG}}{2} \sqcap \frac{1}{2} - \frac{1}{12} + \frac{1}{30} - \frac{1}{56} + \frac{1}{90}$  etc.

Ergo  $\frac{\text{semicirculus}}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{12} - \frac{1}{30} - \frac{1}{56} - \frac{1}{90}$  [etc.]  $\sqcap \frac{1}{2} - \frac{1}{12} + \frac{1}{30} - \frac{1}{56} + \frac{1}{90}$  etc.

sive semicirculus  $\sqcap \left( \frac{1}{1} + \frac{1}{2} \right) \left( -\frac{1}{6} + \frac{1}{12} \right) \left( +\frac{1}{15} + \frac{1}{30} \right) \left( -\frac{1}{28} + \frac{1}{56} \right)$  etc.

$\frac{3}{2} - \frac{1}{12} + \frac{3}{30} - \frac{1}{56}$  etc.

Unde sequitur semicirculum excedere triplam differentiam dimidi spati hyperbo-

15 lici a quadrante duplo huius seriei,  $\frac{1}{12} \frac{1}{56} \frac{1}{132}$ , vel semicirculum excedere differentiam

quadrantis a spatio dicto, duplicata serie:  $\frac{1}{2} \frac{1}{30} \frac{1}{90}$ .

1–11 etc. erg. Hrsg. dreimal 9 spat. FCBG (1)  $\sqcap \frac{1}{6} \frac{1}{20} \frac{1}{42} \frac{1}{72} \frac{1}{100}$  etc. (2)  $\sqcap \frac{1}{2} L$

14 semicirculum (1) esse (2) aequari (a) triplae differentiae dimidi spati hyperbolici et quadrantis (aa)

demto (bb) si duplo huius seriei,  $\frac{1}{12} \frac{1}{56} \frac{1}{132}$  sit minutum, (b) deficere (c) a tripla differentia dimidi spati hyperbolici et quadrantis (aa) differre (bb) deficere (3) excedere (4) excedere (5) excedere L

Esto semicirc.  $\sqcap S$ . differentia dicta  $\sqcap D$ , series  $\frac{1}{2} \frac{1}{30} \frac{1}{90}$   $\sqcap L$ . series  $\frac{1}{12} \frac{1}{56} \frac{1}{132}$   $\sqcap M$ , erit  $S \sqcap 3D + 2M$ . et idem  $S \sqcap D + 2L$ . Ergo  $3D + 2M \sqcap D + 2L$ . Ergo  $D \sqcap L - M$ . quae calculi probatio est elegans.

Quoniam ergo semicirculus  $S \sqcap 3D + [2M]$  duplo seriei huius  $\left[ M \frac{1}{12} \frac{1}{56} \frac{1}{132} \right]$  minus tripli differentiae  $D$  qua quadrans dimidium spatium hyp. dictum excedit, aequatur; et idem semicirculus duplo huius seriei  $\left[ L \frac{1}{2} \frac{1}{30} \frac{1}{90}$  minutus  $\right]$  ipsi differentiae  $D$  aequatur,  $S \sqcap D[+2L]$  ideo vel seriem  $L$ . vel seriem  $M$ . utramlibet earum separatim per circulum vel hyperbolam inveniri sufficit. Quod tamen ut clarius appareat, efficiendum est:

Series  $\frac{1}{2} \frac{1}{12} \frac{1}{30} \frac{1}{56} \frac{1}{90}$  etc. habetur ex data hyperbolae quadratura, quod si iam etiam  $\frac{1}{2} \frac{1}{30} \frac{1}{90}$  [etc.] habetur ex eadem, tunc etiam  $\frac{1}{12} \frac{1}{56} \frac{1}{132}$  [etc.] ex quad. hyp. habebitur.

$L + M \sqcap c$ . quam  $c$ . suppono cognitam ex quad. hyp. Ergo si  $L \sqcap d$ . cognitae etiam ex  $\square$  hyp. erit  $M \sqcap c - d$ . et  $L - M \sqcap d - c + d$ . Ergo  $L - M \sqcap 2d - c$ . Iam  $L - M \sqcap e - f$ . posito  $e$ . haberis ex quad. circ. seu esse quadrantem, et  $f$ . esse dimidium spatium hyperbolicum, *FCBG*. eritque  $2d - c \sqcap e - f$ . Eritque  $e$ . quadrans  $\sqcap 2d - c + f$ . cognitis ex hyperbolae quadratura. Tantum ergo superest ut seriem  $L$ ,  $\frac{1}{2} \frac{1}{30} \frac{1}{90}$  etc. ex sola hyperbolae quadratura ducere tentemus. Figura autem cuius series quadratrix  $L$ , est  $\frac{1}{y^3 + y^2 + y + 1}$ , sive  $\frac{1}{1 + y^2, \cap 1 + y}$ , sive  $\frac{1 - y}{1 - y^4}$  ut initio huius plagulae dixi. Cuius figurae quadraturam ex quadratura hyperbolae superest ut deducamus si licet. Eius momentum ex  $1 + y$  est  $\frac{1}{1 + y^2}$ , quae pendet ex quad. circuli; ita ut summa totius illius

4 2L  $L$  ändert Hrsg.    4 L  $\frac{1}{2} \frac{1}{30} \frac{1}{90}$   $L$  ändert Hrsg.    6 M  $\frac{1}{12} \frac{1}{56} \frac{1}{132}$  auctus  $L$  ändert Hrsg.  
7 –2M  $L$  ändert Hrsg.    11 etc. erg. Hrsg. zweimal    11f. hyp. | pura gestr. | habebitur  $L$   
18 quadratura (1) ducamus (2) ducere  $L$     19 ut ... dixi erg.  $L$     20 si licet erg.  $L$

19 initio: s. o. S. 465 Z. 15f.

figurae aequetur quadranti, e. Eius momentum ex  $y$  est:  $\frac{y}{1+y^2}, \wedge 1+y$ . Ergo  $\frac{1}{1+y^2} -$

$\frac{y}{1+y^2}, 1+y \sqcap \frac{1}{1+y^2}, 1+y$ . Iam:  $\frac{y}{1+y^2}, 1+y$  momentum ex  $1+y$  habet  $\frac{y}{1+y^2}$ , seu  $\frac{f}{2}$

spatium scilicet hyperbolicum dimidiatum; momentum ex  $y$ , habet:  $\frac{y^2}{1+y^2}, 1+y$ . Ergo

$\frac{y}{1+y^2} - \frac{y^2}{1+y^2}, 1+y \sqcap \frac{y}{1+y^2}, 1+y$ . Iam  $\frac{y^2}{1+y^2}, 1+y$  ex  $1+y$  habet momentum  $\frac{y^2}{1+y^2}$

5 ex quad. circ. et ex  $y$ , habet  $\frac{y^3}{1+y^2}, 1+y$  et ex  $y-1$  habet  $\frac{y^3-y^2}{1+y^2}, 1-y^2 \sqcap \frac{y^3-y^2}{1-y^4}$ .

quae omnes proinde pendent ex circuli et hyperbolae coniunctorum quadratura; sed nihil  
inde ad quadraturam circuli ex hyperbola vel contra duci potest.

$\frac{a^2}{a^2+y^2} \sqcap x$ . Ergo differentia duarum  $x \sqcap \frac{a^2}{a^2+y^2} - \frac{a^2}{a^2+y^2+2y\beta+\beta^2} \sqcap$

$\frac{[a^2][+y^2]+2y\beta+\beta^2, \wedge a^2, [-a^4][-a^2y^2]}{a^4+2a^2y^2+y^4}$  fiet:  $\frac{2y}{a^2+y^2, a^2+y^2} \sqcap w$ , cuius figurae habe-

10 tur quadratura.

Si sit:  $\frac{a^3}{a^2-y^2-2y\beta-\beta^2} - \frac{a^3}{a^2-y^2}$ . unde

$\frac{a^3, \wedge a^2-y^2, -, , a^3, \wedge [a^2-y^2]-2y\beta-\beta^2}{a+y, \square, a-y, \square}$ . Haec figura ergo  $\frac{2ya^4}{a+y, \square, a-y, \square}$  est qua-

4  $\sqcap \frac{y}{1+y^2, 1+y}$  (1) vel  $\frac{1}{1+y^2} - \frac{y}{1+y^2, 1+y} \sqcap$  (2). Iam  $L$  7 f. potest. (1)  $2ax-x^2 \sqcap y^2$ ,

investigando intervallum tangentium  $\cancel{2}al - \cancel{2}x l \sqcap \cancel{2}y^2$ , sive  $l \sqcap \frac{y^2}{2a-x}$  (!), sive  $l \sqcap \frac{2ax-x^2}{2a-x}$ . Est au-

tem  $\frac{1}{y} \sqcap \frac{a}{w}$ . Ergo  $w \sqcap \frac{ya, \wedge 2a-x}{2ax-x^2}$ . Ergo  $w \sqcap \frac{a\sqrt{2ax-x^2} \wedge 2a-x}{\sqrt{2ax-x^2} \wedge \sqrt{2ax-x^2}}$ . Ergo  $w \sqcap \frac{2a^2-xa}{\sqrt{2ax-x^2}}$ .

Iam (a)  $\frac{a^2}{\sqrt{2ax-x^2}} \sqcap$  (b)  $\frac{a^4}{2ax-x^2} \sqcap y^2$  (aa)  $\frac{a^2}{y} \sqcap$  (bb)  $\frac{a^4}{2ax-x} \quad (2) \frac{a^2}{a^2+y^2} L$  11 sit: (1)

$\frac{a^2}{a^2-y^2} - \frac{a^2}{a^2-y^2-2y\beta-\beta^2} \sqcap w$ . Unde (a)  $\frac{a^2, \wedge [a^2-y^2]-2y\beta[-\beta^2],, [-a^2, \wedge a^2[-y^2]}{(a^3, \wedge [a^2-y^2]-2y\beta[-\beta^2],, [-a^3, \wedge a^2[-y^2])}$  (b)

$\frac{a^3, \wedge [a^2-y^2]-2y\beta[-\beta^2],, [-a^3, \wedge a^2[-y^2]}{(a^2-y^2-2y\beta-\beta^2)} \quad (2) \frac{a^3}{a^2-y^2-2y\beta-\beta^2} L$

drabilis. Eius momentum ex  $a + y$ , est  $\frac{2y}{a + y, a - y, \square}$ . Eius momentum ex  $a - y$ , est

$$\frac{2y}{a^2 - y^2, a + y}.$$

$\frac{y}{1 + y, 1 - y, \square} + \frac{y}{1 + y, 1 - y^2}$  aequatur  $\frac{2y}{1 + y, 1 - y, \square}$ . ideoque haec summa qua-

drabilis. Investigemus iam:  $\frac{y}{a + y, a - y, \square}$ . Eius momentum ex  $a + y$ , est  $\frac{y}{a - y, \square}$ , eius

momentum ex  $a - y$ , est  $\frac{y}{a^2 - y^2}$ .

5

$\frac{y}{1 - y, \square} + \frac{y}{1 - y^2} \sqcap \frac{2y}{1 + y, 1 - y, \square}$ . Investigemus:  $\frac{y}{1 - y, \square}$ . addatur  $\frac{1}{1 - y, \square}$  quae

habetur absolute.  $\frac{1 - y}{1 - y, \square} \sqcap \frac{1}{1 - y}$ . quae pendet ex quad. hyp. Ergo  $\frac{y}{1 - y, \square}$  pendet ex

quad. hyp. Investigemus et  $\frac{y}{1 - y^2}$ , [eius] momentum ex  $1 + y$ , est  $\frac{y}{1 - y}$ , quae pendet ex

quad. hyp. Eiusdem momentum ex  $1 - y$ , est  $\frac{y}{1 + y}$ , quod etiam pendet ex quad. hyp.

Ergo habetur et tertium momentum  $\frac{y^2}{1 - y^2}$ , ergo et  $\frac{1}{1 - y^2}$  ex ead. quad. hyp.

10

$\frac{1 + y^2 + y^4 + y^6}{1 - y^2}$ . Ergo  $1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{9} + \frac{1}{13}$  [etc.], vel  $\frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{11}$  etc. pendent ex quad.

circ. et hyp. simul: Ergo  $\frac{1}{1 - y^4}$  pendet ex quad. circ. et hyperb. simul. Hoc obiter. Ergo

$\frac{y}{1 + y, 1 - y, \square}$  pendet ex  $\square$  hyp.: Ergo et  $\frac{y}{a^2 - y^2, a + y}$  pendet ex quad. hyp. Quod an

1 a + y, est (1) latus (2)  $\frac{2y}{a + y, a - y, \square}$  L 2f.  $\frac{2y}{a^2 - y^2, a + y}$ . (1) Differentia ergo inter

$\frac{y}{a + y, a - y, \square} - \frac{y}{a + y, a^2 - y^2}$  aequatur (a) cylindro fi (b)  $\frac{2y}{a + y, a - y, \square}$  (2)  $\frac{y}{1 + y, 1 - y, \square}$  L

6 Investigemus:  $\frac{y}{1 - y, \square}$ . (1) Eius (2) Haec pendet ex quad. hyp. (3) addatur L 8 ex L ändert Hrsg.

11 etc. erg. Hrsg.

---

472,11–473,2 Leibniz verwendet punktuell die Homogenitätsfaktoren  $a^3$  bzw.  $a^4$  und streicht dreimal den für die Aussage belanglosen Faktor 2.

aliunde pateat videamus: eius momentum ex  $a - y$ , est  $\frac{y}{a + y}$ . quod habetur absolute.

Eius mom. ex  $a + y$ , est  $\frac{y}{a^2 - y^2}$ . quod etiam habetur ex quad. hyp. Sed satis de his.

Sequitur plagula IX.

38<sub>11</sub>. DE SERIERUM SUMMIS ET DE QUADRATURIS PARS NONA

**Überlieferung:** L Konzept: LH 35 V 4 Bl. 20–21. 1 Bog. 2<sup>o</sup>. 4 S.  
Cc 2, Nr. 775 A tlw.

Schediasmatis de seriebus et quadraturis pars IX.

Quoniam sub finem praecedentis plagulae ostensum est differentias ipsarum  $\frac{a^2}{a^2 + y^2}$  5  
 esse  $\frac{2y}{a^2 + y^2, \square}$ . ductis ergo ipsis in distantias a vertice, fiet:  $\frac{2y^2}{a^2 + y^2, \square}$ , quae figura  
 aequatur ipsi figurae  $\frac{a^2}{a^2 + y^2}$  et proinde pendet ex quad. circuli. Quodsi ei addatur  
 $\frac{a^2}{a^2 + y^2, \square}$ , momentum ipsarum  $\frac{a^2}{a^2 + y^2}$  ex asymptoto, quod ideo etiam ex quad. circuli  
 pendet, fiet:  $\frac{a^2 + y^2}{a^2 + y^2, \square}$ , sive  $\frac{1}{a^2 + y^2}$ , quae pendet ex quad. circuli. Ergo differentia  
 ipsarum  $\frac{a^2}{a^2 - y^2}^{[1]} \sqcap \frac{2y}{a^2 - y^2, \square} \sqcap \frac{2y}{a + y, a - y, \square}$  quae figura quadrari potest. Ergo 10  
 $\frac{2y}{a + y, \square, a - y} + \frac{2y}{a - y, \square, a + y}$  quadrari potest. Item:  $\frac{y^2}{a + y, a - y, \square} + \frac{y}{a + y, \square, a - y}$ ,  
 quadrari potest. Item  $\frac{y}{a - y, \square, a + y} - \frac{y^2}{a + y, a - y, \square}$ .

Subit animum nova quaedam materia inquirendi, e.g. ope huiusmodi calculorum qua-  
 drari possunt figurae quaedam non geometricae, e.g. hyperbola est  $\frac{1}{1 \mp y}$ , eius momentum  
 haberi potest. Haberi ergo et potest dimensio figurae, quae sit quadratrix hyperbolae. 15

6 a vertice erg. L 7 aequatur (1) complemento figurae (2) ipsi L 8  $\frac{a^2}{a^2 + y^2}$  ex (1) basi, (2)  
 asymptoto L 12 f.  $-\frac{y^2}{a + y, a - y, \square}$ . (1) Ope huius meth (2) In (3) Subit L 13 e.g. (1) differentiae  
 (2) ope L 14 e.g. (1) sit hyperbola (2) circulus est (3) hyperbola L

11 Leibniz streicht den für die Aussage belanglosen Faktor 2 im Zähler der beiden Summanden.


Haec figura etsi non sit geometrica, tamen poterit forte describi eo modo quo cycloides; et volutae, et helices; et ita eiusmodi figurarum non geometricarum, quadratura absoluta saepe haberi hac methodo poterit. Ita, circulus  $\sqrt{a^2 - x^2}$ , multiplicetur per  $a + x$ , sive per  $\sqrt{a + x}$ ,  $\square$  fiet:  $\sqrt{a + x} \cdot \text{cub. } a - x$  cuius figurae dimensio dabit dimensionem figurae circuli quadratricis. Itaque videndum an generaliter hoc solvi possit: Propositis figuris non geometricis, geometricas symmetras invenire. Quod foret maximi momenti problema generale.

$$\frac{y}{a} - \frac{a}{y} \sqcap \frac{y^2 - a^2}{ay}, \text{ quae figura est quadrabilis. Differentia ordinatarum}$$

$$\frac{y^2 + 2\beta y + \beta^2 - a^2}{ay + a\beta} - \frac{y^2 - a^2}{ay} \sqcap \frac{ay^3 + 2a\beta y^2 + a\beta^2 y - a^3 y - ay^3 - a\beta y^2 + a^3 y + a^3 \beta}{a^2 y^2 + a^2 y \beta},$$

10 sive:  $\frac{a\beta y^2 + a^3 \beta}{a^2 y^2}$ , quae est quadrabilis.

Aliter:



[Fig. 1]

Exposita esto figura, cuius aequatio sit  $\frac{ya^2}{a^2 + y^2} \sqcap x$ . Momentum ipsarum ordinatarum huius figurae ex  $y$ , est  $\frac{y^2 a}{a^2 + y^2}$ . Quaeritur valor ipsarum  $y$ . ex aequatione  $\frac{ya^2}{a^2 + y^2} \sqcap x$ ,

15 fiet:  $a^2 x + xy^2 \sqcap ya^2$ . Unde  $y^2 - \frac{a^2}{x} y + \frac{a^4}{x^2} \sqcap \frac{a^4}{x^2} - a^2$ . sive  $\pm y \pm \frac{a^2}{x} \sqcap \frac{a\sqrt{a^4 - x^2}}{x}$ . et


5 Itaque (1) propositis lineis (2) videndum  $L = 10f.$  quadrabilis. (1) | Hinc streicht Hrsg. | (2) Ascribere operae pretium est modum, quo demonstrari potest figurae  $\frac{a^2}{a^2 + y^2}$  dimensio pendens a circulari:

(3) Aliter  $L$

15–477,2 Unde: Bei der quadratischen Ergänzung addiert Leibniz  $\frac{a^4}{x^2}$  statt  $\frac{a^4}{4x^2}$  zu beiden Seiten der Gleichung und verfehlt so die richtige Lösung. Der Fehler beeinträchtigt die Rechnung bis S. 477 Z. 2. Analoge Fehler treten in den S. 477 Z. 10 u. S. 478 Z. 5 auf und wirken sich bis S. 479 Z. 3 aus.

$y \sqcap \frac{\pm a\sqrt{a^2 - x^2} + a^2}{x}$ . Quadrata omnium  $y$ , seu momentum complementi figurae  $ABC$ ,  
dat:  $\frac{a^4 - a^2x^2 + a^4 \pm 2a^3\sqrt{a^2 - x^2}}{x^2}$  quae figura pendet ex q. circuli.

Resumemus:



[Fig. 2]

Esto curva  $ADC$ .  $AB \sqcap x \sqcap EC$ .  $BC \sqcap y \sqcap AE$ . Esto aequatio:  $a^2y \sqcap a^2x + y^2x$ . 5  
Erit  $x \sqcap \frac{a^2y}{a^2 + y^2}$  quae pendet a quad. hyp., et  $x^2 \sqcap \frac{a^4y^2}{a^2 + y^2}$ , quorum summa est  
momentum figurae  $AECDA$  ex axe aequilibrii  $AE$ . At summa omnium  $\frac{a^2y^2}{a^2 + y^2}$ , quae  
pendet ex quad. circuli est momentum figurae  $AECDA$  ex axe aequilibrii  $AB$ .

Iam ut quaeramus  $y$ , ita procedendum est, ex aequatione figurae fiet:  $y^2x - a^2y \sqcap$   
 $-a^2x$ , sive  $y^2 - \frac{a^2}{x} \sqcap -a^2$ , sive  $y^2 - \frac{a^2}{x}y + \frac{a^4}{x^2} \sqcap \frac{a^4 - a^2x^2}{x^2}$ , unde  $\pm y \pm \frac{a^2}{x} \sqcap \frac{a\sqrt{a^2 - x^2}}{x}$ . 10  
[Unde patet ut obiter dicam figuram  $\frac{a^2\sqrt{a^2 - x^2}}{x}$ , pendere a quad. hyperbolae. Nam  
ipsae  $y$  pendet a quad. hyp. aufer inde ipsas  $\frac{a^2}{x}$  quae pendent a quad. hyp. etiam

1f.  $y \sqcap \frac{\pm a\sqrt{a^2 - x^2} + a^2}{x}$ . (1) Momentum (2) et momentum omnium  $x$ , (3) Quadrata  $L$   
1f. complementi (1) omnium (2) figurae (a)  $y, yx, yx$  (b)  $ABC$ , (aa) est (bb) dat  $L$  6 quae ... hyp.  
erg.  $L$  7f. aequilibrii erg.  $L$  zweimal 7f. quae ... circuli erg.  $L$

---

10+478,5 +  $\frac{a^4}{x^2}$  u. +  $\frac{y^4}{a^2}$ : s. o. Erl. zu S. 476 Z. 15 – Z. 2. 11+478,9 Die eckigen Klammern stam-  
men von Leibniz.

$\frac{a\sqrt{a^2 - x^2}}{x}$  pendebit a quad. hyp. Eius vero centrum gravitatis pendet a quad. circuli, nam si ducatur in  $x$ , fiet:  $a\sqrt{a^2 - y^2}$ , quae est homogenea circulo, si ducatur in se, fiet:  $\frac{a^4 - a^2x^2}{x^2}$ , quae habetur absolute: Habito ergo figurae centro gravitatis ex data circuli quadratura, quaeramus alteram eius indeterminatam, fiet:  $a^4 - a^2x^2 \sqcap y^2x$ , unde ordinando  $x^2 + \frac{y^2}{a^2}x + \frac{y^4}{a^2} \sqcap \frac{y^4 + a^4}{a^2}$ . Unde  $x + \frac{y^2}{a} \sqcap \frac{\sqrt{y^4 + a^4}}{a}$  ((quae figura patebit ex quad. hyperbolae. Ergo et  $\frac{\sqrt{y^4 + a^4}}{a}$ , pendebit ex quad. hyp. Ergo  $a^4 \sqcap a^2x^2 - y^4$  ex quad. hyp. sive  $a^4 \sqcap ax - y^2$ ,  $\wedge ax + y^2$ . Unde  $a\sqrt{a^2 - x^2} \sqcap y^2$ . momentum ergo omnium  $y$  ex axe eorum ex quad. circuli. Sed  $\sqrt{a\sqrt{a^2 - x^2}} \sqcap y$ . quae figura pendet ex quad. hyperbole. Sed  $x\sqrt{a\sqrt{a^2 - x^2}}$  pendet ex quadratura circuli.)])

Invenimus ut ad figuram nostram redeamus in ea momentum figurae  $AECDA$  ex  $AB$  pendere ex quad. circuli quia  $xy \sqcap \frac{a^2y^2}{a^2 + y^2}$ . Momentum vero figurae  $[ABCDA]$ , ex  $AE$ , pendet etiam ex quadratura circuli, quia  $xy \sqcap \frac{\pm a\sqrt{\sqrt{a^2 - x^2} + a^2}}{x}$ , quia inventa est  $y \sqcap \frac{\pm a\sqrt{a^2 - x^2} + a^2}{x}$ . Ideoque centrum gravitatis figurae propositae pendet ex quad. circuli; ergo  $\frac{a^4y^2}{a^2 + y^2, \square}$ , item  $\frac{a^4 - a^2x^2 \pm 2a^3\sqrt{a^2 - x^2} + a^4}{x^2}$ , et per consequens  $\frac{a^2\sqrt{a^2 - x^2}}{x^2}$  ex quad. circuli pendebit.

6 *Daneben:* Vide plag. 10. pag. ult.

8f. *Dazu am Rande:* Contra potius §.

7  $\sqcap y^2$ . (1) cuius ordinata ex qu (2) momentum  $L$  10 ea (1) BC, esse (2) momentum figurae (a) ex (aa) AE (bb) AB (b) AECDA ex (aa) AE (bb) AB  $L$  11 ex ABCDE  $L$  ändert Hrsg.

16 Vide: s. u. N. 38<sub>12</sub> S. 495 Z. 3–5.

Huius figurae [quadrati ordinatarum]  $y^2$ , habentur absolute, sed  $y$ , ex  $x$ , dant  $\frac{a^2\sqrt{a^2-x^2}}{x} \sqcap y$ . Unde  $a^6 - a^4x^2 \sqcap y^2x^4$ . Unde  $x^4 + \frac{a^4x^2}{y^2} + \frac{a^8}{y^4} \sqcap \frac{a^8}{y^4} + \frac{a^6}{y^2}$  et  $x^2 + \frac{a^4}{y^2} \sqcap \frac{\sqrt{a^8+a^6y^2}}{y^2}$ , et  $x \sqcap \frac{\sqrt{\sqrt{a^8+a^6y^2}-a^4}}{y}$ .

Data figura curvam ei homogeneam invenire, elegantissimum est, atque utilissimum problema, ita enim ope curvae huius evolutae, secari potest figura proposita, in ratione data, et cuilibet eius portioni dari rectilineum aequale. Methodus autem id quaerendi haec est:

A quadrato ordinatae figurae datae auferatur quadratum unitatis; quodsi iam residui radix est ordinatae figurae quadrabilis, satisfieri potest postulato.

Ut esto figura circulus: eius ordinata  $\sqrt{2ax-x^2}$ , eius quadratum  $2ax-x^2$ , auferatur inde  $a^2$ , fiet:  $\sqrt{2ax-x^2-a^2}$ . Unde patet ad hanc curvam habendam ipsius circuli opus esse quadratura. Sed quodsi eius quadratum sit minus quadrato unitatis id utique inde auferri non poterit, et tunc nulla dabitur curva illis homogenea, eo quidem ordinatarum sensu, ut in circulo, ab  $a^2-y^2$ , si auferas  $a^2$  restabit  $-y^2$ , cuius radix est impossibilis.

In hyperbola, sit  $a^2+y^2$ , aufer inde  $a^2$  fiet  $y^2$ , cuius radix  $y$ . Unde sequeretur figuram ipsarum  $y$  quadratricem seu omnium  $\frac{y^2}{2}$  quae est parabola cuius aequatio:  $y^2 \sqcap 2ax$ . habere curvam homogeneam figurae hyperbolae. Hinc si aliter assumas ordinatas figurae hy-

---

14 Dazu am Rande: Imo ab  $a^2-y^2$ , auferri debet  $b^2$ , et res procedet.

478,15–479,1 pendebit. (1) Eius momentum (2) Huius figurae | quadrati ordinatarum *gestr. erg.*

$$Hrsq. | y^2 L \quad 3f. x \sqcap \frac{\sqrt{\sqrt{a^8+a^6y^2}-a^4}}{y}. \quad (1) \text{ Sed ista exitum} \quad (2) \text{ Data } L \quad 5 \text{ ope} \quad (1) \text{ fili} \quad (2)$$

curvae  $L$  7f. est: (1) A (2) Datae figur (3) Quadratum ordinatae figurae datae aufe (4) A  $L$  9f. postulato (1), ex notis (2). Ut  $L$  12 quadratura. (1) | Aliter, streicht Hrsq. | (a)  $a^2-y^2 \sqcap$  (b)  $2a^2$  (c)  $a^2-y^2-a$  (2) Sed  $L$  14 cuius (1) ordinatae (2) radix  $L$  14f. impossibilis. (1) In hyp (2) In parabola: (3) In  $L$  16  $\frac{y^2}{2}$  (1) | esse streicht Hrsq. | hyperbola (2) quae  $L$  16f.  $y^2 \sqcap 2ax$ . (1) esse homogeneam curvae (2) habere  $L$

---

2  $\sqcap y^2x^4$ : Richtig wäre  $y^2x^2$ . Der Fehler und die falsche quadratische Ergänzung beeinträchtigen das Ergebnis in Z. 3.

perbolicae, figura ipsis homogenea semper eveniri poterit, quia enim semel inveniri potuit, invenietur semper, prorsus quemadmodum centro gravitatis ab uno latere reperto, datur id ex aliis omnibus. Esto ergo aequatio  $2ax + x^2$ , inde auferatur  $a^2$ , fiet:  $\sqrt{2ax + x^2 - a^2}$  cuius figurae quaeritur summa, quae summa est quadratrix ipsius hyperbolae. Itaque  
5 iam video applicatis hyperbolae ad axem, ad abscissas ex vertice; homogeneam curvam non posse haberi nisi supposita ipsa hyperbolae quadratura, nam pro  $x$  ponendo  $z - a$ , fiet:  $\sqrt{(2az) - 2a^2 + z^2(-2az)(+a^2 - a^2)}$ , unde fiet  $\sqrt{z^2 - 2a^2}$ . Ad asymptoton hoc modo:  
 $\frac{a^4}{x^2} - a^2$ . fiet:  $\sqrt{\frac{a^4 - a^2x^2}{x^2}}$  sive  $\frac{a}{x}\sqrt{a^2 - x^2}$  quae pendet a quadratura hyperbolae; ut iam  
quaeratur figura homogenea circulo: ab  $a^2 - y^2$ , auferatur alia recta constans:  $b^2$ , fiet:  
10  $\sqrt{a^2 - b^2 - y^2}$  quae rursus est ad circulum.

Ab anonymae  $\frac{ax}{\sqrt{2ax - x^2}}$  quadrato, auferatur  $a^2$ , fiet:  $\frac{a^2x^2}{2ax - x^2}$  seu  $\frac{a^2x}{2a - x}$ , unde  
auferatur  $a^2$ , fiet:  $a^2x[-]2a^3 + a^2x$ , sive  $\sqrt{\frac{[-]2a^3 + 2a^2x}{2a - x}}$  figura ergo  $\frac{[-]2a^3 + 2a^2x}{2a - x} \sqcap y^2$ ,  
sed si iussissem auferri:  $a\gamma$ . fiet:  $\sqrt{\frac{a^2x - 2a^2\gamma + xa\gamma}{2a - x}}$  et  $\gamma$ . ita explicanda iam est ut  
numerator dividi possit per  $2a - x$ , nempe  
15      +  $a^2x - 2a^2\gamma \cancel{f} - a^2 - a\gamma$ . Et fiet:  $-2a^3 - 2a^2\gamma \sqcap -2a^2\gamma$  quod est impossibile,  
 $\frac{+ a\gamma}{- x + 2a}$   
non ergo procurari potest divisibilitas. Saepe vero poterit hac arte procurari.

Iam si rursus a  $\sqrt{\frac{a^2x - 2a^2\gamma + xa\gamma}{2a - x}}$  quadrato, auferas alterius constantis v. g.  $\sqrt{a\delta}$ ,  
quadratum nempe  $a\delta$ , fiet alia iterum figura.  
20 Nimirum verum est, figurae ex hac quadrati vel rectanguli constantis ablatione [factae] radicum, summam dare curvam syntomon figurae datae, sed non inde patet, hanc

4 quae (1) figura (2) summa  $L$       6 quadratura (1) | sed streicht Hrsg. | hanc (2). Imo potest explicando  $x$  (3), nam  $L$       9 circulo: (1) sinus circuli sunt (2) ab  $L$       12 +  $L$  ändert Hrsg.  
12 – erg. Hrsg. zweimal      12  $\sqcap y^2$ , (1) pendebit ex quad. circuli (2) sed  $L$       19 f. figura. (1) Sed video me lapsum (2) Nimirum  $L$       20 est, (1) | a streicht Hrsg. | figurae ex hac quadrati vel rectanguli constantis | ablatione facti ändert Hrsg. | quadratura pendere radicum summa (2) figurae  $L$       21 patet,  
(1) figuram (2) hanc  $L$

summam a quadratura figurae pendere cui syntomas quaeritur. Notabile autem est, quadratum constans, quod aufertur esse arbitrarium; et proinde aliquando tale sumi posse, ut figura inde proveniens sit alia atque alia, v. g. si sit  $a^2 - x^2 + bx \sqcap y^2$ , quae est ad circulum, ut ei quaeratur homogenea, fiet:  $\sqrt{a^2 - x^2 + bx - a\gamma}$ . cuius figurae quadratura habetur curva elementis circuli homogenea. Sed haec figura est modo circulus modo hyperbola. Imo erro: est semper circulus.

5

Interim in alio casu fieri potest ut alia ita fiat figura, v. g. sit:  $\sqrt{b^2 - 2ax + x^2}$ , quae est ad hyperbolam, eius ordinatis quaeratur homogenea, fiet  $\sqrt{b^2 - 2ax + x^2 - a\gamma}$ , pone  $b^2 - a\gamma \sqcap a^2$ , fiet  $\sqrt{a^2 - 2ax + x^2} \sqcap \pm a \pm x$ . ac proinde haberi potest homogenea hyperbolae.

10

Idem in infinitis aliis fieri poterit: tum radicum extractiones tum divisiones reddendo possibles,: v. g. sit curva cuius aequatio:  $\frac{b^2 - x^2}{a - x} \sqcap y^2$ . Ab  $y^2$ , auferatur  $\gamma a$ , fiet:

$$\frac{b^2 - x^2 - \gamma a^2 + \gamma ax}{a - x}.$$

Iamque ita licebit explicare arbitrarias, ut procedat divisio.

10

Haec valde notabilia sunt, et plane nova.

Duae figurae syntomi eiusdem curvae sunt syntomi inter se; duae curvae syntomi eiusdem figurae, sed diverso modo sumtae non sunt quidem syntomi inter se, attamen sunt symmetri, seu data dimensione unius datur et dimensio alterius.

15


Hinc multa nova ac plaecula de symmetriis duci possunt. Data qualibet figura potest describi semigeometrica curva ei homogenea. Quem in finem notandum est trochoeidem cuiuslibet figurae esse homogeneam quadratrici eius figurae, quae sit curvae eius homogenea. Exempli causa: trochoeides parabolae est homogenea quadratrici hyperbolae ac proinde descripta trochoide parabolae habebitur constructio logarithmorum geometrica et sectio rationis in data ratione. Ut autem haec trochoeides describatur necesse est laminam parabolicam sive zonam ex cono scilicet sectam arcte immissam inter duos asseres coniugatos, ut non nisi vi ibi moveri possit, ac ne recta quidem propelli, neque attolli,

20

25

5 habetur (1) figura circulo homogenea. Atqui huius figurae quadratura (2) curva  $L$  5 Sed (1) haec (2) huius figurae quadratura est (3) haec  $L$  9–11 homogenea (1) cir (2) hyperbolae. (a) Hinc manifest (b) Ponamus (c) Er (d) Idem  $L$  13 ita (1) assumere (2) licebit  $L$  14f. nova. (1) Esto nostra ad circulum: (a)  $\frac{x^2}{a^2 + y}$  (b)  $\frac{y^2}{b^2 + y^2}$ , eius quadratum  $\frac{y^4}{b^4 + 2b^2y^2 + y^4}$ . (2) Duae  $L$  17 dimensione (1) circuli (2) unius  $L$  19 ei (1) syntomas (2) homogenea  $L$  20f. eius (1) symmetros (2) homogenea  $L$

sed concava in parte innitendo, provvolvi. Quem in finem utile erit maximi ponderis esse zonam vel suapte natura vel adiectione. Intus erit globus, et ipse gravis quantum satis est. Intus inquam, id est in concavo zonae.



[Fig. 3]

- 5 Zona parabolica est  $ABC$ , duo asseres sibi pene iuncti relicto pro zona nonnihil commissa, intrante interstitio, erunt  $DBE$ , inclinentur asseres ad horizontem; et globus  $F$  provolutus inclinabit zonam parabolicam quae interim stylo in ipsa defixo describet in pariete trochoidem. Sumenda est parabola plurimum differens a recta, et in primis portio eius maxime curva. Idem est si asseres sunt horizonti paralleli, et trochoides tum  
10 ista coarctatione tum pondere maximo imposito, non nisi mechanica ope vectis moveri possit, sed tunc aliud malum. Quod scilicet saepe circa punctum fixum rotabitur, nec progredietur. Eadem curva NB. describetur etiam si zona ponatur immobilis, sed  $DE$  circa ipsam moveantur nunc cum pariete ipsis asseribus  $DE$  affixo, sed tunc idem malum quod aliquando regredietur, et tunc non asseres sed ipsius zonae convexum habebit inci-  
15 suram in qua vectis  $DE$  moveatur. Sed et iam video obiectionem ne ipsius curvae portio aliqua per idem punctum plani decurrat; non videri forte, ne quidem si zona moveatur, cum nullum sit centrum circa quod. Posteriore modo non potest fieri ut idem punctum vectis seu plani respondeat diversis curvae. Priore modo hoc quidem evenire potest. Sed non calcemus imo forte utrumque. Sed iam remedium tale satis elegans. Electo posteriore  
20 modo, hoc redditio: vectis  $B$  tendens suo pondere a  $C$ , versus  $E$ , nihilominus, manu in  $E$  premente  $D$  versus  $C$ , recolligat in se et in lineam rectam chordam ipsi  $BC$  curvae

14 aliquando (1) pro (2) regredietur  $L$     16 decurrat; (1) cessare (2) non  $L$     21 premente (1)  
sursum quodammodo agatur (2) per ipsa (3)  $D$  versus  $L$

circumplicatam. Interea ipse pondere suo perpetuo filum tendet nec regressus ei possibilis ob filum tenens, nec progressus ob pondus renitens.

Eadem methodo et cycloides optime describetur, paries vero vel tabula in qua designanda est curva ipsi *BE* affixa cum eo movebitur, stylus vero erit immobilis. Ausim dicere hanc descriptionem non fore multo difficiliorem quam parabolae secundi generis descriptionem a Cartesio propositam ad construenda problemata sursolida. Filum ipsi *B* infixum. Incisura in vecte, instar fossae, nisu arctioris. Duae acies eius duae acies fossae vel latitudinem incisurae ipsius zonae implebunt vel si mavis duas in ea incisuras parvas parallelas.

Vid. plag. X.

5

10

---

6 Cartesio: *Geometria*, 1659, DGS I S. 67 f. (vgl. DO VI S. 442–444).

38<sub>12</sub>. DE SERIERUM SUMMIS ET DE QUADRATURIS PARS DECIMA

**Überlieferung:** *L* Konzept: LH 35 V 4 Bl. 22–23. 1 Bog. 2°. 4 S. Überschrift erg. Fig. 1 u.  
2 stark überarbeitet.  
Cc 2, Nr. 775 A tlw.

5 Schediasmatis de summis serierum et quadraturis figurarum pars X.

Ope huius curvae inveniri poterunt, quotcunque mediae proportionales: Imo quod est longe maius, et quod alioquin geometrice fieri non potest: Si id omne geometricum est, quod exactum est, fatendum est has constructiones fore exactas: nam linea ista tam exacte describi poterit, quam parabola secundi generis a Cartesio proposita. In 10 quo longe differt a spiralibus quas exacte non describas, ob duos motus, a se invicem independentes, alterum in circulo, alterum in radio, quorum certa debet proportio, quam dare non est in nostra potestate, adeo ut spirales illae non nisi divina arte describi possint, ope intelligentiae, cuius cogitationes distinctae fiant in tempore minore quolibet dato; quod nec de angelis verum puto.

15 Quod secus est in linea nostra: Eadem linea continuo describitur motu; non per puncta invenitur.

P. Pardies, ingeniosissimus utique vir, tractatum de linea logarithmica moliebatur, descripta per medias proportionales ad rectam aequalibus intervallis applicatis; sed praeterquam quod non nisi per puncta, ac proinde non tota exacte linea describatur; inter 20 mediis punctis vacuis futuris, praeter hoc inquam quis non videt has mediarium proportionalium inventiones, aliunde esse sumendas; idque vel qualitercunque, quod non est

10 differt (1) ab helicibus (2) a spiralibus *L*      20 videt (1) quantae (2) has *L*

---

6 Ope huius curvae: Diese Worte befinden sich auf dem vorhergehenden Bogen, Bl. 21 v°. Leibniz hat zunächst fortlaufend geschrieben und den Bogen Bl. 22–23 erst nachträglich mit einer eigenen Überschrift versehen. 9 Cartesio: *Geometria*, 1659, DGS I S. 36–38 (vgl. DO VI S. 407–411); Leibniz setzt sich mit den daran anschließenden Bemerkungen von Descartes über die in der Geometrie zulässigen Kurven auseinander; sein Handexemplar weist auf S. 39 eine Unterstreichung auf. 17 Pardies: Die Abhandlung über die logarithmische Kurve wurde wohl nicht vollendet; vgl. LSB III,1 N. 9 S. 43 Erl. zu Z. 1–6; Pardies hat die logarithmische Kurve auch in den *Éléments de géométrie*, 1671 u. ö., livre VIII, articles 16–31 S. 86–93 behandelt.

geometrice sive exacte agere; vel per totidem operationes quot puncta in curva designare vult; et ille tamen ab ea linea plurimum usus publico pollicebatur.

Ecce ergo lineam geometricam quae id omne praestat quod a logarithmica exacte si possibile esset, descripta posset expectari.

Fateor si ferenda est definitio geometricarum quam dedit nobis Cartesius, nostra talis non erit: sed quemadmodum ille veteres iure culpat, quod a geometricarum numero conicas, aut certe quos vocabant lineares locos, exclusissent; ita; ille rursus culpandus est, quod geometricarum nomine ad analyticas coarctato; scientiam auxilio necessario privat; causam credo habens unicam in arcanis, ut scilicet iactare posset, omnium curvarum geometricarum a se methodum tangentesque traditas. Sane quo ille argumento utitur in veteres, eo ego in illum: quicquid exactum, id inquit geometricum est. Recte. Velim ergo ostendat, in quo descriptio evolutae circularis, vel trochoeidum nostrarum exacta non sit. Sane tam exacte descriptas esse certum est quam ullam geometricam aequa compositam. Culpat veteres, quod agnita helicum et spiralium imperfectione conchoeides quoque et cissoeides cum ipsis confusas exclusissent. Ita ego illum, quod cum helicibus et spiralibus, trochoeides et evolutas confudit. Obicit lineis quas non geometricas vocat, quod a duobus diversis motibus dependeant, quorum proportionem exacte servare non liceat. Recte illud quidem in helices vel spirales: at non recte dicitur in trochoeides nostra methodo descriptas et evolutas. Obicies; ergo habetur circuli quadratura. Nego haberi qualis quaeritur. At inquires ope trochoeidis circularis vel evolutae exacte habetur recta circumferentiae aequalis. Quis neget. Si recte descriptae, habetur ergo et geometricae. Ita certe: nam si exacte, certe geometricae. Ergo habetur et quadratum circulo aequale. Fateor. Ergo quadratura circuli. Fateor, sed non qualis quaeritur; quaeritur enim non geometrica tantum, sed et analytica: id est quaeritur ratio circuli ad quadratum inscriptum, quaeritur ratio diametri ad circumferentiam.

5

10

15

20

25

1 totidem (1) instrumenta separata, quot sunt (2) num (3) operationes  $L$     7 certe (1) sursolidas (2) quas  $L$     8 f. privat; (1) ideo (2) ex uno credo causam haben (3) causam  $L$     14 quod (1) cognita (2) agnita  $L$     20 ope (1) cycloeidis vel tro (2) trochoeidis circularis | vel evolutae *erg.* | exacte  $L$   
21 si ... descriptae *erg.*  $L$

5–16 definitio: *Geometria*, 1659, DGS I S. 20 f. (vgl. DO VI S. 392 f.); culpat: *a. a. O.* S. 17–19 (vgl. DO VI S. 388–390) u. *Lettres*, Bd. 3, 1667, S. 354 (DO II S. 313); Obicit: *Geometria*, 1659, DGS I S. 18 f. (vgl. DO VI S. 390).

Eodem argumento, quo ille utitur in nos, veterum sectatores, et Vieta utebantur in sententiam Cartesii, usi ut Cartesiani quadratura circuli; ita illi duplicatione cubi. Nam Vieta; si lineae conicae in geometriam recipienda sunt; habemus ergo iam duplicationem cubi, geometricam. Ita est; et duas medias proportionales exacte, fateor; ergo et hoc 5 geometrice; ita sane oportet ex datis. Quid ergo cur quaequivere geometrae quod habebant. Facilis responsio est; quemadmodum magnitudinem circuli non tantum geometrica, sed et analytica; ita duplicationem cubi non tantum analytice, sed et plane per lineas scilicet simplicissimas rectam et circulum desiderabant. Recte ergo Cartesius lineas alias non negligendas monet ob praeclaras opticas, staticas, aliasque proprietates. Ita ego eas quae 10 analyticae non sunt, non minus geometricas esse contendo, non tantum quod exactae sint, sed et quod praeclaros habeant usus; ut cycloides primaria inventos ab Hugenio, secundaria observatos a Romero; trochoides parabolica sive curva mesolaba, detectos a me.

Ita ergo distinguendum censeo; lineae omnes aut geometricae sunt aut mechanicae. Geometricae sunt, quae uno tractu descriptae intelliguntur, mechanicae quae per puncta. Unde patet lineas geometricas posse describi per puncta ut ellipsis, et contra lineas mechanicas posse describi geometrica a natura rerum; aut intelligentia directrice. Nam omnes lineae quae modo certa regula constent; omnia eorum puncta concernente, geometricae sunt, natura sui, aut ratione rerum autoris; potest etiam fieri, ut quae lineae 20 nobis geometricae non sunt, ut logarithmica fiant aliquando, reperta eas describendi ratione; quemadmodum et evenire potest, ut lineae non analyticae fiant analyticae, quem-

5 cur | veteres *gestr.* | quaequivere  $L$     9 praeclaras (1) in (a) conicis (b) opticis, in mechanicis, ut (2) opticas, | mechanicas, *gestr.* | staticas, (a) geom (b) aliasque  $L$     11 primaria erg.  $L$     16 puncta. (1) Uno tractu descriptae sunt aut (a) arte (b) in nostra potestate, aut tantum in contemplatione (2) Unde  $L$     16 lineas | sua natura *gestr.* | geometricas  $L$     17 lineas | sua natura *gestr.* | mechanicas  $L$  17 aut (1) angelo (2) intelligentia  $L$     20f. ratione; (1) inventa (2) quemadmodum trochoides (a) parabolica cubica (b) parabolicae cubicae; (3) quemadmodum  $L$

1 Vieta: *Supplementum geometriae*, 1593 (VO S. 240–257). — Fr. v. Schooten erwähnt die Ansichten von Viète in den *Commentarii in R. Descartes Geometriam*, DGS I, S. 169. 8 Cartesius: *Geometria*, 1659, DGS I S. 38 f. [Marg.] u. 50 (vgl. DO VI S. 412 u. 424). 11 f. Hugenio: *Horologium oscillatorium*, 1673; Romero: Leibniz wußte um O. Rømers Forschungen u. a. zu epizykloidisch geformten Rädern; vgl. LSB III,1 S. LXVII.

admodum; trochoeides parabolae quadrato-cubicae cuius dimensionem invenit Heuratius, analytica non erat ante quam ille curvae illius dedisset dimensionem.

Lineae ergo omnes a nobis descriptae geometricae aut mechanicae sunt. Geometricae aut analyticae aut tetragonisticae; analyticae sunt, quae sub calculum cadunt, ita ut relatio ordinatarum ad abscissas aequatione exprimi possit. Tetragonisticae, quae ad calculum tum demum revocari poterunt, cum dimensiones aut quadraturae quorundam curvilineorum invenientur. Analyticae sunt simplex (recta), quadraticae<sup>[,]</sup> cubicae, si aequationes ipsarum aestimes; in quibus scilicet duae incognitae quantitates eadem aut diversae, altera in alteram ducuntur; cubicae etc. Tetragonisticae cuius gradus sint incertum est; (si impossibilis esset quadratura, essent nullius), tales sunt: trochoeides; evolutae; tetragonisticae aut sunt aut non sunt in nostra potestate, sunt evolutae et trochoeides, quas describere possumus; non sunt spirales; mechanicae sunt quae per puncta descriptae intelliguntur; ubi ne quidem rationem continuam describendi intelligimus; ut in logarithmica.

Aliter dividi poterat, lineas esse aut geometricas, aut physicas et mechanicas; geometricae, quorum descriptio a nobis intelligi pariter et fieri potest; physicae, quas describi intelligimus; ut a natura aut mente; mechanicae, quarum descriptionem neque posse possumus neque habemus. Sufficit interea geometricas a me appellari, quas uno tractu describi intelligimus; mechanicas, quas per puncta; analyticas esse eas geometricas, quae sub calculum cadunt. Unde intelligi potest non esse notam lineam [mechanicam] sub calculum cadere, nam logarithmicae quodlibet punctum analytice determinari potest; et tamen geometrica non est; cum nunquam revera, nec nisi ad sensum describi possit.

De trochoeidibus notandum est quandocunque curva alicuius figurae dimensioni analyticae subiecta est et trochoeidem eius fieri analyticam. Et tamen fatebitur mihi aliquis

1 parabolae (1) cubicae (2) quadrato-cubicae  $L$  8 scilicet (1) rectangulum ne (2) duae  $L$   
 10f. sunt: (1) cycloides, (2) trochoeides; evolutae; (a) mechanicae rursus duorum sunt generum, (b)  
 tetragonisticae  $L$  13 ne (1) comminisci quidem rationem continuam describendi possumus, ut in  
 logarithmica (2) quidem  $L$  15 f. geometricae, (1) quae a nobis intelliguntur et describuntur; physicae  
 quae intelliguntur non describuntur (2) quarum  $L$  17 posse erg.  $L$  19 esse (1) eam speciem  
 geometricarum (2) speciem earum geometricarum (3) eas  $L$  20 non geometricam  $L$  ändert Hrsg.  
 21 punctum (1) geometrica (2) analytice  $L$

1 parabolae: Leibniz meint die in H. van HEURAET, *Epistola de transmutatione curvarum linearum in rectas*, 1659, DGS I S. 517–520, als erstes Beispiel für die Rektifikationsmethode angeführte, heute als semikubisch bezeichnete Parabel  $ay^2 = x^3$ . 24 aliquis: z. B. Leibniz selbst; s. N. 39 S. 557 Z. 16–20.

descriptionem per constructionem tetragonisticam in illis casibus plerumque praelatum iri etiam analyticis etsi haberentur certe, etiamsi haberemus quadraturam circuli et omnium eius partium et sectionem angularum universalem, quo facto cycloidis descriptionem analyticam haberemus; mallemus tamen profecto volatione ista tam facili quam aliis 5 regularum forte compositioribus describere.

Nota trochoeides parabolica dat sectionem rationis, et cycloides linea dat sectionem anguli in data ratione; quae sunt illa duo magna geometriae desiderata.

Notabile est, cycloidis ordinatarum differentias geometrice describi posse, est enim figura angularum, quam voco. Si Cartesiani obiciunt fila vel chordas non per minima 10 flecti, certe nec ellipsis descriptio ope filii geometrica erit. Et vero nulla plane regula perfecte recta haberi potest; nec tamen ideo regulam et lineam rectam repudiamus.


Data curva invenire aliam cuius sit trochoeides est invenire curvam differentiis figurae propositae homogeneam, imo paulo amplius quam homogeneam nimirum aequalem. Itaque quandocunque curva dimensionis capax est, eius trochoeidem habemus. Itaque 15 generaliter data curva non habemus statim eius trochoeidem. Etsi data evolutionali habemus evolutam. Ita habemus figuram cuius trochoeides sit parabola, ea est scilicet quadratrix parabolae cubicae Heuratianae.

Videndum an paraboloides aut hyperboloides eae, in quibus exponentes non sunt numeri rationales intelligi possint geometricae, v.g.  $y^{\sqrt{2}}$   $\sqcap x$ . Non certe nisi ope trochoeidi 20 meae.

Hyperbola est figura rationum; et  $\frac{a}{\sqrt{2ax - x^2}}$  figura angularum; et  $\frac{ax}{\sqrt{2ax - x^2}}$  figura segmentorum.

22 Nach segmentorum, ohne Bezug zum weiteren Text:

Cycloides est



1 constructionem (1) analyticam (2) tetragonisticam  $L$       11f. repudiamus. (1) Recte ipse Cartesius; (2) Data  $L$

10 ellipsis descriptio ope filii: R. DESCARTES, *Dioptrique*, 1637, S. 90 bzw. *Dioptrice*, 1644, S. 150 (vgl. DO VI S. 166 bzw. S. 623).      17 parabolae cubicae Heuratianae: s. o. Erl. zu S. 487 Z. 1.




fig. 1.

Esto parabola tangens planum vertice  $A$ , eius axis  $ADFG$ . Sumto in axe puncto  $F$ . (forte utile erit  $AF$ . aequari lateri recto) describatur trochoeides; ex cuius puncto  $C$ .

---

1 fig. 1.: Leibniz verwendet in der Vorlage den Buchstaben  $G$  zur Bezeichnung von zwei verschiedenen Punkten. Zur besseren Unterscheidung wird der zweite in der Figur und im Text mit  $G'$  benannt.

ordinata in axem immobilem consideratum, parabolae in prima statione existentis  $AF$ , demittatur; iungatur et  $[BC.]$  punctum quo parabola nunc tangit planum, iuncta  $BC$ .

erit perpendicularis ad curvam.  $\frac{G'W}{WL} \sqcap \frac{a}{\sqrt{a^2 + x^2}} \sqcap \frac{GD}{DC} \sqcap \frac{DC}{DH} \sqcap \frac{ED \sqcap CQ}{AD}$ . Sumta ergo  $FA \sqcap b$ , et  $FD \sqcap x$ . erit  $AD \sqcap b - x$ . et fiet  $ED \sqcap \frac{ba - ax}{\sqrt{a^2 + x^2}}$ .  $EC$ . autem aequalem 5 curvae parabolae  $BM$ , appellare poterimus  $\psi$  fiet  $CD \sqcap \frac{ba - ax}{\sqrt{a^2 + x^2}} + \psi$ . Sed inesse video errorem, [ratio  $G'W.$ ] ad  $WL$ . non habetur. Omnia paulo consideratius agenda.




fig. 2.




fig. 3.

$AC \sqcap y$ .  $CD \sqcap x$ .  $A$ . centrum hyperbolae  $BD$ , cuius vertex  $B$ . erit  $y \sqcap \sqrt{a^2 + x^2}$ . Esto alia curva  $EL$ , cuius axis  $EF$ . cuius tangens  $GL$ . infinite parva, recta autem  $GL$ . 10 ducta in constantem quandam  $a$ , aequetur ipsi  $[AC.]$  ductae in  $GW$ . Patet rectangulum sub curva  $EL$ , et recta  $a$ . comprehensum aequari spatio  $BCD$ .  $GW$ , infinite parvam

2 BD.  $L$  ändert Hrsg.      3  $\frac{G'W}{WL} \sqcap (1) \frac{a}{a^2 + y^2} (2) \frac{a}{\sqrt{a^2 + x^2}} L$       6 rationem G.  $L$  ändert  
Hrsg.      8f.  $y \sqcap \sqrt{a^2 + x^2}$ . (1)  $GW \sqcap \frac{a^2}{a^2}$  (2) Esto  $L$       10 CD.  $L$  ändert Hrsg.      11  $GW$ , (1) licet  
(2) infinite  $L$


---

3  $\frac{G'W}{WL} \sqcap \frac{a}{\sqrt{a^2 + x^2}}$ : Die Gleichsetzung ist nicht zulässig. Leibniz erkennt den Fehler und setzt neu an.


appellemus 1. Ponamus  $GL \cap a \sqcap \sqrt{a^2 + x^2}$ . ergo  $GL \sqcap \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a}$ . ergo  $GL^2 \sqcap \frac{a^2 + x^2}{a^2}$ ,

unde si auferatur  $GW^2 \sqcap 1$ . restabit  $\frac{x^2}{a^2}$ , et erit  $WL \sqcap \frac{x}{a}$ . Summa autem omnium  $WL$ . aequatur  $FL$ . at summa omnium  $\frac{x}{a} \sqcap \frac{[x^2]}{2a}$ . Ergo  $FL \sqcap \frac{[x^2]}{2a}$ . Ergo  $EL$ . curva est parabolica, cuius latus rectum  $2a$ . aequatur lateri recto hyperbolae transversum et rectum aequalia habentis.

5



[Fig. 4]



[Fig. 5]

Porro quoniam iam quaestio est, an punctum quod trochoeidem parabolicam describere debet in curva an in axe sumendum sit, video naturalissimum videri, ut sumatur in axe, neque enim video cur in curva aliud pro alio sumatur; praeterea, non inciperet ita trochoides ab ipso axe, si punctum sumeretur in curva; itaque naturalissimum arbitror in ipso axe sumere parabolae focum. Ita enim mirabilis naturae orietur linea continuabilis in infinitum, sed involuta, et serpentina, ubi scilicet punctum parabolae foco oppositum praeterierit. Antea perpendicularis ad curvam ex punto parabolae semper ducetur versus sinistrum, quando punctum foco oppositum in parabola, planum attigerit, tunc neque dextra erit neque sinistra sed perpendicularis; postea tendet in [dextrum]; unde habebit ibi flexum contrarium curva, si non involuta est.

10

In producto axe parabolae, fig. 3. sumatur  $EP \sqcap$  quartae parti lateris eius recti  $\sqcap EF$ . erit  $FP \sqcap a$ . Et sumto in curva parabolae puncto quolibet  $Q$ . fiet  $QR \sqcap QF \sqcap \frac{1}{2}a+y$

15

3  $y^2 L$  ändert Hrsg. zweimal    4 aequatur (1) lateri tr (2) diametro (3) lateri  $L$     7 iam (1)  
AN (a)  $\sqcap$  (b) in fig. 1  $\sqcap \sqrt{(2)}$  quaestio  $L$     13 Antea (1) curvae punctum semper erit a latere (2)  
perpendicularis ad curvam | ex punto parabolae erg. | semper  $L$     15 sinistrum  $L$  ändert Hrsg.  
18 et (1) sumta in curva parabolae recta (2) sumto  $L$

11 focum: Die folgenden Aussagen über die Gestalt der Kurve, die sich an fig. 1 orientieren, gelten nicht für die Trochoide des Brennpunktes, die eine nach oben offene Kettenlinie darstellt.

quae in fig. 1.  $\sqcap AE \sqcap BC$  posita  $AD \sqcap y$ . in dicta fig. 1. eritque  $AE^2 \sqcap \frac{a^2}{4} + ay + y^2$ ,

unde si auferatur  $AD^2 \sqcap y^2$ , restabit:  $\sqrt{\frac{a^2}{4} + ay}$  quae est applicata parabolae dimidii lateris transversi, nam pro  $\frac{a}{4} + y$ . posito  $z$ . fiet  $\sqrt{az}$ . cui si addatur curva parabolica  $\sqcap \psi \sqcap EC$ , fiet  $DC$  ordinata  $\sqcap \sqrt{az} + \psi$ .

Quemadmodum series inaequabiles non ideo negamus esse arithmeticas, quia calculo explicari possunt, etsi non aequatione; ita figurae quoque inaequabiles, quales sunt cycloides et mesolaba, cum descriptione accurata exhiberi possint, non est negandum geometricas esse, etsi sub aequationem non cadant.

Veteres constructionem aliam esse geometricam dicebant, aliam organicam; hanc 10 Cartesius recte expposit cum constet regulam et circulum organa quoque esse, etsi minus composita. Quicquid ergo organicum est, id geometricum est, modo supposita organi exactitudine, etiam lineam quandam veram seu geometricam, apparenti oppositam sequi necesse sit.

Si lineas eas appellamus geometricas, quarum ordinatae ad abscissas relationem habent calculo explicabilem; utique et logarithmica Renaldini ex eius et Gregorii et P. Pardies sententia erit geometrica, et curva quadratrix Wallisii: Sin ait Cartesius eas ideo non sufficere, ut calculo explicentur, sed ut aequatione, quod fieri non potest: Afferat distinctionis causam. Nam et series arithmeticae ut dixi non semper aequatione explicari possunt, v. g. progressio geometrica. Sin rationem affert; quod hae lineae quae sub 20 calculum cadunt describi tamen nisi aequationis sint capaces nequeant: videt ergo non

2 applicata (1) eiusdem parabolae, ad aliam licet diametrum (2) parabolae  $L$  5 Quemadmodum (1) figurae (2) series  $L$  5 esse (1) geometricas (2) arithmeticas, (a) ita (b) quia  $L$  13f. sit. (1) Si C (2) Si (a) cum Cartesio (b) lineas  $L$  20 capaces (1) ope calculi, (2) nequeant  $L$

---


10 Cartesius: *Geometria*, 1659, DGS I S. 17–19 (vgl. DO VI S. 388–390). 15f. logarithmica Renaldini: J. Gregory erwähnt in seiner Verteidigung der Logarithmuskurve, *Geometriae pars universalis*, 1668, Prooemium, die Mediceischen Kurven von Renaldini, bei denen es sich jedoch um spezielle Kurven zur Gleichungslösung handelt; Leibniz bezieht sich vermutlich auf die mißverständliche Darstellung des Sachverhalts durch die Rezension von Gregorys Werk in den *Philosophical Transactions* III Nr. 35 vom 18./28. Mai 1668 S. 685–688, insbesondere S. 685f. — P. Pardies: *Éléments de géométrie*, 1671, préface. — curva quadratrix Wallisii: *Arithmetica infinitorum*, 1656, Scholium nach prop. 194 S. 196 (WO I S. 477).

calculum, sed describendi potestatem lineas reddere geometricas; et quasdam analyticas describi non posse, ac proinde non esse geometricas, vicissim quasdam geometricas calculari non posse atque adeo non esse analyticas.

$2ax \sqcap y^2$ .  $\cancel{2}al \sqcap \cancel{2}y^2$ . Ergo  $l \sqcap x$ . Iam  $\frac{l}{y} \sqcap \frac{\beta}{w}$ . Ergo  $w \sqcap \frac{y\beta}{x} \sqcap \frac{\beta\sqrt{2ax}}{x}$ . eius quadrato addatur 1. fiet:  $\frac{\sqrt{2ax+x^2}}{x}$ . quae curva proinde pendet ex quad. hyp. Unde  $2ax+x^2 \sqcap \frac{x^2y^2}{a}$  sive:  $\frac{2a^3}{y^2-a^2}$ . Porro et  $2ax \sqcap 2yl$ . et  $\frac{ax}{y} \sqcap l$ . et pro  $x$ . ponendo  $\frac{y^2}{2a}$ . fiet:  $\frac{ay^2}{2ay} \sqcap \frac{y}{2}$ . Iam  $\frac{l}{x} \sqcap \frac{\beta}{w}$ . erit  $w \sqcap \frac{2x\beta}{y} \sqcap \frac{2y^2}{2ay} \sqcap \frac{y}{a}$ . et cuius quadrato addendo 1. fiet  $\frac{y^2+a^2}{a^2}$ . cuius radix  $\frac{\sqrt{y^2+a^2}}{a}$ . homogenea ordinatae hyperbolae et exprimens curvam parabolae. Interea valde notabile est, quod ita detexi eandem curvam diversis figuris homogeneam esse posse.

5

10




[Fig. 6]

Hyperbola:  $a^2 \sqcap xy$ . Unde  $-xy \sqcap xl$ . Iam  $\frac{x}{l} \sqcap \frac{w}{\beta}$ . Ergo  $\frac{x\beta}{-y}$  seu  $\frac{a^2\beta}{-y^2} \sqcap w$ . cuius quadratum  $\frac{a^4\beta^2}{y^4}$ . Addatur  $\beta^2$ . fiet:  $\sqrt{\frac{a^4\beta^2+\beta^2y^4}{y^4}}$ . seu  $\frac{\beta}{y^2}\sqrt{a^4+y^4}$ . homogenea curvae hyperbolicae  $\pm a^2 + x^2 \sqcap y^2$ . Unde  $\cancel{2}xl \sqcap \cancel{2}y^2$ . Unde  $l \sqcap \frac{y^2}{x} \sqcap \frac{\pm a^2+x^2}{x}$ . Iam


1 describendi (1) possibilitat (2) potestatem  $L - 7 \sqcap \frac{y}{a}$ . (1) Unde auferendo  $a^2$  (2) et  $L$

$w \sqcap \frac{y\beta}{l} \sqcap \frac{y\beta}{\frac{y^2}{x}} \sqcap \frac{x\beta}{y} \sqcap \frac{x\beta}{\sqrt{\pm a^2 + x^2}}$ . Ad  $\frac{x^2}{\pm a^2 + x^2}$  addatur 1. fiet:  $\frac{x^2 \mp a^2 + x^2}{\pm a^2 + x^2}$ , et

$\sqrt{\frac{2x^2 \mp a^2}{\pm a^2 + x^2}} \sqcap \sqrt{1 \frac{[+x^2]}{\pm a^2 + x^2}}$ . homogenea curvae hyperbolicae. Ope huius inventi semper plurium curvarum quadratura ad alteram reduci possunt.



[Fig. 7]



[Fig. 8]

5 Ellipsis  $a^2 - \frac{a}{b}y^2 \sqcap x^2$ . Unde  $-\frac{2a}{b}yl \sqcap 2x^2$ . sive  $l \sqcap -\frac{bx^2}{ay} \sqcap \frac{-ba^2 + ay^2}{ay}$ . Iam  $w \sqcap \frac{y\beta}{l}$ .

Ergo  $w \sqcap \frac{y^2\beta a}{-ba^2 + ay^2}$ , sive cum est explicanda prius  $y$ . addatur 1. ad eius quad. fiet:

$$\sqrt{\frac{2y^4a^2 + b^2a^4 - 2ba^3y^2(+a^2y^4)}{b^2a^4 - 2ba^3y^2b + a^2y^4}} \sqcap \frac{\sqrt{2y^4a^2 + b^2a^4 - 2ba^3y^2}}{\pm ba^2 \pm ay^2}, \text{ sive } \frac{\sqrt{2y^4 + b^2a^2 - 2bay^2}}{y + \sqrt{ba}} \wedge \frac{\sqrt{2y^4 + b^2a^2 - 2bay^2}}{y - \sqrt{ba}}.$$

Hinc puto inveniri posse tandem dimensionem curvae ellipticae. Additis iis quae de momento curvae ellipticae dicta sunt.

10 Curvae hyperbolicae valor pariter ex ellipticae quaeratur et explicata recta  $x$ . item sumta hac aequatione:  $2av \mp \frac{a}{b}v^2 \sqcap z^2$ . Quia curva hyperbolica est  $\sqrt{\frac{2x^2 \mp a^2}{\pm a^2 + x^2}}$ . ducatur in  $\sqrt{\pm a^2 + x^2}$ , eius momentum ex axe erit:  $\sqrt{2x^2 \mp a^2}$ . quod pendet ex quad. hyp. Iam

2  $\pm a^2 L$  ändert Hrsg. 6 cum ... prius y. erg. L 9 f. sunt. (1) Momentum curvae hyperbolicae quaeratur (2) Curvae L

eadem curva et sic exprimitur:  $\frac{\sqrt{a^4 + y^4}}{y^2}$ . Eius momentum ex asymptoto est:  $\frac{\sqrt{a^4 + y^4}}{y}$ .

Cuius momentum ex  $y$ . est  $\sqrt{a^4 + y^4}$ . Momentum ex axe est  $\frac{a^4}{y^2} + y^2$ . Quod habetur

pure. Iam  $\frac{a^4 + y^4}{y^2} \sqcap x^2$ . Unde  $y^4 - x^2y^2 + x^4 \sqcap x^4 - a^4$ . Unde  $y^2 \sqcap \pm\sqrt{x^4 - a^4} + x^2$ . Quod

momentum pendet ex quad. hyp. quia  $\sqrt{x^4 + a^4}$  pendet ex quad. hyp. ut ostendi <sup>5</sup> plaga

9. pag. 2. huius schediasmatis. Iam puto has duas figuras  $\sqrt{x^4 - a^4}$ , et  $\sqrt{x^4 + a^4}$  non differre, sed esse eandem, ut  $\sqrt{x^2 + a^2}$ , et  $\sqrt{x^2 - a^2}$  non differunt. Cum ergo hoc modo

tria habeamus momenta, figurae huius quae curvae hyperbolicae homogenea est, sequitur

credo haberi ipsam figuram, et proinde et curvam, ex quad. hyp. Ipsae autem figurae

ordinata  $y$ . erit  $\sqcap \pm\sqrt{x^4 - a^4} + x^2$ . In spem ex his venio dandae dimensionis curvae

ellipticae et hyperbolicae. Memini Iac. Gregorium asserere, se dare centrum gravitatis

curvae parabolae ex quad. circuli et hyperbolae; idem dicit Wallisius. Ego vero id dare

possum ex sola quad. hyp. Hinc si non erramus aliquis dabit quad. circ. ex data quad.

<sup>10</sup> hyp. In eadem pene spem ex curvae ellipticae dimensione et momento erigor.

6 differunt. (1) Et  $y \sqcap$  (2) Porro  $y \sqcap \sqrt{\pm\sqrt{x^4 - a^4} + x^2}$  quae (3) Cum  $L = 7$  habeamus (1) curvae  
(2) momenta  $L = 9 \sqrt{\pm\sqrt{x^4 - a^4} + x^2}$ . (1) Iam quaeramus eius differentiam a  $\sqrt{+ \sqrt{x^4 - a^4} - x^2}$  (2)  
In  $L$

---

3  $y^4 - x^2y^2 + x^4$ : Leibniz erweitert bei der quadratischen Ergänzung mit  $x^4$  statt mit  $\frac{x^4}{4}$ . Der

Fehler wirkt sich auf die folgenden Gleichungen aus, jedoch nicht auf die grundsätzliche Überlegung.

4 ostendi: s. o. N. 38<sub>11</sub> S. 478 Z. 6 f. 10 Iac. Gregorium: *Vera circuli et hyperbolae quadratura*, 1668, Postscriptum S. 60. 11 Wallisius: Die für die Berechnung des Kurvenschwerpunkts erforderlichen Werte der Bogenlänge der Parabel und der Oberfläche ihres Drehkörpers bestimmt Wallis erstmals in *Tractatus duo*, 1659, S. 97–99 (WO I S. 554–556). Leibniz bezieht sich vermutlich — wie in *De hyperbola* (Cc 2, Nr. 612) — auf *Mechanica*, 1670–71, pars 2 cap. 5 prop. 31 S. [544]–555 und das Scholium S. 747 bis 753 (WO I S. 916–930).

Curva  $\frac{a^2}{a^2 + y^2} \sqcap x^2$ . pendet ex quad. circuli. Est enim momentum anonymae lineae ex basi. Ergo et  $\frac{y^2}{a^2 + y^2} \sqcap x^2$ . Earum summa:  $\frac{a+y}{\sqrt{a^2 + y^2}} \sqcap z$ . et quadrando:

$$\frac{a^2 + y^2 + 2ay}{a^2 + y^2} [bricht ab]$$

2 Über Ergo et  $\frac{y^2}{a^2 + y^2}$ :  $\mathfrak{A}$

3 Am Rande, gestrichen:  $\sqrt{\frac{a^2\beta^2}{y^2} - \beta^2} \sqcap \frac{\sqrt{a^2\beta^2 - \beta^2y^2}}{y}$ . Quadratum ergo est


momentum hyperbolae ex diametro coniugata, et habebitur curva logarithmorum.  $a^2 - y^2 \sqcap x^2$ . Ergo  $y^2 \sqcap x^2 + a^2$  [!]. Quadrata ergo omnium invenienda sunt. Ea vero habentur; habetur ergo curva quae sit homogena elementis hyperbolae. Atque ita perfectam habebimus logarithmorum descriptionem.

8 ergo (1) momentum hyperbolae (2) curva L

38<sub>13</sub>. DE SERIERUM SUMMIS ET DE QUADRATURIS PARS UNDECIMA

**Überlieferung:** L Konzept: LH 35 V 4 Bl. 24–25. 1 Bog. 2°. 4 S. Überschrift ergänzt.  
Cc 2, Nr. 775 A tlw.

Plagula XI. schediasmatis de seriebus et summis.



[Fig. 1]

5

Veniant in mentem res tanti momenti, circa curvam constructricem generalem, sive trochoidem parabolicam, ut non possim non persequi.

7 parabolicam, | ut streicht Hrsg. | ut L

5 Fig. 1: Die flüchtig skizzierte Figur der Handschrift bildet die tatsächlichen Lage- und Größenverhältnisse nur stark verzerrt ab. Da Leibniz dies im Text kommentiert und punktuell korrigiert, wird die Figur möglichst vorlagengetreu wiedergegeben. — Zwei verschiedene Punkte, die Leibniz beide mit dem Buchstaben D bezeichnet, werden D u. D' benannt.

Descripta intelligatur trochoides nostra, [ABC]. Parabola genitrix in situ descriptionis, GDFH. tangens planum LM. in puncto F. eius vertex D. umbilicus curvam ABC. describens [B]. FB. perpendicularis ad curvam. D'L. ipsi aequalis et parallela quia D'B. aequalis et parallela ipsi LF. Et FN. aequalis utriusque ex proprietate parabolae, positio 5 BP. esse eius latus rectum dimidium.

Et quia LM. tangit parabolam, ideo erit DQ  $\sqcap$  DR. seu QR. dupla ipsius QD. Axis DB. producatur in S. dum QS. fiet aequa ipsi BP. et ex nota parabolae proprietate SF. erit ipsi perpendicularis in F, et proinde angulus SFM. rectus et anguli SFL. et SFM. aequales, quamquam figura id non ita ferat, sed provideri talia ab initio tumultuaria 10 descriptione non potuere. Ergo recta SF. parallela rectae AL. Iungatur BN. erit BN  $\sqcap$  FS. et triangula BPN. et SQF. aequalia et similia.

Ergo triangula SQF, (vel BPN.) et FQR. et BTR. erunt similia. Sunt autem BT. et SF. parallelae. Ex tot proprietatibus innumera poterunt duci theorematum memorabilia, sed et quadraturae (applicando ordinatas nunc ad axem parabolae, nunc ad axem tro- 15 choeidis,) et solidorum ac superficierum dimensiones. Sed quoniam nunc non nisi curvae aequationem quaerimus; illa in aliud tempus differemus.

Iam datur BR, posita enim DQ  $\sqcap$  x  $\sqcap$  DR, erit BR  $\sqcap$  x +  $\frac{a}{2}$ . ponendo latus rectum parabolae, 2a.

Hinc iam facile habetur FT  $\sqcap$  VD'. Nam habetur BF  $\sqcap$  QP  $\sqcap$  BR  $\sqcap$   $\frac{a}{2} + x$ .

### 11 Am Rande: Etiam FB. vel FN. vel QP. $\sqcap$ BR

1 nostra, | ACD ändert Hrsg. |. (1) Descripta sit et parabola, genitricis dimidium habens latus rectum, AD'E. (2) Parabola L 2 GDFH. (1) eius axis (2) tangens L 2f. umbilicus (1) B. describ (2) curvam ABC. describens |C ändert Hrsg. |. FB. perpendicularis L 6 QD. (1) Cumque rectae sint parallelae (2) Axis L 10 potuere. (1) Perpetuo (2) Ergo (a) anguli (b) triangula (3) Ergo L 10f. BN  $\sqcap$  FS. (1) et ei parallela (2) et L 15f. quoniam (1) satis (2) nunc (a) nisi (b) non nisi curvae (a) descriptionem quaerimus (b) aequationem quaerimus; (aa) ista (bb) missa (cc) ita (dd) illa L 17 datur (1) BT ad TR (2) BR, (a) quae est (b) posita L 18f. 2a. (1) Iam

$$\frac{BT}{BR \sqcap x + \frac{a}{2}} \sqcap \frac{FQ \sqcap \sqrt{2ax}}{QR \sqcap 2x}. Erit BT \sqcap \frac{x + \frac{a}{2} \sqrt{2ax}}{2x}. FT \sqcap TV(!). Nam habetur FB (2) Hinc L$$

19 FT  $\sqcap$  VD'. (1) Nam habetur VD'  $\sqcap$  (2) Nam L

16 differemus: vgl. *De trochoidibus et relationibus reductarum ad ordinatas* (Cc 2, Nr. 828), datiert 24. Dezember 1674.




fig. 2.

Iam sciendum est  $F$  potius cadere debere ibi ubi parenthesi ( $F$ ) inclusum, et erit triangulum,  $RBF$ , isosceles, et  $RT \sqcap TF$ . Verus situs est in fig. 2. Tunc enim  $BR \sqcap BF \sqcap FN \sqcap PQ \sqcap \frac{a}{2} + x$ . Ergo  $DT$  parallela  $QF$ . Porro ut  $RF$  ad  $[QR]$ , id est, ut  $\sqrt{4x^2 + 2ax}$  ad  $2x$ . ita  $BF \sqcap BR \sqcap [RN] \sqcap PQ \sqcap D'L$  ad  $RT \sqcap TF \sqcap D'V$  seu  $\frac{a}{2} + x$ . ad quartam.

Ergo  $\frac{\sqrt{4x^2 + 2ax}}{2x} \sqcap \frac{\frac{a}{2} + x}{D'V}$ , et  $D'V \sqcap \frac{ax + 2x^2}{\sqrt{4x^2 + 2ax}}$ . Unde  $\frac{a^2x^{\frac{1}{2}} + 4ax^{\frac{3}{2}} + 4x^{\frac{5}{2}}}{4x^{\frac{1}{2}} + 2ax} \sqcap D'V^2$ .

498,19+499,4  $\pi \frac{a}{2} + x$  (1), eius quadratum est  $x^2 + ax + \frac{a^2}{4}$ . Unde auferatur quadratum ipsius BT.

$$(a) \text{ fiet: } (b) \text{ nempe } \frac{x^2 + ax + \frac{a^2}{4}, \wedge 2ax}{24x^4} \text{ fiet: } \frac{2x^3 + 2ax^2 + \frac{a^2x}{2} - ax^2 - a^2x - \frac{a^3}{4}}{2x} \text{ sive}$$

$\frac{2x^3 + ax^2 + \frac{a^2 x}{4} - \frac{a^3}{4}}{2x}$  n quadrato ipsius FT. Sed suspicor calculi errorem, cum enim sit BF semper

<sup>2</sup> maior quam BT, | aut saltem aequalis erg. | hoc calculo posset fieri minor. (2) Nimirum (3) Iam L 2. NFB L ändert Hsga. 5. fig. 2. (1) Unde et ratio patet erroris (2) Tunc L 6. ut (1) BO n 2x ad

$$\sqrt{2ax} \sqcap QF \quad (2) \quad RF \text{ ad } |QF \text{ ändert Hrsg.}|, \text{id } L \quad 7 \quad BN \quad L \text{ ändert Hrsg.} \quad 8 \quad D'V \sqcap \frac{ax + 2x^2}{\sqrt{4x^2 + 2ax}}. \quad (1)$$

Quae (2) Unde  $\frac{ax + 2x^2}{4x^2 + 2ax} \sqcap y^2$ . (3) Unde  $ax^2 + 2x \sqcap 4xy^2 + 2ay^2$ , et  $x \sqcap 2ay^2$  (4) Unde  $L$


et quia dividi potest, per  $2x + a$ , fiet:  $x^2 + 2x \sqcap 2D'V^2$ , quae est aequatio ad hyperbolam. Unde patet  $RF$  esse velut diagonalem semiquadrati  $RBF$ . Iam si  $\frac{a^2}{4} + ax + x^2$ , auferatur:  $\frac{xa}{2} + x^2$ , restabit:  $\frac{a^2}{4} + \frac{ax}{2}$ , sive  $\frac{a^2 + 2ax}{4}$  et  $\frac{\sqrt{a^2 + 2ax}}{2} \sqcap LV \sqcap BT$ . Iam  $LV$ , vocando  $y$ . fiet  $4y^2 \sqcap a^2 + 2ax$ , et erit  $\frac{4y^2 - a^2}{2a} \sqcap x$ . quem valorem ipsius  $x$ . in serendo in  $D'V^2 \sqcap \frac{xa + 2x^2}{2}$ , fiet:  $D'V^2 \sqcap \frac{\frac{4y^2 - a^2}{2a} \sqcap \cancel{a} + \frac{16y^4 - 8a^2y^2 + a^4}{24a^2} \sqcap \cancel{a}}{2}$  sive  $[4a^2] D'V^2 \sqcap 4y^2a^2[-a^4] + 16y^4 - 8a^2y^2[+a^4]$ . et fiet:  $D'V \sqcap \frac{2y}{\cancel{2a}} \sqrt{[4]y^2 - a^2}$ .

Habemus ergo naturam curvae nostrae, quantum licet aequatione expressam, nam abscissa  $LV$ , posita  $y$ , erit ordinata  $[VB] \sqcap \frac{y\sqrt{[4]y^2 - a^2}}{a} \neq$  (puto +, sed examinandum in vero situ)  $D'B$ .  $D'B$  autem iam aequetur curvae parabolicae.  $DF$  explicari analytice non potest, nisi per seriem numerorum.

1 potest, | fiet streicht Hrsg. | per  $L$  2 patet (1) quadratum ipsius R (2) RF esse velut diagonalem (a), et  $D'$  (b) quadrati (c) semiquadrati  $L = 4a^2$  erg. Hrsg. 6 f.  $D'V \sqcap \frac{2y}{\cancel{2a}} \mid \sqrt{2y^2 - a^2}$  ändert Hrsg. | (1) quae facile in aliam transmutan (2) sive  $D'V \sqcap \frac{y}{a} \sqrt{y\sqrt{2} + a, \sqcap y\sqrt{2} - a}$  et  $y\sqrt{2} - a$  vocando (3). Habemus  $L = 8 D'C L$  ändert Hrsg. 8 2  $L$  ändert Hrsg.

---

2 semiquadrati  $RBF$ :  $RBF$  ist nur für den Spezialfall  $x = \frac{a}{2}$  ein halbes Quadrat. 8 ordinata:  
Für die Trochoide des Brennpunkts gilt  $VB = -D'V + D'B$ .



[Fig. 3]

Inspice figuram hic ascriptam, in ea:  $Q\Omega \sqcap BP \sqcap a$ .  $DP \sqcap DB \sqcap \frac{a}{2}$ .  $DR \sqcap DQ \sqcap x$ .  $2DT \sqcap QF \sqcap \sqrt{2ax}$ .  $FB \sqcap FN$ . Ergo  $BT \sqcap TN$ . et recta  $[RTF]$ , angulum  $BFN$  bissecat. Iam  $FN \sqcap x + \frac{a}{2} \sqcap FB$ . et  $BR \sqcap DR$  seu  $x, +DB$  seu  $\frac{a}{2}$ . ergo  $FB \sqcap FN \sqcap BR \sqcap x + \frac{a}{2}$ . Porro ad  $QF^2 \sqcap 2ax$ , addatur  $Q\Omega^2 \sqcap a^2$ , fiet:  $\sqrt{a^2 + 2ax}$  [in  $\Omega F$ ]. Et quia  $QD$  dimidia ipsius  $QR$ . seu  $DT$ . ipsius  $QF$ . erit  $TF$  dimidia ipsius  $RF$ ,

500,10–501,2 numerorum. (1) Tantum addam AL aequari BD( $\frac{a}{2}$ )  $\sqcap$  D'L. Ergo circulum (a) per (b) centro L; radio LD' descriptum transire per (A) locum ipsius A verum. Ergo iam invenio: (2) Unum iam superest monendum nempe BT (a) aequari (b) sive LV, aequari BQ et proinde quod optabam DQ abscissam parabolae, aequari AV, abscissae trochoidis respondentis, ac proinde, (aa) descripta (bb) semiparabola DFH, translata in AW, nempe D in A, et F in W erectaque WVD'B, (aaa) curvam (bbb) rectam D'B fore curvae AW aequalem. (aaaa) Rectius (bbbb) Utilius ergo pro VL, incognitam (aaaaa) sumemus (bbbb) abscissam sumemus AV, aequalem abscissae parabolicae x. Unum optarem, ut et VD' fieret  $\sqcap$  VW. Sed hoc calculus negat, experiar denuo; a quadrato D'L  $\sqcap$   $\frac{a^2 + 4ax + x^2}{4}$ , | auferatur streicht Hrsg. | auferatur quadratum VL seu  $\frac{a^2 - 4ax + x^2}{4}$ , restabit  $\frac{8ax}{4}$ , seu 2ax. Ergo D'V  $\sqcap \sqrt{2ax}$ ,  $\sqcap$  VW. quod est verissimum. Est ergo AD', vel AW, ipsa parabola generatrix. Huc usque ergo plane satisfactum est voto. — Sed iam incipio vereri, ne error sit in illa suppositione, quod scilicet DQ  $\sqcap$  AV, DF  $\sqcap$  VD', et BQ  $\sqcap$  VL  $\sqcap$  BT. (3) Inspice L 3 BTN L ändert Hrsg. 5 f.  $\sqrt{a^2 + 2ax}$  |  $\sqcap$   $\Omega F$  erg. Hrsg. | (1), eiusque dimidium (2). Et L

et  $BT$  ipsius  $\Omega F$ . Ergo  $BT \sqcap \frac{\sqrt{a^2 + 2ax}}{2}$  quae in figura prima primae paginae  $\sqcap [LV]$ .

Eius quadratum  $\frac{a^2 + 2ax}{4}$  auferatur a quadrato ipsius  $BF$ , quod est  $\frac{4x^2 + 4ax + a^2}{4}$ ,

restabit:  $\frac{4x^2 + 2ax}{4} \sqcap \frac{2x^2 + ax}{2} \sqcap TF^2$  ut supra. Item a  $BF^2$ , seu  $\frac{4x^2 + 4ax + a^2}{4}$  au-

feratur  $QF^2 \sqcap \frac{8ax}{4}$ , fiet:  $\frac{4x^2 + 4ax - 8ax + a^2}{4} \sqcap BQ^2$ , et erit  $BQ \sqcap \frac{\pm 2x \pm a}{2}$  sive erit

- 5  $BQ$ . differentia inter  $x$  et  $\frac{a}{2}$ , quod et dudum constat<sub>[,]</sub> est enim utique  $BQ$  differentia inter  $DQ$  et  $DB$ . Unde satis apparet non esse  $BT$  aequale ipsi  $BQ$  nec ideo in figura primae paginae prima  $AV \sqcap DQ$ . Quare nec  $AD'$  curva est parabolica generatrici eadem; ut in cycloide evenit.

Nunc  $BT$  appellando  $y$ , fiet:

$$10 \quad \frac{a^2 + 2ax}{4} \sqcap y^2. \text{ et } x \sqcap \frac{4y^2 - a^2}{2a}. \text{ et } x^2 \sqcap \frac{16y^4 - 8a^2y^2 + a^4}{4a^2}, \text{ inseratur valori ipsius } TF^2, \text{ fiet: } \frac{16y^4 - 8a^2y^2 \boxed{+a^4}}{[4]a^2} + \frac{4y^2 \boxed{-a^2}}{[4]} \sqcap \frac{16y^4 - 4a^2y^2}{[4]a^2} \text{ ut supra.}$$

1f. paginae  $\sqcap | AV. ändert Hrsg. | (1)$  Ab eius quadrato  $\frac{a^2 + 2ax}{4}$  auferatur quadratum ipsius DB, quod est  $\frac{a^2}{4}$  (2) Eius  $L$  8f. evenit. (1) Si ab  $x + \frac{a}{2}$  auferatur  $TF$  (2) Nunc  $L$  11 fiet:

$$| \frac{16y^4 - 8a^2y^2 + \boxed{a^4}}{2a^2} ändert Hrsg. | (1) + 4y^2 \boxed{-a^2} \sqcap \frac{16y^4}{2a^2} \text{ et erit } TF \sqcap \frac{4y^2}{a\sqrt{2}} \text{ sive } \sqcap \frac{2y^2\sqrt{2}}{a}; \text{ unde}$$

aequatio:  $y^2 \sqcap \frac{aTF}{2\sqrt{2}}$  (a) cuius latus (b) quae indicat curvam  $AD'E$  in fig. 1 pagina prima huius plagulae esse parabolam quidem, sed cuius latus (aa) transversum (bb) rectum  $\frac{a}{2\sqrt{2}}$ . est ad  $2a$  latus rectum

parabolae generatricis,  $\frac{a}{4\sqrt{2}}$  ut 1 ad  $4\sqrt{2}$ , seu ut 1 ad Rq 32. Cumque omnis parabola alteri sit similis,

modo et similiter posita sit, (quod secus est in ellipsi et hyperbola latus rectum transversumque aequalia habente) ac proinde omnis parabola possit ita collocari, ut alteri parallela reddatur, seu ut omnis recta uni perpendicularis producta etiam sit alteri perpendicularis; ideoque intelligi potest hanc novam parabolam eodem, cum genitrice trochoidis, seu data parabola, tempore describi posse; quod utile est, ne diversae

descriptiones turbent exactitudinem. (2)  $| + \frac{4y^2 \boxed{-a^2}}{2} \sqcap \frac{16y^4 - 4a^2y^2}{2a^2} ändert Hrsg. |$  ut  $L$

3 ut supra: S. 500 Z. 1. 11 ut supra: S. 500 Z. 5.

Ergo ut concludamus ut ante: abscissa  $LV$  posita  $y$ , ordinata trochoeidis parabolicae seu  $[VB]$  erit  $\sqcap \frac{y}{a} \sqrt{[4y^2 - a^2]} + DNF$  posito  $DNF$  esse curvam parabolicam et nota  $D'V$  esse  $\sqcap \sqrt{\frac{y, y, 4y + 2a, 4y - 2a}{[4]a^2}}$ .

Hactenus de trochoide nostra quae describitur ab umbilico. Superest, ut consideremus an commodior illa futura sit, quae describitur a parabolae vertice, qualis est  $L\Delta D$  ad quam recta  $FD$  erit perpendicularis unde ordinata ducatur  $\Delta$  producenda dum ipsi  $L\Delta$  parallelae ad  $FD$ , occurrat in  $\Delta$  erit  $D\Delta$  arcui  $DNF$  aequalis. Ordinata ergo  $D\Delta$  erit curva minuta recta  $[\Delta\Delta]$  cuius superest ut quaeramus valorem.

Habetur valor ipsius  $FD$ . Nam  $QD$  posita  $x$ , fiet  $FD \sqcap \sqrt{x^2 + 2ax}$ . Porro  $\Delta L \sqcap D\Delta$  facile habetur, nam ut  $RF \sqcap \sqrt{4x^2 + 2ax}$ , ad  $QF$  seu  $\sqrt{2ax}$  ita  $RD \sqcap x$ , ad  $D\Delta$ . Ergo  $\frac{D\Delta}{x} \sqcap \sqrt{\frac{2ax}{4x^2 + 2ax}}$  et fiet:  $D\Delta \sqcap \sqrt{\frac{2ax^2}{4x + 2a}} \sqcap x \sqrt{\frac{2a}{24x + 2a}} \sqcap y$ . ponendo  $D\Delta \sqcap y$ . et fiet:  $x^2a \sqcap 2y^2x + ay^2$ . et fiet:  $x^2 - \frac{2y^2}{a}x + \frac{y^4}{a^2} \sqcap \frac{y^4}{a^2} + y^2$  et erit  $\pm x \pm \frac{y^2}{a} \sqcap \frac{y}{a} \sqrt{y^2 + a^2}$ , sive  $x \sqcap \pm \frac{y}{a} \sqrt{y^2 + a^2} + \frac{y^2}{a}$ .

1 ante (1) recta (2) abscissa  $L$     2  $y^2 - 2a^2$   $L$  ändert Hrsg.    2 D'C  $L$  ändert Hrsg.    3 2  $L$  ändert Hrsg.    8  $L\Delta$   $L$  ändert Hrsg.    9 posita x, | fiet: streicht Hrsg. | fiet  $L$     10 f. Ergo  $\frac{D\Delta}{x} \sqcap$   
 $(1) \sqrt{\frac{24x^2 + 2ax}{2ax}}$  vel  $D\Delta \sqcap x \sqrt{\frac{2x + a}{a}} \sqcap y$  ponendo | igitur gestr. |  $D\Delta \sqcap y$ . Itaque  $2x^3 + ax^2 \sqcap ay^2$ .  
Iam  $L\Delta^2 \sqcap \frac{2x^3 + ax^2}{a}$  subtrahatur a  $\Delta\Delta^2$  seu a  $x^2 + 2ax$ , residui quadratum (videndum ne error calculi  
insit, nam videtur aliquando id quadratum minus nihilo fieri posse) (2)  $\sqrt{\frac{2ax}{4x^2 + 2ax}} L$

1 ut ante: vgl. Erl. zu S. 500 Z. 8.

Porro  $\frac{d^2}{dx^2} \ln \frac{-2ax^2}{4x+2a} + x^2 + 2ax$  (seu  $FD^2[-]D^2$ )  $\ln \frac{-2ax^2 + 4x^3}{4x+2a} [+ 4a^2x + 2ax^2 + 8ax^2]$ ; in quo si substituatur valor ipsius  $x$ , habebitur

itaque aequatio satis composita, explicans valorem ipsarum  $\frac{d^2}{dx^2}$  per ipsas  $L$  abscissas. Ut proinde satius tandem videatur trochoeide uti ab umbilico descripta. Poterit tamen  
5 examinis causa describi utraque, quoniam id fit eodem tempore.

Descriptio autem ope fili ex materia non facile distendibili, in asseris zonam parabolicam tangentis incisuram se indentis, ponderis appensi tendentisque vi; assere interea et tabulam fixam in quam stylus agit, circumferente; perfectissime describetur; cum eadem opera et evolutionalis parabolica in pariete fixo a stylo asseri infixo possit describi. Stylus  
10 autem acicula esse potest in materia molluscula lineam inscribens.

Sed satis de descriptione veniamus ad usum. Ubi unum ante adiciem lineam istam pantometram aut similem esse absolute necessariam ad perfectionem geometriae<sup>[,]</sup> sunt enim problemata analytice soluta, seu quae calculo fieri possunt, et quorum tamen constructio geometrica per lineas analyticas non datur; qualia sunt: rationem secare in ratione duorum numerorum irrationalium. Haec autem problemata impossibile est solvi geometrice nisi per lineas non analyticas. Fatenda est ergo necessitas linearum non analyticarum in geometria. Praeterea [impossibile] est lineam inveniri analyticam quae sit omnium graduum simul; qualis ista est: itaque tot opus est curvis Cartesiana construendi methodo, quot sunt genera aequationum, cum linea pantometra sola sufficiat omnibus.  
15

20 Vid. part. XII.

1 f. (seu  $FD^2| + D^2$ )  $\ln \frac{-2ax + 4x^3 + 2a^2x}{4x+2a}$  ändert Hrsg.; (1) et fiet:  $\frac{d^2}{dx^2} \ln (2)$  in  $L$

17 Praeterea | impossibilis ändert Hrsg. | est lineam inveniri (1) geometricam (2) analyticam  $L$

---

18 f. Cartesiana construendi methodo: *Geometria*, 1659, DGS I S. 84 f. u. 105 f. (vgl. DO VI S. 463 f. u. 485).

38<sub>14</sub>. DE SERIERUM SUMMIS ET DE QUADRATURIS PARS DUODECIMA

**Überlieferung:** L Konzept: LH 35 V 4 Bl. 26–27. 4 S. Fig. 1, 2, 4, 6 mit Vorstufen und Korrekturen.  
Cc 2, Nr. 775 A tlw.

Pars XII schediasmatis de quadraturis figurarum et summis serierum. 5

Nunc ad usum figurae nostrae pantometrae veniamus. Vide hic fig. 1.




fig. 1

Si  $Ad$  sint inter se ut numeri, spatia  $Ad\beta$ . erunt inter se ut eorum logarithmi per inventa Gregorii a S. Vincentio. Sit centrum  $C$ . vertex  $E$ . axis  $Cf$ . Ducantur ordinatae  $\beta f$ . ad axem. Et eaedem producantur dum asymptotis occurrant in  $g$ . 10

9 axis (1) | EF. streicht Hrsg. | (2) Cf. L

7 fig. 1: Leibniz hat eine erste Fassung der Figur gestrichen und in der zweiten Punktbezeichnungen geändert, den Text aber nicht konsequent angepaßt. Es wird an die Bezeichnungen der gültigen Figur angeglichen. 9 S. Vincentio: *Opus geometricum*, 1647, Buch VI prop. 125–130 S. 594–597.


Spatium  $\beta Ad\beta$ . est rectangulum  $Ad\beta$ . demto curvilineo  $\beta\lambda\beta$ . Esto dd. vel  $dA \sqcap b$ .  $[AC] \sqcap z$ .  $CH \sqcap a$ . erit  $[dm] \sqcap \frac{a^2}{z}$ . et  $[Adm.]$  rectangulum erit:  $\frac{ba^2}{z}$ .

Investiganda quin quantitas ipsius  $f$ . Patet triangulum  $gfC$ . esse simile triangulo  $gA\beta$ . Ergo  $\frac{gA}{A\beta} \sqcap \frac{a^2}{z}$  et  $\frac{gf}{fC}$ . Imo  $Ag \sqcap A\beta$ . et  $gf \sqcap Cf$ . et  $g\beta \sqcap \sqrt{\frac{2a^4}{z^2}} \sqcap \frac{a^2}{z} \sqrt{2}$ . et

5  $gf \sqcap \frac{a^2}{z} \sqrt{2} + \beta f$ . At  $\beta f \sqcap \sqrt{2a^2 + x^2}$ . ponendo  $CE \sqcap a \sqrt{2}$ . et  $Cf \sqcap x$ . ut constat.

Eritque:  $\frac{a^2}{z} \sqrt{2} + \sqrt{2a^2 + x^2} \sqcap a\sqrt{2} + x$ . Adeoque  $z$ . habetur absolute  $\sqcap \frac{a^2[\sqrt{2}]}{a\sqrt{2} + x - \sqrt{2a^2 + x^2}}$   $\sqcap z$ . Contra si  $x$ . investigare velis, retenta  $z$ , fiet:  $\sqrt{2a^2 + x^2} \sqcap a\sqrt{2} + x - \frac{a^2}{z}\sqrt{2}$ . Unde  $(2a^2)(+x^2) \sqcap (2a^2) + 2ax\sqrt{2}(+x^2)$ ,  $\boxed{-\frac{2a^2\sqrt{2}\sqrt{2}}{z}} - \frac{4a^2}{z} - \frac{2a^2x\sqrt{2}}{z} + \frac{2a^4}{z^2} \sqcap 0$ . sive:  $2axz^2\sqrt{2} - 4a^2z - 2a^2xz\sqrt{2} + a^4 \sqcap 0$ . et  $x \sqcap \frac{4a^2z - a^4}{2az^2\sqrt{2} - 2a^2z\sqrt{2}}$ . Iam pro  
10  $z$ . pone  $z - b$ . fiet:  $\frac{4a^2z - 4a^2b - a^4}{2az^2 - 4azb\sqrt{2} + 2ab^2 - 2a^2z\sqrt{2} + 2a^2b\sqrt{2}}$ . quarum duarum  $x$ . differentialia utique est  $ff$ .

Iam spat.  $\beta Ad\beta \sqcap \square A\lambda\beta$  – spat.  $\beta\lambda\beta$ . sed spatium  $\beta\lambda\beta \sqcap$  spat.  $\beta ff\beta - \square ff\xi - \square \beta\xi\pi + \square \pi\lambda\beta$ . Ergo spat.  $\beta Ad\beta \sqcap \square A\lambda\beta$  – spat.  $\beta ff\beta + \square ff\xi + \square \beta\xi\pi - \square \pi\lambda\beta$ .



[Fig. 2]


2 AG  $L$  ändert Hrsg.    2 gm  $L$  ändert Hrsg.    2 Agm  $L$  ändert Hrsg.    7  $\sqrt{2}$  erg. Hrsg.

5  $\sqrt{2a^2 + x^2}$ : Richtig wäre  $\sqrt{x^2 - 2a^2}$ . Leibniz rechnet mit dem falschen Wert weiter; hinzu kommen Flüchtigkeitsfehler in Z. 8, Z. 9 u. Z. 10, welche die Rechnung bis Z. 10 beeinträchtigen.

Quod si iam inveniri potest linea curva cuius elementa  $rr$  procedunt ut  $ff$ . Et ordinatae trochoidis (quae figura superflua diminuta sit)  $st$ , procedant ut summae elementorum, seu ut curvae portiones  $Mr$  tunc procedent etiam ut spatia  $Eff\beta\beta E$ . Sed hoc loco contrarium postulatur ut procedant ut spatia  $Gff\beta\beta G$ , sciendum ergo hoc modo procedere trochoidis huius complementa  $tv$ . Atque ita id praeterea eveniet praeclarissimum, ut ordinatae  $tv$  sint purae et simplices aequales curvae, est enim  $tv \sqcap Nr$  nulla extraneae figurae alioquin trochoidem turbantis intermixtione. Iam ad  $tv$  adiungantur  $v\omega$  quae scilicet procedant ut differentiae  $Add\beta\beta A$  et  $Gff\beta\beta G$  quod utique fieri potest, quoniam earum differentiarum progressio opinor erit constans et aequatione exprimi poterit; ideoque  $t\omega$  procedent ut logarithmi numeris naturalibus prout procedentibus non quidem ut  $Pv$ , vel  $Gf$  attamen ut  $Ad$ .

5

10



Ponamus iam istam ita descriptam haberi curvam cuius ordinatim applicatae, alterius curvae descriptae ordinatim applicatis auctae procedant ut logarithmi. Sane ita facile erit rationem secare in data ratione; sed quaeritur a me quiddam maius. Nempe constructio omnium aequationum etiam affectarum, quod videamus esto  $\frac{b}{a+cx} \sqcap \frac{x^2}{d}$ . Id est,

15

[Fig. 3] quaerenda est linea ex asymptoto hyperbolae quo dixi modo abscissae  $[Ad]$  seu logarithmica  $t\omega$  ut differentia inter logarithmum rectae cognitae  $b$ , et logarithmum rectae  $a$ , logarithmo  $c$ , et  $x$  summa auctum, et logarithmo ipsius  $a$  minutum, aequetur logarithmi dupli ipsius  $x$ , differentiae a logarithmo  $d$ , ipso minore quae ut patet clarius aequatio analytica convertatur in logarithmicam, ponendo literas  $b. a. c. x. d.$  significare iam non ipsas lineas seu numeros sed eorum logarithmos, et fiet:  $b(\underline{-a}) - c(\underline{+a}) - x \sqcap 2x - d$ , fietque  $x \sqcap \frac{b - c + d}{[3]}$ . Sed videtur hic subesse error; nam [logarithmi] ipsius

20

1 cuius (1) ordinatae procedunt ut spatia  $Ef\beta$  (2) elementa  $L$  5 huius (1) elementa (2) complementa  $L$  7f. ad (1)  $v\omega$  (2)  $tv$  adiungantur  $v\omega$  (a) necessariae scilicet ut solae (b) vel etiam ab altero (c) necessariae scilicet (d) quae  $L$  8  $Gff\beta\beta G$  (1) et tot (2) quod  $L$  11 vel  $Gf$  erg.  $L$  13 applicatae (1) sunt homo (2) utut (3) alterius  $L$  19 abscissae | AG ändert Hrsg. | seu ...  $t\omega$  erg. | ut  $L$  19 inter (1) ordinatam (2) logarithmum  $L$  19 b, | et streicht Hrsg. | et  $L$  24 2  $L$  ändert Hrsg. 24 error; (1) logarithmus enim non (2) nam (a) logarithmus inveniendus est (b) | logarithmus ändert Hrsg. | ipsius  $L$

*b* et *d* habentur; sed logarithmus non sumendus est ipsius *a. c. x. a.* separatim, sed logarithmus quaerendus est ipsius totius  $a + \frac{cx}{a}$ . Nimirum ex logarithmis partium non componitur logarithmus tutorum. Nisi velis numeros illos invenire quorum logarithmi sint ipsi naturales; quorum numerorum potestates eo modo invenies. Sed hoc nihil ad 5 rem pertineret.

An ita? Pro *x* naturali cuius logarithmica quaeritur seu ex quaesitis *Ad*, et *tω*, rem eo reducamus, ut quaeratur *fg* et *vt*, eodem modo et *b*, et *d*, reducamus et  $a + \frac{c}{a}x$ , et *x*, reducendo numero naturales et eorum logarithmos: ad numeros artificiales et eorum quasi logarithmos; quod una semper methodo constante fit, quo facto aequatio habebitur 10 correcta:  $b - \left[ a + \frac{c}{a}x \right] \sqcap [2x] - [d]$ . Numeris inclusis, propositorum quasi logarithmos significantibus; additis scilicet vel subtractis antea illis superfluis nempe rectis *vω*, quae calculo semper haberi possunt vel sic[:] ipsius *b*, ipsam *vω*, appellemus ( $\beta$ ), ipsius  $a + \frac{c}{a}x$ , appellemus  $\alpha + \frac{\kappa}{\alpha}\xi$ , et ipsius *d*, vocemus  $\delta$ , et fiet aequatio correcta:


$$b - \beta - a + \underbrace{\frac{c}{a}x}_{\alpha} + \left[ a + \frac{c}{a}x \right] \sqcap 2x - 2\xi - d + \delta.$$

15 Ubi patet incognitas esse quatuor:  $a + \frac{c}{a}x$ ,  $\left[ a + \frac{c}{a}x \right]$ , *x*,  $\xi$ , logarithmos partim supplementa logarithmica. Et video si aequationem initio propositam in aliam mutare velis analogiam[,] multiplicari rursus incognitas. Non ergo sic exitus.

An ita[:] rectam ducamus **Nt** quae secet curvam *Pt* in *t*, ipsa *wt*, per lineam rectam ex sumta *Ad* incognita, habebit valorem quandam explicabilem, quia ipsa *tv* ordinata 20 trianguli, et *vω* ordinata curvae analyticae. Eadem recta iam habet et alium valorem, ut sit logarithmus ipsius *Ad*.


$$10 - [d]. (1) eritque x \sqcap (2) Numeris L \quad 15 patet (1) tres fieri incognitas x, \left[ a + \frac{c}{a}x \right] (2)$$

incognitas *L* \quad 16 logarithmica. (1) Quare aequatio initio proposita mutetur in hanc: (2) Et *L*  
18f. rectam (1) ex sumta *P* (2) ex *L* \quad 19 ipsa *tv* (1) recta cognita, et (2) ordinata *L*



[Fig. 4]

Ecce ergo aequationem factitiam inter logarithmum, et alias quasdam cognitas, cuius ope videndum an possint solvi problemata; sed dubito, quia non eam intrant logarithmi quales  $a + x$ . terminorum compositorum.




[Fig. 5]


5

Videndum ergo illud est an non fieri possit, ut linea  $vp$  fiat perfecte logarithmica, quod fieret retroagendo nonnihil ipsam parabolam genitricem inter volvendum id est read nostram descriptionem applicata, prorsum seu dextrorsum agendo separato motu, tabulam in qua logarithmica describi debet, retroagetur vero quantum postulat summa spatiorum complementalium, idque per applicationes regularum constantium, eo scilicet modo aliae quoque curvae describuntur. Qui motus ab ipso evolutionis motu pendebit.

10



[Fig. 6]



[Fig. 7]

1 Fig. 4: Leibniz hat eine erste Fassung der Figur gestrichen und in der zweiten Punktbezeichnungen geändert, den Text aber nicht konsequent angepaßt. Es wird an die Bezeichnung der gültigen Figur angeglichen. 6 linea  $vp$ : Leibniz meint die Kurve mit der Ordinate  $vp$ .

Ponamus ergo haberi lineam  $vp$  vere logarithmicam; resumta aequatione superiore  
 $b - a + \underbrace{\frac{c}{a}x}_{\text{in}} \sqcap 2x - d$ . vel  $d + b - a + \underbrace{\frac{c}{a}x}_{\text{in}} \sqcap [2]x$ . In adiuncta hyperbolae asymptoto cuius  
initium arbitrarium  $A$ , centrum  $C$  sumatur  $\overline{AC} \sqcap a$ . Praeterea ex  $\lambda$  ducatur recta  $\overline{EP}$   
angulum ad asymptoton faciens talem ut  $\overline{EP}$  posita  $x$ , ipsa  $\overline{P}\varphi$  sit  $\frac{c}{a}x$ . et ipsa  $\overline{P}\varphi$  erit  
5  $a + \frac{c}{a}x$ . eique respondens  $vp$  vel  $t\omega$  erit logarithmus  $a + \frac{c}{a}x$ . Iam ipsa  $\overline{P}$  translata cogitetur  
in ipsam  $AC$ , et  $\overline{P}$  incipere ab  $A$ , et  $\overline{P}$  esse etiam in recta  $AC$  v. g.  $\overline{EP}$  translatam in  $A\overline{P}$ .

Itaque si regula sit ex  $A$ , versus  $C$  tendens indefinita mobilis in fixo assere  $AC$ . et  
in  $\varphi$  fixus sit palus circa quem chorda ita ut dum regula alia  $\overline{P}\varphi$  mobilis in ipsius  $\overline{EP}$   
assere descendit, regula  $A\overline{P}$  eodem motu etiam descendat, dum autem descendent aliarum  
10 regularum applicationibus signabuntur earum logarithmi aut potius a datis logarithmis  
differentiae; et quando eveniet, ut concurrent duae regulae in unum, ibi vero habebitur  
aequationis radix.

Sed quid si esset:  $\frac{b}{e + xa + \frac{c}{a}x^2} \sqcap \frac{x^2}{d}$ . Eo casu id profecto non ita succederet, quo-

modo enim logarithmum ipsius  $x^2$ , per regulam designabimus. Consideranda aequatio  
15 proposita:  $x^4 + ax^3 + ex^2 - bd$ , ut quantitas composita ex rectarum quarundam differen-  
tiis ab ipsa  $x$  vel eius summis: sed nec hoc procedit, quia ipsa  $x$  universalis est quantitas  
imaginaria.

An ita: quaerendae sunt quatuor lineae naturales quarum logarithmorum summa  
 $bd$ , ipsarum linearum summa  $a$ : summa numerorum naturalium logarithmo cuilibet lo-  
20 garithmis duorum quorumlibet combinatis aequali respondentium sit  $e$ . sed difficiliora  
sunt ista, quam ut spes sit vinci posse; nisi quadam arte artibus Vietae simili utamur; ut

2 2 erg. Hrsg. 2f. cuius ... centrum C erg. L 10 logarithmi (1) intersectione quarundam regularum et rectae p (2) aut potius (a) cum datis (b) a (c) a datis L 14 designabimus (1), nisi ita addendo (2). (a) Ista ergo difficillima (b) Videndum, an (c) Consideranda L 18 sunt (1) tres lineae, (2) quatuor lineae (a) in logarithmis, (b) naturales L 19 f. summa a: (1) summa logarithmorum duorum quorumlibet (2) summa numerorum naturalium | logarithmo cuilibet erg. | logarithmis duorum quorumlibet (a) aequali (b) combinatis L

21 Vietae: *De numerosa potestatum*, 1600 (VO S. 162–228).

scilicet quia ut ille ab extractione incipit, caetera multiplicationibus subtractionibus et additionibus peragit; ita nos incipiendo a divisione logarithmorum, caetera additionibus etc. Sed video nec hoc procedere, nam in numeris fiet semper ob alias causas tractabilior.


Malum omne ex eo quod ut logarithmi repreäsentant quidem extractionem radicum, divisione; multiplicationem additione et divisionem subtractione ipsorum; sed nihil habent, quo repreäsentent additionem et subtractionem naturalium. Quemadmodum naturales nihil habent quo repreäsentent extractionem radicum ex logarithmis. 5

Sumantur numeri quorum logarithmi sint ipsi naturales; hi naturales naturalium, multiplicantur additione naturalium, et involvuntur additione logarithmorum.

Itaque si detur  $\frac{b}{a + \frac{c}{a}x} \sqcap \frac{x^2}{d}$ , et horum loco aequatio similis fiat inter logarithmos; 10


faciendo:  $b - a + \underbrace{\frac{c}{a}x}_{\text{ }} \sqcap 2x - d$ .

Si invenire posset curva ipsis elementis hyperbolae ad asymptoton homogena haberetur descriptio curvae logarithmorum; nempe  $\frac{a^2 - x^2}{x^2} \sqcap \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x}$  cuius quaeritur dimensio seu quadratura: aequatio est:  $a^2 - [x^2] \sqcap x^2y^2$ . quae pendet ex quadratura circuli. 15



[Fig. 8]

4 quidem (1) additionem (2) extra (3) extractio (4) extractionem  $L$       5 additione erg.  $L$   
 7 repreäsentent (1) additionem (2) extractionem  $L$       9 involvuntur (1) multiplicatio (2) additione  $L$   
 14  $a^2x^2 L$  ändert Hrsg.      15 circuli. | Quemadmodum series inaequabiles non gestr. |  $L$



[Fig. 9, tlw. Blindzeichnung]


38<sub>15</sub>. DE SERIERUM SUMMIS ET DE QUADRATURIS PARS TERTIA DECIMA

**Überlieferung:** L Konzept: LH 35 V 4 Bl. 28–29. 1 Bog. 2°. 4 S. Überschrift ergänzt.  
Cc 2, Nr. 775 A tlw.

### Pars XIII. de seriebus et summis.

5

[Teil 1]



[Fig. 1]

$CB \perp y$ .  $BD \perp x$ .  $AB \perp z$ . Erit  $2az - \frac{a}{b}z^2 \perp x^2$ . ponendo  $AL \perp 2b$ . latus transversum; et  $2a$  latus rectum. Pro  $z$  substituendo  $b - y$  fiet  $z^2 \perp b^2 - 2by + y^2$ . et

$\frac{2ab^2 - 2aby - ab^2 + 2aby - ay^2}{b} \sqcap x^2$ . sive  $ab - \frac{a}{b}y^2 \sqcap x^2$ , sive erit  $ab^2 - ay^2 \sqcap bx^2$ , sive  
 $\frac{a}{b} \sqcap \frac{x^2}{b^2 - y^2}$ , sive  $b^2 - y^2 \sqcap \frac{b}{a}x^2$ , sive  $b^2 - \frac{b}{a}x^2 \sqcap y^2$ , ponendo abscissam  $x$  esse  $CE$ , et applicatam  $y$  esse  $ED$ .

Quod si relatio fiat non ad axem  $AL$ . sed ad axem  $MF$ . tunc  $FE$ . appellando  $v$  et

- 5  $MF$ . appellando  $2c$ , et latus rectum ad eum pertinens appellando  $d$ , fiet:  $2dv - \frac{d}{c}v^2 \sqcap y^2$ .  
et pro  $EF \sqcap v$ , ponendo  $c - x \sqcap CE$ , fiet:  $2dc - 2dx, -\frac{d}{c}c^2 + 2\frac{d}{c}cx - \frac{d}{c}x^2 \sqcap y^2$ . sive  
 $\frac{2}{\pi}dc^2 \boxed{-2dcx} \boxed{-dc^2} \boxed{+2dcx} - dx^2 \sqcap cy^2$ , sive  $c^2 - x^2 \sqcap \frac{c}{d}y^2$ .

Iam ut curvae ellipseos elementa investigemus: primum ex aequatione  $2az - \frac{a}{b}z^2 \sqcap x^2$ . quaeramus  $BN$ . posito  $ND$ . esse tangentem, nempe  $BN$ . appellata 1, fiet:  $\cancel{2}al - \frac{2a}{b}zl \sqcap \cancel{2}x^2$ , sive  $l \sqcap \frac{x^2}{a - \frac{a}{b}z}$ . et pro  $x^2$ , substituendo eius valorem, nempe  $2az - \frac{a}{b}z^2$ ,  
10 fiet:  $\frac{2az - \frac{a}{b}z^2}{a - \frac{a}{b}z} \sqcap l$ . Fiat  $\frac{w}{\beta} \sqcap \frac{\sqrt{2az - \frac{a}{b}z^2}}{2az - \frac{a}{b}z^2} \sqcap a - \frac{a}{b}z \sqcap \frac{y}{l}$  fiet:  $w \sqcap \frac{\beta, \sqcap a - \frac{a}{b}z}{\sqrt{2az - \frac{a}{b}z^2}}$

$$\begin{aligned} & 8 \text{ ut (1) curvam hype (2) curvae } L \quad 8 \text{ f. } \sqcap x^2. \text{ (1) et pro z. ponendo } z - \beta. \text{ fiet: } 2az - (2) \\ & \text{quaeramus } L \quad 10 \text{ l } \sqcap \frac{x^2}{a - \frac{a}{b}z}. \text{ (1) Et faciendo ND } \sqcap \frac{x^4}{a^2 - \frac{2a}{b}z + \frac{a^2}{b^2}z^2} - (2) \text{ et } L \quad 11 \text{ l. (1)} \\ & \text{cuius quadratum est } \frac{4a^2z^2 - 4\frac{a^2}{b}z^3 + \frac{a^2}{b^2}z^4}{a^2 - \frac{2a^2}{b}z + \frac{a^2}{b^2}z^2} \text{ (a), fiat (b) } \sqcap \frac{az, + az - \frac{a}{b}z^2, \square}{a - \frac{a}{b}z, \square} \text{ a quo si auferatur } BD^2, \\ & \sqcap 2az - \frac{a}{b}z^2, \text{ fiet: } \frac{az, + az - \frac{a}{b}z^2, \square, \square, \square, - az, - az + \frac{a}{b}z^2, \sqcap a - \frac{a}{b}z, \square}{a - \frac{a}{b}z, \square} \text{ et liberando numeratorem a} \\ & \text{vinculis, fiet: } \frac{4a^2z^2 - 4\frac{a^2}{b}z^3 + \frac{a^2}{b^2}z^4, - 2a^3z + \frac{4a^3}{b}z^2 - \frac{2a^3}{b^2}z^3, + \frac{a^3}{b}z^2}{a - \frac{a}{b}z, \square} \text{ (2) Fiat } L \end{aligned}$$

cuius quadrato,  $\frac{\beta, \wedge a - \frac{a}{b}z, \square}{2az - \frac{a}{b}z^2}$  addatur  $\beta^2$ , fiet:  $\frac{\beta^2, \wedge a - \frac{a}{b}z, \square + 2az - \frac{a}{b}z^2}{2az - \frac{a}{b}z^2}$ , eritque

$\beta \sqrt{\frac{a^2 - \frac{2a^2}{b}z + \frac{a^2}{b^2}z^2 + 2az - \frac{a}{b}z^2}{2az - \frac{a}{b}z^2}}$   $\sqcap g$ . Quae  $g$  reprezentat momentum curvae ellipseos.

Invenienda est ergo dimensio figurae, cuius elementa sint:  $g$ . et habebitur dimensio curvae ellipseos. Sed quia ea figura satis intractabilis videtur ultra pergendum est.

5

Nimirum quaeratur curvae momentum ex  $AC$ , axe; ducantur elementa in  $\sqrt{2az - \frac{a}{b}z^2}$  distantiam ab axe; fient elementa momenti curvae haec:

$$\beta \sqrt{a^2 - \frac{2a}{b}z + \frac{a^2}{b^2}z^2} \text{ quae est ad ellipsin si } b \text{ maior quam } a, \text{ quia tunc etiam } \frac{a}{b} \text{ maior}$$

$$+ 2a \dots - \frac{a}{b} \dots$$

quam  $\frac{a^2}{b^2}$ , sed ad hyperbolam, si  $a$  maior quam  $b$ . Est autem  $b$  minor quam  $a$  in nostro exemplo cum ordinata ad axem minorem applicata est, et proinde momentum curvae ex axe  $AL$  minore, est ad hyperbolam. Contra si pro  $a$  substituas  $d$ , pro  $b$  substituas  $c$ , et pro  $z$  substituas  $v$ , fiet:

$$\beta \sqrt{d^2 - 2\frac{d}{c}v + \frac{d^2}{c^2}v^2} \text{ quae est ad ellipsin, quia } c \text{ est maior quam } d; \text{ momentum ergo}$$

$$+ 2d \dots - \frac{d}{c} \dots$$

15

curvae ellipticae  $ADF$  ex axe minore  $AL$ , dependet ex quadratura hyperbolae, ex axe vero maiore dependet ex quadratura ellipseos vel circuli.

Summa omnium  $NS$ . applicatarum in  $BQ$ , aequatur rectangulo sub curva  $ADF$ , et recta  $CF$ . comprehenso. Nam  $\frac{NS}{g} \sqcap \frac{TS \sqcap c}{\beta}$  ergo  $NS \sqcap \frac{cg}{\beta}$ . Nullus ergo novus hinc

3f. ellipseos. (1) Inventa est cu (2) Invenienda est ergo (a) cu (b) dimensio (aa) curvae (bb) figurae L 8 ad (1) hyperbolam (2) ellipsin, si a ma (3) ellipsin L 10 autem (1) b maior quam a, si (2) b (a) maior (b) minor L 16 ADF (1) pendet ex axe maiore (2) ex L 18 BQ, (1) ducta in CF, (2) aequatur L

ducitur calculus, porro  $g$  relata ad axem maiorem  $MR$ , eundem habet valorem, quem ad axem minorem, nisi quod ut dixi, pro  $a. b. z.$  aliae quas dixi lineae,  $d. c. v.$  substituendae sunt.

Nunc eadem aequatione  $2az - \frac{a}{b}z^2 \sqcap x^2$ , inverse utamur; nempe sumta  $AH$  pro

5 abscissa[,]  $DH \sqcap z$  pro ordinata, et quaeramus  $D\lambda$  pro intervallo tangentis quam voca-

bimus  $\lambda$  nempe fiet  $\cancel{2}az - \frac{2a}{b}z^2 \sqcap \cancel{2}x\lambda$  et  $\lambda \sqcap \frac{az - \frac{a}{b}z^2}{x}$ , huius aequationis priori iunctae ope tollamus terminum  $z$ . Nempe primum  $z^2$ , pro  $-\frac{a}{b}z^2$ , substituendo in posteriore eius valorem ex priore, qui est  $x^2 - 2az$ , et fiet:  $(\cancel{az}) + x^2 - \cancel{2}az \sqcap x\lambda$ . et erit  $z \sqcap \frac{x^2 - x\lambda}{a}$ , et  $z^2 \sqcap \frac{x^4 - 2x^3\lambda + x^2\lambda^2}{a^2}$ , quibus valoribus in prima aequatione substitutis, fiet:

$$\frac{2a^{\cancel{2}}x^{\cancel{2}} - 2a^{\cancel{2}}\cancel{x}\lambda - \frac{\cancel{a}}{b}x^{\cancel{3}} + \frac{2\cancel{a}}{b}x^{\cancel{2}}\lambda - \frac{\cancel{a}}{b}x^{\cancel{2}}\lambda^2}{a^{\cancel{2}}} \sqcap x^{\cancel{2}}, \text{ qua aequatione exprimitur valor}$$

10 ipsius  $\lambda$  aequatione tali:  $2a[x] - 2a\lambda - \frac{x^3}{b} + \frac{2x^2\lambda}{b} - \frac{x\lambda^2}{b} \sqcap ax$ .

Sed brevius forte ita rem obtinebimus:  $z^2 - 2bz + b^2 \sqcap b^2 - x^2$ , et  $\pm z \pm b \sqcap \sqrt{b^2 - x^2}$ , et  $z \sqcap \pm \sqrt{b^2 - x^2} + b$ . Pro  $x$  substituendo  $x + \beta$ . fiet: proxima  $z \sqcap \pm \sqrt{b^2 - x^2 - 2x\beta - \beta^2} + b$ .

Auferatur illa ab hac, fiet:  $\pm \sqrt{b^2 - x^2 - 2x\beta - \beta^2} \pm \sqrt{b^2 - x^2} \sqcap (w)$ . Unde

$$+b^2 - x^2 - 2x\beta - \cancel{\beta^2} - 2\sqrt{b^2 - x^2 - 2x\beta} \cancel{\beta^2}, \hat{b}^2 - x^2 + b^2 - x^2 \sqcap w^2.$$

$2b^2 - 2x^2 - 2x\beta - 2\sqrt{\dots} \sqcap w^2$ , sive :

$$2b^2 - 2x^2 - 2x\beta - w^2 \sqcap 2\sqrt{\dots}, \text{ et quadrando utrobique}$$

$$(\cancel{4b^4})(\cancel{-8b^2x^2}) - 8b^2x\beta - 4b^2w^2(+4x^4) + 8x^3\beta + 4x^2w^2, +4x^2\beta^2 + 4x\beta w^2 + w^4 \sqcap$$

$$(\cancel{4b^4})(\cancel{-8b^2x^2})(+4x^4) - 8b^2\beta x + 8x^3\beta.$$

$$6 \quad \lambda \sqcap \frac{az - \frac{a}{b}z^2}{x}, (1) \text{ sive } \lambda^2 \sqcap (2) \text{ sive } \lambda (3) \text{ huius } L$$

11  $x^2 L$  ändert Hrsg.

11f.  $\sqcap ax$ . (1) Ita efficia (2) Sed  $L$

14f. Unde (1)  $(+b^2 - x^2) - 2x\beta - \cancel{\beta^2} -$

$2\sqrt{b^2 - x^2 - 2x\beta - \cancel{\beta^2}, \hat{b}^2 - x^2} (+b^2 - x^2) \sqcap w^2$ . sive  $w^2 + 2x\beta, \square \sqcap b^2 - x^2 - 2x\beta, \hat{b}^2 - x^2$ , sive:  
 $w^4 + 4x\beta w^2 + 4x^2\beta^2 \sqcap b^4 - 2(2) + b^2 L$

Quod si iam ad  $w^2$  addatur  $\beta^2$ , radix summae repraesentabit etiam elementa ellip-  
seos, sed haec quoque compositiora quam velim. Ope tamen ipsius  $\lambda$  facilius habetur  
exitus, quia ibi  $\lambda$  habetur pura.

Satius ergo erit ad reliquas progredi aequationes. Sumamus scilicet aequationem:  
 $b^2 - \frac{b}{a}x^2 \sqcap y^2$ . et quaeramus  $ER \sqcap \mathfrak{L}$ . ponendo  $CE \sqcap x$  pro ordinata; et  $ED \sqcap y$  pro  
abscissa nempe fiet:

$$\begin{aligned} -\frac{\cancel{y}b\mathfrak{L}}{a} \sqcap \cancel{y}y^2, \text{ et } \mathfrak{L} \sqcap -\frac{b^2 - \frac{b}{a}x^2}{\frac{b}{a}x}, \text{ fiat } \frac{w}{\beta} \sqcap \sqrt{\frac{b^2 - \frac{b}{a}x^2}{b^2 - \frac{b}{a}x^2}} \sim \frac{b}{a}x, \text{ sive } w \sqcap \frac{\beta \frac{b}{a}x}{\sqrt{b^2 - \frac{b}{a}x^2}}. \text{ eius} \\ \text{quadrato } \frac{\beta^2 \frac{b^2}{a^2}x^2}{b^2 - \frac{b}{a}x^2}, \text{ addatur } \beta^2, \text{ producti radix fiet: } \beta \sqrt{\frac{\cancel{\beta}^2 \frac{b^2}{a^2}x^2 + b^2 \cancel{\beta}^2 - \frac{b\beta^2}{a}x^2}{b^2 - \frac{b}{a}x^2}} \sqcap g. \end{aligned}$$

Superest ergo ut huius figurae dimensionem tentemus.

$$\text{Nimirum aequatio fit: } \frac{b^2g^2 - \frac{b}{a}x^2g^2}{\beta^2} \sqcap \frac{b^2}{a^2}x^2 + b^2 - \frac{b}{a}x^2.$$

10

$$\boxed{-\frac{b}{a}..}$$

$$\text{Huius figurae } g^2 \text{ habentur ex quadratura hyperbolae: fit enim } g^2 \sqcap \frac{\frac{b^2}{a^2}x^2 + b^2 - \frac{b}{a}x^2}{b^2 - \frac{b}{a}x^2}$$

$$\sqcap \frac{\frac{b^2}{a^2}x^2}{b^2 - \frac{b}{a}x^2} + 1. \text{ quae pendent ex quad. hyp. At } x^2, \text{ fit } \sqcap \underbrace{\frac{b^2g^2}{\frac{b^2}{a^2} - \frac{b}{a} + \frac{b}{a}g^2}}_{[b^2]} - \underbrace{\frac{b^2}{\frac{b^2}{a^2} - \frac{b}{a} + \frac{b^2}{a^2}g^2}}_{[b^2]}$$

quae pendent ex quad. vel circuli si  $\underbrace{\frac{b^2}{a^2} - \frac{b}{a}}$  est quantitas affirmativa, vel hyperbolae

9 huius (1) curvae (2) figurae  $L$       11 *Umrahmung erg. Hrsg.*      12 figurae (1) momenta  $g^2$   
habentur ex quadratura hyperbolae. Eiusdem  $x^2$ , etiam habentur ex quadratura hyperbolae (2)  $g^2$   $L$

13  $\frac{b}{a}g^2 L$  ändert Hrsg.

si negativa. Duo ergo momenta habemus figurae ipsarum  $g$ . Ducantur  $g$  in  $b + x\sqrt{\frac{b}{a}}$  fiet: momentum omnium  $g$  ex puncto versus verticem, symmetrum summae ipsarum

$x^2$ , id tanquam fiet:  $\sqrt{\frac{\frac{b^2}{a^2}x^2, + b + x\sqrt{\frac{b}{a}} - b - x\sqrt{\frac{b}{a}},, \wedge b + x\sqrt{\frac{b}{a}}}{b - x\sqrt{\frac{b}{a}}}}$ . Curvae hyperbolicae

homogenea est haec figura:  $\frac{\sqrt{a^4 + y^4}}{y^2}$ . Item haec  $\sqrt{\frac{2x^2 \mp a^2}{\mp a^2 + x^2}}$ . quae posterior similis facile

5 reddi potest homogeneae curvae ellipticae dividendo per  $\sqrt{\frac{b}{a}}$ . cognitam: Elementa curvae

hyperbolicae ex posteriore etiam sic enuntiari possunt:  $\sqrt{1 + \frac{x^2}{\mp a^2 + x^2}}$ . Utamur si licet extractione per partes:  $\sqrt{1 + \frac{x^2}{\mp a^2 + x^2}} \sqcap 1 + z$  ponendo  $2z + z^2 \sqcap \frac{x^2}{\mp a^2 + x^2}$ . Sed ut progressio fiat in infinitum, ita procedemus:

$$\begin{aligned} & \sqrt{1 + \frac{x^2}{\mp a^2 + x^2}} + \frac{x^4}{\mp a^2 + x^2, \square} - \frac{x^4}{\mp a^2 + x^2, \square} \\ 10 & \quad \frac{x^2}{\mp a^2 + x^2, \wedge 2} \quad \frac{-x^4}{\mp a^2 + x^2, \not\square} \sim \frac{\mp 2a^2 + 3x^2}{\mp a^2 + x^2} \\ & \quad \frac{x^2}{\mp a^2 + x^2} + \frac{x^4}{\mp a^2 + x^2, \square} \\ & \quad \frac{\mp 2a^2 + 2x^2 + x^2}{\mp a^2 + x^2} \end{aligned}$$

1 ergo (1) | curvae streicht Hrsg. | (a) huius momenta habemus (b) momenta habemus ipsarum g  
(2) momenta  $L - 2$  ex (1) verti (2) puncto (a) ultra verticem (b) versus  $L - 8$  fiat (1) in infinitum

faciemus ita:  $\sqrt{1 + \frac{x^2}{\mp a^2 + x^2}} \sqcap 1 + (2)$  in  $L$

9 Bei der quadratischen Ergänzung unter der Wurzel vergibt Leibniz den Faktor 4 im Nenner der letzten zwei Terme, was die Berechnung der weiteren Terme des Schemas beeinträchtigt.

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \cancel{a} + \cancel{bc} + \frac{b^2c^2}{4a^2} - & \cancel{\frac{b^2c^2}{4a^2}} & + \cancel{\frac{b^4c^2}{2a^2+bc,4,\square}} - & \cancel{\frac{b^4c^2}{2a^2+bc,4,\square}} \\
 \hline
 a \parallel & \frac{bc}{2a} & \frac{-b^2c^2}{2a^2+bc,,4} & & \frac{-b^4c^2}{2a^2+bc,\square,4,,\wedge 2a^2+bc,4,-b^2c^2} & \text{etc. } \square \\
 & & & & & \sqrt{a^2+bc} \\
 \hline
 a & \frac{bc}{2a} & \frac{2a+bc}{2a} & ) & \frac{2a^2+bc,,\wedge 2a^2+bc,4,-b^2c^2}{2a^2+bc,4} & ) \\
 \hline
 bc + \frac{b^2c^2}{4a^2} - & \cancel{\frac{b^2c^2}{4a^2}} & + \cancel{\frac{b^4c^2}{2a^2+bc,4,\square}}
 \end{array}$$

5

Regula continuandi haec est, ut numerator termini sequentis sit quadratum a numeratore proxime praecedentis, nominator autem eius sit numerator fractionis factae ex praecedentibus terminis omnibus ad commune nomen redactis, ductus in nominatorem ultimi.

Esto radix extrahenda ex 2. seu ex  $\sqrt{1+1}$ , fiet:

10

10–520,2 Nebenrechnungen:

$$\begin{array}{r}
 \frac{3}{2} - \frac{1}{12} \sqcap \frac{18-1}{12} \quad \frac{12}{34} \\
 \qquad \qquad \qquad \frac{17}{204} \\
 204 \left\{ \begin{array}{l} 2 \\ 102 \end{array} \right. \quad 12 \left\{ \begin{array}{l} 2 \\ 6 \\ 17 \end{array} \right\} 12
 \end{array}$$

1–5 In den Zählern der letzten zwei Terme der ersten Zeile des Schemas müßte  $b^4c^4$  stehen, im Nenner des dritten Terms der zweiten Zeile fehlt der Faktor  $a$ ; beides beeinträchtigt die Berechnung der weiteren Terme. 8f. ductus in nominatorem ultimi: Leibniz vergißt, mit dem Faktor 2 zu multiplizieren. Vgl. N. 32 S. 347 Z. 3–7. 10  $\sqrt{1+1}$ : Leibniz rechnet ab dem dritten Term der Reihendarstellung mit der fehlerhaften Regel, ein Schreibfehler in einer Nebenrechnung verzerrt das Ergebnis zusätzlich.

$\frac{3}{2} - \frac{1}{12} - \frac{1}{204} - \frac{1}{22432} - \frac{1}{167611904}$  etc. Ergo ratio diagonalis ad latus in quadrato, est ut  $\frac{3}{2} - \frac{1}{12} - \frac{1}{204} - \frac{1}{22432} - \frac{1}{167611904}$  etc. ad 1.

Eodem modo per extractionem radicis cubicae de 2. in infinitum continuatam, ex primi potest ratio lateris cubi dupli ad latus cubi dati; id est duplicatio cubi.

Quod si vero iam quaelibet harum fractionum ex quibus componitur numerus irrationalis, resolvatur in integros, patet in infinitas paraboloides resolvi posse figuram quamlibet. Eadem etiam ad radicum altiorum radices applicari possunt; addo id servire ad radices cognitas etiam ex affectis extrahendas.

Sed superest alia quoque ratio resolvendi radicem in infinitas alias quantitates, sed in quas ni fallor ipsa radix ingreditur:

$$\begin{array}{rccccccccc} & 17 & & 102 & & 208 & [?] & 208 & \underline{11\dot{2}16} \\ & 6 & & \underline{3} & & 204 & & 17 & 3536 \\ \hline 102 & & 306 & -17 - 1, ^{\wedge} 204 & & \underline{832} & & \underline{1456} & 208 \\ & & 17 & & & 2160 & & 208 & 3744 \\ & & \underline{289} & & & \underline{22432} & & \underline{3536} & \underline{7472} \\ & & 1 & & & & & & \\ & & \underline{288} & & & & & & \end{array}$$

$$\begin{array}{rccccc} & 22432 & & 8 & & \\ & 7472 & & \diagup & & \\ & \underline{44864} & & 4 & \diagdown & 2 \\ & & & 3 & & \\ & 157024 & & & & \\ & 89728 & & & & \\ & \underline{157024} & & & & \\ & & & & & \hline & & & & & 167611904 \end{array}$$

6f. c u b i . (1) Sed aliam (2) Quod  $L = 8$  posse (1) quantitatem (2) figuram  $L$

Ut esto:  $\sqrt{a^2 \pm bc} \sqcap a \pm z$ . Erit  $\boxed{a^2} \pm 2az + z^2 \sqcap \boxed{a^2} \pm bc$ ; et pro  $z$  substituendo eius valorem, fiet:  $z^2 \sqcap \pm bc - 2a\sqrt{a^2[\mp]bc} + 2a^2$  et  $z \sqcap \sqrt{\pm bc - 2a\sqrt{a^2[\mp]bc} + 2a^2}$ . Nam  $z \sqcap \pm \sqrt{a^2 \pm bc} \pm a$ , ex hypothesi. Ergo  $\pm 2az \sqcap 2a\sqrt{a^2 \pm bc} - 2a^2$ . Ergo  $z^2 \sqcap \pm bc - 2a\sqrt{a^2 \pm bc} + 2a^2$ . Et  $z \sqcap \sqrt{2a^2 \pm bc - 2a\sqrt{a^2 \pm bc}}$ . Et  $\sqrt{a^2 \pm bc} \sqcap a \pm \sqrt{2a^2 \pm bc - 2a\sqrt{a^2 \pm bc}}$ .

Haec methodus duo habet praeclera supra priorem; nam neque fractos introducit, ubi non iam tum adsunt, et quod superior non potest, finiri potest ubilibet, et servit ad alias figuras ad alias reducendas; ponendo  $\pm \sqcap -$  et  $bc \sqcap x^2$  fiet  $+\sqrt{2a^2 - x^2} - 2a\sqrt{a^2 - x^2} \sqcap -y + a$ , et fiet quadrando:

(2)  $a^2 - 2a\sqrt{a^2 - x^2} \sqcap y^2 + 2ya \boxed{+a^2}$ . Unde  $2a\sqrt{a^2 - x^2} \sqcap a^2 - y^2 - 2ya$ . et rursus quadrando:  $3\boxed{4}a^4 - 4a^2x^2 \sqcap \boxed{a^4} \boxed{-2a^2y^2} - 4a^3y + y^4 + 4y^3a + 2\boxed{4}y^2a^2$ . Sed calculo errorem inesse iudico, nam in  $2a\sqrt{a^2 - x^2} \sqcap a^2 - y^2 - 2ya$  substituendo pro  $\sqrt{a^2 - x^2}$  eius valorem  $y$ , fit  $y$  aequalis quantitati determinatae, quod est absurdum. Error ergo in calculo, resumamus.

$\sqrt{a^2 - x^2} \sqcap a - z$ . Ergo  $\boxed{a^2} - x^2 \sqcap \boxed{a^2} - 2az + z^2$ . Iam ex hypothesi  $z \sqcap a - \sqrt{a^2 - x^2}$ . Ergo  $-x^2 \sqcap -2a^2 + 2a\sqrt{a^2 - x^2} + z^2$ . sive  $z \sqcap \sqrt{+2a^2 - x^2 - 2a\sqrt{a^2 - x^2}}$  ut ante  $\sqcap a - \sqrt{a^2 - x^2}$ . Unde  $\sqrt{a^2 - x^2} \sqcap a - \sqrt{2a^2 - x^2 - 2a\sqrt{a^2 - x^2}}$ . Et videndum est an radix haec posterior possit esse impossibilis seu imaginaria, etsi prior sit realis, nimurum ponamus  $a \sqcap x + e$ . et  $2a^2 + f \sqcap x^2 + 2a\sqrt{a^2 - x^2}$ . Videamus an non ex hac hypothesi sequatur absurdum. Pro  $x$  pone  $a - e$ . Unde (2)  $a^2 + f \sqcap \boxed{a^2} - 2ae + e^2 + 2a\sqrt{\boxed{a^2 - a^2}} + 2ae - e^2$ .

2  $z^2 \sqcap (1) bc \pm 2a\sqrt{a^2 + bc}$  et  $z \sqcap \sqrt{bc \pm 2a\sqrt{a^2 + bc}}$ . | Ergo (a)  $\sqrt{a^2 + bc} \sqcap a \boxed{+ \sqrt{bc \pm 2a\sqrt{a^2 + bc}}}$   
 (b)  $\sqrt{a^2 \pm bc} \sqcap a \pm \underbrace{\sqrt{bc \pm 2a\sqrt{a^2 + bc}}}_{\sqrt{bc + 2a\sqrt{a^2 + bc}}}$  streicht Hrsg. | (2)  $\pm bc - | 2a\sqrt{a^2 + bc} + 2a^2$  et  $z \sqcap \sqrt{bc + 2a\sqrt{a^2 + bc}}$   
 $\sqrt{\pm bc - 2a\sqrt{a^2 + bc} + 2a^2}$ . ändert Hrsg. | (a) Nam  $z \sqcap \pm \sqrt{a^2 \pm bc} \pm a \sqcap \sqrt{\mp}$  (b) Nam  $L$  5 priorem;  
 (1) etsi enim in eo inferior (2) nam  $L$  15 f.  $\sqcap a - \sqrt{a^2 - x^2}$  (1), quod statim probari potest nam (2).  
 Unde  $L$

8 fiet quadrando: Auf der linken Seite der Gleichung fehlt der Term  $-x^2$ , auf der rechten müßte  $-2ya$  stehen. Leibniz bemerkt die Unstimmigkeit und setzt neu an.

et transponendo et  $a^2 + f + 2ae - e^2$  ducendo in se fiet:  $a^4 + 2a^2f + 4a^3e - 2a^2e^2 + f^2 + 4aef - 2fe^2 + 4a^2e^2 - 4ae^3 + e^4 \sqcap 8a^3e - 4a^2e^2$ . Sed hoc prolixius, manifestum aliunde est radicem eam fieri posse imaginariam,  $f \sqcap x^2 + 2a\sqrt{a^2 - x^2} - 2a^2$ . Optime id patebit, ponendo  $x$  talem ut radix extrahi possit ex quadrato  $a^2 - x^2$ . Pone  $x \sqcap 3$ .  $a \sqcap 5$ . fiet

5  $f \sqcap 9 + 40 - 50$ . Ergo  $f \sqcap -1$ . eoque casu radix realis manet:  $a^2 - x^2 \sqcap d^2$ , pone  $a \sqcap x+g$ .

fiet  $\boxed{x^2} + 2gx + g^2 \boxed{-x^2} \sqcap d^2$ . et  $\frac{d^2 - g^2}{2g} \sqcap x$ . Pone  $d \sqcap hg$ , erit  $x \sqcap \frac{h^2g - g}{2}$ , et pro  $g$

ponendo  $2m$  fiet:  $x \sqcap h^2m - m$ .  $d \sqcap 2hm$ . et  $a \sqcap h^2m \boxed{-m} + \boxed{2}m$ .

Pone  $h \sqcap 2$  et  $m \sqcap 10$ , fiet  $a \sqcap 50$ . et  $x \sqcap 30$ , et  $a^2 - x^2 \sqcap 2500 - 900$  seu 2500.

$$\begin{array}{r} 900 \\ \hline 1600 \end{array}$$

10

Ponendo  $h \sqcap 10$  et  $m \sqcap 10$  fiet  $a \sqcap 1000 + 10$ . et  $a^2 \sqcap$

$$\begin{array}{r} 100010 \quad [!]. \\ 100010 \\ \hline 1000100 \\ 100010000 \\ \hline 10002000100 \end{array}$$

15

$h \sqcap 3$  fiet:  $90 + 10 \sqcap 100 \sqcap a$ . et  $x \sqcap 80$ . et  $a^2 - x^2 \sqcap 10000 - 6400 \sqcap 10000$ . Unde

$$\begin{array}{r} 6400 \\ \hline 3600 \end{array}$$

$f \sqcap 6400 + \underbrace{2 \cdot 100}_{12000} \cdot \underbrace{60}_{-20000}$ .

20

Pone  $h \sqcap \frac{1}{2}$ . fiet  $a \sqcap \frac{10 + 40}{4}$ . et  $x \sqcap \frac{-30}{4}$ . fiet  $2500 - 900 \sqcap 1600$ .

In aequatione  $f \sqcap x^2 + 2a\sqrt{a^2 - x^2} - 2a^2$  substituendo valores inventos fiet:

$\boxed{h^4m^2} \boxed{-2h^2m^2} \boxed{+m^2} + \underbrace{2h^2m + 2m}_{\sim 2hm}, -\boxed{2}h^4m^2 - \boxed{6}\boxed{4}h^2m^2 - \boxed{2}m^2$  et  
 $4h^3m^2 + 4hm^2$

$\frac{f}{m^2} \sqcap 4h^3 + 4h - h^4 - 6h^2 - 1$ .

8 Pone (1)  $h \sqcap 10$ , et  $m \sqcap 100$ , fiet:  $a \sqcap 100000$  (!) +100  $\sqcap 100100$  et  $a^2 \sqcap$

$$\begin{array}{r} 10010000 \quad (2) \\ 1001 \\ \hline 10010000 \\ 100100 \\ \hline 10020010000 \end{array}$$

22 4(2) L ändert Hrsg.

Nam si  $x \sqcap 3.$  et  $a \sqcap 5.$  erit  $g \sqcap 2.$  et  $m \sqcap 1.$  et  $h \sqcap 2.$  Ita enim  $\frac{h^2g - g}{2} \sqcap 3.$  et  $h^2g + g \sqcap 5.$

$$\begin{array}{rccccc} 4h^3 & + & 4h & - & h^4 & - & [6]h^2 \\ & & & & & & -1 \\ 32 & + & 8 & - & 16 & - & [24] \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccccccc} (h^4m^2) & (-2h^2m^2) & (+m^2) & +4h^3m^2 & +4hm^2 & -(\textcircled{2})h^4m^2 & -6(\textcircled{4})h^2m^2 & -(\textcircled{2})m^2 \\ 16 & -8 & +1 & +32 & +8 & -32 & -16 & -2 \\ & & & \underbrace{\phantom{+32}}_{40} & & \underbrace{\phantom{-32}}_{-50} & & \\ & & & +32 & +8 & -16 & -24 & -1 \\ & & & \underbrace{\phantom{+32}}_{40} & & \underbrace{\phantom{-16}}_{-40} & & \\ & & & & & -1 & & \\ & & & & & & & \end{array}$$

Restat ergo examinandum an ita possibile sit  $f$  esse quantitatem affirmativam, nam si potest, radix realis imaginarie exprimi potest, instar cubicarum Cardani radicum ageometricarum.

Sed iam video id fieri non posse, quia mutatis omnibus signis et ordinando, fiet  $-f \sqcap h^4 - 4h^3 + 6h^2 - 4h + 1.$  quae est quantitas quadrato quadratica ab  $h - 1,$  ac proinde non potest esse negativa, nec proinde  $f$  affirmativa. Itaque de radicibus imaginariis aliter exprimendis parum hinc spero.

Valde notabile est ex progressione aliqua in infinitum continuata non semper sequi seriem esse termino ex quo fit aequalis; nisi demonstrari possit in infinitum continuando ultimum fore aequalis nihilo. Idque patet in posteriore meo extrahendi modo; ubi patet continuo radicem extracti posse, ita ut extractas partes non ingrediatur  $bc;$  sed tantum  $a.$

Generaliter quandocunque datur appropinquatio terminorum in infinitum accedentium; datur series infinita aequalis quantitati quaesitae. Nimur sumendo omnium ter-

3 4 L ändert Hrsg. 5 16 L ändert Hrsg. 13–15 radicum (1) non (2) ageometricarum. (a)  
Scilicet: fiet (b) Sed L

22 non ingrediatur  $bc:$  Leibniz berücksichtigt nicht, daß er in S. 521 Z. 7  $bc$  durch  $x^2$  ersetzt hat.

minorum accendentium differentias; eorum summa si quidem termini accedentes crescent (ut polygona inscripta v. g.) est aequalis termino quaesito. At si decrescent summa eorum aequatur excessui termini maximi super ignotam quantitatem.

Si recta secatur in extrema et media ratione observatum est, a quibusdam, hanc

5 seriem seu rationem numerorum,

$$1 \quad \frac{1}{2} \quad \frac{2}{3} \quad \frac{3}{5} \quad \frac{5}{8} \quad \frac{8}{13}$$

continue accedere ad rationem minoris termini ad maiorem.

Ego addo eius diff.

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{15} - \frac{1}{40} + \frac{1}{104}$$

10 quarum habetur summa aequalis rationi portioni minoris ad maiorem.

[Teil 2]

$$\begin{aligned}
 & \frac{b}{a}y^2 + cy + da \\
 & \frac{2b}{a}y\beta + c\beta \\
 & \frac{b}{a}y^2 + cy + da \quad \frac{b}{a}\beta^2 \\
 \not\equiv & \frac{\frac{a}{e}y^2 + fy + ga}{\frac{a}{e}y^2 + fy + ga} \not\equiv \frac{\frac{a}{e}}{\frac{a}{e}y^2 + fy + ga} \quad \square \\
 & \frac{2e}{a}y\beta + f\beta \\
 & \frac{e}{a}\beta^2
 \end{aligned}$$

15

10 Nach maiorem:  $\mathfrak{A}$

3 f. quantitatem. (1) Differentiae autem (2) Si  $L$

---

4 a quibusdam: z. B. von J. KEPLER, *Strena*, 1611, S. 12 (*KW* IV S. 270) u. *Harmonice mundi*, 1619, S. 76 f. u. 183 (*KW* VI S. 175 f. u. 294) sowie A. Girard in S. STEVIN, *L'arithmétique*, 1634, S. 169 f.

10 portioni: Die Partialsummen der Differenzenreihe ergeben die Folge  $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{3}{8}, \frac{5}{13}$  etc.

5

divisa per

10

15

1–526,9 NB. In hac fractione  $y^2$  et  $y$  tolli possunt ex numeratore ut inde fiat fractio cuius [numerator] constans et restabunt in denominatore quantitates arbitriae; quarum ope videndum est an nominator possit accipere formam quadrato-quadrati aut etiam quadrati.

17 hac (1) serie (2) fractione  $L$     17 ex (1) denominari (2) numeratore  $L$     18 nominator  $L$  ändert  
Hrsg.

$$\begin{aligned}
 & \frac{e^2}{a^2}y^4 + \frac{2e^2}{a^2}\beta y^3 + \frac{e^2}{a^2}\beta^2 y^2 \\
 & + \frac{ef}{a} \quad .. \quad + \frac{ef}{a}\beta \quad .. \\
 & \quad \quad + \frac{ega}{a} \quad .. \\
 & \frac{fe}{a} \quad .. \quad + \frac{2fe}{a}\beta .. \quad + \frac{fe}{a}\beta^2 \quad y \\
 & \quad \quad f^2 \quad .. \quad f^2\beta \quad .. \\
 & \quad \quad fga \quad .. \\
 & \frac{gae}{a} \quad .. \quad \frac{2gae}{a}\beta .. \quad \frac{gae}{a}\beta^2 \\
 & \quad \quad gaf \quad .. \quad gaf\beta \\
 & \quad \quad g^2a^2
 \end{aligned}$$

10 Si ex producto facere velis figuras geometricas, reice in numeratore omnia multiplicata per  $\beta^2$ , et in denominatore omnia in quibus est  $\beta$ , fiet:

$$\frac{\frac{ec}{a}y^2 + 2edy + fda}{\frac{fb}{a}.. + 2gb.. + gac} \text{ Et proinde } \frac{\frac{e}{a}y^2 + fy + ga}{a} \square$$

omnes figurae quae ordinatam habent valoris puri rationalis, qui ad hunc reduci potest, sunt quadrabiles. Hinc data aliqua serie, cuius terminus est valoris puri rationalis, sed 15 in qua abscissa  $y$  ingreditur denominatorem, ille denominator multiplicandus est per proxime maiorem, multiplicando totam fractionem per ipsam. Inde numerator cogitandus est compositus ex duabus partibus; altera multipla nominatoris initio dati, altera multipla proxime maioris. Multipla inquam per aliam quantitatem, ita ut ea per quam multipla est nominatoris sit proxime maior ea per quam multipla est proxime maioris [numerator] 20 quantitatis.

Pro figuris geometricis, fractio ordinatae valorem exhibens multiplicetur per denominatorem, denominator fiet quadratus. Si opus est videbitur adhuc fractio per aliam

14 aliqua (1) figura, cuius ordinata (2) serie  $L$  15 denominator, (1) radicandus est quadratus (2) multiplicandus  $L - 17f.$  multipla (1) radicis (2) nominatoris | initio dati erg. | altera (a) multiplum eiusdem radicis sed (b) multipla proxime maioris. (aa) Sed ita ut quantitas multipla ra (bb) Multipla  $L$  19 est (1) radix (2) nominatoris  $L - 19f.$  est proxime (1) maior radix (2) maioris | nominatore ändert Hrsg. | quantitatis  $L$

quantitatem quadratam multiplicari posse. Ac postea numerator quoque resolvendus. Sed ut hoc fiat facilius utile erit, continuatis eiusmodi tabulis constantem quandam progressum notare, tum ut in altioribus non sit opus calculatione tabulae, sed ut scribi statim possit; tum ut inde lux ad regressum habeatur. Praeterea, crediderim ita formula data tandem iudicari posse an eam aptari tali seriei possibile sit, an vero id sit impossibile, utcunque per formulas arbitrarias q u a d r a t a s multiplicetur. In numeris semper pro quadratis formulis sunt quasi triangulares, quantitatis in proxime maiorem.

Unum restat indagandum an possibile sit inveniri series inaequabiles, quarum differentiae sint aequabiles. Sunt autem inaequabiles aliae, quia in ipsis crescunt exponentes, aliae, quia non ex numero solo naturali componi possunt. Credibile est figuras geometricas quae non sunt quadrabiles per aequabilem, ut figura angulorum, esse per inaequabilem, ratione exponentium ut puto, sed aequabilitati mixtam. Figurae logarithmorum differentiae sunt applicatae hyperbolae.

5

10

5 an (1) in infinitum (2) eam  $L$

38<sub>16</sub>. DE SERIERUM SUMMIS ET DE QUADRATURIS PARS QUARTA DECIMA

Überlieferung: L Konzept: LH 35 V 4 Bl. 30–31. 1 Bog. 2°. 4 S. Isolierte Rechnung auf Bl. 31 v° rechts unten, schräg geschrieben (= S. 538 Z. 12–16) — Berechnung der Größen  $e, g, h, l$  auf LH 35 XII 2 Bl. 62 r° (Cc 2, Nr. 00 = S. 537 Z. 12–14). 4 Z. Auf dem Rest des Blattes Cc 2, Nr. 543 (Druck in einem späteren Band der Ausgabe).  
Cc 2, Nr. 775 A tlw., 00.

Pars XIV schediasmatis de seriebus et summis.

Si in formula sub finem tabulae praecedentis ponas  $e$ , et  $b$  nihilo aequales fiet

$$\frac{[\#]fda \pm gac}{f^2y^2 + f^2\beta y + gaf\beta}. \text{ Si iam nominatorem huius formulae cum ista conferas:}$$

$$+ 2fga.. + g^2a^2$$

$$f^2y^2 + 2maf y + m^2a^2 \text{ fiet: } \beta f + 2ga \sqcap 2ma, \text{ sive } m \sqcap \frac{\beta f + 2ga}{2a}. \text{ Ergo quia } a^2m^2 \sqcap$$

$$gaf\beta + g^2a^2 \text{ fiet: } \frac{\beta^2 f^2 + 4\beta fga + 4g^2a^2}{4} \sqcap gaf\beta (+g^2a^2), \text{ vel } \beta f \sqcap 0.$$

Quod cum sit contra propositum, quia  $f$  posita  $\sqcap 0$ . in nominatore restabit tantum  $g^2a^2$ , contra propositum, quia quaerimus quantitatem variantem. At  $\beta$  poni  $\sqcap 0$ . non licet, quia differentia alioquin quae quaeritur erit infinite parva seu nulla, quod non nisi in geometricis ordinatarum seriebus locum habet.

Hinc colligo seriem ipsarum  $\frac{1}{y^2}$  summaticem non posse habere terminorum sive ordinatarum valorem purum, in qua  $y$ , ultra  $y^2$  non ascendet in nominatore. Quare necesse esse ut ascendet altius; sed ut postea divisione etc. deprimatur differentia ad habendas  $\frac{1}{y^2}$ .

Videamus iam an quadrata unitate minuta, per saltum assumta, quae ita exprimi potest:  $\frac{1}{z^\wedge, z + \frac{1}{2}\beta}$ . ponendo  $\beta$  esse per quam crescent ipsae  $z$ . Quod si ponatur  $\beta$  aequale

10 # erg. Hrsg.

---

9 formula: N. 38<sub>15</sub> S. 526 Z. 11 f.

ipsi 4 erit series circuli quadratrix. Quam formulam, ut conferamus superiori, dividamus nominatorem superioris per  $f^2$ , fiet:  $y^2 \begin{cases} + f^{\frac{1}{2}}\beta y \\ + 2fga.. \end{cases}$  et conferenda:  $z^2 + \frac{1}{2}\beta z.$

$$\frac{f^{\frac{1}{2}}}{f^2}$$

explicando  $y$ , fiet  $y \sqcap z + d$ . et fiet:

$$\begin{aligned} \sqcap & \quad z^2 \begin{cases} + 2df & z \\ + f\beta & .. \\ + 2ga & .. \end{cases} \begin{cases} + d^2f^2 \\ + f^2\beta d \\ + 2fgad \\ + gaf\beta \\ + g^2a^2 \end{cases} \\ & \quad \underbrace{f}_{f^2} \quad \underbrace{\qquad\qquad\qquad}_{f^2} \\ & \quad \underbrace{\qquad\qquad\qquad}_{\sqcap} \\ & \quad \underbrace{z^2 + \frac{1}{2}\beta z}_{*} \end{aligned}$$

5

10

Iam si  $\frac{2df + f\beta + 2ga}{f} \sqcap \frac{1}{2}\beta$ . erit  $4df + \boxed{2}f\beta + 4ga \sqcap \boxed{f\beta}$ . ac proinde  $4df + f\beta +$

$4ga \sqcap 0$ . et  $g \sqcap \frac{-4df - f\beta}{4a}$ . et  $g^2 \sqcap \frac{4d^2f^2 + 8f^2d\beta + f^2\beta^2}{16a^2}$ . et inserendo hos valores,

$$\frac{\boxed{4d^2f^2a^2} + \boxed{4f^2\beta da^2} - 16\boxed{32}f^2d^2a^2 - 12\boxed{8}f^2\beta da^2}{16a^2} \quad \frac{\boxed{-16df^2a^2\beta} - 3\boxed{4}f^2a^2\beta^2}{16a^2}$$

$$\frac{\boxed{+4d^2f^2a^2} + \boxed{+8f^2d\beta a^2} + \boxed{+f^2\beta^2a^2}}{16a^2} \sqcap 0. \text{ sive } 16\cancel{f^2}d^2\cancel{a^2} - 12\cancel{f^2}\beta d\cancel{a^2} - 3\cancel{f^2}\cancel{a^2}\beta^2 \text{ sive } 16d^2 -$$

$$3\beta \sim 4d + \frac{9\beta^2}{4} \sqcap \frac{12\beta^2 + 9\beta^2}{4} \sqcap \frac{21}{4}\beta^2. \text{ sive } \pm 4d \pm \frac{3\beta}{2} \sqcap \frac{\beta}{2}\sqrt{21}. \text{ sive } d \sqcap \pm \frac{\beta/21 + 3\beta}{8}.$$

Quodsi ergo nullus error in calculo, videtur haberi exitus.

Quod cum sit magni momenti repetemus calculum:

1 Quam (1) seriem (2) formulam  $L$

---

13  $g^2 \sqcap \frac{4d^2f^2 + 8f^2d\beta + f^2\beta^2}{16a^2}$ : Der erste Term im Zähler müßte  $16d^2f^2$  lauten; in Z. 14 müßten die beiden ersten Koeffizienten 16 lauten. Dieser Fehler beeinträchtigt die Rechnung bis Z. 16. Leibniz überprüft anschließend das Ergebnis durch eine korrekte Kontrollrechnung.

$$\begin{array}{c}
 \boxed{\pm cf y^2} \quad \boxed{\pm fda y} \quad \boxed{\pm f\beta da} \\
 \boxed{\pm f\beta c ..} \quad \boxed{\pm ga^2d} \\
 \boxed{\pm cf ..} \quad \boxed{\pm fc\beta ..} \quad \boxed{\pm gac\beta}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc}
 5 & cy + c\beta & & \boxed{\pm fda ..} & \boxed{\pm ga^2d} \\
 & cy + da & + da & \boxed{\pm gac ..} & \\
 & \pm \frac{fy + ga}{f^2y^2 + 2fgay + g^2a^2} & \pm \frac{fy + f\beta}{f^2y^2 + 2fgay + g^2a^2} & \sqcap & \\
 & & + ga & + f^2\beta .. + f\beta ga &
 \end{array}$$

sive  $\frac{\pm fda\beta \pm gac\beta}{f^2y^2 + 2fgay + g^2a^2}$  ut ante, diviso nominatore per  $f^2$ , fiet nominator,

$$10 \quad + f^2\beta .. + f\beta ga$$

$$y^2 \left\{ \begin{array}{l} + 2gay \\ + f\beta .. \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} + g^2a^2 \\ + f\beta ga \end{array} \right. . \text{ Unde faciendo } \frac{2ga + f\beta}{f} \sqcap \frac{1}{2}\beta, \text{ sive } 4ga + \boxed{2}f\beta \sqcap \boxed{f\beta} \text{ fiet:}$$

$g \sqcap \frac{-f\beta}{4a}$  et  $g^2 \sqcap \frac{+f^2\beta^2}{16a^2}$ . Iam  $g^2a^2 + f\beta \neq 0$  fiet  $g \sqcap -\frac{f\beta}{a}$ . quod contradicit priori,  
quare ut haberi possit exodus quemadmodum paulo ante feci, explicanda est  $y$ , et po-

$$15 \quad \text{nenda } y \sqcap z + d.$$

$$\text{Unde ex formula } y^2 \left\{ \begin{array}{l} + 2fgay \\ + f^2\beta .. \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} + g^2a^2 \\ + f\beta ga \end{array} \right. \text{ ponendo } y \sqcap z + d, \text{ et } y^2 \sqcap z^2 + 2dz + d^2,$$

16 ex (1) aequatione (2) formula L

---

9 ut ante: S. 528 Z. 10; dort ist im Zähler  $\beta = 1$  gesetzt. 13 contradicit priori: S. 529 Z. 13.  
14 paulo ante: S. 529 Z. 3–11.

fiet:  $z^2 \left\{ \begin{array}{l} + 2df^2 z \\ + 2fga.. \\ + f^2\beta .. \end{array} \right. \overline{f^2} \left\{ \begin{array}{l} + d^2f^2 \\ + 2fgad \\ + f^2\beta d \\ + g^2a^2 \\ + f\beta ga \end{array} \right. \overline{f^2}$  comparanda cum formula:

$$z^2 + \frac{1}{2}\beta z \quad * \quad .$$

5

Ergo  $\frac{2df^2 + 2fga + f^2\beta}{f} \sqcap \frac{1}{2}\beta$ . sive  $4df + 4ga + \boxed{2}f\beta \sqcap \boxed{f\beta}$ . Ergo  $g \sqcap \frac{-4df - f\beta}{4a}$ .

et  $g^2 \sqcap \frac{+16d^2f^2 + 8df^2\beta + f^2\beta^2}{16a^2}$ . Quos valores inserendo in posteriore collatitia, fiet:

$$\begin{aligned} & 16d^2f^2\cancel{\alpha^2} - 32f^2d^2\cancel{\alpha^2} - 8f^2\cancel{\alpha^2}d\beta + 16f^2\beta d\cancel{\alpha^2} + 16d^2f^2\cancel{\alpha^2} + 8df^2\beta\cancel{\alpha^2} + f^2\beta^2\cancel{\alpha^2} \\ & - 16f^2\beta d\cancel{\alpha^2} - 4f^2\beta^2\cancel{\alpha^2} \sqcap 0, \end{aligned}$$

10

sive  $\left\{ \begin{array}{l} + 16d^2f^2 \\ + 16d^2f^2 \\ - 32d^2f^2 \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} - 8f^2d\beta \\ + 16f^2\beta d \\ + 8df^2\beta \\ - 16f^2\beta d \end{array} \right. \begin{array}{l} + f^2\beta^2 \\ - 4f^2\beta^2 \end{array} \right\} \sqcap 0$  quod est impossibile. Hac ergo methodo

15

solvi problema non potest. Unde patet explicationem  $y$  per  $z + d$ . nihil contulisse.

Si  $z$  explicassemus per  $y + h$ , et  $z^2$  per  $y^2 + 2hy + h^2$ , fieret:

$$\begin{aligned} y^2 & + 2hy + h^2 \\ & + \frac{1}{2}\beta.. + \frac{1}{2}\beta h \end{aligned}$$

20

conferenda cum  $y^2 \left\{ \begin{array}{l} + 2fgay \\ + f^2\beta.. \end{array} \right. \overline{f^2} \left\{ \begin{array}{l} + g^2a^2 \\ + f\beta ga \end{array} \right. \overline{f^2}$  .

Unde  $g \sqcap \frac{2hf^2 \left[ \frac{1}{2}f^2\beta - f^2\beta \right] - \frac{1}{2}f^4\beta}{2fa} \sqcap \frac{4hf - f\beta}{4a}$  et  $g^2 \sqcap \frac{16h^2f^2 - 8hf^2\beta + f^2\beta^2}{16a^2}$ . Et

his valoribus in ultima aequatione collatitia insertis, fiet:

25

$$\boxed{f^2 h^2} + \frac{1}{2} \beta h f^2 \sqcap \frac{\boxed{16h^2 f^2} - 8h f^2 \beta + f^2 \beta^2}{16} + \frac{4f^2 \beta h - f^2 \beta^2}{4}$$

seu  $\boxed{+ 8\beta h f^2}$   $\sqcap f^2 \beta^2 - 4f^2 \beta^2 \sqcap 0$ . quod est absurdum.  
 $\boxed{+ 8h f^2 \beta}$   
 $\boxed{- 16f^2 \beta h}$

5 Scilicet generaliter: ipsi  $y^2$   $\begin{cases} 2fgay \\ f^2 \beta .. \\ f^2 \end{cases}$   $\begin{cases} + g^2 a^2 \\ + f \beta ga \\ f^2 \end{cases}$  aequentur  $y^2 + ly + ma$ . et sumendo

$l$ , et  $m$ , quasi cognitas, fiet:

$$g \sqcap \frac{fl - f\beta}{2a}. \text{ et } g^2 \sqcap \frac{f^2 l^2 - 2f^2 l\beta + f^2 \beta^2}{4a^2}, \text{ quo valore in posteriore collatitia inserto,}$$

fiet:  $\cancel{f^2 l^2} \boxed{- 2f^2 l\beta} \boxed{+ f^2 \beta^2}, \boxed{+ 2f^2 \beta l} - \boxed{2} \cancel{f^2 \beta^2} \sqcap \cancel{f^2} ma$ . et deletis caeteris arbitrariis, fit  
10 aequatio:  $l^2 - \beta^2 \sqcap ma$ . Unde fit ut quandocunque  $ma$ . abest, fiat  $l \sqcap \beta$ . id est fiat progressio triangularis. Posita autem  $ma$ , adesse, series haberi poterit:  $\frac{1}{y^2 + ly + l^2 - \beta^2}$   
sumtis  $l$ . et  $\beta$ . pro arbitrio sed constantibus, et  $\beta$ . differentia abscissarum. Quodsi  $l$ . et  $\beta$ . aequales oritur series triangularis, si inaequales, v. g. ponendo  $l \sqcap 2$ . et  $\beta \sqcap 1$ . fiet:

$$\frac{1}{1+2+4-1} \quad \frac{1}{4+4+4-1} \quad \frac{1}{9+6+4-1} \quad \frac{1}{16+8+4-1} \quad \frac{1}{25+10+4-1} \quad \frac{1}{36+12+4-1} \quad \text{etc.}$$

$$\frac{1}{6} \quad \frac{1}{11} \quad \frac{1}{18} \quad \frac{1}{27} \quad \frac{1}{38} \quad \frac{1}{51}$$

Si potius malis  $l \sqcap 1$ . et  $\beta \sqcap 2$ . tunc  $\frac{1}{y^2 + ly + l^2 - \beta^2}$  dabit:

$$\frac{1}{1+1-3} \quad \frac{1}{4+2-3} \quad \frac{1}{9+3-3} \quad \frac{1}{16+4-3} \quad \frac{1}{25+5-3}$$

$$\frac{1}{-1} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{9} \quad \frac{1}{17} \quad \frac{1}{27} \quad \text{etc.}$$

Generaliter fractionum iniri poterit summa, si a nominatoribus triangularium fractionum constans quaedam subtracta intelligatur. Non perinde si addita.

2–5 absurdum. (1) Scilicet  $2fga + f^2 \beta$ , et  $g^2 a^2 + f \beta ga$  (2) Scilicet  $L$  12 abscissarum. (1)  
| Itaque seriei huiusmodi: *streicht Hrsg.* |  $\frac{1}{1+1+1-1} + \frac{1}{4+2+1-1} +$  (2) Quodsi  $L$  19 si (1) ad nominatores triangularium fractionum constans quaedam quantitas addita vel ab iis (2) a nominatoribus  $L$

Generalius omnium fractionum iniri potest summa, quarum numerator unitas, non minatores vero, quadrati numerorum arithmetice crescentium, aucti ipsis radicibus suis per datam multiplicatis et praeterea excessu quadrati datae, super quadratum intervalli ipsius arithmeticæ progressionis. Qui excessus nihilo minor esse potest, cum data minor est intervallo; et nihilo aequalis est, cum data et intervallum aequales, quo postremo casu res reddit ad seriem fractionum triangulare.

5

Sed ut videamus an non aequatio:  $y^2 + \frac{1}{2}\beta y$  altiore seriem, v. g. ad  $y^4$  assurgentem habeat summaticem, ideo multiplicando per  $\frac{e^2}{a^2}y^2 + hy + la$  fiet:

$$\begin{aligned} \frac{e^2}{a^2}y^4 &+ \frac{1}{2}\beta\frac{e^2}{a^2}y^3 + \frac{1}{2}h\beta y^2 + \frac{1}{2}la\beta y * \\ &+ h .. + la .. \end{aligned}$$

10

conferenda cum facto ex  $\frac{e}{a}y^2 + fy + ga$  in seipsum, et praeterea in  $\frac{2e}{a}\beta y + \frac{e}{a}\beta^2$   
 $+ f\beta$

---

1–6 Am Rande, zweite und dritte Spalte gestrichen:

$$\begin{array}{rcc} 1 & 3 & \\ & 3 & \\ 2 & 6 & \\ & 3 & \\ 3 & 9 & \\ & 3 & \\ 4 & 12 & \end{array}$$

2 crescentium, (1) ipsis radicibus suis per datam multiplicati, (2) aucti  $L - 3$  praeterea (1) differentia inter huius datae, et (2) excessu (3) excess (4) residuo quadrati d (5) excessu  $L - 4$  potest, cum (1) quadratum datae (2) data  $L$

fiet:

$$\begin{aligned} \frac{e^2}{a^2} y^4 &+ \frac{2e}{a} f y^3 + \frac{2e}{a} g a y^2 + 2 f g a y + g^2 a^2 \\ &+ f^2 \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &+ \frac{2e^2}{a^2} \beta \dots + \frac{2e}{a} f \beta \dots + \frac{2e}{a} \beta g a \dots \\ &+ \frac{e^2}{a^2} \beta^2 \dots + \frac{e}{a} f \beta^2 \dots + \frac{e \beta^2}{a} g a \\ &+ \frac{e}{a} \beta f \dots + f^2 \beta \dots + f \beta g a \end{aligned}$$

5

Conferendo terminos ultimos fiet:  $g^2 a^2 + e \beta^2 g + f \beta g a \sqcap 0.$  et  $g \sqcap \frac{-e \beta - f a, \wedge \beta}{a^2}.$

Conferendo penultimos, fiet,  $l \sqcap \frac{2 f g a + 2 e \beta g + \frac{e}{a} f \beta^2 + f^2 \beta}{\frac{1}{2} a \beta}$  quo valore ipsius  $l,$  in

antepenultimorum aequatione inserto, fiet:

$$h \sqcap \frac{\frac{2e}{a} g \not{a} + f^2 + \frac{2e}{a} f \beta + \frac{e^2}{a^2} \beta^2 + \frac{e}{a} \beta f - \frac{2 f g a + 2 e \beta g + \frac{e}{a} f \beta^2 + f^2 \beta}{\frac{1}{2} \beta}}{\frac{1}{2} \beta}.$$

10 Unde novissima aequatio haec erit ex terminis secundis collatis:

$$\frac{1}{2} \beta \frac{e^2}{a^2} + \frac{2 e g + f^2 + \frac{2e}{a} f \beta + \frac{e^2}{a^2} \beta^2 + \frac{e}{a} f \beta - \frac{2 f g a + 2 e \beta g + \frac{e}{a} f \beta^2 + f^2 \beta}{\frac{1}{2} \beta}}{\frac{1}{2} \beta} \sqcap + \frac{2 e f}{a} + \frac{2 e^2}{a^2} \beta.$$

et explicando  $g.$  multiplicandoque omnia per  $a^2 \beta^2,$  et omnino fractiones tollendo fiet:

$$\begin{aligned} &\boxed{\beta^3 e^2} - 7 \boxed{\beta^3 e^2} \boxed{+ 4 f^2 a^2 \beta} \boxed{+ 8 e f a \beta^2} \boxed{+ 4 e^2 \beta^3} \boxed{+ 4 e f \beta^2 a} - 16 f g a^3 - 16 e \beta g a^2 \\ &- 8 e f \beta^2 a \boxed{- 4 \beta^2 f^2 \beta a^2} \sqcap \boxed{4 e f a \beta^2} \boxed{+ 4 e^2 \beta^3} \text{ et fiet denique:} \end{aligned}$$

15  $+ 7 \beta^3 e^2 + 16 f g a^3 + 16 e \beta g a^2 + 4 f^2 \beta a^2 \sqcap 0.$  et explicando ipsam  $g.$  fiet:

12 fiet: Leibniz vergibt auf der linken Seite der folgenden Gleichung den Term  $-8 e f a \beta^2,$  was das Ergebnis der Umformung beeinträchtigt. Die folgende Kontrollrechnung ist, wie Leibniz selbst bemerkt, fehlerhaft.

$$\begin{aligned} & \boxed{\frac{7\beta^3 e^2}{I}} - 32 \boxed{\frac{16}{II}} f a e \beta \cancel{f} - 12 \boxed{\frac{16}{I}} f^2 a^2 \beta - 9 \boxed{\frac{16}{II}} e^2 \beta \cancel{f}^2 \left[ \boxed{-16e\beta^2 fa} + \boxed{4f^2\beta a^2} \right] \sqcap 0. \text{ sive} \\ & + 32 f a e \beta + 12 f^2 a^2 + 9 e^2 \beta^2 \sqcap 0. \end{aligned}$$

Operae pretium est eundem calculum bis facere ob eius momentum quae melior probandi ratio est, et sane expeditissima.

$$\begin{aligned} y^2 + \frac{1}{2}\beta y, \text{ multiplicetur per } \frac{e^2}{a^2}y^2 + hy + la, \text{ fiet:} \\ \frac{e^2}{a^2}y^4 + \frac{1}{2}\beta \frac{e^2}{a^2}y^3 + \frac{1}{2}\beta hy^2 + \frac{1}{2}\beta lay * \\ + h .. + la .. \end{aligned}$$

5

conferenda cum formula sequente:

$$\begin{aligned} \frac{e^2}{a^2}y^4 + \frac{2e}{a}f y^3 + 2eg y^2 + 2fga y + g^2a^2 \odot \\ + \frac{2e^2}{a^2}\beta .. + f^2 .. + 2e\beta g .. + e\beta^2g \\ + \frac{3\cancel{2}e}{a}f\beta .. + \frac{ef\beta^2}{a}.. + f\beta ga \\ + \frac{e^2}{a^2}\beta^2 .. + f^2\beta .. \\ + \boxed{\frac{e}{a}\beta f ..} \end{aligned}$$

10

Has duas formulas inter se conferendo, quia ultima posterioris nihilo seu loco vacuo prioris aequalis est, fiet:

15

$$g \sqcap \frac{-e\beta^2 - f\beta a}{a^2} \text{ et conferendo penultimos terminos, fiet:}$$

$$l \sqcap \frac{4fga^2 + 4e\beta ga + 2ef\beta^2 + 2f^2\beta a}{\beta a^2} \text{ et conferendo antepenultimos, fiet:}$$

$$h \sqcap \frac{\boxed{4ega^2\beta} + \boxed{2f^2a^2\beta} + 6eaf\beta^2 + 2e^2\beta^3 - 8fga^3 - 4\cancel{8}e\beta ga^2 - 4ef\beta a^2 - 2\cancel{4}f^2\beta a^2}{\beta^2 a^2}$$

et conferendo secundos, fiet:

18 Über  $-4ef\beta a^2$ : Hinc ob positam  $\beta a^2$ , pro  $\beta^2 a$ , error in sequentibus.

$$\beta^2 e^2 \underbrace{+ 8ega^2 \beta}_{\text{III}} \underbrace{+ 4f^2 a^2 \beta}_{\text{II}} \underbrace{+ 12eaf\beta^2}_{\text{I}} \underbrace{+ 4e^2 \beta^3}_{\text{I}} - 16fga^3 - 8\underbrace{16}_{\text{III}} e\beta ga^2 \underbrace{- 8ef\beta a^2}_{\text{II}} -$$

$$4\underbrace{8f^2 \beta a^2}_{\text{II}} \sqcap \underbrace{4efa\beta^2}_{\text{I}} \underbrace{+ 4e^2 \beta^3}_{\text{I}}, \text{ sive,}$$

$\beta^3 e^2 - 16fga^3 - 8e\beta ga^2 - 4f^2 \beta a^2 \sqcap 0.$  et explicando  $g$ , fiet:

$$\beta^3 e^2 + 16fae\beta^2 + 12\underbrace{16}_{\text{I}} f^2 \beta a^2 + 8e^2 \beta^3 + 8e\beta^2 af \underbrace{- 4f^2 \beta a^2}_{\text{I}} \text{ sive}$$

5      $9\beta^{\frac{3}{2}} e^2 + 32fae\beta^{\frac{3}{2}} + 12f^2 \beta a^2 \sqcap 0.$  prorsus ut supra, ut adeo de hoc calculo possimus esse certi.

$$\text{Unde } \beta^2 e^2 + \frac{32}{9} fae\beta + \frac{32}{81} \sqrt[3]{32} f^2 a^2 \sqcap \frac{32, 32}{81, 4} f^2 a^2 - \frac{12f^2 a^2}{9}.$$

$$\text{Unde } \pm \beta e \pm \frac{32fa}{18} \sqcap fa \sqrt{\frac{32, 32, - 12, 9, 4}{81, 4}} \sqcap \frac{fa\sqrt{592}}{18}. \text{ sive } e \sqcap \frac{fa}{18\beta} \sim -32 \pm \sqrt{592},$$

sive  $e \sqcap \frac{fa}{\beta} \sim \frac{-32 \pm \sqrt{592}}{18}$ . Unde patet  $e$  esse quantitatem negativam. Hic valor  $e \sqcap$

$$10 \quad \frac{-32fa \pm fa\sqrt{592}}{18\beta}, \text{ inseratur valori } g, \text{ erit } g \sqcap \frac{+32fa\beta^2 \pm fa\beta^2\sqrt{592} - f\beta^2 a}{\beta a^2}, \text{ sive } g \sqcap$$

$$\frac{31f\beta \pm f\beta\sqrt{592}}{a}.$$

6     *Neben certi: Imo inest error.*

7–11     *Nebenrechnungen und Nebenbetrachtungen:*

$$\begin{array}{r} 32 & 81 & 36 & 1024 \\ 32 & 4 & 12 & 432 \\ \hline 64 & 324 & 72 & 592 \\ 96 & & 36 \\ \hline 1024 & & 432 \end{array}$$

$$10-537,1 \quad g \sqcap \frac{31f\beta \pm f\beta\sqrt{592}}{a}. \quad (1) \text{ Ita} \quad (2) \text{ Sed quoniam tota fractio} \quad (3) \text{ Multiplicando } L$$

$$5 \text{ ut supra: S. 535 Z. 2.} \quad 10 \text{ erit } g: \text{ Konsequenter wäre } g \sqcap \frac{32fa\beta^2 \pm fa\beta^2\sqrt{592} - 18f\beta^2 a}{18\beta a^2} \sqcap$$

$\frac{14f\beta \pm f\beta\sqrt{592}}{18a}.$      13 error in sequentibus: Der Fehler beeinträchtigt die Rechnung bis Z. 11 sowie in N. 38<sub>17</sub>.

Multiplicando autem per  $\frac{e^2}{a^2}y^2 + hy + la$  fractionis  $\frac{1}{y^2 + \frac{1}{2}\beta y}$  non tantum nominatum, ut iam praestitimus, sed et numeratorem fiet:

$$\frac{1}{y^2 + \frac{1}{2}\beta y} \sqcap \frac{\frac{e^2}{a^2}y^2 + hy + la}{\frac{e^2}{a^2}y^4 + \frac{1}{2}\beta \frac{e^2}{a^2}y^3 + \frac{1}{2}\beta hy^2 + \frac{1}{2}\beta lay} \quad \mathfrak{D},$$

$$+ h .. + la ..$$

cuius nominatorem cum nominatori fractionis generalis summam seriei recipientis contulerimus cum successu, unum superest, ut si licet eadem felicitate et numeratores conferamus. Quod antequam faciam, repetendus est calculus, quo fractionis generalis numerator habitus est.

5

Malo enim bis idem agere, quam semel nihil.

Setzung:  $\pm \sqcap \frac{p}{a}, \sqrt{592} \sqcap \frac{q}{a}$ .

10

Berechnung der Größen  $e, g, l, h$  auf LH 35 XII 2 Bl. 62 r<sup>o</sup>:

$$e \sqcap \frac{-32fa^2 + fpq}{18\beta[a]} \quad g \sqcap \frac{31f\beta[a^2] - [f]p\beta q}{[a^3]}$$

$$l \sqcap \frac{4fga^2 + 4e\beta ga + 2ef\beta^2 + 2f^2\beta a}{\beta a^2}$$

$$h \sqcap \frac{6eaf\beta^2 + 2e^2\beta^3 - 8fga^3 - 4e\beta ga^2}{[bricht ab]}$$

$$12 \text{ a erg. Hrsg.} \quad 12 \frac{31f\beta a - p\beta q}{a} L \text{ ändert Hrsg.} \quad 14 (1) h \sqcap \frac{-4ega^2\beta - 2f^2a^2\beta + 6eaf\beta^2 + 2e^2\beta^3 - 8fga^3}{(2) h \sqcap \dots L}$$

2 praestitimus: S. 535 Z. 6 f.

$$\begin{aligned}
 & \frac{b}{a} y^2 + cy + da \\
 & \frac{2b}{a} \beta y + c\beta \\
 \text{Fractio composita erat: } & \frac{\frac{b}{a} y^2 + cy + da}{\frac{e}{a} y^2 + fy + ga} \pm \frac{\frac{b}{a} \beta^2}{\frac{e}{a} y^2 + fy + ga} \\
 & \frac{2e}{a} \beta y + f\beta \\
 & \frac{e}{a} \beta^2
 \end{aligned}$$

5

Unde multiplicando nominatorem per nominatorem habuimus nominatorem illum signo ⊕. cum altero signo ⊖. hactenus collatum: restat ut numeratorem multiplicatione per crucem coniunctis productis factum, sub finem plagulae praecedentis positum, et sub initium sequentis repetito calculo examinandum cum numeratore signi ⊖. conferamus.

10 Vid. plag. seq.

1–5 Daneben isolierte Rechnung, schräg geschrieben:

$$\begin{array}{r}
 30 \\
 2 \\
 \hline
 60 \\
 8 \\
 \hline
 480
 \end{array}$$

3 erat: N. 38<sub>15</sub> S. 524 Z. 12–16.      7 signo ⊕: S. 535 Z. 9–13.      8 praecedentis: N. 38<sub>15</sub> S. 525 Z. 1–16.      9 sequentis: N. 38<sub>17</sub> S. 539 Z. 7 – S. 540 Z. 16.

38<sub>17</sub>. DE SERIERUM SUMMIS ET DE QUADRATURIS PARS QUINTA DECIMA

**Überlieferung:** L Konzept: LH 35 V 4 Bl. 32–33. 1 Bog 2°. Ca 2 1/2 S. Bl. 33 v° leer.  
Cc 2, Nr. 775 A tlw.

## Pars XV

5

Nimirum fiet ordinando:

$$\begin{array}{l} \text{formula multiplicanda} \\ \frac{e}{a} y^2 + \frac{2e}{a} \beta y + \frac{e}{a} \beta^2 \\ \quad + f \dots + f\beta \\ \quad \quad + ga \end{array}$$

$$\text{per formulam} \quad \ddagger, \left\{ \frac{b}{a} y^2 + cy + da \right.$$

10

$$\begin{aligned} & \left. \begin{array}{c} \boxed{edy^2} \quad 2e\beta dy \quad e\beta^2 d \\ \boxed{fda..} \quad f\beta da \\ \boxed{ga^2d} \end{array} \right\} \\ & \ddagger \left. \begin{array}{c} \boxed{\frac{e}{a} cy^3} \quad \frac{(2)e}{a} \beta c \dots \quad \frac{e}{a} \beta^2 c \dots \\ \boxed{fc..} \quad \boxed{f\beta c..} \\ \boxed{gac..} \end{array} \right\} \\ & \left. \begin{array}{c} \boxed{\frac{eb}{a^2} y^4} \quad \boxed{\frac{2e\beta b}{a^2} ..} \quad \boxed{\frac{e\beta^2 b}{a^2} ..} \\ \boxed{\frac{fb}{a} ..} \quad \boxed{\frac{f\beta b}{a} ..} \\ \boxed{gb..} \end{array} \right\} \end{aligned}$$

15

Hoc productum concordat cum superiore sub finem plagulae praecedentem praecedentis, itaque dubitandum non est de calculi veritate.

Eodem modo fiet ordinando,

$$\text{formula multiplicanda } \frac{b}{a} y^2 \quad \frac{2b\beta}{a} y \quad \left. \begin{array}{l} \frac{b}{a} \beta^2 \\ c .. \\ c\beta \\ da \end{array} \right\} \ddagger$$

5

per formulam:  $\frac{e}{a} y^2 + f .. + ga$

---

10

$$\left. \begin{array}{c} \boxed{bgy^2} \quad 2b\beta gy \quad b\beta^2 g \\ \boxed{cga ..} \quad c\beta ga \\ \boxed{dga^2} \\ \hline \boxed{\frac{b}{a} fy^3} \quad \frac{\cancel{2}b\beta f}{a} .. \quad \frac{b}{a} \beta^2 f .. \\ \boxed{cf ..} \quad \boxed{c\beta f ..} \\ \boxed{daf ..} \\ \hline \boxed{\frac{be}{a^2} y^4} \quad \boxed{\frac{2b\beta e}{a^2} ..} \quad \boxed{\frac{b\beta^2 e}{a^2} ..} \\ \boxed{\frac{ce}{a} ..} \quad \boxed{\frac{c\beta e}{a} ..} \\ \boxed{\frac{d\phi e}{\phi} ..} \end{array} \right\} \ddagger$$

15

Hoc productum rursus convenit cum superiore quod est sub finem plagulae praecedentem praecedentis possumusque de hac quoque calculi parte securi esse.

---

1 f. praecedentem praecedentis: N. 38<sub>15</sub> S. 525 Z. 1–7      17 f. praecedentem praecedentis: N. 38<sub>15</sub>  
S. 525 Z. 8–16

Et quoniam haec duo producta contrariis signis afficiuntur, destruantur quae convenient.

Absolutis ergo destructionibus, restabit numerator totalis,

$$\text{nempe } \left\{ \begin{array}{l} \pm \frac{e}{a} \beta c y^2 \mp 2e\beta dy \mp e\beta^2 d \\ \pm \frac{b}{a} \beta f .. \mp \frac{e}{a} \beta^2 c .. \mp f\beta da \\ \quad \pm 2b\beta g .. \mp b\beta^2 g \\ \pm \frac{b}{a} \beta^2 f .. \mp c\beta ga \end{array} \right. \quad 5$$

in quo literae,  $a$ .  $\beta$ . cognitae: literae autem  $e$ . et  $g$ ,  $h$ . pendent ab  $f$ . ac proinde explicanda, si  $f$ . quaerimus. Denique,  $b$ .  $c$ .  $d$ . sunt indeterminatae a se invicem independentes: 10 quas tentemus determinare, conferendo cum superiore numeratore, seu formula:

$$e^2 y^2 + ha^2 y + la^3$$

ubi  $h$ . et  $l$ . quoque pendent ab  $f$ . Tamdiu ergo differemus quaerere  $f$ . quamdiu non cogemur.

Ex prima collatione fiet  $b \sqcap \pm \frac{e^2 a + e\beta c}{\beta f}$ . 15

Ex secunda:  $\pm 2e\beta daf \mp e\beta^2 cf + 2e^2 a^2 g \pm 2e\beta acg + 2e^2 a\beta f \mp 2e\beta^2 cf \sqcap ha^3 f$  et fiet  
 $c \sqcap \frac{ha^3 f \pm 2e\beta daf - 2e^2 a^2 g - 2e^2 a\beta f}{\pm e\beta^2 f \pm 2e\beta ag \pm 2e\beta^2 f}$ .

Ex tertia:  $\pm e\beta^2 d \mp f\beta da \mp b\beta^2 g \mp c\beta ga \sqcap la^3$ , sive  $\pm e\beta^2 d \mp f\beta da + \frac{e^2 a\beta^2 g \pm e\beta^3 cg}{\beta f} \pm c\beta ga \sqcap la^3$ .

5–8 Neben dem Schema:  $\frac{p}{a} \sqcap \pm$ .

13 f. Tamdiu ... cogemur. erg. L

20  $\frac{p}{a} \sqcap \pm$ : vgl. N. 38<sub>16</sub> S. 537 Z. 10.

Quoniam vero quaerimus  $d$ , et in  $c$ . latet  $d$ , ideoque  $c$ . per brachylogiam ita exprimemus:  $c \sqcap \frac{ma^4 \pm 2e\beta daf}{na^3}$ , adeoque

$\mp e\beta^2 dna^3\beta f \mp f\beta dana^3\beta f + e^2 a\beta^2 gna^3 \mp e\beta^3 ma^4 g + 2e\beta^3 e\beta daf g \mp ma^4 \beta ga\beta f + 2e\beta daf\beta ga\beta f \sqcap la^3 na^3\beta f$  eritque

$$5 \quad d \sqcap \frac{la^3 na^3\beta f - e^2 a\beta^2 gna^3 \mp e\beta^3 ma^4 g \mp ma^4 \beta ga\beta f}{\mp e\beta^2 na^3\beta f \mp f\beta ana^3\beta f + 2e\beta^3 e\beta afg + 2e\beta af\beta ga\beta f}.$$

Posito ergo  $f$ . esse quamlibet cognitam pro arbitrio sumtam, etiam *e.g. h. m. n.* cognitae erunt, et satisfactum est collationi.

Quoniam patet superesse  $f$  supernumerariam, nec tamen ab ea possit oriri variatio, cum problema sit determinatum, ideoque necesse est eam destrui. Quod ut videamus,

10 utile est quamlibet literam quae  $f$  continet, explicari; eatenus saltem, quatenus  $f$  continet, itaque pro  $g$  ponemus  $\frac{\gamma f}{a}$ , pro  $e$  ponemus:  $\frac{Ef}{a}$ , pro  $h$  ponemus  $\frac{Hf^2}{a}$ , pro  $l$  ponemus  $\frac{\lambda f^2}{a^2}$ , pro  $m$  ponemus  $\frac{\mu f^3}{a^3}$ , et pro  $n \sqcap \frac{Nf^2}{a^2}$ , sed hoc credo sub exitum sufficere, ubi destruendi  $f$  tempus erit.

Antequam autem explicemus  $d$ ,  $c$ ,  $b$ , explicabimus distinete  $l$ , et  $h$ :

$$15 \quad \beta a^2 l \sqcap 4fa^2, + 4\beta \alpha \sim \frac{-32fa \mp fa\sqrt{592}}{18\beta}, \sim \frac{31f\beta \pm f\beta\sqrt{592}}{\alpha},,,$$

$$\frac{-64f^2 a\beta^2 \mp 2f^2 a\beta^2 \sqrt{592}}{18\beta} + 2f^2 \beta a$$

$$18\beta 4fa 31f\beta \pm 18\beta 4fa f\beta \sqrt{592} - 4\beta 31fa 31f\beta \pm 4\beta 32fa f\beta \sqrt{592}$$

$$\text{sive } l \sqcap \frac{\mp 4\beta fa\sqrt{592}, 31f\beta - 4\beta fa\sqrt{592}, f\beta\sqrt{592} - 64f^2 a\beta^2 \mp 2f^2 a\beta^2 \sqrt{592} + 18\beta 2f^2 \beta a}{18\beta^2 a^2}$$

14  $l$ , et  $h$  (1), est autem (a)  $l \sqcap 128f^2 a\beta$  (b)  $l \sqcap 124f\beta a \pm 4f\beta a\sqrt{592}$  (2): (a) Sed ut hoc quoque tutius procedat, utile arbitror, numeros adhibere, quo facilius error vitetur (b)  $\beta a^2 l L$

14  $l$ , et  $h$ : Leibniz verwendet für  $g$  den falschen Wert aus N. 38<sub>16</sub> S. 536 Z. 11; konsequent gerechnet, müßte in Z. 17 der dritte Term des Zählers  $-4\beta 32fa 31f\beta$  lauten. Leibniz vermutet schließlich einen Fehler und beginnt eine Kontrollrechnung.

Unde  $l \sqcap \frac{-4008f^2 \pm 182f^2\sqrt{592}}{18a}$ .

Cum vero etiamnum verear, ne aliquis in ipsa denominatorum collatione error insit, resumere placet tertia vice, et quidem adhibitis numeris, necesse est enim, ut me assuefaciam usui numerorum in calculo analytico. Esto  $a \sqcap 1$ .  $\beta \sqcap 4$ .  $f \sqcap 2$ .  $e \sqcap 3$ .

et fiet  $\frac{-2f4\beta a - 3e16\beta^2 + 57\lambda a}{[a^2]} \sqcap g$ .

5

$$70l \sqcap \frac{\frac{8}{4}2fga^2 + \frac{3}{4}3e4\beta ga + \frac{3}{2}3e2f16\beta^2 + \frac{3}{2}4f^24\beta a}{4\beta a^2}$$

$$78h \sqcap \frac{\frac{3}{4}3ega^2 + \frac{8}{2}4f^2a^2 + \frac{9}{6}3e2f4\beta a + \frac{9}{2}9e^216\beta^2 - \frac{4}{2}70la^3}{4\beta a^2}$$

1 Nebenrechnungen:

$$\begin{array}{rccccc}
 18 & -592 & -31 & 2 & \pm 32 & \pm 2 & \pm 18 & \pm 31 \\
 \underline{4} & \underline{4} & \underline{31} & \cancel{2} \cancel{4} 4 & \underline{4} & \underline{4} & \underline{4} \\
 72 & -2368 & 31 & \cancel{4} \cancel{0} \cancel{0} 8 \cancel{f} 2 2 2 & \pm 128 & \pm 72 & \pm 124 \\
 \underline{31} & & \underline{93} & \cancel{1} \cancel{8} \cancel{8} 8 & & & \pm 128 \\
 72 & & 961 & \cancel{1} 1 & & & \underline{\pm 2} \\
 \underline{216} & & \underline{4} & & & & \pm 254 \sqrt{592} \\
 + 2232 & & -3844 & & & & \underline{\pm 72 \sqrt{592}} \\
 \underline{+ 36} & & -2368 & & & & \pm 182 \sqrt{592} \\
 + 2268 & & \underline{- 64} & & & & \\
 \underline{- 6276} & & -6276 & & & & \\
 - 4008 & & & & & &
 \end{array}$$

5 fiet (1)  $g \sqcap \frac{-2f4\beta a - 3e16\beta^2}{a}$  (2) |  $\frac{-2f4\beta a - 3e16\beta^2 + 57\lambda a}{a}$  ändert Hrsg. |  $\sqcap g L$

5  $+57\lambda a$ : Leibniz verwendet für  $g$  zunächst den Wert der Stufe (1) der Lesart, dann addiert er im Zähler  $57\lambda a$ , um für die Kontrollzahl von  $g$  den Wert  $1 = \frac{-56 + 57}{1}$  zu erhalten.

et pro 70  $l$  substituendo eius valorem inventum multiplicandoque omnia per  $4\beta a$ , ut et communem hunc divisorem habere possint fiet

$$\frac{\begin{array}{c} \text{III} \\ \boxed{4}3ega^24\beta \end{array} + \begin{array}{c} \text{V} \\ \boxed{2}4f^2a^24\beta \end{array} + \begin{array}{c} \text{IX} \\ \boxed{2}\boxed{6}3e2f16\beta^2a + \begin{array}{c} \text{IX} \\ \boxed{2}9e^264\beta^3 \end{array} \\ \parallel \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{VI} \\ 78h \end{array} - \begin{array}{c} \text{II} \\ \boxed{8}2fga^3 - \begin{array}{c} \text{III} \\ \boxed{4}\boxed{8}3e4\beta ga^2 - \begin{array}{c} \text{III} \\ \boxed{4}3e2f16\beta^2a \end{array} \end{array} - \begin{array}{c} \text{VIII} \\ \boxed{2}\boxed{4}4f^24\beta a^2 \end{array} \\ \hline \begin{array}{c} \text{VII} \\ 16\beta^2a^2 \end{array}$$

5 sive  $\frac{\frac{\emptyset}{78h} \cdot \frac{3}{\boxed{2}3e2f16\beta^2a + \boxed{2}9e^264\beta^3 - \frac{2}{\boxed{8}2fga^3 - \frac{\emptyset}{\boxed{4}3e4\beta ga^2 - \frac{4}{\boxed{2}4f^24\beta a^2}}}{16\beta^2a^2}}$  et confe-

rendo terminos secundos, fiet:

$$\begin{array}{c} \boxed{4}\beta9e^2 + \boxed{2}78ha^2 \cdot \boxed{4}3ea2f + \boxed{3}\boxed{4}9e^24\beta + 24\mu a^2 \text{ sive explicata } h, \text{ fiet:} \\ \begin{array}{c} \boxed{4}\boxed{3e2f16\beta^2a} + \boxed{4}9e^264\beta^3 - \frac{4}{\boxed{16}}2fga^3 - \frac{3}{\boxed{8}}3e4\beta ga^2 - \frac{8}{\boxed{4}}4f^24\beta a^2 \\ \hline \boxed{4}\boxed{16\beta^23ea2f} + \boxed{3}\boxed{16\beta^29e^24\beta} + \frac{\emptyset}{16\beta^224\mu a^2}. \end{array} \end{array}$$

10 Dividi autem possunt omnia per  $\beta$ . Porro ordinando ut radix extrahi possit seu haberi  $e$  absolute; fiet:

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \text{IV} \\ \boxed{4}3ega^24\beta \end{array} + \begin{array}{c} \text{X} \\ \boxed{2}4f^2a^24\beta \end{array} + \begin{array}{c} \text{IX} \\ \boxed{4}\boxed{6}3e2f16\beta^2a + \begin{array}{c} \text{IX} \\ \boxed{2}9e^264\beta^3 \end{array} \\ \hline \begin{array}{c} \text{I} \\ -\boxed{8}2fga^3 - \begin{array}{c} \text{III} \\ \boxed{4}\boxed{8}3e4\beta ga^2 - \begin{array}{c} \text{III} \\ \boxed{4}3e2f16\beta^2a \end{array} - \begin{array}{c} \text{VIII} \\ \boxed{4}4f^24\beta a^2 \end{array} \end{array} \\ \hline \begin{array}{c} \text{VI} \\ 16\beta^2a^2 \end{array} \end{array} \end{array} \text{ fiet (1) } | 78h \text{ n } \text{ (!) streicht} \\ Hrsg. | \text{Porro } \frac{e^2}{a^2} \text{ (2) } 78 \text{ h L } \quad \begin{array}{c} \text{VI} \\ 8 - \frac{4}{\boxed{16}}2fga^3 \text{ erg. L} \end{array}$$

VI

4 78h n: Leibniz führt die Neunerprobe vor dem Reduzieren der Terme im Zähler durch.

8  $-\frac{4}{16}2fga^3$ : Leibniz hatte den Term zunächst vergessen. Nach dem Einfügen korrigiert er die durch weitere Flüchtigkeitsfehler beeinträchtigte Rechnung nicht mehr, sondern setzt auf dem nächsten Bogen neu an. Die Teilbarkeitsbemerkung hinsichtlich  $\beta$  trifft nach der Ergänzung nicht mehr zu.

$$9e^2 - \boxed{8} \frac{ga^2}{16\beta^2} 3e + \frac{g^2a^4}{\boxed{4}256\beta^4} \sqcap \frac{g^2a^4 + \boxed{16}4f^2a^216\beta^2 + \boxed{4}4\beta24\mu a^216\beta^2}{\boxed{4}256\beta^4}$$

sive  $\pm 3e \pm \frac{ga^2}{\boxed{2}16\beta^2} \sqcap \frac{\sqrt{g^2a^4 + \boxed{16}\beta^24f^2a^2 + \boxed{4}4\beta24\mu a^216\beta^2}}{\boxed{2}16\beta^2}$

2 Nebenrechnungen:

24	Dazu gestrichen :	16
<u>16</u>	1 3	<u>16</u>
144	<del>6</del> <u>2</u> 0 9	256
<u>24</u>	<u>7</u> 7	<u>4</u>
384	<del>4</del> <u>9</u> 4 9 [!]	1024
<u>4</u>	1	6144
1536		<u>1</u>
<u>4</u>	Zur ersetzen Lesart,	7169
6144	nicht gestrichen :	
64	1 2	7
<u>1</u>	<del>6</del> <u>1</u> 6 1	<u>7</u> <u>1</u> 6 9
6209	<u>7</u> 9	<u>8</u>
	<del>4</del> <u>9</u> 4 9	<del>6</del> <u>4</u> 6
	1	1

[Rechnung bricht ab]

12–15 linke Spalte (1) 6144 (2) 6144 L

16	64
<u>1</u>	<u>1</u>
6161	6209

38<sub>18</sub>. DE SERIERUM SUMMIS ET DE QUADRATURIS PARS SEXTA DECIMA

Überlieferung: L Konzept: LH 35 V 4 Bl. 34–36. 1 1/2 Bog. 2°. Ca 3 1/2 S. Bl. 35 v° u. 36 v° leer. Textfolge Bl. 34 r°, 34 v°, 36 r°, 35 r°.  
Cc 2, Nr. 775 B, C.

5

[1. Ansatz]

$$(1) g \sqcap \frac{-e\beta^2 - f\beta a}{a^2} \text{ ex ultimis terminis collatis.}$$

$$(2) l \sqcap \frac{4afga + 4ae\beta g + 2ef\beta^2 + 2af^2\beta}{\beta a^2} \text{ ex penultimis collatis.}$$

$$\boxed{4a^2eg\beta} \boxed{+2a^2f^2\beta} + 2\boxed{6}ae f\beta^2 + 2e^2\beta^3$$

$$-8fga^2 - 4\boxed{8}e\beta ga^2 \boxed{-4ef\beta^2a} - 2\boxed{4}f^2\beta a^2$$

$$10 \quad (3) h \sqcap \frac{\boxed{4a^2eg\beta} \boxed{+2a^2f^2\beta} + 2\boxed{6}ae f\beta^2 + 2e^2\beta^3}{\beta^2a^2} \text{ ex antepenultimis collatis et}$$

destructis destruendis:

$$(4) h \sqcap \frac{2ae f\beta^2 + 2e^2\beta^3 - 8fga^3 - 4e\beta ga^2 - 2f^2\beta a^2}{\beta^2a^2}.$$

Iam ex secundis collatis, fiet:

$$(5) \beta^3 e^2 \boxed{+4ae f\beta^2} \boxed{+4e^2\beta^3} - 16fga^3 - 8e\beta ga^2 - 4f^2\beta a^2 \sqcap \boxed{4ef\beta^2a} \boxed{+4e^2\beta^3} \text{ et}$$

15 destructis destruendis, atque ordinando fiet:

$$(6) e^2 - \frac{8ga^2}{\beta^2} e + \frac{16\boxed{64}g^2a^4}{\boxed{4}\beta^4} \sqcap \frac{16g^2a^4 + 16fga^3\beta + 4f^2\beta^2[a^2]}{\beta^4} \text{ et extracta radice:}$$

$$(7) \pm e \pm \frac{4ga^2}{\beta^2} \sqcap \frac{\sqrt{16g^2a^4 + 16fga^3\beta + 4f^2\beta^2[a^2]}}{\beta^2} \text{ sive}$$

16–547,1 a L ändert Hrsg. dreimal

---

7 ex ultimis terminis collatis: Leibniz wertet die Gleichungen N. 38<sub>16</sub> S. 535 Z. 6–13 aus.

$$(8) e \sqcap \frac{+4ga^2 \mp \sqrt{16g^2a^4 + 16f ga^3\beta + 4f^2\beta^2[a^2]}}{\beta^2}.$$

Sed iam video non fuisse ad extrahendam radicem accedendum ante explicatam  $g$ , quia in ea est  $e$ , resumenda ergo est aequatio quinta, et in ea explicanda  $g$ , et  $g^2$ , est autem  $g^2 \sqcap \frac{e^2\beta^4 + 2efa\beta^3 + f^2\beta^2a^2}{a^4}$  quare tota aequatio quinta per  $a^4$  multiplicanda est, et fiet:

$$(9) [\beta^3e^2a^4] + 24[\overline{16}]fe\beta^2a^5 + 12[\overline{16}]f^2\beta a^6 + 9[\overline{8}]e^2\beta^3a^4[\overline{+8e\beta^2fa^5}] [\overline{-4f^2\beta a^6}] \sqcap 0.$$

destructisque destruendis et ordinando divisis prius omnibus per  $\beta a^4$ , fiet:

$$(10) 9e^2\beta^2 + 4af \wedge 2 \wedge 3e\beta + 16a^2f^2 \sqcap [16a^2f^2 - 12f^2a^2] 4a^2f^2 \text{ et extracta radice,}$$

$$(11) 3e\beta + 2[\overline{4}]af \sqcap [\overline{2af}] \text{ sive}$$

$$(12) e \sqcap \frac{-2af}{\beta}.$$

Ergo aequationi 12. iungendo aeq. 1. fiet:

$$(13) g \sqcap \frac{[+2\cancel{f}\beta - 3f\beta\cancel{f}]}{3a\cancel{f}} \frac{-f\beta}{3a}.$$

$$(14) \text{Et } eg, \text{ erit } \frac{+2f^2\beta}{9\beta} \text{ sive } \frac{2f^2}{9}. \text{ quibus valoribus 12. 13. 14. in aequatione 2.}$$

substitutis, multiplicandus est totus valor ipsius aequationis 2. per  $9\beta a$ , ut omnia dividi possint per  $[\beta a^2] \wedge 9\beta a$ . Nimirum omnes termini multiplicandi per 3, excepto uno, ubi est  $eg$ ; omnes termini in quibus est  $e$  multiplicandi per  $-6a^2f$ , omnes termini in quibus est  $g$ , multiplicandi per  $-3\beta^2f$ , et  $eg$  per  $2f^2a\beta$ , fiet:

$$(15) \frac{-12a^2f^2\beta^2 + 4a^2\beta^2f^2 - 12f^2\beta^2a^2 + 18a^2\beta^2f^2}{9\beta^2a^2} \sqcap l \sqcap \frac{-2f^2}{9a}.$$

5

10

15

18 Über der gestrichenen 4 von  $4a^2\beta^2f^2$ : Error. Debet esse 8.

Über dem durch + ersetzen Minuszeichen von  $-2f^2$ : Debet esse +. Ergo in seqq. erratum.

1f.  $e \sqcap \dots$  (1) et pro  $g$  substituendo eius valorem, item pro  $g^2$  qui est:  $+e^2\beta^4 + 2ef$  (2). Sed L  
15 βa L ändert Hrsg.

Eodem modo quaeremus valorem ipsius  $h$  ex aequatione 5<sup>ta</sup>, ubi cum ingrediatur et  $e^2 \sqcap \frac{4a^2f^2}{9\beta^2}$ , ideoque multiplicanda sunt omnia per  $9\beta^2a$ , et fiet:

$$(16) \quad h \sqcap \frac{-2af\beta^22af3a\beta + 2\beta^34a^2f^2a + 8fa^3f\beta3\beta^2 - 4\beta a^22f^2\beta^2a - 2f^2\beta a^29\beta^2a}{9\beta^4a^3} \\ \sqcap \frac{-2f^2}{3\beta}.$$

5 Valores ergo ipsarum  $e, g, l, h$ . invenimus sane simplicissimos, nempe

$$e \sqcap \frac{-2af}{3\beta} \quad g \sqcap \frac{-f\beta}{3a} \quad l \sqcap \frac{-2f^2}{9a} \quad h \sqcap \frac{-2f^2}{3\beta}.$$

Hoc ergo sucessu animati ad reliquas aequationes collatitias progrediamur, ubi collatis primis nominatorum terminis, fiet:

$$(17) \quad b \sqcap \frac{\pm e^2a + e\beta c}{\beta f} \text{ sive explicata } e, \text{ fiet: } \frac{\pm 4a^2f^2a - 2af\beta c3\beta}{9\beta^3f}, \text{ sive}$$

$$10 \quad (18) \quad b \sqcap \frac{\pm 4a^3f - 6a\beta^2c}{9\beta^3} \text{ collatis porro secundis, fiet:}$$

3 Kontrollrechnung: 8

$$\begin{array}{r} \underline{24} \\ \underline{32} \\ \hline -12 \\ -8 \\ \hline -18 \\ \underline{-38} \\ -6 \end{array}$$

7 f. collatis ... fiet: erg. L

547,18–552,6 (15): Im zweiten Term des Zählers unterläuft Leibniz ein Koeffizientenfehler, der die weitere Rechnung beeinträchtigt. Konsequent gerechnet müßte in Gleichung (19) vor dem letzten Term der linken Seite  $\pm$  stehen; in Gleichung (23) fehlt in den letzten beiden Termen der linken Seite der Faktor 9. In Gleichung (26) steht im zweiten Term der zweiten Zeile der Faktor 7 statt 4. Leibniz bemerkt schließlich den ersten Fehler, markiert den beeinträchtigten Bereich und setzt in S. 552 Z. 8 neu an.

$$(19) \pm 2e\beta d9\beta^3a \mp e\beta^2c9\beta^3 + 2\beta g4a^3fa \mp 2\beta g6a\beta^2ca + \beta^2f4a^3f - \beta^2f6a\beta^2c \sqcap -2f^2a^23\beta^2a \text{ sive explicando } e, \text{ per 12, fiet}$$

$$(20) \pm 4af d3\beta^3a \mp 2af\beta c3\beta^3 - \frac{2\beta 4a^3f^2\beta \pm 2\beta 6\beta^2caf\beta}{3} + \beta^2f4a^3f - \beta^2f6a\beta^2c \sqcap -2f^2a^23\beta^2a \text{ sive multiplicatis omnibus per 3, et divisis per } f\beta^2a, \text{ fiet:}$$

$$(21) \pm 36d\beta a \mp 30\overline{(18)}\beta^2c \left[ \begin{matrix} -8a^2f \\ \parallel \end{matrix} \right] \left[ \begin{matrix} \pm 12\beta^2c \\ \parallel \end{matrix} \right] \left[ \begin{matrix} +4\overline{(12)}a^2f \\ \parallel \end{matrix} \right] - 18\beta^2c \sqcap -22\overline{\overline{(18)}}fa^2, \text{ ac } 5$$

destructis destruendis, fiet,  $c \sqcap \frac{-22fa^2 \mp 36d\beta a}{\pm 30\beta^2 - 18\beta^2}$  sive

$$(22) c \sqcap \frac{11fa^2 \mp 18d\beta a}{\pm 15\beta^2 + 9\beta^2}.$$

Superest ut veniamus ad aequationem collatitiam ultimam, quam cum ingrediantur,  $e, b, c$ , ideoque multiplicanda erit tota illa aequatio per  $\pm 135\beta^3 + 81\beta^3$ , itaque fiet:

$$(23) -\beta^2d45\beta^22af \mp \beta^2d27\beta^22af + f\beta da135\beta^3 \mp f\beta da81\beta^3, \mp \beta^2g15, 4a^3f + \beta^2g15, 10 \\ 6a\beta^2c + \beta^2g9, 4a^3f \mp \beta^2g9, 6a\beta^2c \mp \beta ga11fa^2\beta + \beta ga18d\beta a\beta \sqcap \pm 2f^2a^215\beta^3 - \\ 2f^2a^29\beta^3.$$

Pro  $g$ , et  $c$ , substituamus eorum valorem, et tota aequatio 23, multiplicanda erit per  $\pm 15\beta^2a + 9\beta^2a$ , sed prius dividemus omnia per  $\beta a$ , itaque sufficit multiplicari omnia per  $\pm 15 + 9$ , et fiet:

$$(24) \pm 15\beta^2d45\beta^22af - 9\beta^2d45\beta^22af - 15\beta^2d27\beta^22af \mp 9\beta^2d27\beta^22af \mp 15f\beta da135\beta^3 + \\ 9f\beta da135\beta^3 + 15f\beta da81\beta^3 \mp 9f\beta da81\beta^3, , -5f\beta \beta^215, 4a^2f \mp 3f\beta \beta^215, 4a^2f, , - \\ 3\beta^2f\beta 15, 6, 11fa^2 \mp 3\beta^2f\beta 15, 6, 18d\beta a, , \mp 5\beta^2\beta f9, 4a^2f - 3\beta^2\beta f9, 4a^2f, , \mp \\ 3\beta^2f\beta 9, 6, 11fa^2 + 3\beta^2f\beta 9, 6, 18d\beta a, , +5f\beta \beta^211, 4a^2f \mp 3f\beta \beta^211, 4a^2f, , \mp \\ 5\beta^2f18d\beta^2a - 3\beta^2f18d\beta^2a \sqcap -30f^2a^215\beta^3 \mp 18f^2a^215\beta^3 \mp 30f^2a^29\beta^3 - \\ 18f^2a^29\beta^3. \quad 20$$

Sed ut error, qui in calculum tam prolixum, quam est postremus, irrepere potuit, vitetur; tandem aequationem 23 aliter enuntiabimus:

4 –  $2f^2a^23\beta^2a$  (1) adeoque (21)  $c \sqcap 18f^2a^2\beta^2f^2 \mp 36fda^2\beta^2f^2 - 8\beta^2a^2\beta^2f^2 \pm 12\beta^2c^2f^2 + \\ 12\beta^2f^2a^3 - 18\beta^2f^2c^2f^2 \sqcap -18f^2a^2\beta^2f^2$ , explicata g. divisisque omnibus per  $fa^2\beta^2$ , hunc denique habebimus valorem ipsius  $c$ , (22)  $c \sqcap (2)$  sive  $L = 14 \pm 15\beta^2a + 9\beta^2a$ , (1) et fiet:  $\pm \beta^2d45\beta^22af15\beta^2a - \\ \beta^2d45\beta^22af9\beta^2a - \beta^2d27\beta^22af15\beta^2a \mp \beta^2d27\beta^22af9\beta^2a$  (2) sed  $L$

#49

$$(25) \quad \begin{array}{l} \boxed{-45, 2} \beta^4 da f \quad \boxed{\pm 15, 4} \beta^2 a^{\frac{1}{2}} f g \quad \boxed{+15}, 6 \beta^{(4)} \phi g c + 18 \beta^3 d a^{\frac{1}{2}} g \quad \square \pm 2, 15 f^2 a^2 \beta^2 \\ \boxed{\pm 27, 2} \dots \dots + 9, 4 \dots \dots \quad \boxed{\mp 9}, 6 \dots \dots \quad \boxed{\mp 1} \quad \boxed{\frac{-f\beta}{3\phi}} \quad -2, 9 \dots \dots \\ + \boxed{[135]45} \dots \dots \quad \boxed{\pm 11} \dots \dots \quad \boxed{\frac{-f\beta}{3\phi}} \quad \boxed{\frac{-f\beta}{3\phi}} \\ \mp \boxed{[81]27} \dots \dots \quad \boxed{\frac{-f\beta}{3\phi}} \quad \boxed{\frac{11fa^2 \mp 18d\beta a}{(\pm 15\beta^2 + 9\beta^2)}} \end{array}$$

5

$$\text{sive (26)} \quad 3, + 45 \beta^4 d \phi f \quad \pm 49 \beta^2 a^{\frac{1}{2}} f^2 \quad \square 0.$$

$$3, \mp 27 \dots \dots \quad - 9, 7 \dots \dots$$

$$10 \quad 6, + 18 \dots \dots \quad \pm 6, 11 \dots \dots$$

$$-18 \dots \dots \quad \mp 6, 15 \dots \dots$$

$$+ 6, 9 \dots \dots$$

$$\text{sive (27)} \quad + 225 \beta d \quad \square \pm 25 a f, \quad \text{sive (28)} \quad d \quad \square \frac{\pm 9 \dots}{+ 225 \beta d}.$$

Habita  $d$ , facile habetur  $c$ , fiet enim ex aeq. 22 iuncta 28

$$15 \quad (29) \quad c \quad \square \frac{\frac{25}{11, \cancel{225}, fa^2} \mp 11, \cancel{81}, fa^2 - \cancel{18}, 25a^2 f \pm 18, \cancel{9}a^2 f}{\frac{25}{\pm 15, \cancel{225}\beta^2 + 15, \cancel{81}\beta^2} + \cancel{9}, 225\beta^2 \mp \cancel{9}, 81\beta^2}$$

8-12 Nebenrechnungen:

$$\begin{array}{rrrrrr} 18 & 45 & \mp 27 & \pm 15 & \pm 49 & -63 \\ \underline{5} & \underline{3} & \underline{3} & \underline{6} & \underline{.. 66} & \underline{+54} \\ 90 & 135 & \mp 81 & \mp 90 & \pm 115 & - 9 \\ & & \underline{90} & & \underline{\mp 90} & \\ & & 225 & & \pm 25 & \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 & +9, \quad 25fa^2 \quad +3 \wedge 25fa^2 \quad +3 \wedge 25fa^2 \\
 \text{sive (30) } c \sqcap & \frac{\pm 81 \dots}{\mp 3 \wedge 125\beta^2} \sqcap \frac{\mp 3 \wedge 9 \dots}{\mp 125\beta^2} \sqcap \frac{\mp \dots 9 \dots}{\mp [152]\beta^2} . \\
 & \quad 27 \dots \quad .. \quad 27 \dots \quad + 120 \dots \\
 & +3 \wedge 45 \dots \quad + 45 \dots \\
 & \quad 75 \dots \quad .. \quad 75 \dots \quad 5 \\
 & \quad -4, 125a^3f \quad -6, 3, 25a^3f \\
 & \quad .. \dots 27 \dots \quad \pm \dots \dots 9 \dots \\
 & \quad \pm \dots 45 \dots \quad \mp 642fa^3 \\
 \text{Ac denique erit (31) } b \sqcap & \frac{\dots \dots 75 \dots}{\mp 9, 125\beta^3} , \text{ seu } b \sqcap \frac{-602 \dots}{\mp 1368\beta^3} . \\
 & \quad .. \dots 27 \dots \quad +1080 \dots \quad 10 \\
 & \quad + \dots 45 \dots \\
 & \quad .. \dots 75 \dots
 \end{aligned}$$

550,15–551,5 Nebenrechnungen:

$$\begin{array}{ll}
 \text{zu Z. 15: } & 4 \quad 15 \wedge 25 \quad \text{zu Z. 1–5: } +9, 25 \mp 99 \mp 3 \wedge 125 9 \wedge 15 \\
 & \cancel{2} \cancel{5} \cancel{f} 25 \quad \mp 18 \mp 3 \wedge 27 9 \wedge 25 \\
 & \cancel{9} \quad 9 \wedge 9 \quad \mp 81 3 \wedge \mp 152 3 \wedge 45 \\
 & \quad \quad \quad 3 \wedge 75
 \end{array}$$

6–12 Nebenrechnungen:

$$\begin{array}{r}
 \mp 45 \quad 125 \quad 18 \quad 152 \quad 45 \\
 \underline{\mp 75} \quad \underline{27} \quad \underline{25} \quad \underline{9} \quad \underline{75} \\
 \mp 18 \quad 120 \quad 152 \quad 90 \quad 1368 \quad 120 \\
 \underline{9} \quad \underline{\wedge 4} \quad \underline{450} \quad \underline{36} \quad \underline{8} \\
 \mp 162 \quad \mp 480 \quad -602 \quad 450 \quad 1080 \\
 \underline{\mp 162} \\
 \underline{\mp 642}
 \end{array}$$

2+552,5 125 L ändert Hrsg. zweimal

9 (31): Leibniz vergißt den Faktor 4 aus den ersten zwei Summanden im Zähler des Wertes von  $b$ , wie die zugehörige Nebenrechnung zeigt. Der Fehler überträgt sich auf die quadratische Gleichung in  $y$  im Zähler des Bruches S. 552 Z. 4–6.

Inventis ergo tandem valoribus omnium incognitarum ex quibus primario quaesitae sunt,  $b, c, d, e, f, g$ ;  $f$  autem pro arbitrio sumi potest, cum qualiscunque supponatur

evanescat; fractionem quaesitam  $\frac{\frac{b}{a}y^2 + cy + da}{\frac{e}{a}y^2 + fy + ga}$  habebimus inventam, fiet enim:

$$\begin{aligned} & \pm 642fa^2 \quad + 3,25fa^2 \quad \mp 25fa^2 \\ & - 602\dots y^2 + \frac{\mp \dots 9 \dots}{\mp [152]\beta^2} y + \frac{+ 9 \dots}{+ 225\beta} \\ & + 1080\dots \quad + 120\dots \quad \mp 81\dots \\ & \hline \frac{-2f}{3\beta} y^2 + f y \quad \frac{-f\beta}{3}. \end{aligned}$$

[2. Ansatz]

$$(1) g \sqcap \frac{-e\beta^2 - f\beta a}{a^2}.$$

$$(2) l \sqcap \frac{+4fga^2 + 4e\beta ga + 2ef\beta^2 + 2f^2\beta a}{\beta a^2}.$$

$$\begin{aligned} & \frac{\boxed{4ega^2\beta} \boxed{2f^2a^2\beta} + 2\boxed{6}ef\beta^2a + 2e^2\beta^3}{\beta^2a^2} \\ & - 8fga^3 - 4\boxed{8}e\beta ga^2 \boxed{-4ef\beta^2a} - \boxed{4}2f^2\beta a^2 \\ (3) h \sqcap & \frac{(4 - 5 - 6 - 7 - 8)\beta^3 e^2 \boxed{+4ef\beta^2a} \boxed{+4e^2\beta^3} - 16fga^3 - 8e\beta ga^2 - 4f^2\beta a^2 \sqcap \boxed{+4e\beta^2af}}{\beta^2a^2} \\ & \boxed{+4e^2\beta^3} \text{ et explicando } g, \end{aligned}$$

6 Darunter: Error fuit in calculo.

8 Darüber: Calculus iste probus est.

15 probus: s. u. Erl. zu S. 554 Z. 5 f.

$$(9) \underbrace{\beta^3 e^2} + 24 \underbrace{16}_{\text{f}} f e \beta^{\frac{1}{2}} a + 12 \underbrace{16}_{\text{f}} f^2 \beta a^2 + 9 \underbrace{8}_{\text{e}} e^2 \beta^{\frac{3}{2}} \underbrace{+8e\beta^2fa}_{\text{f}} \underbrace{-4f^2\beta a^2}_{\text{f}} \sqcap 0. \text{ et}$$

ordinando ad extrahendam radicem,

$$(10) 9e^2\beta^2 + 4fa \wedge 2, 3e\beta + 16f^2a^2 \sqcap [16f^2a^2 - 12f^2a^2]4f^2a^2. \text{ Et extrahendo:}$$

$$(11) 3e\beta + 2 \underbrace{4}_{\text{a}} af \sqcap [2af], \text{ sive, ut obtineamus tandem valorem ipsius } e,$$

$$(12) e \sqcap \frac{-2af}{3\beta}. \text{ Eumque valorem substituendo in valorem ipsius } g, \text{ fiet:} \quad 5$$

$$(13) g \sqcap \frac{+2af\beta - 3af\beta}{3a^2} \sqcap \frac{-\beta f}{3a}.$$

Hos valores ipsarum  $e$ , et  $g$ , repertos inseramus in valore ipsius  $h$ , aeq. 3. ubi reperitur et

$$(14) eg \sqcap \frac{+2f^2}{g}, \text{ insertis ergo valoribus fiet:}$$

$$(15) h \sqcap \frac{-2f\beta^2\alpha^2\alpha f^3\alpha\beta + 2\beta^4\alpha^2 f^2\alpha + 8f\alpha^2\beta f^3\beta^2 - 4\beta^2\alpha^2 f^2\beta^2\alpha - 2f^2\beta\alpha^2 9\beta^2\alpha}{9\beta^2\alpha^2} \quad 10$$

$$\text{sive } h \sqcap \frac{-12 \underbrace{[+8]}_{\text{f}} + 24 \underbrace{[-8]}_{\text{f}} - 18}{9\beta} f^2 \sqcap \frac{-6f^2}{9\beta} \sqcap \frac{-2f^2}{3\beta}. \text{ Ergo denique}$$

$$(16) h \sqcap \frac{-2f^2}{3\beta}.$$

Nunc ad reliquas collationes pergendum est.

$$(17) \pm 3\beta^2 c^2 a f \pm b \beta f 9\beta^2 \sqcap 4a^2 f^2 a, \text{ et proinde (18) } b \sqcap \frac{\pm 4a^3 f^2 - 6\beta^2 c a f}{9\beta^3 f}. \quad 10$$

$$(19) [a^2\beta] l \sqcap \frac{-4fa\beta f}{3} + \frac{8f^2\beta a}{9} - \frac{4af^2\beta}{3} + 2f^2\beta a \text{ seu} \quad 15$$

$$[9a^2\beta] l \sqcap -24 \underbrace{12}_{\text{f}} f^2\beta a \underbrace{+8f^2\beta a}_{\text{f}} \underbrace{-12f^2\beta a}_{\text{f}} + 26 \underbrace{18}_{\text{f}} f^2\beta a. \text{ Ergo } l \sqcap \frac{2f^2\beta a}{9\beta a^2} \sqcap \frac{2f^2}{9a}.$$

$$15 (19) (1) \pm 2d^2 a f 9\beta^2 \pm \beta c f 3 \underbrace{9}_{\text{f}} \beta^2 + 2g a^3 f \pm 2g\beta^2 c a \underbrace{+f4a^2f\beta}_{\text{f}} \underbrace{\pm\beta f 6\beta^2 c}_{\text{f}} \sqcap (a) - a^2 2f^2 9 \quad (b)$$

$$-a^2 2f^2 5 \underbrace{9}_{\text{f}} \beta \pm 108da\beta^{\frac{1}{2}} \pm 11 \underbrace{9}_{\text{f}} \beta^{\frac{3}{2}} c f \underbrace{+8a^2f\beta f}_{\text{f}} \underbrace{\pm 2\beta^2c\beta f}_{\text{f}} \sqcap -22 \underbrace{30}_{\text{f}} a^2 f^{\frac{1}{2}} \beta. \text{ Unde } c \sqcap \frac{\pm 22a^2f - 108da\beta}{11\beta^2}.$$

Sed quia (aa) haec ra (bb) hic valor ipsius c dissentit ab eo quem superiore calculo inveni, ideo repetendus est calculus aeq. 18. (2) | a<sup>2</sup>β erg. Hrsg. | 1 □ L 16 9a<sup>2</sup>β erg. Hrsg.

19 inveni: s. Gleichung (22) S. 549 Z. 7.

$$(20) \pm 2e\beta da \pm e\beta^2 c \pm 2b\beta g\alpha \pm b\beta^2 f \sqcap ha^3$$

$$\frac{-2af}{3\beta} \quad \frac{-2af}{3\beta} \quad \frac{-\beta f}{3\phi} \quad \frac{-2f^2}{3\beta}$$

$$(21) \pm 4a^2 f \beta d \pm 2a f \beta^2 c \pm 2b\beta^2 f \pm 3b\beta^2 f \sqcap -2f^2 a^3$$

$$\frac{\pm 4a^3 f - 6\beta^2 ca}{9\beta^2}$$

5 (22)  $\pm 36a^2 \cancel{f} \beta d \pm 12 \boxed{18} \alpha \cancel{f} \beta^2 c \boxed{+4a^3 f^2} \boxed{\pm 6\beta^2 c a f} \sqcap -22 \boxed{18} f^2 a^2$ . Adeoque  
 $c \sqcap \frac{\pm 11fa^2 - 36a\beta d}{12\beta^2}$ .

$$\begin{array}{cccccc} \text{Porro } \pm e\beta^2 d & \pm f\beta da & \pm b\beta^2 g & \pm c\beta g\alpha & \sqcap & la^2 \\ \frac{-2af}{3\beta} & \frac{\pm 4a^2 f - 6\beta^2 c\phi}{9\beta^2} & \frac{-\beta f}{3\phi} & \frac{\cancel{c\beta g\alpha}}{\cancel{3\phi}} & & \frac{l a^2}{9\phi} \\ & & & & & \\ & & & & & \frac{\pm 11fa^2 - 36a\beta d}{12\beta^2} \end{array}$$

10 (23)  $\boxed{\pm 2, 3, 12af\beta d} \boxed{\pm 3 \boxed{9}, 12af\beta d} - 4, 4a^2 f^2 \pm 6, 4\beta^2 c f + 11, 3f^2 a^2 \pm 2 \boxed{3}, 36a\beta d f \sqcap 2, 12f^2 a^2$  sive

$$\pm 24\beta^2 c f \pm 72a\beta d f \sqcap 7f^2 a^2, \text{ sive explicando } c, \text{ fit}$$

$$-22fa^2 \boxed{\pm 72a\beta d \pm 72a\beta d} \sqcap 7fa^2.$$

Quae aequatio est impossibilis. Unde consequitur exitum sic quidem reperiri non  
15 posse.

---

5 f. Adeoque  $c \sqcap$ : Im ersten Term des Zählers steht irrtümlich 11 statt 22. Der Fehler pflanzt sich bis zum Ende der Rechnung fort.

Zum 3. Teil (S. 555)