

[Zum 2. Teil \(S. 554\)](#)
[Zum Inhaltsverzeichnis](#)
[Zum Personenverzeichnis](#)
[Zum Schriftenverzeichnis](#)
[Zum Sachverzeichnis](#)

39. DE PROGRESSIONIBUS ET GEOMETRIA ARCANA ET METHODO
TANGENTIUM INVERSA

Dezember 1674

Überlieferung: L Konzept: LH 35 V 2 Bl. 3–4. 1 Bog. 1°. 4 S. Textfolge Bl. 4 r°, 4 v°, 3 r°,
3 v°. Datum und Überschrift auf Bl. 4 r° oben ergänzt. Geringe Textverluste an einer Ecke
und im Falz sind ergänzt.
Cc 2, Nr. 820

5

Xb. 1674

De progressionibus et geometria arcana et
methodo tangentium inversa

10

Progressiones magnitudinum per crementa infinite parva increcentium aut decrescentium figuris quibusdam geometricis continuo quodam motu descriptilibus repraesentare interest ad mechanicen quoque; nam et vires et motus, sive temporum spatiorumque relationes crementa habent infinite parva: in quo differunt hae progressiones a progressionibus numericis illis, quae exacte per geometriam repraesentari non possunt.

15

Exempli causa progressio numerorum triangularium est arithmeticā, nam geometricē exprimi non potest; et si tentaveris compēries degenerare in progressionem numerorum quadratorum. At progressio numerorum quadratorum geometricā est simul et arithmeticā, nam parabolae ordinatis ad tangentem verticis accurate repraesentatur.

9 f. Rechts: Adde *Schediasma de calculo elastico*, item *schediasma Methodi tangentium inversae exemplum*, omnia eodem mense.

8 (1) No (2) Xb. L 11 Progressiones (1) figurarum (2) magnitudinum L 13 vires et erg.
L 15 illis erg. L 18 est (1), quia (2) simul L 22 item *schediasma* (1) *De* (2) *Methodi* L

17 f. degenerare in progressionem numerorum quadratorum: Die Darstellung der Dreieckszahlen als Parabel $y + \frac{1}{8} = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{2} \right)^2$ führt auf die halben Quadratzahlen. 20 f. *Schediasma de calculo elastico*: Cc 2, Nr. 822; *schediasma Methodi tangentium inversae exemplum*: Cc 2, Nr. 832. Auf das vorliegende Stück verweist Leibniz jedoch (außer in Cc 2, Nr. 822) in *De methodo tangentium inversa exemplum* (Cc 2, Nr. 823); alle sind auf Dezember 1674 datiert.

Progressio omnis per regulam quandam constituitur plus minusve simplicem. Quod si geometrica est, extremitates terminorum progredientium desinere intelligentur in locum quandam sive lineam, sive superficiem, sive corpus. Qui locus variis saepe modis exprimi potest, quos interest notari, et ex iis ad descriptionem lineae vel superficie vel corporis 5 motu continuo faciendam, eligi simplicissimos. Regula progressionis continet vel unam indeterminatam, praeter eam quae ipsos progressionis terminos refert; quo casu locus est ad lineam, vel duas, quo casu est ad superficiem, vel tres, quo casu est ad solidum.

Porro ut nunc de progressionibus ad lineam tantum loquamur: Ordinatae seu termini progressionis ad locum seu lineam desinentes ab una parte, ex altera parte desinunt vel 10 ad rectam, vel ad curvam; idque certa aliqua anguli determinatione; quae infinitis fieri potest modis.

Nimirum rectae ordinatae (nam de *curvis ordinatis* hoc loco non loquor et si id quoque aliquando usum habere possit) definito initio et magnitudine et positione seu inclinatione, ad quandam aliam figuram positione datam definuntur. Sane si dicas omnes 15 rectas datae magnitudinis eiusdem ex puncto uno ductas terminari in circuli circumferentiam non est opus nisi duabus conditionibus quia tertia hoc casu sequitur; nempe rectam illam esse perpendicularē ad curvam ad quam terminatur. Si vero dicas omnes rectas ex puncto dato ductas triangulorum instar crescentes terminari debere in curvam quandam nondum satis dixisti, nisi explices aliud quiddam, scilicet ad quam rectam referas, aut 20 quo angulo velis occurrere vel ipsi curvae, vel alteri lineae in quam certa lege productae

10 Über rectam: punctum

12 Über *curvis ordinatis*: NB.

1 omnis | geometrica *erg. u. gestr.* | per $L = 1$ constituitur (1); quae regula aut aequatione aliqua exprimi potest, aut non potest. Si aequatione potest exprimi, figura modo geometrica sit, eo ipso describi potest; potest (2) plus $L = 5$ faciendam | est streicht Hrsg. |, eligi $L = 5$ vel (1) nullam indeterminatam (2) unam $L = 7$ lineam, vel (1) plures, quo casu est ad superficiem vel corpus. Na (2) duas $L = 8$ loquamur: (1) Lineae a (2) Ordinatae $L = 10$ punctum *erg. L = 10* curvam; (1) angulo aliquo dato, vel eodem si ad rectam, vel vario et (2) neque enim explicabo cum ad superficiem hinc ad lineam illinc (3) angulo aliquo dato, quare (4) idque $L = 11$ f. modis. (1) Sane si omnes ad unum punctum (a) des (b) terminantur hinc ad unam lineam illinc, (aa) non est (bb) opus est ut vel (2) Nimirum (a) rectarum ordinatarum termino definito (b) rectae $L = 15$ in (1) differentiam, (2) circuli $L = 19$ explices (1), curvam (2) aliud $L = 20$ alteri (1) rectae (2) lineae L

terminarentur. Sed et fieri potest, ut non enunties unum angulum, sed ut angulus ipse certo quodam modo varietur; quod est sine dubio complicatissimum sed rarum.

Inter difficillimos etiam casus habendum est, cum postulatur, ut ipsae ordinatae faciant angulum quendam certum aut certo modo crescentem, ad curvam ad quam terminari debent. Exempli causa, si ex puncto quodam ductae ad curvam perpendiculares debeant progredi instar elementorum ∇^{li} ; quaeritur curva: Sed rursus hoc diversis modis concipi potest pro diversis scilicet modis dividendi curvam in partes, prout scilicet dividitur curva in partes aequales; aut in partes aequalibus axis partibus per ordinatas (parallelas aliasque) abscissis, respondentes. Porro si calculo explicanda sit relatio, fiet vel per aequationem quandam constantem determinati gradus, aut de gradu in gradum ascendentem, ita tamen ut saltem exponentes sint determinati gradus. Vel denique fiet [per] progressionem replicatam, in qua sequens ordinata supponit praecedentem; continue; et hae progressiones sunt omnium maxime difficiles cum calculo utcunque continuante puncto quidem progrediamur, et si figuram per puncta describere velimus futurus sit calculus terminis parumper productis horrendae prolixitatis.

Porro ex omnibus progressionibus eae maxime utiles sunt, quibus commode describuntur figurae geometricae, quales non eae tantum sunt, quibus ordinatae communes explicantur, sed in primis illae, in quibus poli quidam aut centra adhibentur; aut foci. Sed omnes illae progressionum expressiones quibus describi potest figura analytice ad certam reduci possunt aequationem [ordinatarum] communium et abscissarum.

Fieri potest ut figura geometrice describi possit analytice non possit ut cycloides; quod tunc sufficit, quando figura analyticam expressionem uniformem respuit, nam etsi circulus et omnes eius partes quadrari possent, cycloides tamen commodius quam nunc non describeretur; imo contra non aliter describetur methodo uniformi seu motu continuo. Hos ergo describendi modos voco semi-analyticos, quos scilicet ad analyticos reduci pendet a methodo tangentium inversa.

Data ergo quacunque expressione sive progressionе per incrementa infinite parva, quaerendus est modus describendi geometricus sive analyticus, sive semi-analyticus. Et

6 instar (1) applicatarum trianguli (2) elementorum L 12 vel L ändert Hrsg. 19 figura
 (1) modo (2) motu (3) solis rectarum (4) motum (5) a motibus ab unico (6) |solis streicht Hrsg.|
 rectarum (a) rectili (b) linearum intersectionibus (7) ad eam reduci possunt quibus (8) reduci possunt
 ad aequationem (9) analytice L 20 ordinariarum L ändert Hrsg. 21f. non possit (1) cum scil
 (2) ut cycloides; (a) et tunc res saepe redibit ad (aa) alteram (bb) eum methodi casum, (b) quod L
 22 expressionem (1) respuit (2) perpetuam resp (3) uniformem L 25 semi-analyticos (1). Nihi (2)
 pendet (3), quos L

ex problematibus eiusmodi transcendentibus sunt quaedam quae pendent ex quadraturis et imprimis sunt quae pendent ex curvarum in rectas extensionibus. Itaque tentandum est eo reducere problemata irregularia ut pendeant ex curvarum, v. g. circuli, parabolae, aliarumve in rectas extensionibus; ita solvi poterunt geometrice; seu continuo motu 5 construi loca quorum constructione solvantur. Qualia sunt problemata interpolationum Wallisiana, problemata serierum quarundam convergentium Iac. Gregorii; constructio logarithmorum geometrica Gregorii a S. Vincentio; quae omnia geometrice fieri possunt evolutionibus curvarum aut applicationibus ad plana. NB. aliasve curvas ut si circulum ponas volvi non super plano, sed super curva parabolica; etc. si ponas stylum circumferentiae circuli evolutae non in plano sed superficie sphaerae curvam describere. Adde et 10 superficies in rectum extensas; et corpora, quibus tamen non aequa lubenter ac curvis ad constructiones utar; nisi extrema iubeat necessitas. Quaerenda est ergo ratio problemata irregularia huc semper reducendi; quemadmodum isochronismum penduli ad cycloeidem reduxit Hugenius; et ego mesolabum generale ad trochoeidem parabolicam, cuius unius 15 ope quotunque inveniri possunt mediae proportionales geometrice, et omnia de rationum compositionibus et divisionibus problemata solvi.

Possunt aliqua problemata adeo esse difficilia, ut utile sit ea certis quibusdam curvis [solvi], quae physica in usum adhibita describuntur, ut vi elastica arcus tensi se restituantis, aliisque id genus artibus. Quomodo cunque enim dummodo accurate uno tractu 20 fiat descriptio; immensi calculi et horrendae alioquin necessariae operationes geometricae evitantur. Et vel hinc utile est doctrinam de figuris arcus tensi, de velorum, deque funium

1 transcendentibus (1) sive irregu (2) sunt L 3 f. circuli, | hyperbolae, *gestr.* | parabolae L
 6 quarundam erg. L 9 ponas (1) agi circa (2) volvi L 13 semper (1) referendi (2) reducendi L
 15 possunt (1) methodi propo (2) mediae L 18 solvis L ändert Hrsg. 19 artibus. (1) Ita enim
 qui (2) Quomodo cunque L 19 accurate (1) per omn (2) uno

5 interpolationum: J. WALLIS, *Arithmetica infinitorum*, 1656, S. 132–146, 161–165, 193–196 (WO I, S. 439–447, 458–460, 476–478) sowie WALLIS, *Commercium epistolicum*, 1657, S. 51 (WO II, S. 786).
 6 serierum: J. GREGORY, *Vera circuli et hyperbolae quadratura*, 1668, u. a. S. 15 ff. u. 23 ff. u. 56 ff. [Marg.].
 6 constructio: Gr. de SAINT-VINCENT, *Opus geometricum*, 1647, Buch VI, Prop. 125–130, S. 594–597.
 14 reduxit Hugenius: Chr. HUYGENS, *Horologium oscillatorium*, 1673, Teil 3, prop. VI, S. 67 [Marg.] (HO XVIII, S. 201); Leibniz' Handexemplar enthält in der Figur auf der prop. VI gegenüberliegenden S. 66 Ritzspuren und ergänzte Punktbezeichnungen; ego: N. 3812 u. *Schediasma de constructione* (Cc 2, Nr. 827), datiert Dezember 1674. 21 de figuris arcus tensi: vgl. u. a. *De vitandis erroribus geometricis in re mechanica* (Cc 2, Nr. 835), datiert Dezember 1674.

intensionibus ad geometriam reduci; ut hinc appareant exempla casuum per synthesin, ut in aliis oblatis per analysin quaerantur describendi modi. Ita inquiram aliquando exactius in methodum qua demonstravit P. Greg. a S. Vincentio logarithmos esse spatiis [hyperbolicis] proportionales: eadem enim opera aliae methodi ostendentur in casibus similibus problemata irregularia revocandi ad geometricas quasdam constructiones.

5

San Vincentius revocavit logarithmos ad spatia hyperbolica; (: videndum quod dent circularia, vel elliptica eadem methodo tractata :) Heuratius hyperbolam ad curvam parabolicam; ego curvae sectiones in plano conservo ope trochoidis parabolicae. Ergo iunctis omnibus illis inventionibus inter se inventa est repraesentatio logarithmorum geometrica in plano, ope trochoeidis parabolicae. Horum exemplo igitur quaerenda est aliorum quoque problematum irregularium constructio ope curvarum geometricarum neque enim nunc quidem ad rem pertinet an sit analytica, quando eas construendi rationes profecto analyticis etsi inventae essent paeferremus.

10


Huc pertinent extensiones in rectum superficierum cylindricarum per plana angulo semirecto aliterque truncatarum, (exemplum in figura sinuum) unde rursus varia curvarum genera; quae omnia ad constructiones adhibita intelligi possunt, quando operae pretium est. Denique ubi variae sunt construendi rationes adhiberi possunt simplicissimae, neque enim refert [an] magis minusve sint analyticae; vel etiam geometricae. Certe si physicae essent, ut fit adhibito elaterio non ideo minus ad usum sufficient; hoc consilio haud dubie spiram ex recto circularique motu compositam ad quadrandum circulum adhibuit Archimedes; et si parabola ope gravis descendantis projecti describatur, non minus erit utilis, quam si aliter descripta esset, imo erit simplicior et forte exactior.

15

20

3 Vincentio (1) reduci (2) logarithmos L 4 parabolicis L ändert Hrsg. 5 ad (1) casus ex quibus pendent (2) geometricas L 5 f. constructiones. (1) Gregorius (2) San L 8 ego (1) curvas illas in plano (2) curvae L 18 an erg. Hrsg. 20 dubie (1) helicem (2) spiram L 21 projecti erg. L

3 demonstravit P. Greg. a S. Vincentio: s. o. Erl. zu S. 558 Z. 5. 7 Heuratius: H. van HEURAET, *Epistola de transmutatione curvarum linearum in rectas*, 1659 (DGS I, S. 517–520); ego: N. 3811–14 u. Cc 2, Nr. 827–829, alle datiert Dezember 1674. 9 repraesentatio logarithmorum: a. a. O. vor allem Cc 2, Nr. 827. 20 f. adhibuit Archimedes: ARCHIMEDES, *De lineis spiralibus*, prop. 24; Leibniz erwähnt die archimedische Kreisquadratur mittels der Spirale auch in der *Praefatio opusculi de quadratura circuli arithmeticæ* (LMG V S. 93 f.).



[Fig. 1]

Esto tabula inclinata marmorea polita, pone pilam bene tornatam ex C versus D directo ictu proici; pondere autem suo descendere durante motu, curva quam vestigiis suis in tabula nonnihil pulvere aut humore respersa relictis, aliterve signatis describet,
 5 sive parabola sit, sive alia, erit multo profecto descripta exactius quam eadem curva
 descripta instrumento. Inprimis autem descriptiones quae per opticen fieri possunt utiles
 erunt exacte, cum radii lucis lineas describant perfecte rectas. Operae autem pretium est
 ex tot variis inquisitionibus edi specimina quaedam prae caeteris utiliora.


Etiam cum curva quaedam vel superficies in rectum extenditur; considerari potest,
 10 quam durante extensionis motu punctum aliquod in ea sumtum describat lineam. Ita
 inquiri etiam potest, data figura arcus invenire figuram ad quam data tensione reduci
 possit, et contra, idque saltem in exemplis illustribus.

Separata est summaeque difficultatis doctrina de progressionibus in se replicatis, ubi
 in valorem unius ordinatae sequentis ingreditur antecedens, et proinde in valorem unius
 15 ordinatae ingrediuntur omnes; (: evenit hoc etiam in seriebus convergentibus :).

Cuius ecce exemplum: pone in temporis punto aliquo seu spatio infinite parvo, B
 vim adesse quamlibet ut BC sequenti autem temporis spatio BD vim praeter priorem

2 polita erg. L 4 aut humore erg. L 16 in (1) tempore GB vim quaesitam adesse ut (a)
 AB (b) $AC \sqcap \alpha + \beta$. posito $AB \sqcap \alpha$ et BC infinite parvam $\sqcap \beta$. (2) temporis L

2 tabula inclinata: vgl. *De descriptionibus curvarum* (Cc 2, Nr. 831), datiert Dezember 1674.
 6 descriptiones ... per opticen: vgl. *Methodi tangentium inversae exemplum* (Cc 2, Nr. 832) u. *De Cartesii ovalibus* (Cc 2, Nr. 833), beide datiert Dezember 1674.



[Fig. 2]

accedere novam, EF eiusmodi ita ut incrementum sit ad vim quandam primam, qua coeptus scilicet est motus β , in reciproca ratione vis praesentis BC , ad β , seu ut β ad BC . Idemque cum in reliquis punctis rectae BD continuatae dici possit; et omnes BC , DF , et sequentes in curvam quandam terminentur, omnes huius curvae ordinatas nomine

5

generalii appellemus y , erit ordinata quaelibet sequens $y + \frac{\beta^2}{y}$. Quaeritur qualis sit ista

curva, et quomodo continuo tractu describi possit; in qua scilicet clementa sint ordinatis reciproce proportionalia. Id ita inquiremus: tangens C axi BD producto occurrat in H . Iam BH appelletur l . et clementum v. g. EF appelletur c . Constat clementum EF


8 Am oberen Rand der Rückseite, mit Hinweisstrich verbunden: Solutum hic analyticke problema: Invenire figuram in qua clementa ordinatis reciproce proportionalia.

2 novam, (1) quae sit (a) ad vim | proxime erg. | praecedentem (bb) proxima parte in reciproca ratione (aaa) quantitatis β a (bbb) summae virium in (b) ad vim β , (aa) ut (bb) in reciproca ratione summae virium (2) $EF L = 2$ incrementum | infinite parvum, gestr. | sit ad vim quandam primam | infinite parvam gestr. |, qua $L = 4$ punctis (1) omnibus dici possit, (a) appellando (b) ordinatam huius figurae quamlibet (2) rectae $L = 5$ et (1) similes (2) sequentes $L = 6$ f. ista (1) figura, et (2) curva $L = 8$ producto (1) occurrat in (2) si opus, (3) occurrat L

esse ad ordinatam $BC \sqcap y$ ut pars axis $\alpha \sqcap BD, \sqcap CE$, ad productam $BH \sqcap l$. Ergo $\frac{c}{y} \sqcap \frac{\alpha}{l}$. Ergo $c \sqcap \frac{\alpha y}{l}$. Iam idem $c \sqcap \frac{\beta^2}{y}$. Ergo $\frac{\beta^2}{y} \sqcap \frac{\alpha y}{l}$ et $l \sqcap \frac{y^2 \alpha}{[\beta^2]}$. Iam ex puncto C ducatur perpendicularis CM , quae axi BD reducto si opus occurrat in M , rectam BM appellemus p . Constat generaliter esse $p \sqcap \frac{y^2}{l}$, seu $\frac{BC^2}{BH}$ ob angulos CBM , et

5 HCM rectos. Iam $l \sqcap \frac{y^2 \alpha}{[\beta^2]}$. ergo $p \sqcap \frac{y^2}{y^2 \alpha} \sqcap \frac{[\beta^2]}{\alpha}$. Hinc sequitur ipsam BM reductam $\frac{y^2}{[\beta^2]}$

esse perpetuo eandem, ubicunque sumatur punctum in curva; ac proinde curvam CF esse parabolam; quod et verum esse calculus ostendet per synthesis. Nam reperietur: crementa ordinatarum parabolae ad axem esse ipsis ordinatis reciproce proportionalia quod desiderabatur.



10

[Fig. 3]

5 Nebenbetrachtung: $\frac{y^2}{\alpha} \sqcap l \cdot \alpha + \beta + \frac{1}{y}$

10 Unter Fig. 3: Vide huc pertinentia *Schediasmate de calculo elastico* Xb. 1674.


1 ut (1) recta quaedam constans $CE \sqcap$ (2) pars L 2 βL ändert Hrsg. 5 βL ändert Hrsg. dreimal.

10 Fig. 3: Die (nicht wiedergegebene) Verbindungsline DR hat Leibniz gestrichen. 12 *Schediasmate de calculo elastico*: Cc 2, Nr. 822.

Eodem modo inveni subtilissimo (ausim dicere) calculo vim si in vas cylindricum *ADBC* embolus exakte respondens concavitati oris vasculi ita intrudatur, ut aer qui ante totum vas repleverat intrudatur in spatium *LBCM* posteaque emota vi intrudente libertas aeri detur restituendi sese; et in quolibet restitutionis loco ut *GH* vis elaterii qua porro nititur, tum ab ipso elaterio perseverante orta, tum et acceleratione genita recta *FG* curvae cuiusdam *IFN*, virium quaesitarum in quolibet spatii puncto progressionis repraesentantis; ordinata esse intelligatur; inveni inquam curvam eius fore naturae, ut ordinatae sint quadratorum suorum clementis reciproce proportionales, sive si alia descripta intelligatur figura *EKO* cuius ordinatae *DE*, *HK* etc. sint proportionales [quadratis] ordinatarum respondentium *AI*, *GF*, seu in ratione ordinatarum respondentium duplicata. Clementa autem ordinatarum *DE*, *HK* etc., nempe *PQ*, *RS*, sint ipsis *AI*, *GF* reciproce proportionales; curva ergo *IFN*, quae hoc praestabit, erit quaesita. Unde intelligi potest, quanti sit momenti haec inquisitio. Curva autem ista qualis sit, et an omnino analytica sit, ex earum scilicet numero, quarum puncta omnia relatione ad certam quandam rectam assumtam calculo expressa definiri possint; nondum definire possum. Est autem ista inquisitio pars methodi tangentium inversae.

Esto curva *AC*, tangens *CDHF*, ordinata *BC*, clementum *EC*, producta (axis dum tangenti occurrat[]) *BF*, producta reciproca [*HM*], curvado *CD* perpendicularis *CG*, perpendicularis reciproca *CL*, tangens reciproca *CH*, ordinata reciproca *MC*, abscissa *AB*, abscissa reciproca *AM*, directrix *AN* indefinita; *DE* intervallum[, directrix reciproca, *AO*, indefinita. Iam generaliter abscissa est aequalis ordinatae reciprocae et contra. Clementum est aequale intervallo reciproco et contra. $\frac{CM}{HM} \sqcap \frac{AF}{AH} \sqcap \frac{FB}{BC}$. Ergo $CM \hat{\sqcap} BC \sqcap FB \hat{\sqcap} HM$ ergo rectangulum sub abscissa et ordinata aequatur rectangulo sub producta et producta reciproca.

1f. si (1) vas cylindricum aëre (2) in vas cylindricum (a) aer (b) *ADBC* (aa) operculum exakte ostium implens (bb) embolus *L* 4 vis (1) aeris (2) elaterii *L* 5 tum (1) a novo (2) ab *L* 5 genita (1) ordinata *FG* (2) recta *L* 7f. ut (1) clementa ordinatarum sint ipsis ordina (2) ordinatae sint (a) differentiis (b) quadratorum ipsarum ordinatarum clementis recipro (c) quadratorum *L* 8 proportionales, (1) seu (a) $\frac{PQ}{R}$ (b) $\frac{PQ}{RS} \sqcap \frac{A}{(2)}$ sive *L* 9f. *EKO* (1) quadratis (2) cuius ordinatae (a) sint proportionales ordinatis (b) *DE*, *HK* etc. sint proportionales | quadratis erg. Hrsg. | ordinatarum *L* 10 ratione ordinatarum (1) duplicata (2) dictarum qua (3) respondentium *L* 12 quaesita. (1) Breviter ergo quaerenda est curva, in qua (a) clementa (b) ordinatae sint in (2) Unde *L* 18 *CH L ändert Hrsg.* 21 *DE* intervallum erg. *L*



[Fig. 4]

Innumera alia id genus theorematum condi possunt, maximo usu ad geometriam, dum scilicet ex quibusdam datis aliae investigantur, quot licet modis, variisque modis inde ortae aequationes transformantur. Porro ex data relatione inter abscissam et ordinatam 5 caeterae omnes facile calculantur. Itaque id unum agitur ut ex data alia relatione detur relatio abscissae et ordinatae. Data relatione $\langle \text{productae} \rangle$ ad ordinatam datur relatio productae reciprocae ad ordinatam reciprocum seu ad abscissam. Dari relationem AH ad HM idem est quod dari relationem productae reciprocae ad ordinatam. In nostro exemplo data relatione BG ad BC quaeritur figura seu curva, seu relatio BC ad AB . Datur ergo 10 et relatio FB ad BC . Ergo relatio DE rectae constantis ad crementum EC , nempe in nostro casu $BG \sqcap \frac{1}{BC}$. Iam $\frac{BG}{BC} \sqcap \frac{CE}{1}$. Ergo $\frac{BG}{BC} \sqcap \frac{CE}{BG \cap BC}$. Ergo $CE \sqcap \frac{BG^2}{1}$. Ergo

4 ex (1) datis abscissa et ordinata (2) data L 5 ex (1) datis aliis relationibus dentur relationes
(2) data L

1 Fig. 4: Den von ihm zunächst mit N bezeichneten Schnittpunkt der Verlängerung von AC mit der Grundlinie hat Leibniz später gestrichen, ebenso die hier wiedergegebene Parallelle zu AG durch L ; im Bereich der unteren Hälfte dieser Linie ist die Handschrift schadhaft.

pro BG substituendo \sqrt{CE} , fiet $CE \sqcap \frac{\sqrt{CE}}{BC}$ sive $CE^2 \sqcap \frac{CE}{BC^2}$, sive $CE \sqcap \frac{1}{BC^2}$. Unde demonstratur crementa figurae propositae esse in ordinatarum ratione reciproca duplicita; at differentiae semiquadratorum ordinatarum ($\sqcap BG$) sunt in ordinatarum ratione reciproca ut initio dixi; videamus ergo an iunctis his duobus theorematis inter se, exitus haberi possit: Nimirum suntu duae ordinatae: BC , et $BC + CE$ sive BC et $BC + \frac{1}{BC^2}$ ^[,]

semiquadratum ab uno $\frac{BC^2}{2}$, semiquadratum ab altero $\frac{BC^2 + 2BC \wedge \frac{1}{BC^2} + \frac{1}{BC^4}}{2}$,

sive $\frac{BC^2}{2} + \frac{1}{BC} + \frac{1}{BC^4}$ ^[,] cremenntum semiquadratorum $\frac{1}{BC} + \frac{1}{BC^4} \sqcap BG \sqcap \frac{1}{BC}$

absurdum. Foret enim $\frac{1}{BC^4} \sqcap 0$. Error ergo admissus inter calculandum. Satis tamen manifestum est his inter se iunctis theorematis non posse sic quidem exitum haberi, cum nondum calculum ingressa sit abscissa, ad quam tamen relatio ipsius BC quaeritur.

Resumto calculo $BG \sqcap \frac{a^2}{BC}$ ex hypothesi deinde $\frac{BG}{BC} \sqcap \frac{CE}{ED \sqcap \beta}$. (Nam adicere

$BG \sqcap \frac{BC^2 + 2BC \wedge CE + CE^2}{2}$ inutile, satis enim video hic restitui debere quae in condendo eiusmodi theoremate negliguntur, quoties calculo ad infinite parva descenduntur. Unde patet NB. non sufficere aliquando nosse theorematata ad calculum, nisi et eorum origo nota sit.) Nihil autem novi hinc deduci posse, sed aequationem sub finem fore identicam patet, quia alioqui tribus aequationibus duae ex incognitis tollerentur, tertiaque

$\frac{1}{BC^2}$ (1) quod est id quod dixi crementa esse (2). Unde L 4 ut initio dixi *erg. L*

5 ordinatae: (1) y . et (a) $y + \beta$. (b) $y + \gamma$. (2) BC L 11 hypothesi | deinde *erg. L* | $\frac{BG}{BC} \sqcap \frac{CE}{ED \sqcap \beta}$. (1)

ac denique $BG \sqcap \frac{BC^2 + 2BC \wedge CE + CE^2 - BC^2}{2} \sqcap \frac{BC \wedge CE + CE^2}{2}$ quae duae posteriores aequationes sunt generales et locum habent in figura qualibet: Quod si ergo (a) quaeramus valorem ipsius (b) elidere velimus: BG et BC . restabit sola CE , itaque $\frac{\alpha^2}{BC^2} \sqcap \frac{CE}{\beta}$. item $\frac{\alpha^2}{BC} \sqcap BC \wedge CE, + \frac{CE^2}{2}$. Ex priore fiet:

(2) (Nam L

7 $+ \frac{1}{BC^4}$: Richtig wäre $+ \frac{1}{2BC^4}$; der Fehler beeinträchtigt die weitere Überlegung nicht.

residua absolute explicari posset, neque esset indeterminata quod est absurdum: Cumque relatio ipsius BG ad ipsam AB quaeratur, iudicatu facile est, sic haberi non posse, cum AB non ingrediatur calculum. Tentandum ergo an aliqua arte effici possit, ut in calculum intret.

- 5 Nimirum ut AB ad BC , ita FA seu $FB - AB$ ad AH . Demonstratum est a me alibi summam omnium AH aequari segmento $ACDA$ duplicato. Ergo summa omnium HM aequatur spatio exteriori $AMCDA$, itaque si ad omnes HM addantur omnes $PH(\frac{AH}{2})$ idem est ac si spatio $AMCDA$ adderetur segmentum $ACDA$ unde fiet triangulum AMC vel ABC seu semirectangulum sub abscissa et applicata. Igitur $PM \sqcap BC - \frac{AH}{2}$ ducta in
10 $DE \sqcap \beta$, seu βPM , aequatur differentiae inter $\frac{AB \wedge BC}{2}$, et $\frac{AB - DE, \wedge BC - EC}{2}$ sive
 $\beta \wedge PM \sqcap \frac{(AB \wedge BC - AB \wedge BC) - DE \wedge BC, -AB \wedge EC + DE \wedge EC}{2}$. Iam $PM \sqcap BC - \frac{AH}{2}$. et $DE \sqcap \beta$. Ergo $2\beta BC - \beta AH \sqcap -\beta BC - AB \wedge EC + \beta EC$, cumque $\beta \wedge EC$ negli possit, fiet: $-3\beta BC + \beta AH \sqcap AB \wedge EC$. Est autem $\frac{AH}{FB - AB} \sqcap \frac{BC}{AB}$. sive
15 $AH \sqcap \frac{BC, \wedge FB - AB}{AB}$. et $FB \sqcap \frac{BC^2}{BG}$. Ergo $AH \sqcap \frac{BC}{AB}, \wedge \frac{BC^2}{BG} - AB$. Idemque $AH \sqcap \frac{AB \wedge EC + 3\beta BC}{\beta}$. fiet ergo aequatio inter $\frac{BC^3, -AB^2 \wedge BG}{AB \wedge BG}$ et $\frac{AB \wedge EC + 3\beta BC}{\beta}$, sive inter: $BC^3\beta - AB^2, BG, \beta \sqcap AB^2, EC, BG + 3\beta BC, AB, BG$. Pro BG substituatur $\frac{a^2}{BC}$. fiet: $BC^3\beta - AB^2, \frac{a^2}{BC}, \beta \sqcap AB^2, EC, \frac{a^2}{BC} + 3\beta BC, AB, \frac{a^2}{BC}$ sive multiplicatis omnibus per BC fiet: $BC^4\beta - AB^2, a^2\beta \sqcap AB^2, EC, a^2 + 3\beta BC, AB, a^2$.

5 ut AB ad BC : Richtig wäre $FB : BC = FA : AH$; der Fehler tritt in Z. 13 wieder auf und beeinträchtigt zusammen mit weiteren Fehlern in Z. 11 (beim Ergebnis der Subtraktion sind die Vorzeichen vertauscht) u. Z. 15 (statt $BC^3 - AB^2 \cdot BG$ müßte $BC^3 - AB \cdot BC \cdot BG$ im Zähler des mittleren Bruches stehen) sowie in S. 567 Z. 4 (beim Term $-a^2y^3x$ fehlt der Faktor 3) u. S. 567 Z. 15 (im Nenner des Bruches fehlt der Term $+a^2y^3x$) die Überlegung bis S. 567 Z. 18. 5 Demonstratum est: vgl. u. a. *LQK*, prop. VII, S. 33–35; zur Entstehungsgeschichte des Transmutationssatzes im Anschluß an Cc 2, Nr. 545/6 vgl. D. MAHNKE, *Neue Einblicke*, 1926 S. 34–37 und die Erl. zu *Inventa aliquot mea geometrica*, [Sommer 1674], *LSB* III, 1 N. 29 S. 115.

Iam supra $CE \sqcap \frac{\beta BG}{BC}$ ergo $CE \sqcap \frac{\beta a^2}{BC^2}$. Unde inserendo hunc valorem fiet: $BC^6\beta - AB^2, a^2\beta, BC^2 \sqcap AB^2\beta a^4 + 3\beta BC^3 AB a^2$. Unde BC appellando y , et AB appellando x , fiet:

$$y^6 - a^2y^3x - a^2y^2x^2 - a^4x^2 \sqcap 0.$$

Ut facilius appareat an dividi possit, ordinetur secundum a , fiet:

$$a^4 + \frac{y^3 + y^2x}{x} a^2 - \frac{y^6}{x^2}.$$

Necesse est ergo dividi posse aut per $a^2 \nmid \frac{y^4}{x^2}$, aut per $a^2 \nmid \frac{y^3}{x}$. Sin ordinetur secundum y , necesse est si dividi potest dividi posse per $y^4 \nmid a^2x^2$, vel $y^3 \nmid a^2x$ vel denique si ordinatur secundum x , fiet: $x^2 \frac{+y^3\cancel{x}}{\cancel{x}y^2 + a^4} x \frac{-y^6}{a^2y^2 + a^4}$ quo casu solus ex prioribus divisoribus

tentandis restat: $x \nmid \frac{y^3}{a^2}$. Multiplicetur per $x + b$. fiet: $x^2 \nmid \frac{y^3}{a^2} x \nmid \frac{y^3b}{a^2}$. Unde conferendo: 10
 $+ b ..$

$b \sqcap \nmid \frac{y^3}{y^2 + a^2}$ et fiet: $\frac{\nmid y^3}{a^2} \nmid \frac{y^3}{y^2 + a^2} \sqcap \frac{y^3}{y^2 + a^2}$, sive $\nmid y^2(\nmid a^2 \pm a^2) \sqcap a^2$. Quod est absurdum. Ergo nullum habet aequatio inventa divisorem rationalem. Aequatione ergo ad tangentes ordinata fiet:


$$6y^6 - 3a^2xy^3 - 2a^2x^2y^2 \sqcap + 2a^4xl + a^2y^3xl, \text{ et fiet: } l \sqcap \frac{6y^6 - 3a^2xy^3 - 2a^2x^2y^2}{2a^4x + 2a^2y^2x}. \quad 15 \\ + 2a^2y^2..$$

Iam $l \sqcap \frac{y^4}{a^3}$ unde fieret $6y^4a - 3a^3xy - 2a^3x^2 \sqcap 2a^2xy^2 + 2y^4x$. quae aequatio eadem esse deberet cum superiore $y^6 - a^2y^3x - a^2y^2x^2 - a^4x^2 \sqcap 0$. quod cum sit absurdum, signum est calculi falsi. Ut tamen appareat an methodus ista valeat ad methodum tangentium

4 f. $\sqcap 0$. (1) Dividatur per y^2 (2) Ut $L = 8$ si dividi potest erg. $L = 9$ secundum x, (1) necesse est dividi posse per (2) fiet: L

1 Iam supra: s. o. S. 565 Z. 11. 5 Ut facilius appareat: Das Verfahren zur leichteren Ermittlung der Wurzeln einer Gleichung durch wiederholtes Umordnen wird in *Schediasma de divisionibus*, dat. Dez. 1674 (*LSB* VII, 1 N. 143) aufgegriffen.

inversam; ideo aliud exemplum quaeram, in quo constat de solutione: Nimirum quaeramus figuram, in qua crementa ordinatis reciproce proportionalia; inventum est figuram esse parabolicam, sed investigandum hoc per eam qua nunc usus sum, analysin.



[Fig. 5]

5 $CE \vdash \frac{a}{BE} \beta \cdot \frac{FB}{BE} \vdash \frac{\beta}{CE} \vdash \frac{\beta}{\frac{\alpha\beta}{BE}} \vdash \frac{BE}{a}$. Ergo $FB \vdash \frac{BE^2}{a}$. Iam $\underbrace{FB - AB}_{FA}$ ad
 $AH \vdash FB$ ad BE . fiet: $\frac{BE^2}{a} - AB$ ad $AH \vdash \frac{BE^2}{a}$ ad $BE \vdash BE$ ad a , sive $AH \vdash$
 $a, \frac{\frac{BE^2}{a} - AB}{BE} \vdash BE - \frac{ABA}{BE}$. Iam $2PM\beta \vdash AB \cap BE, , -, BE - CE, \cap AB - \beta$ sive \vdash
 $\boxed{AB \cap BE - BE, AB} + BE\beta + CE, AB - CE\beta$, sive $2PM\beta \vdash BE\beta + \frac{aAB\beta}{BE} - \boxed{\frac{a\beta^2}{BE}}$

1-3 Dazu, später ergänzt: $d\bar{y} \sqcap \frac{a}{y}$. Ergo $y d\bar{y} \sqcap a$. Ergo $y^2 \sqcap xa$. $\frac{y}{y + \beta} \sqcap [bricht ab]$

² inventum est: vgl. Cc 2, Nr. 832 (s. o. Erl. zu S. 555 Z. 20f.).

sive $2PM, BE \sqcap BE^2 + aAB$. et $PM \sqcap \frac{BE^2 + aAB}{2BE}$. Iam $PM \sqcap \frac{2BE - AH}{2}$. et $AH \sqcap \frac{BE^2 - ABa}{BE}$ ergo $PM \sqcap \frac{2BE^2 - BE^2 + ABa}{2BE} \sqcap \frac{BE^2 + ABa}{2BE}$ quae aequatio identica est, et forte servire potest ad theorema nostrum non detecta origine demonstrandum. Sed ad methodum tangentium inversam nihil inde opis esse video saltem in hoc exemplo^[,] an tamen in alio res procedere possit, non determino, quia scio esse aliquas methodos quae in parabola ob nimiam eius simplicitatem non procedant. Imo repetito brevius calculo superiore, vidi sic quoque rediri denique ad identitatem. Nam retenta figura novissima $BG \sqcap \frac{a^2}{BE}$. Iam $\frac{CE}{DC \sqcap \beta} \sqcap \frac{BG}{BE} \sqcap \frac{a^2}{BE^2}$ sive $CE \sqcap \frac{a^2\beta}{BE^2}$. Pone $ML \sqcap BE$. Constat ex superioribus summam omnium HL aequari rectangulo $ABEM$ (quia omnes HM aequantur figurae $AMEDA$ et omnes ML seu BE , figurae $ABEDA$). Ergo $HL \sqcap BE + HM \sqcap$ differentiae inter $BE \wedge AB$, et BC vel $[ND] \wedge AN$. Est autem $\frac{HM}{EM \sqcap x \sqcap AB} \sqcap \frac{BE}{FB} \sqcap \frac{BG}{BE} \sqcap \frac{a^2x}{BE^2}$. Ergo $HM \sqcap \frac{a^2x}{BE^2}$ ergo $BE\beta + \boxed{HM\beta} \sqcap BEx$ demto $BE - \frac{a^2\beta}{BE^2}, \frac{a^2x\beta}{BE^2}$
 $\wedge x - \beta$ seu demto $BEx - \frac{a^2\beta}{BE^2}x - BE\beta + \boxed{\frac{a^2\beta^2}{BE^2}}$. Ergo fiet $BE\beta + \frac{a^2x\beta}{BE^2} \sqcap (BEx - BEx) + \frac{a^2\beta x}{BE^2} + BE\beta$ quae aequatio identica est signum elegans veritatis theorematum quibus usi sumus; sed nihil inde novi duci potest. Habet problema propositum illud praeterea difficillimum ut ne quidem ad aequationem quatuor incognitarum quae determinatione dupli ad duas radices aequales reducatur ad duas denique indeterminatas, resolvi possit. Una ergo superest via tentanda, quam nunc exponam.

3 est, (1) neque inde quicquam duci posse putem, (2) et L 4f. an (1) forte (2) tamen L 6 procedant. (1) Sed (2) Tamen (3) Imo L 9f. HM | aequantur streicht Hrsg. | aequantur L 11 BD L ändert Hrsg. 16 Habet (1) hoc theorema (2) problema L 17 aequationem (1) trium (2) quatuor L 18 dupli erg. L

6f. calculo superiore: s. o. S. 565 Z. 11.

(In) problemate proposito quaeritur figura, cuius ordinatis appellatis y . productae sint $\frac{y^3}{a^2}$. An autem possibile sit figuram analyticam reperiri quae satisfaciat, ita indagabimus: Sumamus aequationem generalem, quae in infinitum continuata comprehendat figuratas analyticas possibles omnes; continuemus nunc quidem usque ad 4^{tum} gradum, ut

5 sit:

$$bx^4 + cx^3y + dx^2y^2 + exy^3 + fy^4 + agx^3 + ahx^2y + akxy^2 + aly^3 + a^2mx^2 + a^2nxy + a^2py^2 + a^3qx + a^3ry + a^4s \sqcap 0.$$

et ordinando ad tangentes fiet:

$$\begin{aligned} 10 \quad & 4bx^3t + 3cyx^2t + 2dy^2xt + ey^3t \sqcap -4fy^4 - 3exy^3 - 2dx^2y^2 - cx^3y \\ & + 3ag \dots + 2ahy \dots + aky^2. \quad -3al \dots - 2akx \dots - ahx^2. \\ & + 2a^2m \dots + a^2ny. \quad -2a^2p \dots - a^2nx. \\ & \quad \quad \quad - a^3r. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 15 \quad & \text{eritque } t \sqcap \frac{y^3}{a^2} \sqcap -4fy^4 - 3exy^3 - 2dx^2y^2 - cx^3y \cup 4bx^3 + 3cyx^2 + 2dy^2x + ey^3 \\ & - 3al \dots - 2akx \dots - ahx^2. \quad + 3ag \dots + 2ahy \dots + aky^2 \\ & - 2a^2p \dots - a^2nx. \quad + 2a^2m \dots + a^2ny \\ & \quad \quad \quad - a^3r. \end{aligned}$$

quae aequatio reducta eadem esse debet cum prima. Quodsi fieri non potest, ut singulis terminis cum singulis comparatis et literis quibusdam destructis, ut similes reddantur aequationes potest per multa examina iudicari. Tunc sequitur figuram quaesitam neque

20 primi neque secundi neque tertii neque quarti gradus esse posse. Si t . ponatur $\sqcap \frac{y^2}{a}$. non difficuler invenietur figuram esse parabolam. Sed si sit $\frac{y^3}{a^2}$. omnia difficiliora. Duo hic inquirenda sunt, primum an compendiose definiri queant figurae aptae si quae sunt, ne

1 f. productae (1) sint axis (2) sint L 2 figuram (1) geometricam (2) analyticam L 5 f. sit:
 $(1) ax^4 + bx^3y + cx^2y^2 + rdx^3 + rex^2y + rfx^2 + r^2gx^2 + r^2hx^2 + r^2ky^2 + r^3lx + r^3my + r^4n \sqcap 0.$ | Unde ordinando ad productam axis x , fiet: *streicht Hrsg.* | $4ax^3p + 3byx^2p + 2cy^2xp + rfy^2p$ (2) $bx^4 + cx^3y + 3rd \dots + 2rey \dots + r^2hy + 2r^2g \dots + r^3l$.

$dx^2y^2 + exy^3 + afx^3 + agx^2y + ahxy^2 + (3) bx^4 L 13+17 + ey^3$ (1) et multiplicando per crucem (2) quae $L 19$ figuram (1) datam (2) quaesitam $L 20$ posse. (1) Et videnda hic (2) Si L 21 omnia | paulo *gestr.* | difficiliora. (1) Quod (2) Duo L

nimirum multis opus sit examinibus; deinde an ratione quadam certa diudicari possit; si in his gradibus res non procedit, processura sit in altioribus. Interim in iis fateor exemplis, in quibus methodus tangentium inversa per determinationem formulae propositae ad duas radices aequales absolvvi potest, exitus citius invenitur; neque tentando.

Rem autem quia calculi est prolixioris alibi absolvemus: Quid vero si constet nullam figuram analyticam succedere, et quaestio sit an non aliqua geometrica transcendens inveniri possit, quemadmodum aliqua ex trochoeidum genere aut volutarum, aut helicum.

Habemus aut habere possum indices ac velut formulas omnium figurarum geometri-
carum, quaerendum an possibile sit formulas quasdam quasi analyticas dare figurarum
transcendentium.

Quod dupli modo fieri potest, uno breviore sed minus perfecto; altero tam prolixo
sed tam perfecte analytico quam possibile est arte humana. Modo minus perfecto, dum
praeter duas indeterminatas x . et y . tertia adhibetur portio scilicet quaedam curvae in
rectam si placet extensae, quae appelletur ω .


Ita analyticice cycloides, trochoides, aliaeque figurae explicari possunt. Potest et
fieri ut plures una curvae adhibeantur, ad quarum portiones referenda sit curva propo-
sita; eaeque erunt aut a se invicem independentes; aut dependebunt a se invicem; et vel
analyticice vel semianalyticice per methodum scilicet tangentium inversam, perfectam aut
imperfectam. Quodsi analyticice a se invicem dependent duae curvae ad unam ω reduci
possunt sin semianalyticice reducentur quidem omnia ad unam curvam, sed si methodus
tangentium inversa est perfecta accedet alia adhuc recta incognita quae eliminari pos-
set, si posset determinari aequatio ad duas aequales radices geminate. Sed si per gradus
methodo cuius hic et alibi specimen dedi res sit resolvenda; tunc fateor omnia ad unam
curvam reduci non poterunt.

Quod si iam illam ipsam quoque curvam elidere velimus; tunc designatio adhibebitur
tam perfecta quam fieri potest. Nimirum per methodum tangentium inversam perfectam

3 per (1) aequationes (2) determinationem L 4f. tentando. (1) Quodsi iam (2) Rem L
7f. helicum. (1) Tunc scilicet praeter duas incognitas (2) Ut ergo (3) Habemus L 9 sit (1) addere
indices form (2) formulas L 20 semianalyticce (1) possunt (2) reducentur L 22 duas (1) rectas
(2) aequales L 25 velimus; (1) accedet rect (2) tunc L

5 alibi absolvemus: vgl. *De methodo tangentium inversa per aequ. duarum radicum aequalium*
(Cc 2, Nr. 839). 23 alibi specimen dedi: vgl. Cc 2, Nr. 823 und 824.

inquiretur in eius curvae longitudinem; et ita habebitur aequatio duarum incognitarum capitalium, sed unius duarumque praeterea intervenientium, eliminandarum determinatione ad duas radices aequales.



[Fig. 6]

5 Exemplo utamur cycloeidis: Esto curva cuius ordinata $\sqcap \frac{a^2}{\sqrt{a^2 - x^2}}$. Eius quae-
ritur quadratura id est quaeritur curva AC , cuius [reducta] $BD \sqcap \frac{a^2}{\sqrt{a^2 - x^2}}$. Erit
 $\frac{a^4}{a^2 - x^2} + y^2 \sqcap s^2$. appellando $AB \sqcap x$. $BC \sqcap y$. $BD \sqcap \frac{a^2}{\sqrt{a^2 - x^2}}$. et $CD \sqcap s$. Fiet
 aequatio: $a^4 + a^2y^2 - x^2y^2 \sqcap a^2s^2 - s^2x^2$. in qua aequatione tam x . quam y . duas habent
 radices aequales. Inventa y . erit arcibus circuli seu elementis cycloeidis (demtis sinibus)
 10 respondentibus proportionalis. Cum autem impossibile sit invenire figuram analyticam
 circuli quadratricem, ut alibi demonstravi, ideo nec poterit solvi hoc problema per deter-
 minationem ad duas radices aequales. Tantum ergo ipsis x . et y . signum adscribendum est
 quo significetur habere tam unam quam alteram duos valores aequales; et ita analyticice
 15 quantum possibile est expressa est aequatione figura circuli quadratrix, homogenea arcu-
 bus, geometrica sed non perfecte analytica. Rectius forte ipsi s . circumdabitur signum,
 quo intelligatur esse minimam seu proinde ea conditione accidente debere eliminari et
 fiet: $a^4 + a^2y^2 - x^2y^2 \sqcap a^2(s^2) - x^2(s^2)$.

1 aequatio (1) trium et quat (2) duarum L 5 utamur (1) in cissoide: (2) cycloeidis: L
 6 cuius (1) ordinatae (2) | reductae ändert Hrsg. | BD L 10 analyticam erg. L

11 ut alibi demonstravi: vgl. u. a. Cc 2, Nr. 1102, zweite Propositio und LQK, prop. LI S. 127 f.

Ipsius autem y . quadratorum dimidiatorum figura erit perfecte arcuum circuli summatrix, ergo pro $\frac{y^2}{2}$. ponamus za . fiet $y^2 \sqcap 2za$. et fiet: $a^4 + 2a^3z - 2x^2az \sqcap a^2(s^2) - x^2(s^2)$. et figura omnium z . erit arcuum summatrix. Et $z \sqcap \frac{a^2(s^2) - x^2(s^2) - a^4}{2a^3 - 2ax^2}$.

cui si addatur $\sqrt{a^2 - x^2}$. sinus circuli, ponendo scilicet n . elementum cycloidis valere $z + \sqrt{a^2 - x^2}$, tunc inquam fiet:

$$n \sqcap \frac{a^2(s^2) - x^2(s^2) - a^4 + 2a^3\sqrt{a^2 - x^2} - 2ax^2\sqrt{a^2 - x^2}}{2a^3 - 2ax^2}. \text{ in qua aequatione tam } x.$$

quam n . duos habent valores aequales: Idque ob s . duplicato circulo inclusam subintelligendo perfecta quantumlicet habebitur designatio cycloidis per analysin. Quod si iam cycloidis perpendicularares quaerantur; videndum est, an per analysin istam eae possint haberi, quemadmodum inveniuntur facile per geometriam, tunc autem determinanda sunt omnia ad tres radices aequales, ut ex calculo patet, facta scilicet inquisitione in tangentibus Cartesii more per duas radices aequales. Quod an succedat, et an hoc omnia de cycloide praestari possint quae per geometriam communem; (et per consequens multa alia) vi- cissim an alia problemata constructu difficultia difficultatesque id genus reduci possint ad cycloidem; videndum est et quod ad novissimum attinet, analysis ostendit viam. Nam ipsa s . velut tertia indeterminata cogitanda est, et locus ad cycloidem erit velut locus ad superficiem seu tres indeterminatas. Igitur formulis trium incognitarum explicabuntur curvae transcendentes, instar superficierum. Sed restant facienda; nimirum (1) eligendum quando illae formulae pendent ex curvae in rectum extensione, potius quam ex quadratura, (2) videndum an et quando quadratura et alia talia problemata reduci possint ad curvarum in rectum extensiones, (3) videndum an et quibus modis difficultas reduci pos- sit ad seriem numerorum rationalium; seu quando figurae datae quadrandae alia exhiberi possit analytica rationalis aequivalens, (4) an hoc modo per summas numerorum rationa-

1 f. arcum (1) quadratrix (2) summatrix $L = 4$ circuli, (1) tunc perfecte fiet: ae (2) ponendo $L = 8$ quantumlicet erg. $L = 11$ patet, (1) nova scilicet adhibita incognita (2) facta $L = 17$ indeterminatas. (1) Videndum ergo an ex formulis istis ad (2) Igitur $L = 20$ an et erg. $L = 23$ possit (1) geometrica (2) analytica L

12 Cartesii more: vgl. R. DESCARTES, *Geometria*, DGS I, 1659, S. 40–50 [Marg.] (vgl. DO VI S. 413–424).

lium semper problemata ista solvi possint, etsi non constructionibus generalibus, (5) an difficultas quadraturae semper reduci possit ad simplicissimae quadraturam figurae, vel simplicissimae curvae in rectum extensionem, (6) exemplo logarithmorum inquirendum quomodo figurae transcendentes non replicatae ((quae methodo mea ex methodo tangentium [inversa] (sed plerumque imperfecta,) pendent,)) sed gradu aequationis continue variantes ad figuras geometricas sive etiam analyticas quadrandas possint reduci cum et figura angulorum possit in exemplum valere.

5 inversa *erg. Hrsg.*

40. SERIERUM SUMMA PER DIFFERENTIARUM MOMENTA

[Oktober 1674 – Januar 1675]

Überlieferung: L Konzept: LH 35 XIII 1 Bl. 223–224. 1 Bog. 2°. 4 S. Überschrift erg. Text
zweispaltig.
Cc 2, Nr. 776

5

Datierungsgründe: Das Wasserzeichen des Papiers ist für den Zeitraum September 1674 bis Januar 1675 belegt. N. 40 ist vermutlich nach N. 38 entstanden, zu dem es außer den thematisch bedingten Korrespondenzen auch konkrete Verbindungen gibt: Von den Figuren A–C auf S. 584 f. wird nur die fig. C im Text behandelt; die funktionslose fig. A ist wohl eine Übernahme der Fig. 1 von N. 386 S. 423. Auf S. 583 Z. 8 f. äußert sich Leibniz zur Zerlegung der Polynome $y^3 + y^2 + 1$ bzw. $y^3 - y^2 + y - 1$; ähnliche Bemerkungen finden sich auch in N. 382 S. 391 Z. 13 f. u. N. 3810 S. 465 Z. 16 – S. 466 Z. 2, wo Leibniz die zugehörigen Rechnungen durchführt.

10

S e r i e r u m s u m m a p e r d i f f e r e n t i a r u m m o m e n t a

(1)	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$
(2)	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{30}$	
(3)	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{15}$	
(4)	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{25}$	$\frac{1}{36}$	
(5)	$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{144}$	$\frac{9}{400}$	$\frac{11}{900}$	addatur
(6)	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{144}$	$\frac{1}{400}$	$\frac{1}{900}$	fiet
(7)	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{40}$	$\frac{1}{75}$		

15

20

20 Nebenrechnung: $\begin{array}{r} 26 \\ 900 \quad f \quad 75 \\ 122 \\ \hline 1 \end{array}$

A 5. auferatur 6. fiet:

$$(8) \quad \begin{array}{cccccc} \frac{1}{2} & \frac{1}{9} & \frac{1}{24} & \frac{1}{50} & \frac{1}{90} \\ & \frac{7}{18} & \frac{15}{216} & \frac{26}{1200} & \frac{40}{4500} & \text{Repetatur 3.} \\ \frac{1}{1} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{10} & \frac{1}{15} \end{array}$$

5 (9) $\frac{2}{3} \quad \frac{3}{18} \quad \frac{4}{60} \quad \frac{5}{150}$

(10) $\frac{2}{3} \quad \frac{1}{6} \quad \frac{1}{15} \quad \frac{1}{30}$

(11) 0 $\frac{1}{3} \quad \frac{1}{9} \quad \frac{1}{15} \quad \frac{1}{24} \quad \frac{1}{35}$

(12) $\frac{1}{3} \quad \frac{6}{27} \Big| \frac{2}{9} \quad \left[\frac{6}{135} \right] \quad \frac{9}{360} \Big| \frac{3}{120}$. Confer 12. et 9.

14 Nebenrechnungen zur Lesart zu Z. 7:

Nicht gestrichen: Gestrichen: Nicht gestrichen:

$$\begin{array}{ccc} 150 & & \frac{6}{139} \\ \underline{15} & & \underline{\quad} \\ \overline{139} [!] & & \end{array} \qquad \qquad \qquad \begin{array}{c} 6 \\ 9 \cap 15 \sqcap 135 \end{array}$$

$$7 \quad (11) \quad (1) \quad \begin{array}{cccccc} \frac{1}{1} & \frac{1}{3} & \frac{1}{9} & \frac{1}{15} & \frac{1}{24} & \frac{1}{35} \end{array} \quad (2) \quad 0 \ L \quad 8 \quad \begin{array}{c} 6 \Big| \frac{2}{9} \quad | \quad \frac{6}{135} \quad \text{erg. Hrsg.} \quad | \quad (1) \quad \frac{6}{144} \Big| \frac{2}{72} \\ (1) \quad (2) \quad \frac{9}{360} \Big| \frac{3}{120} \quad L \end{array}$$

7 $\frac{1}{9}$: Richtig wäre $\frac{1}{8}$. Leibniz rechnet zunächst konsequent weiter; den angekündigten Vergleich der Differenzenfolgen (12) und (9) führt er jedoch nicht durch, sondern schreibt die Folgen (11) mit dem falschen Wert $\frac{1}{9}$ und (3) an und bildet die Summenfolge von (3). S. 577 Z. 13 schreibt er die Folge (11) zunächst wieder mit dem falschen Wert an, verbessert dann aber in $\frac{1}{8}$.

$$\begin{array}{ccccccccc}
 \frac{1}{3} & . & \frac{1}{9} & . & \frac{1}{15} & . & \frac{1}{24} & . & \frac{1}{35} \\
 & & & & & & & & \frac{1}{63} \\
 \frac{1}{1} & . & \frac{1}{3} & . & \frac{1}{6} & . & \frac{1}{10} & . & \frac{1}{15} \\
 (13) \quad \frac{4}{3} & . & \frac{9}{18} & \Big| \frac{1}{2} & . & \frac{16}{60} & \Big| \frac{4}{15} & . & \frac{25}{150} \Big| \frac{5}{30} \Big| \frac{1}{6}
 \end{array}$$

Sit 6. in distantias a vertice fiet

$$(14) \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{18} \quad \frac{1}{48} \quad \frac{1}{100} \quad \frac{1}{150} \quad \text{quae incipit} \quad 5$$

ut dimidia 8. sed non continuat.

Si 7. multiplicetur in distantias a vertice, fiet 3. quod significat summam summarum huius seriei 7, aequari summae seriei ③.

Eodem modo si ⑧. multiplicet per distantias a vertice unitate auctas seu per numeros 2. 3. 4. 5. fiet iterum series ③. Hinc ex serie ⑧ et ⑯. iunctis habetur series ④. At eadem habetur ex sola serie ⑭. per marginalia notata NB. NB. Ergo ex sola serie ⑧. etiam habetur ④.

$$\begin{array}{ccccc}
 \frac{1}{3} & . & \frac{1}{8} & . & \frac{1}{15} \\
 ab & \frac{1}{3} & . & \frac{1}{6} & . & \frac{1}{10} \\
 & & & & & \frac{1}{15} \\
 & & & & & \frac{1}{21}
 \end{array}$$

5 Nebenrechnung: 3

$$\begin{array}{r}
 900 \\
 \times 150 \\
 \hline
 666
 \end{array}$$

11 NB. NB. Nam ⑦ – ⑥ □ ⑤ et ⑦x – ⑥x □ ⑤x. x □ 1. vel 2. vel 3. seu distantiae a vertice. Iam ⑤x dato datur ④. Ergo datis ⑦x et ⑥x dabitur ④. Datur autem ⑦x nam □ ③. Et datur ③ ut constat. Superest ergo ⑥x quam nondum habeo. Et quae adeo pendet ex ④x.

6 ut (1) dupla (2) dimidia L 9 unitate (1) minutias, seu per (2) auctas L 10–12 Hinc ...
habetur ④ erg. L 13 $\frac{1}{3}$ (1) $\frac{1}{9}$ (2) $\frac{1}{8}$ L


5 $\frac{1}{150}$: Leibniz rechnet $6 \cdot \frac{1}{900}$ statt $5 \cdot \frac{1}{900}$ und verfehlt so die Identifizierung (14) = $\frac{1}{2}$ (8).

$$[(15)] \quad 0 \quad \frac{1}{24} \quad \frac{1}{30} \quad \frac{1}{40} \quad \frac{[2]}{105}, \text{ ducatur in distantias, fiet}$$

$$\frac{1}{12} \quad \frac{1}{10} \quad \frac{1}{[10]} \quad \frac{[2]}{21}.$$

Hac methodo saepissime invenimus summam figurae quae datae seriei summas continentia sit aequivalens.

5 Hinc sequitur, quotiescumque serie in numeros naturales ducta figuram reperimus summabilem, videndum an data summa haberi possit.



[Fig. 1]

Differentiae cuiuslibet figurae ductae in numeros naturales seu intervalla a vertice, aequantur figurae complemento. Ideoque si proposita quadam serie in numeros naturales
10 ducta productum quadrari seu summarri potest et summa illa a parallelogrammo isopar-

1 *Nebenrechnungen:*


$$\begin{array}{r|l} 5 & \frac{1}{30} \\ \hline 150 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 9 & \frac{15}{24} \\ \hline & \frac{30}{360} \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 9 & \frac{1}{40} \\ \hline 360 & \end{array}$$

6 *Nach* possit: Imo male.

577,14–578,3 $\frac{1}{21} | (14)$ ändert Hrsg. | 0 (1) $\frac{1}{27} \frac{5}{15}$ (2) $\frac{1}{24} \dots \frac{1}{40} | \frac{1}{105}$ ändert Hrsg. |, ducatur ...
fiet (a) (25) (b) | 25 streicht Hrsg. | $\frac{1}{12} \frac{1}{10} | \frac{1}{20} \frac{1}{21}$ ändert Hrsg. |. Hac $L = 3$ invenimus (1) figuram
(2) summam $L = 9$ Ideoque (1) differentiae (2) si $L = 10$ quadrari (1) potest habetur summa (2)
seu $L = 12$ (1) $\frac{5}{15} | \frac{1}{3}$ (2) $\frac{5}{150} | \frac{1}{30} L$

allelo subtrahatur, residuum erit summa figurae quae ex datae componitur summis; seu residuum erit summa summarum figurae datae.

Hinc porro si datae figurae differentiae, in intervalla ductae quadrari possunt, etiam figura quadrari potest.



[Fig. 2]

5

Hinc cum seriei	0	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{25}$	$\frac{1}{36}$	etc.
differentiae sint		1	$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{144}$	$\frac{9}{400}$	$\frac{11}{900}$	etc.

cogitentur diametro quidem applicari per numeros impares.

Area figurae erit: $1 \frac{2}{4} \frac{2}{9} \frac{2}{16}$ etc. Sed si intervalla negligas, et applicata ponas ad
1. 2. 3. 4. 5. non ad 1. 3. 5. 7. area figurae erit $1. \frac{1}{4}. \frac{1}{9}. \frac{1}{16}$. Porro differentiae in
distantias 1. 2. 3. 4. etc. ductae dabunt:

6 cum (1) figurae (2) seriei L

1 $\frac{3}{2}$ $\frac{5}{12}$ $\frac{7}{36}$ $\frac{9}{80}$.

Illius summa reperta, etiam
summa $1 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{9}$. haberi potest. Ut autem summa posterioris quaeratur, auferatur inde
[dimidia] progressio 7. seu

1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{36}$ $\frac{1}{80}$, fiet:
5 0 1 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{10}$ etc. quae summa haberi potest,

ergo ad summam omnium $1 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{9}$. etc. habendam, opus est hac summa quae supra
notata num. 7, scilicet:

1 $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{18}$ $\frac{1}{40}$ $\frac{1}{75}$ quae rursus multiplicata per:
10 1. 2. 3. 4. etc. dabit:
 1 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{15}$, ergo eius habetur momentum

ex vertice.

Quadrata numerorum naturalium ducta in differentias dant duplum momentum a
vertice complementi figurae datae. Ita:


15 1 $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{36}$ $\frac{7}{144}$ $\frac{9}{400}$, ducta in
 1 4 9 16 25 dant:
 1 3 $\frac{5}{4}$ $\frac{7}{[9]}$ $\frac{9}{16}$.

Ad habendum momentum seriei a vertice, ducendi sunt eius termini in numeros
naturales. Unde

2–4 inde | (1) summa num. 3 (2) | dupla ändert Hrsg. | progressio 7. seu erg. | 1 L 8 $\frac{1}{40}$ (1)
etc. (2) $\frac{1}{75}$ L 10 ergo (1) haec summa, $1 \frac{1}{6} \frac{1}{18} \frac{1}{40}$ (a) etc. (b) $\frac{1}{75}$. Hinc etiam summa num. 6.
 $\frac{1}{4} \frac{1}{36} \frac{1}{144} \frac{1}{36}$ (1) seu quadrata | fractionum erg. | triangularium haberi possunt (2) eius L 12f. dant
| duplum erg. | momentum (1) figurae a vertice, ut de (2) a vertice L 16f. $\frac{5}{4} \frac{7}{6}$ ändert Hrsg. | $\frac{9}{16}$.
(1) Si series quaedam in numer (2) Ad L 17 vertice (1) habetur (2), (a) ducendae (b) ducendi L

$$\begin{array}{ccccc} 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{9} & \frac{1}{16} & \frac{1}{25}, \\ & \text{dabit:} \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5}. \end{array} \quad \text{Quare momentum a vertice}$$

integrae progressionis haberi non potest. Idem momentum a vertice aliter haberi potest, ducantur differentiae figurae in numerorum naturalium quadrata, productum erit duplum momenti a vertice, complementi figurae, quare si dimidium eius a prismate isoparallelo auferatur, restabit momentum figurae, et contra momento figurae reperto habetur et summa ipsorum productorum. Momentum figurae ex axe, habetur unica tantum via, per quadrata scilicet terminorum:



[Fig. 3]

Videndum est an ex figura proposita alia fieri possit regularis basi quoque in partes aequales secta certisque accessionibus et diminutionibus; quod statim ostendit aequatio:

$$\text{Nam } \frac{a^3}{x^2} \sqcap y. \text{ Ergo } a\sqrt{\frac{a}{y}} \sqcap x. \text{ Sed vereor ut hoc in numeris serviat.}$$

Porro quoniam ad summam quadratorum omnium fractionum habendam, sufficit haberi momentum fractionum triangularium, patet centrum gravitatis triangularium de-

2 momentum (1) eius (2) a vertice $L = 4$ in (1) numeros na (2) numerorum naturalium quadrata, (a) habetur etiam resi (b) productum erit (aa) dupli (bb) duplum $L = 5$ eius (1) ab altitudinis (2) a prismate $L = 10$ possit (1) rationalis (2) regularis $L = 14-582,1$ desiderari (1) Invento centro gravitatis habetur area figurae, modo et detur mo (2) Invento ... dividatur (a) figura (b) momentum (aa) ex (bb) per L

14 centrum gravitatis triangularium: Der gesuchte Schwerpunkt existiert nur für endliche Partialfolgen, so daß die weiteren Folgerungen bis S. 582 Z. 13 nur für solche Folgen gelten.

siderari. Invento centro gravitatis dividatur momentum per distantiam, et habebitur area figurae.

Data summa quadratorum fractionum naturalium, datur et triangularium et contra.

$$(1) \frac{1}{y} - \frac{1}{1+y} \sqcap (2) \frac{y+1-y}{y^2+y} \sqcap \frac{1}{y^2+y}.$$

$$(3) \frac{1}{y^2} - \frac{1}{y^2+2y+1} \sqcap (4) \frac{\boxed{y^2} + 2y + 1 \boxed{-y^2}}{y^4 + 2y^3 + y^2} \text{ sive}$$

$$(5) \frac{y+1}{y^4 + 2y^3 + y^2} + \frac{y}{[y^2, \hat{y}] y^2 + 2y + 1} \text{ sive } (6) \frac{1}{y^3 + y^2} + \frac{y}{y^4 + 2y^3 + y^2} \text{ sive}$$

$$(7) \frac{1}{y^3 + y^2} + \frac{1}{y^3 + [2y^2 + y]}. \text{ Ergo habetur summa, nempe}$$

$$(8) \frac{1}{y+1, \hat{y}^2} + \frac{1}{[y+1, \square, \hat{y}]}. \text{ Idem aliter resolvi potest, in}$$

$$(9) \frac{2}{y^3 + 2y^2 + y} + \frac{1}{y^4 + 2y^3 + y^2}.$$

10 Si facias ab initio (10) $\frac{1}{y^2 - 2y + 1} - \frac{1}{y^2}$ fiet: (11) $\frac{+2y - 1}{y^2 - 2y + 1, \hat{y}^2}$, quod rursus in duo resolvi potest: (12) $\frac{1}{y-1, \hat{y}^2} + \frac{1}{y^2 - 2y + 1, \hat{y}}$, vel in (13) $\frac{2}{y^2 - 2y + 1, \hat{y}} - \frac{1}{y^2 - 2y + 1, \hat{y}^2}$.

Quare si unius ex partibus 8 et 9 haberi potest summa, etiam alterius haberi poterit.

$$(14) \frac{1}{y^2 + 1} - \frac{1}{y^2 + 2y + 2} \sqcap \frac{\boxed{y^2} + 2y + 2 \boxed{-y^2} - 1}{y^2 + 1, \hat{y}^2 + 2y + 2} \sqcap (15) \frac{2y + 1}{y^2 + 1, \hat{y}^2 + 2y + 2},$$

15 summabilis. Dissolvatur, in

$$6 y^2, \hat{y} \text{ erg. Hrsg.} \quad 7 (7) \frac{1}{y^3 + y^2} + \mid \frac{1}{y^3 + 2y^2 + y} \text{ ändert Hrsg.}. (1) Horum ergo duorum (2)$$

$$\text{Ergo } L \quad 8 (8) \frac{1}{y+1, \hat{y}^2} + \mid \frac{1}{y^2 + 1, \square, \hat{y}^2} \text{ ändert Hrsg.}. (1) Fiat } \frac{1}{y^2 - 2y + 1} - \frac{1}{y^2}, \text{ habebimus eodem modo } \frac{\boxed{y^2} \boxed{-y^2} + 2y - 1}{y^2 - y, \square}, \text{ fiet: } \frac{2}{y^3 - 2y^2 + y} (2) \text{ Idem } L$$

15 Dissolvatur: Die folgende Zerlegung ist nicht zulässig.

$$[(16)] \quad \frac{y}{y^2 + 1, y^2 + 2y + 2} \left[+ \frac{y+1}{y^2 + 1, \hat{\square} y+1, \square} \right] + \frac{1}{y^2 + 1, \hat{\square} y+1}, \text{ sive}$$

$$[(17)] \quad \frac{y}{y^2 + 1, y^2 + 2y + 2} + \frac{1}{y^3 + y^2 + y + 1}.$$

Aliter:

$$[(18)] \quad \frac{1}{y^2 - 2y + 2} - \frac{1}{y^2 + 1} \text{ sive } [(19)] \quad \frac{\boxed{y^2} \boxed{(+1)} \boxed{-y^2} + 2y - \boxed{2}}{y^2 - 2y + 2, \hat{\square} y^2 + 1}, \text{ unde}$$

$$[(20)] \quad \frac{2y - 1}{y^2 - 2y + 2, \hat{\square} y^2 + 1}, \text{ quae quantitas dissolvi potest in has duas:}$$

$$[(21)] \quad \frac{y}{y^2 - 2y + 2, \hat{\square} y^2 + 1} - \frac{1}{y - 1, \hat{\square} y^2 + 1}, \text{ sive } \frac{y}{y^2 - 2y + 2, \hat{\square} y^2 + 1} - \frac{1}{y^3 - y^2 + y - 1}.$$

Hinc patet ut obiter dicam quantitatem hanc $y^3 + y^2 + y + 1$ vel $y^3 - y^2 + y - 1$ duos habere divisores: Prior enim fit ex $y^2 + 1, \hat{\square} y+1$ posterior fit ex $y^2[+]1, \hat{\square} y-1$.

$\frac{a^2 y}{a^2 + y^2}$ pendet ex quadratura hyperbolae, demonstrari potest, ex serie eius quadratricem per regressum.

Nam est $\frac{y - y^3 + y^5 - y^7}{b^2 - \frac{b^4}{2} + \frac{b^6}{4} - \frac{b^8}{6}}$ etc. Unde $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8}$ at hyperbolae numerus

quadrator est: $\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4}$. Patet ergo duplicatam esse hyperbolam figurae propositae. Attamen fatendum est ope collationis numerorum vel serierum quadratricium, non

1–6 Zählung (15) ... (20) L ändert Hrsg. 3 f. Aliter: (1) $\frac{1}{y^2} - \frac{1}{y^2 - 2y + 1}$ (2) $\frac{1}{y^2 - 2y + 1} - \frac{1}{y^2}$
 $\sqcap y^2 - y^2 + 2y - 1$ (3) | (17) ändert Hrsg. | $\frac{1}{y^2 - 2y + 2}$ L 9 – L ändert Hrsg. 10 potest, ex
(1) numero eius (a) characteri (b) quadratoris (2) serie L 14 numerorum | quadratorum gestr. | vel
L

5 dissolvi potest: Die folgende Zerlegung ist nicht zulässig. 8 Hinc patet: Ähnliche Aussagen in N. 382 S. 391 Z. 13 f. u. N. 3810 S. 465 Z. 16 – S. 466 Z. 2.


nisi totorum, at non et portionum respondentium collationes institui: Indicio sunt tamen.

At geometria ostendit etiam $\frac{b^2}{2} - \frac{b^4}{4} - \frac{b^6}{6} - \frac{b^8}{8}$ inveniri posse ex $\frac{b}{1} - \frac{b^2}{2} + \frac{b^3}{3} - \frac{b^4}{4}$.

Et hinc iam lux habetur paeclaris, stabiliendis per inductionem regulis de ratione totorum inter se ex variante in infinitum, sed regula certa partium ratione.


5

fig. A



[Fig. 4]


fig. B



[Fig. 5]

3 de (1) collatione totorum ex (2) ratione $L = 4-585,3$ partium ratione. (1) $\frac{a^2}{y^2 - a^2}$ pendet ex quadratura hyperbolae. Fiat: $\frac{a^3}{y^2} \sqcap x$. Unde $a^3 \sqcap xy^2$ (2) $\frac{a^3}{x^2} \sqcap y$. (a) Unde $a^3 \sqcap x^2y$. sive $+2xy \sqcap -x^2y$. sive $1 \sqcap \frac{-xy}{2}$. sive $1 \sqcap \frac{a^3}{2}$ (b) Unde L

fig. C



[Fig. 6]

$\frac{a^3}{x^2} \sqcap y$. Unde $a^3 \sqcap x^2y$. Unde $-2xly \sqcap x^2y$. Ergo $2l \sqcap x$ seu $l \sqcap \frac{-x}{2}$. Si fecissemus $-x^2y \sqcap 2xly$ idem habuissemus.

$lw \sqcap yg$. At summa omnium yg aequatur figurae, summa vero omnium lw , aequatur in nostro exemplo, vid. fig. C. aequatur inquam summae omnium $\frac{xw}{2}$ at summa omnium xw aequatur figurae in hoc exemplo, in aliis figurae complemento. Ergo hic summa omnium $\frac{xw}{2}$ aequatur figurae dimidiae. Sed haec ita explicanda sunt. Sumatur portio quaedam curvae, EL . Unde rectae demittantur perpendiculares in oppositas directrices EG , ED et LH , LM . Dictum est summam omnium lw (seu $\frac{xw}{2}$) aequari summae omnium y , seu spatio $LHDEL$. At constat omnium xw summam aequari spatio $LMGEL$. 5 10

6 in (1) fig. B (2) nostro L 6 omnium (1) $-\frac{xw}{2}$ (2) $\frac{xw}{2}$ L 7 figurae (1) complemento,
et figura omnium $-xw$ (2) in L 7 hic erg. L 10 LM. (1)) Aio patet (2) Dictum L

Ergo omnium $\frac{xw}{\sqrt{2}}$ summa aequabitur dimidio spatio *LMGEL*, at eadem aequatur spatio

LHDEL, ergo spatium *LMGEL*, est *d u p l u m* spatii *LHDEL*.

Distinguamus unumquodque horum spatiorum, in id quod cuilibet proprium, et id quod utriusque commune est; punctoque intersectionis rectarum *DE*, et *LM*, appellato *N*,

5 commune erit utriusque spatium *LNL*, quod vocabimus ξa , et spatio *LMGEL* proprium erit rectangulum *NG*, et spatio *LHDEL*, proprium erit rectangulum *DL*. Recta autem *DH* appellata *z*. et *DE* appellata *e*. erit rectangulum *DL* \sqcap *zy* et rectangulum *NG* \sqcap *e* – *y*, $\hat{\wedge}$ *x* – *z*. Ergo spatium *LMGEL* \sqcap ξa , + *e* – *y*, $\hat{\wedge}$ *x* – *z*, et *LHDEL* \sqcap ξa + *zy*. Ergo ξa , + *e* – *y*, $\hat{\wedge}$ *x* – *z* \sqcap $2\xi a$ + *zy*, sive ξa + *ex* – *ez* – *yx* + *yz* \sqcap $2\xi a$ + *zy*,

10 sive *ex* – *ez* – *yx* \sqcap ξa + *zy*. Et ξa \sqcap *ex* – *ez* – *yx* – *yz* sive rectangulum *DG*, demta rectangulorum *HM* et [HN] summa.

Ipsam *FD* appellemus ω et erit *z* \sqcap *x* – ω , fietque: *ex* – *ex* + *ew* – *yx* – *yx* + *yw* \sqcap ξa sive *ew* – *2yx* + *yw* \sqcap ξa . Ad ξa addatur *HM* \sqcap *yx*, itemque *NG* \sqcap *ew* – *yw*, fiet spatium

LHFGEL \sqcap *2ew* – *yx*. Et pro *y* ponendo $\frac{a^3}{x^2}$, pro *e* ponendo $\frac{a^3}{\omega^2}$, fiet: $\frac{2a^3}{\omega} - \frac{a^3}{x}$. Auferatur

15 inde *FE*, seu *ew*, seu $\frac{a^3}{\omega}$ fiet: $\frac{a^3}{\omega} - \frac{a^3}{x}$. aequalis spatio *LHDEL*. Quod si ad ξa addatur

NG fiet: $2ew - 2yx$, sive $\frac{2a^3}{\omega} - \frac{2a^3}{x}$ \sqcap spatio *LMGEL*. Unde si aequatio fuissest $\frac{a^4}{x^3} \sqcap y$

fiet puto $\frac{a^3}{\omega^2} - \frac{a^3}{x^3}$, item $\frac{3a^3}{\omega^2} - \frac{3a^3}{x^2}$.

$$y + a \quad \hat{\wedge} \quad y + b \quad \hat{\wedge} \quad y + c \quad \sqcap \quad 0.$$

Unde $y^2 + a y + ab \hat{\wedge} y + c, \sqcap y^3 + a y^2 + ab y + abc \sqcap 0$.

20 $+ b .. \quad + b .. + ac .. \quad + c .. + bc ..$

$$15 \quad Zu \quad \frac{a^3}{\omega} - \frac{a^3}{x}: \frac{a^3x - a^3\omega}{\omega x}, \text{ vel } \frac{za^3}{x^2 - [z]x}.$$

7 *DL* \sqcap *zy* (1) – *ez* sive *zy* – *ze*, (2) et *L* 11 *DM L ändert Hrsg.* 12 *FD* | appellemus
streicht *Hrsg.* | appellemus *L* 13 *ew* – *2yx* + *yw* \sqcap ξa . (1) Pro *y* ponamus $\frac{a^3}{x^2}$, et pro *e* ponamus $\frac{a^3}{\omega^2}$,
fiet: $\frac{a^3}{\omega} - \frac{2}{x}$ (2) Ad (a) x (b) ξa *L* 22 ω *L ändert Hrsg.*

$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ summetur. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \sqcap \frac{b+a}{ab}$, $\frac{1}{c} \sqcap \frac{bc+ac}{abc}$.

Hinc si series quotcunque fractionum numeratorem constantem habentium ineunda sit: aequatio fingenda est cuius incogniti, seu radices fingantur ipsi nominatores. Summa eorum erit terminus secundus: summa rectangulorum sub ipsis terminus tertius: [factus] ex omnibus terminus ultimus. Sed ut cum aliis terminis nihil sit nobis negotii, fingenda est aequatio, quae non habeat nisi terminos maximum qui tot est dimensionum quot sunt nominatores seu quasi-incognitae, secundum qui est summa nominatorum, tertium, qui ignoratur sed qui velut cognitus consideratur, qui est summa fractionum, per ultimum multiplicatarum; et ultimum qui est factus ex denominatoribus. Sed ista aequatio fateor intractabilis est: Interim synthetica methodo serviunt ista ad inveniendas summas; v.g. si sit:


$$y^{100} + 1000y^{99} * * * + 100y \sqcap 100,000.$$

Hoc modo summa omnium fractionum quarum nominatores sunt radices, numerator unitas erit $\frac{100}{100,000}$ vel $\frac{1}{1000}$. Sed et secundus terminus omitti potest. Addatur aliquid radici, seu pro y . ponatur $z + 1$. et habebitur omnium aliarum combinationum nempe et solidorum ex omnibus radicibus etc. summa.

<i>a</i>			
<i>g</i>		etc.	
<i>b</i>	<i>m</i>		
<i>h</i>	<i>s</i>		20
<i>c</i>	<i>n</i>		
<i>i</i>	<i>t</i>		
<i>d</i>	<i>o</i>		
<i>k</i>	<i>v</i>		
<i>e</i>	<i>p</i>		25
<i>l</i>	<i>w</i>		
<i>f</i>	<i>q</i>		
<i>f</i>	<i>x</i>		
0	<i>f</i>		
0	<i>f</i>		30
0			
0			

Ponantur termini inter a . et f . finitas quantitates interiecti infiniti, continue decrescentes, sed incremento tali, ut nunquam infra f descendant, quemadmodum cogitare possumus fieri, si a , ponatur esse circulus, et f . cogitetur esse quadratum inscriptum, e . octogonum inscriptum, d . hexdecagonum etc.

- 5 Videndum est an differentiae *l.k.i.* etc. ad certam seriem vel progressionem revocari possint, quae sit summabilis. Eius seriei summa aequabitur circulo. Idem est in circumferentiis polygonorum:



[Fig. 7]

- Ostensum est ab aliis si AE tangens arcus dati AB sit x , AF tangentem arcus dupli 10 AC fore $\frac{2a^2x}{a^2 - x^3}$. Hinc patet semper rationalem esse tangentem arcus dupli si rationalis tangens arcus dati. Ponatur iam arcus datus esse infinite parvus, et tangens eius esse β .

$$\text{Tangens arcus dupli erit } \frac{2a^2\beta}{a^2 - \beta^2} \text{ et tangens arcus quadrupli erit: } \frac{\frac{2a^2}{a^2 - \beta^2}}{a^2 - \frac{4a^4\beta^2}{a^4 - 2a^2\beta^2 + \beta^4}}$$

587,2 series (1) progressionis harmoni (2) quotcunque fractionum (a) nominatorem (b) numeratorem $L = 587,3$ cuius (1) | terminus streicht Hrsg. | ultimus (2) incogniti $L = 587,4$ summa L ändert Hrsg. 587,6 f. sunt (1) incognitae (2) nominatores $L = 587,8$ f. fractionum (1) et ultimum qui est (2) per ultimum (a) divisarum (b) multiplicatarum $L = 3$ esse (1) circumferentia (2) circulus $L = 6$ f. in (1) polygonis (2) in (3) circumferentiis $L = 10$ esse (1) pars (2) tangentem $L = 11$ iam (1) tangens (2) arcus L

9 ab aliis: vgl. J. PELL, *Controversiae de vera circuli mensura ... pars prima*, 1647, S. 13 u. S. 47 bis 60, wo zehn Beweise von verschiedenen Mathematikern abgedruckt sind; der Satz wird mit Hinweis auf die vorliegenden Beweise analytisch bewiesen bei Fr. van SCHOOTEN, *Tractatus de concinnandis demonstrationibus ex calculo algebraico*, 1661, DGS II, S. 366–368.

atque ita crescendo in infinitum donec ad certum perveniat terminum, qui sit v.g. quadratum circumscripturn.

Haec fere gemina illis quae alibi etiam de exprimendis ordinatis curvarum dixi.

$$\text{Progressio: } \underbrace{\frac{1}{1} - \frac{1}{3}}_{\frac{2}{3}} + \underbrace{\frac{1}{5} - \frac{1}{7}}_{\frac{2}{35}} + \underbrace{\frac{1}{9} - \frac{1}{11}}_{\frac{2}{99}}.$$

5

$$\text{Sit iam } \underbrace{\frac{1}{3} - \frac{1}{5}}_{\frac{2}{15}} + \underbrace{\frac{1}{7} - \frac{1}{9}}_{\frac{2}{63}} + \underbrace{\frac{1}{11} - \frac{1}{13}}_{\frac{2}{143}} \text{ fiet}$$

$$\text{Ergo } \frac{2}{3} + \frac{2}{35} + \frac{2}{99} \text{ etc.,,} + \frac{2}{15} + \frac{2}{63} + \frac{2}{143} \text{ etc. } \sqcap 1.$$

$$\text{Sive } \frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \frac{1}{63} + \frac{1}{99} + \frac{1}{143} \text{ etc. } \sqcap \frac{1}{2}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} \text{ etc.} \\ + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{9} + \frac{1}{11} \text{ etc.} \end{array} \right\} \sqcap \left\{ \begin{array}{l} \frac{2}{3} + \frac{2}{35} + \frac{2}{99} \text{ etc.} \\ \frac{2}{15} + \frac{2}{63} + \frac{2}{143} \text{ etc.} \end{array} \right\}$$

quia

$$\left. \begin{array}{l} \frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} \text{ etc.} \\ + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{9} + \frac{1}{11} \text{ etc.} \end{array} \right\} \sqcap \left\{ \begin{array}{l} \frac{2}{3} + \frac{2}{35} + \frac{2}{99} \text{ etc.} \\ \frac{2}{15} + \frac{2}{63} + \frac{2}{143} \text{ etc.} \end{array} \right\}$$

$$\text{Eodem modo: } \underbrace{\frac{1}{2} - \frac{1}{3}}_{\frac{1}{6}} + \underbrace{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}}_{\frac{1}{20}} + \underbrace{\frac{1}{5} - \frac{1}{6}}_{\frac{1}{42}} + \underbrace{\frac{1}{7} - \frac{1}{8}}_{\frac{1}{72}} + \underbrace{\frac{1}{9} - \frac{1}{10}}_{\frac{1}{110}}$$

$$\text{facit: } \frac{1}{2} - \frac{1}{12} + \frac{1}{30} - \frac{1}{56} + \frac{1}{90}.$$

$$\text{At } \underbrace{\frac{1}{2} - \frac{1}{3}}_{\frac{1}{6}} + \underbrace{\frac{1}{4} - \frac{1}{5}}_{\frac{1}{20}} + \underbrace{\frac{1}{6} - \frac{1}{7}}_{\frac{1}{42}} + \underbrace{\frac{1}{8} - \frac{1}{9}}_{\frac{1}{72}} + \underbrace{\frac{1}{10} - \frac{1}{11}}_{\frac{1}{110}} \text{ etc. } \sqcap$$

10

$$\frac{1}{6} - \frac{1}{20} + \frac{1}{42} - \frac{1}{72} + \frac{1}{110}.$$

15

14 f. $\frac{1}{90}$. (1) Eodem modo (2) At L

3 alibi: *Approximatio ad mensuram circularem geometrica*, LSB VII, 1 N. 62 S. 71+73, wo fast das gleiche Differenzenschema wie S. 587 Z. 18–32 auftritt.

$$\begin{aligned} \text{Ergo iungendo: } & \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} + \frac{1}{42} + \frac{1}{56} \text{ etc. } \sqcap 1 \\ \text{et } & 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10} + \frac{1}{15} + \frac{1}{21} + \frac{1}{28} \text{ etc. } \sqcap 2. \end{aligned}$$

Quod verissimum.

$$\begin{aligned} \text{Eodem modo } & \underbrace{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}}_{\frac{2}{8}} + \underbrace{\frac{1}{6} - \frac{1}{8}}_{\frac{2}{48}} + \underbrace{\frac{1}{10} - \frac{1}{12}}_{\frac{2}{120}} + \underbrace{\frac{1}{14} - \frac{1}{16}}_{\frac{2}{224}} \\ & \quad \frac{1}{4} - \frac{1}{6} \quad \frac{1}{8} - \frac{1}{10} \quad \frac{1}{12} - \frac{1}{14} \quad \text{etc. } \text{facit} \\ & \quad \frac{2}{24} \quad \frac{2}{80} \quad \frac{2}{168} \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ergo } & \left. \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \frac{1}{14} - \frac{1}{16} \text{ etc.} \right\} \sqcap \left\{ \begin{array}{l} \frac{2}{8} + \frac{2}{48} + \frac{2}{120} + \frac{2}{224} \\ + \frac{2}{24} + \frac{2}{80} + \frac{2}{168} \end{array} \right. \\ & \quad \left. + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} + \frac{1}{8} - \frac{1}{10} + \frac{1}{12} - \frac{1}{14} + \frac{1}{16} \text{ etc.} \right\} \end{aligned}$$

$$\text{Ergo: } \frac{1}{8} + \frac{1}{24} \left[+ \frac{1}{48} \right] + \frac{1}{80} \left[+ \frac{1}{120} \right] + \frac{1}{168} + \frac{1}{224} \quad \text{etc. } \sqcap \frac{1}{4}.$$

$$\text{Iam } \frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \frac{1}{63} + \frac{1}{99} + \frac{1}{143} \text{ etc. } \sqcap \frac{1}{2}.$$

$$\text{Et } + \frac{1}{8} + \frac{1}{24} \left[+ \frac{1}{48} \right] \left[+ \frac{1}{80} \right] \left[+ \frac{1}{120} \right] \text{ etc. } \sqcap \frac{1}{4}.$$

$$\text{Ergo } \frac{1}{3} + \frac{1}{8} + \frac{1}{15} + \frac{1}{24} + \frac{1}{35} \left[+ \frac{1}{48} \right] + \frac{1}{63} \left[+ \frac{1}{80} \right] + \frac{1}{99} \left[+ \frac{1}{120} \right] + \frac{1}{143} \text{ etc. } \sqcap \frac{3}{4}.$$

$$12 + \frac{1}{48} \text{ erg. Hrsg.} \quad 12 + \frac{1}{120} \text{ erg. Hrsg.} \quad 12 \text{ f. } \sqcap \frac{1}{4}. (1) \text{ Quare denique: } \frac{1}{3} + \frac{1}{8} + (2) \text{ Iam L}$$

$$14 + \frac{1}{24} | + \frac{1}{80} + \frac{1}{168} + \frac{1}{224} \quad \text{ändert Hrsg. | etc. L} \quad 15 \frac{1}{35} | + \frac{1}{80} + \frac{1}{63} + \frac{1}{168} + \frac{1}{99} + \frac{1}{224} \quad \text{ändert}$$

$$\text{Hrsg. |} + \frac{1}{143} L$$

Superest ut quaeramus summam huius seriei,

$$\underbrace{\frac{1}{3} - \frac{1}{5}}_{+ \frac{2}{15}} + \underbrace{\frac{1}{7} - \frac{1}{9}}_{+ \frac{2}{63}} + \underbrace{\frac{1}{11} - \frac{1}{13}}_{+ \frac{2}{143}} \sqcap \frac{1}{3} - \frac{2}{15} + \frac{2}{7} - \frac{2}{9} \text{ etc.}$$

$$\text{Ergo } \frac{1}{15} - \frac{1}{35} + \frac{1}{63} - \frac{1}{99} + \frac{1}{143} \text{ etc. } \sqcap \frac{1}{6} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{9} \text{ etc. } \sqcap \frac{2}{15} + \frac{2}{63} + \frac{2}{143} \text{ etc. } - \frac{1}{6}.$$

$$\text{Ergo } \frac{1}{6} \sqcap \frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \frac{1}{63} + \frac{1}{99} + \frac{1}{143} \text{ etc.}$$

5

$$\text{Ergo } \frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \frac{1}{63} + \frac{1}{99} + \frac{1}{143} \text{ etc. } \sqcap \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \sqcap \frac{3}{6} \sqcap \frac{1}{2} \text{ ut ante.}$$

$$\begin{aligned} \text{Nota si } & \frac{1}{1} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10} + \frac{1}{15} \text{ etc. multiplicentur per } \frac{2}{8}, \\ \text{fiet: } & \frac{2}{8} + \frac{2}{24} + \frac{2}{48} + \frac{2}{80} + \frac{2}{120} \text{ etc. seu} \\ & \frac{2}{9-1} + \frac{2}{25-1} + \frac{2}{49-1} \text{ etc. quod iterum ad demonstrandam aliter} \end{aligned}$$

huius quoque seriei summam servit.

10

$$\frac{1}{y^2} - \frac{1}{y^2 + 2y\beta + \beta^2} \sqcap \frac{\boxed{y^2} + 2y\beta + \beta^2 \boxed{-y^2}}{\boxed{y^2 + 2y\beta + \beta^2}, \boxed{y^2}} \text{ summabilis. (1)}$$

$$\frac{1}{y^2 - 2y\beta + \beta^2} - \frac{1}{y^2} \sqcap \frac{\boxed{y^2 - y^2} + 2y\beta + \beta^2}{\boxed{y^2 - 2y\beta + \beta^2}, \boxed{y^2}} \text{ summabilis. (2)}$$

Iungantur 1. et 2., ac primum addendo, fiet:

$$\begin{aligned} 1 \text{ f. seriei (1) } 15 \text{ (2) } \frac{1}{15} \frac{1}{63} \text{ (3) Quod si ergo vel (4) } & \underbrace{\frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{13}}_{(a)} \\ 1 + \frac{1}{15} - \frac{1}{35} + \frac{1}{63} - \frac{1}{99} + \frac{1}{143} \sqcap \frac{4}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{9} \text{ etc. (b) } 1 + \frac{2}{15} - \frac{2}{35} + \frac{2}{63} - \frac{2}{99} + \frac{2}{143} \sqcap \frac{2}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{9} \\ \text{etc., } \wedge 2 \text{ (aa) demto (bb) } \sqcap (5) \underbrace{\frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{13}}_L & \end{aligned}$$

12 (2): Auf der rechten Seite der Gleichung müßte im Zähler $-\beta^2$ stehen. Leibniz rechnet konsequent weiter, der Vorzeichenfehler beeinträchtigt die Überlegung bis S. 592 Z. 3.

$$\frac{2y\beta + \beta^2, \wedge y^2, \wedge y^2[-2y\beta] + \beta^2, , + + 2y\beta + \beta^2, \wedge y^2 \wedge y^2 + [+2y\beta] + \beta^2}{y^4, , \wedge y^4 + 2\beta^2y^2 + \beta^4, -4\beta^2y^2} \text{ sive}$$

$$\frac{4y\beta + 2\beta^2 \wedge y^2, \wedge y^2 + \beta^2}{y^4, , \wedge y^2[+2\beta^2y^2] + \beta^4[-4\beta^2y^2]}.$$

Iungi possunt et subtrahendo, et fiet $\frac{4y\beta, \wedge 2y\beta + \beta^2}{y^4, \wedge y^4 - 2\beta^2y^2 + \beta^4}$ cuius seriei datur rursum summa.

$$5 \quad \frac{1}{y} - \frac{1}{y + \beta} \sqcap \frac{y + \beta[-y]}{y^2 + \beta y}. \quad \frac{1}{y - \beta} - \frac{1}{y} \sqcap \frac{y - y + \beta}{y^2 - \beta y}.$$

Iungantur addendo, fiet: $\frac{[\beta y^2[-\beta^2 y] + \beta y^2[+\beta^2 y]]2\beta y^2}{y^4 - \beta^2 y^2} \sqcap \frac{2\beta}{y^2 - \beta^2}.$

Iungantur subtrahendo, fiet: $\frac{-\beta y^2 + \beta^2 y + \beta y^2 + \beta^2 y}{y^4 - \beta^2 y^2} \sqcap \frac{2\beta^2}{y^3 - \beta^2 y}.$

Huius ergo seriei $\frac{1}{3} + \frac{1}{8} + \frac{1}{15} + \frac{1}{24}$ etc. habetur summa, item huius:

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{60} + \frac{1}{120} \text{ etc. } [\wedge 6] \sqcap 1 \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{10} \quad \frac{1}{20}, \text{ quae est series [reciprocorum]}$$

- 10 pyramidalium, nimirum omnes numeri cubi radicibus minutis sunt senarii, et divisi per 6. dant numeros pyramidales.

$$\begin{array}{ccccccccc} \frac{1}{4-1} & + & \frac{1}{9-1} & + & \frac{1}{16-1} & + & \frac{1}{25-1} & \text{etc.} & \sqcap \frac{3}{4}. \\ \text{Iam} \quad \frac{1}{4-1} & \sqcap & \frac{1}{4} & + & \frac{1}{16} & + & \frac{1}{64} & + & \frac{1}{256} \text{ etc.} \\ \frac{1}{9-1} & \sqcap & \frac{1}{9} & + & \frac{1}{81} & + & \frac{1}{729} & + & \frac{1}{6561} \text{ etc.} \end{array}$$

5 Nebenrechnung: $\frac{1}{y} - \frac{1}{y+b} \sqcap \frac{y+b-y}{y^2+by} \sqcap \frac{b}{y^2+by}$

9 $\wedge 6$ erg. Hrsg. 9 reciprocorum erg. Hrsg.

Omnis ergo omnium fractionum potestates exponentium parium simul sumtae aequaliter quantur tribus quartis.

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{6} + \frac{1}{9} - \frac{1}{12} + \frac{1}{15} - \frac{1}{18}$$

$$\frac{3}{18} \qquad \qquad \qquad \frac{3}{108} \qquad \qquad \qquad \frac{3}{270}$$

$$\frac{1}{\cancel{6}} \qquad \qquad \qquad \frac{1}{\cancel{108}} \qquad \qquad \qquad \frac{1}{\cancel{270}}$$

$$\frac{1}{c} - \frac{1}{9} + \frac{1}{12} - \frac{1}{15} + \frac{1}{18} - \frac{1}{21}$$

$$\frac{3}{54} \qquad \qquad \frac{3}{180} \qquad \qquad \frac{3}{378}$$

$$\frac{1}{18} \qquad \qquad \frac{1}{60} \qquad \qquad \frac{1}{126}$$

$$\text{Ergo } \frac{1}{3} - \frac{1}{6} + \frac{1}{9} - \frac{1}{12} + \frac{1}{15} - \frac{1}{18} \text{ etc. } \left. \right\} \quad \left. \begin{array}{c} \frac{1}{6} \\ \frac{1}{36} \\ \frac{1}{90} \end{array} \right\} \text{ etc.}$$

$$+ \frac{1}{6} - \frac{1}{9} + \frac{1}{12} - \frac{1}{15} + \frac{1}{18} \text{ etc. } \left\{ \begin{array}{c} \\ \parallel \\ \end{array} \right\} \frac{1}{18} \frac{1}{60} \frac{1}{126} \text{ etc.}$$

$$\text{Ergo } \frac{1}{6} + \frac{1}{18} + \frac{1}{36} + \frac{1}{60} + \frac{1}{90} + \frac{1}{126} \quad \text{etc. } \sqcap \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{[9]} + \frac{1}{18} + \frac{1}{30} + \frac{1}{45} + \frac{1}{63} \quad \text{etc.} \sqcap \frac{2}{3} \text{ et}$$

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10} + \frac{1}{15} + \frac{1}{21} \quad \sqcap 2, \text{ ut dudum scimus.}$$

$$\text{Sed } \frac{1}{1} - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} - \frac{1}{10} + \frac{1}{13} - \frac{1}{16} \text{ etc.}$$

$$\frac{3}{4}, \quad \frac{3}{70}, \quad \frac{3}{208} \quad \text{etc.}$$

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{7} + \frac{1}{10} - \frac{1}{13} + \frac{1}{16} - \frac{1}{19} \text{ etc.}$$

$$\frac{3}{28} \quad \frac{3}{130} \quad \frac{3}{304} \quad \text{etc.}$$

ium (1) totius (2) rerum (combi) (3) fractionum L 13

¹ omnium (¹) totius (²) rerum (^{combi}) (³) fractionum *L* 13 6 *L ändert Hrsq.*

Unde $\frac{1}{4} + \frac{1}{28} + \frac{1}{70} + \frac{1}{130} + \frac{1}{208} + \frac{1}{304} \sqcap \frac{1}{3}$
 $\frac{1}{2} \quad \frac{1}{14} \quad \frac{1}{35} \quad \frac{1}{65} \quad \frac{1}{104} \quad \frac{1}{152}$ etc. $\sqcap \left[\frac{2}{3} \right]$

Series quadratrix $\frac{1}{4y^2 - 1}$. Ponendo y esse numerum imparem, erit differentia:

$$\frac{1}{4y^2 - 1} - \frac{1}{4y^2 + 16y + 15}, \text{ seu } \frac{16y + 16}{16y^4 + 64y^3 + 60y^2 - 16y - 15}.$$

5 Si invicem addantur $\frac{a^3}{a^2 + y^2}$ et $\frac{a^3}{y^2 - a^2}$, fiet: $\frac{2y^2[a^3]}{y^4 - a^4}$.

Si invicem addantur $\frac{a^3}{a^2 + y^2}$ et $\frac{a^3}{a^2 - y^2}$, fiet: $\frac{[2]a^5}{a^4 - y^4}$. Qua habita habetur et

$$\frac{a^4}{a^4 - y^4}, \text{ inde } \frac{y^4 + y^8 + y^{12} + y^{16}}{\frac{1}{5} \quad \frac{1}{9} \quad \frac{1}{13} \quad \frac{1}{17}}$$

Iam $\frac{y^2}{a^2 + y^2} \sqcap \frac{y^2 - y^4 + y^6}{\frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{9}}$ etc. Addendo ergo $\frac{y^4}{a^4 - y^4}$, et $\frac{y^2}{a^2 + y^2}$ summa

omnium fiet: $\frac{[a^2y^2]}{a^4 - y^4} \sqcap \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{11}$ etc.

10 Quid si sit: $\frac{y^2a}{a^2 + 2ay + y^2} \sqcap x$, fiet:

$$\frac{y^2a}{a^2}, -\frac{2ay[+]y^2, \wedge y^2a}{a^4} + \frac{2ay[+]y^2, \square, \wedge y^2a}{a^6} \text{ etc.}$$

$$\frac{a^2}{a^2 + 2ay + y^2} \text{ quadrabilis.}$$

2 $\frac{1}{6} L$ ändert Hrsg. 4 $- \frac{1}{4y^2 + 16y + 15}$, (1) differentia (2) seu L 5 a^3 erg. Hrsg. 6 2
erg. Hrsg. 9 $2y^4 + a^2y^2$ L ändert Hrsg. 11 $- L$ ändert Hrsg. zweimal

$$\frac{1}{4y^2 - 1} \sqcap \frac{1}{2y + 1, 2y - 1}.$$

$$\left[-\frac{1}{4y^2, +2, 2y, 2, +, 4 - 1} + \frac{1}{4y^2 - 1} \sqcap \frac{\boxed{4y^2} + 8y + 3 \boxed{-4y^2} + 1}{\boxed{2y + 2} \boxed{2} - 4y^2} \right] \sqcap \frac{2y + 2, +2y, , \wedge 2y + 2, -2y \sqcap 8y + 4}{\boxed{2y + 2} \boxed{2}, -1, , 4y^2 - 1}$$

dividatur per $2y + 1$, tam

nominator quam numerator, fiet: $\frac{4}{\boxed{2y + 2} \boxed{2}, -1, , 2y - 1} \sqcap \frac{4}{2y + 1, 2y + 3, 2y - 1}$ quae

ducta in $2y + 3$. distantiam a vertice aliquo, dabit: $\frac{4}{4y^2 - 1}$. Et quadruplum summae, 5

habetur ex ductu hoc differentiarum. Cum aliunde constet hunc ductum dare eius complementum, unde videtur aliquid duci ad summam seriei huius quadraticis ineundam.

$$\begin{array}{ccccc} 2 & 6 & 10 & 14 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{35} & \frac{1}{99} & \frac{1}{[195]} & \frac{1}{323}. \end{array}$$

Esto y numerus impar, erit $\frac{1}{4y^2 - 1}$ terminus seriei quadraticis. 10

$$\begin{aligned} 1-4 \sqcap \frac{1}{2y + 1, 2y - 1}. (1) \frac{1}{4y^2, +2, 2y, 2, +4, -1} - \frac{1}{4y^2 - 1} (2) -\frac{1}{4y^2, +2, 2y, 2, +4, -1} + \frac{1}{4y^2 - 1} \sqcap \\ \boxed{4y^2} + 8y + 3 \boxed{-4y^2} + 1 \sqcap \frac{\boxed{2y + 2} \boxed{2} - 4y^2}{\boxed{2y + 2} \boxed{2}, -1, , 4y^2 - 1} \sqcap \frac{2y + 2, , +2y, , \wedge 2y - 2, -2y \sqcap 8y + 4}{\boxed{2y + 2} \boxed{2}, -1, , 4y^2 - 1} (a) \end{aligned}$$

vidatur per $2y + 1$, (aa) fiet (bb) tam nominator quam numerator, fiet: $\frac{4}{\boxed{2y + 2} \boxed{2}, -1, , \wedge 2y - 1} \sqcap$

$\frac{4}{2y + 1, 2y + 3, 2y - 1}$ (b) multiplicetur per $2y + 1$, fiet (3) $| -\frac{1}{4y^2, +2, 2y, 2, +16, -1} + \frac{1}{4y^2 - 1} \sqcap$

$\boxed{4y^2} + 8y + 15 \boxed{-4y^2} + 1 \sqcap \frac{\boxed{2y + 2} \boxed{2} - 4y^2}{\boxed{2y + 4} \boxed{2}, -1, 4y^2 - 1} \sqcap \frac{2y + 4, , +2y, , \wedge 2y - 2, -2y \sqcap 8y + 16}{\boxed{2y + 4} \boxed{2}, -1, 4y^2 - 1} ändert$

Hrsg. | dividatur per $y + 2$, fiet $\frac{4}{\boxed{2y + 4} \boxed{2}, -1, , \wedge 2y - 1} \sqcap \frac{4}{2y + 1, 2y + 3, 2y - 1} gestr., erg. u. ändert$

Hrsg. | quae L

6 aliunde constet: Leibniz verwendet den Satz bereits S. 578 Z. 8 f.

$\frac{1}{y} - \frac{1}{y-1} \sqcap \frac{y+1-y}{y^2+[y]} \sqcap \frac{1}{y^2+[y]}$. Sed quia differentiae ipsarum y sunt 2[,] sic potius faciemus: $\frac{1}{y} - \frac{1}{y+2}$, vel potius denique: $\frac{1}{2y} - \frac{1}{2y+2}$ fiet: $\frac{2y+2-2y}{4y^2+4y} \sqcap \frac{1}{2y^2+2y}$, cuius dimidium $\frac{1}{4y^2+4y}$. Vel ita: $\frac{1}{2y-2} - \frac{1}{2y} \sqcap \frac{(2y-2y)+2}{4y^2-4y}$ cuius dimidium: $\odot \frac{1}{4y^2-4y}$, addatur ad $\mathbb{D} \frac{1}{4y^2+4y}$ fiet $\frac{4y^2(+4y^2)+4y^2(-4y^2)}{16y^4-16y^2}$, sive $\frac{1}{2y^2-2}$ cuius duplum $\wp \frac{1}{y^2-1}$.

5 Contra si alterum ab altero auferatur, $\mathbb{D} a \odot$, restabit $\frac{(+4y^2)+4y(-4y^2)+4y}{16y^4-16y^2}$ cuius [duplum]: $\wp \frac{1}{y^3-y}$. Cuius seriei habetur summa. Addantur hae duae series, \wp et \wp , fiet:

595,9 Nebenrechnungen:

Zur Lesart, nicht gestrichen:

14	5	18
14	14	18
56	285 f 19	144
14	155	18
296 [!]	1	296

Zum gültigen Text:

14	5	18
14	14	18
56	285 f 19	144
14	155	18
296 [!]	1	296

595,9 f. $\frac{1}{99} | \frac{1}{295}$ ändert Hrsg. $| \frac{1}{323}$. (1) Multiplicentur ista per 3. 7. 11. 15. 19. (2) Esto L

1 1 L ändert Hrsg. zweimal 3 $\frac{1}{4y^2+4y}$. (1) Unde auferenda a (a) $\frac{2}{4y^2-1}$, restabit

$$\frac{1}{4y^2-1} - \frac{1}{4y^2+2} \sqcap \frac{(4y^2)+2(-4y^2)+1}{16y^4+8y^2-2} \sqcap \frac{3}{16y^4+4y^2-2}$$

(2) Vel $L = 4$ fiet (1) $\frac{4y^2(+4y)+4y^2(-4y)}{16y^4+16y^2}$,

sive (a) $\frac{8}{2y^2+2}$ (b) $\frac{1}{2y^2+2}$ (c) $\frac{y^2}{2y^2+2}$ cuius duplum erit: $\frac{y^2}{y^2+1}$, vel $1 - \frac{1}{y^2+1}$. Contra (2)

$$\frac{4y^2(+4y)+4y^2(-4y)}{16y^4+16y^2} L = 5$$

si (1) addantur simul, fiet: (2) alterum $L = 6$ quadruplum L ändert Hrsg.

$\frac{y+1}{y^3-y} \sqcap \frac{1}{y-1, \wedge y} \sqcap \frac{1}{y^2-y}$. Contra si altera ab altera auferatur, fiet: $\frac{y-1}{y^3-y} \sqcap \frac{1}{y^2+y}$.

$$\begin{array}{cccccc} \frac{1}{4+2} & \frac{1}{9+3} & & \frac{1}{4-2} & \frac{1}{9-3} & \frac{1}{16-4} & \frac{1}{25-5} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{12} & \frac{1}{20} & & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & \frac{1}{12} & \frac{1}{20} \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc} \frac{1}{4-2} & - & \frac{1}{4+2} & \sqcap & \frac{2+2}{16-4} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{9-3} & - & \frac{1}{9+3} & \sqcap & \frac{\boxed{9}+3\boxed{-9}+3}{81-9} & \frac{1}{12} \\ \frac{1}{16-4} & - & \frac{1}{16+4} & \sqcap & \frac{8}{256-96} & \sqcap \frac{1}{32-2} \quad \sqcap \frac{1}{30} \end{array}$$

5

41. AUS UND ZU GOSSELINS DE ARTE MAGNA

[Oktober 1674 – Januar 1675]

Leibniz hat — vermutlich während seines Aufenthaltes in Paris — ein Exemplar von G. Gosselins *De arte magna*, Paris, 1577 erworben, das sich heute in der Niedersächsischen Landesbibliothek Hannover befindet. Oben auf dem Titelblatt steht ein Eintrag von fremder Hand: „ex lib: Jacobi Michelet de La Cheuallerye. §9. n°. 109.“

Die gestrichene Marginalie auf fol. 11 r^o (= S. 599 Z. 13–22) dürfte unmittelbar vor N. 41₂ entstanden sein, wo dieselbe Rechnung korrekt durchgeführt ist (= S. 602 Z. 4–16). Dies kann frühestens im Oktober 1674 geschehen sein, da in N. 41₂ auf das datierte Stück N. 38₁₆ verwiesen wird. Das Wasserzeichen von N. 41₂ ist für September 1674 bis Januar 1675 belegt. N. 41₂ muß vor dem 3. März 1675 entstanden sein, da es in dem datierten Stück N. 44₂ erwähnt wird.

Dem Text Gosselins ist die Blattzählung der Ausgabe von 1577 in eckigen Klammern vorangestellt. Die Marginalien von Leibniz werden als Fußnote wiedergegeben. Marginalien, Korrekturen oder Unterstreichungen im Inhaltsverzeichnis sowie auf fol. 4 r^o–7 r^o, 9 r^o, 11 r^o u. 25 v^o, die von fremder Hand stammen oder Leibniz nicht eindeutig zugeschrieben werden können, sind nicht wiedergegeben.

41₁. HANDEXEMPLAR

Überlieferung: *LiH* Marginalien in G. GOSSELIN, *De arte magna*, Paris, 1577: *Niedersächs. Landesbibl.* Nm-A 317
Cc 2, Nr. 00

[fol. 5 v^o]

...

Theorema nostrum ad rationem vestigandi lateris Cubici. Cap. VII.

Si numerus in duas partes quascunque secetur Cubus totius aequalis erit Cubis par-

25 tium; et facto ex triplo uniuscuiusque partis in factum ex una in alteram, ut 8 dividatur in 5 et 3, Cubus 8 est 512: Cubus 5. est 125, Cubus 3. est 27, factus ex 3 in 5. est numerus

24–599,3 $a + b^3 \sqcap a^3 + b^3 + 3ab \wedge a + b \sqcap a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ vel $\sqcap a^2, \wedge a + 3b, , +b^2, \wedge 3b + a$ vel $\sqcap a, \wedge a^2 + 3ab + 3b^2, +b^3$ vel $\sqcap a^3, +b, \wedge 3a^2 + 3ab + b^2.$

6 Jacobi Michelet de La Cheuallerye: nicht ermittelt.

15, qui ductus in triplum 5. hoc est in 15, facit 225, idem numerus 15 ductus in triplum 3 hoc est 9 efficit 135, quae omnia simul sumpta aequalia sunt Cubo 8, nam 125, 27, 225, et 135, faciunt 512.

...

[fol. 11 r^o/v^o]

5

...

De Proportione Arithmetica. Cap. IX
Dato latere vestigandi cuiuscunque Polygoni
generalis ratio et facilis.

Auferemus 2 ex numero Polygoni, auferemus et monadem a latere, tum residuos hos numeros multiplicabimus invicem, facto addemus 2, summa haec ducta in semissem,

10–600,3 *Gestrichen:*

$$\begin{array}{r}
 b - 2 \\
 y - 1 \\
 \hline
 -2y + 2 \\
 +b.. \underline{-b} \\
 \hline
 +2 \\
 \hline
 -2y + b \\
 +b.. \\
 \hline
 \frac{y}{2} \\
 \hline
 \end{array}
 \quad \text{15}$$

$$\begin{array}{r}
 -y^2 + \frac{b}{2}y \\
 +\frac{b}{2}.. \\
 \hline
 \end{array}
 \quad \text{20}$$

15 f. (1) $-2y - 2$ (2) $-2y + 2$ L
 $+b.. \underline{+b}$ $+b.. \underline{-b}$

18 +b: Richtig wäre $-b + 4$; Leibniz erkennt den Fehler, korrigiert unvollständig und streicht die Marginalie. Richtig durchgeführt ist die Rechnung in N. 41₂ S. 602 Z. 4–16.

vel contra semissis lateris in hanc summam, facit polygonum quaesitum. Atque hanc a se excogitatam rationem demonstravit Vir Doctissimus M. Bressius Professor Mathematicus.

Vestigemus triangulum ab latere 6, quia triangulum habet tres angulos, subductis 2 restat 1, deduco etiam 1 ex 6, restat 5, quem multiplico in 1 residuum angularum fit ipse 5, cui addo 2, existit 7, hunc multiplico per semissem 6 lateris, hoc est per 3, exurgunt 21, triangulus ab latere 6.

Vestigemus Pentagonum ab latere 6, deduco 2 ex 5 numero angularum, restant [3], deduco 1 ex 6, supersunt 5, residuos hos numeros invicem multiplico, 5 in 3, fiunt 15, addo 2, existunt 17, quae multiplico per 3 semissem 6 lateris, fiunt 51, atque tantus est Pentagonus cuius latus est 6. Idemque de reliquis esto iudicium.

8-11

$$\begin{array}{r}
 5 - 2 \sqcap 3 \sqcap b - 2 \\
 y - 1 \\
 y - 1, \hat{\wedge} \underbrace{b - 2}_{c}, +2, , \hat{\wedge} \frac{y}{2} \\
 yc - ca + 2a^2 \\
 \hline
 y^2c - ca \quad y \\
 \hline
 + 2a^2 \\
 \hline
 2
 \end{array}$$

8 2 H ändert LiH

2 demonstravit: Beweis von M. Bressieu nicht gefunden. — Der Satz ist bereits bewiesen in DIOPHANT, *De multangulis numeris*, prop. 8.

41₂. DE SUMMA FRACTIONUM QUARUM NOMINATORES NUMERI POLYGONI

Überlieferung: L Konzept: LH 35 IV 17 Bl. 10–11. 1 Bog. 4°. 2 1/2 S. Bl. 11 v° leer.
 Überschrift ergänzt.

Cc 2, Nr. 756

5

De summa fractionum quarum numeratores constans;
 nominatores numeri polygoni.

Ex Gosselino *De arte magna sive algebra lib. 1. cap. 11 [!]. Dato latere vestigandi polygoni ratio generalis ac facilis.*

Auferemus 2 ex numero angulorum; auferemus et monadem a latere[;] residuos multiplicabimus invicem; facto addemus 2; summa ducta in lateris semissem, dabit polygonum quae situm.

V. g. vestigemus Δ^{lum} a latere 6, quia triangulum tres habet angulos, subductis 2 restat 1; ex 6 aufer 1 restat 5. Iam $5 \hat{\wedge} 1 \sqcap 5$, adde 2, fit 7, multiplica per $\frac{6}{2} \sqcap 3$, fiet 21 triangularis numerus quae situs.

10

Ego id analyticce ita enuntio: Si numerus angulorum sit b , latus sit y . Erit polygonum

$$\left\{ \begin{array}{l} -2ay^2 \\ +b .. \\ \hline 2 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} +4a^2y \\ -ba .. \\ \hline 2 \end{array} \right. \quad \text{sive } b-2, \hat{\wedge} y-1, , +2, , , \hat{\wedge} \frac{y}{2}.$$

15

8 Ex Gosselino: *De arte magna*, 1577, Buch 1, Kap. IX, Bl. 11 r° [Marg.]. 16–18 Erit polygonum: Leibniz berechnet hier die allgemeinere Formel $((b-2a)(y-a) + 2a^2)\frac{y}{2}$, in der a für die Einheit steht (vgl. N. 36 S. 366 Z. 2 f.).

Si esset $\frac{e}{a}y^2 + ely + el^2 - \beta e^2$ iniri poterit summa, fractionum ab ipsis denominatarum, ut alibi a me inventum est. Sunt autem e . a . β . datae; iam ut termini ubique conferri

601,18 *Nebenbetrachtung:*

$$\begin{array}{rcl}
 & b - 2 & 3 - 2 \sqcap 1 \\
 5 & \underline{y - 1} & 6 - 1 \sqcap 5 \\
 \\
 & -2y + 2 & \\
 & +b.. - b & \\
 & \underline{\underline{+ 2}} & \\
 \\
 10 & -2y + 4 & \\
 & +b.. - b & \\
 & \underline{y} & \\
 & \underline{\underline{2}} & \\
 \\
 & -y^2 + 2y & \\
 & +\frac{b}{2}.. - \frac{b}{2}.. & \\
 & \underline{\underline{-36}} & +12 \\
 15 & 54 \left(\begin{matrix} +3 & 18 \end{matrix} \right) & -9 \\
 & \diagup & \\
 & 18 & \overline{+3} \quad \sqcap 21
 \end{array}$$

2 datae; (1) | iam streicht Hrsg. | termini conferantur, fiet: $-2a + b \sqcap 2e$ et $e \sqcap \frac{-2a + b}{2}$ (2) iam

$$L \quad 14-16
 \begin{array}{c}
 (1) \quad \left(\begin{matrix} +3 & 9 \end{matrix} \right) \quad \left(\begin{matrix} -3 & 3 \end{matrix} \right) \\
 \left(\begin{matrix} \frac{3}{2} & 9 \end{matrix} \right) \quad \left(\begin{matrix} -\frac{3}{2} & 3 \end{matrix} \right) \\
 \frac{27}{2} \quad -\frac{9}{2}
 \end{array}
 \left. \right\} \quad \frac{27 - 9}{2} \sqcap \frac{18}{2} \sqcap 9
 \quad (2) \quad \left(\begin{matrix} -36 \end{matrix} \right) \quad L
 \begin{array}{c}
 54 \left(\begin{matrix} +3 & 18 \end{matrix} \right) \\
 \diagup \\
 18
 \end{array}$$

2 alibi: N. 38₁₆ S. 532 Z. 5 – S. 533 Z. 6.

possint scribatur: $2ez^2 + 2elz + 2el^2 - 2\beta e^2$. Et in polygono pro y . pone $z + f$. fiet $y^2 \sqcap z^2 + 2fz + f^2$ et iam ordinando:

$$\begin{array}{rcl} - & 2az^2 & - & 4faz & - & 2af^2 \\ + & b.. & + & [2]bf.. & + & bf^2 \\ & & & + & 4a^2.. & + & 4a^2f \\ & & & - & ba.. & - & baf . \end{array}$$

5

$$\text{Conferantur termini terminis: } e \sqcap \frac{-2a+b}{2}, l \sqcap \frac{-4fa+[2]bf+4a^2-ba}{2e \sqcap -2a+b}.$$

$[2e]l^2 \sqcap -2af^2 + bf^2 + 4a^2f - baf + 2\beta e^2$. Quibus valoribus inter se iunctis habebitur valor ipsius f . pariter et l . Quibus obtentis poterit inveniri fractionum omnium a polygonis denominatarum, numeratorem constantem habentium summa. In triangulo ipsa f . necessaria non est. 10

Summam habens seriei $\frac{1}{y^2 + ly + l^2}$ quaeritur summa huius seriei: $\frac{1}{z^2 + \frac{1}{2}\beta z}$.

 $-\beta^2$

Pone $z \sqcap y + d$. erit $z^2 \sqcap y^2 + 2dy + d^2$. et $\frac{1}{2}\beta z$. erit $\sqcap \frac{1}{2}\beta y + \frac{1}{2}\beta d$. et conferendae erunt

$$\left\{ \begin{array}{rcl} y^2 & + & ly & + & l^2 \\ & & - & & \beta^2 \\ y^2 & + & 2dy & + & d^2 \\ & + & \frac{1}{2}\beta.. & + & \frac{1}{2}\beta d. \end{array} \right. \quad 15$$

formulae hae:

$$\text{Erit } l \sqcap 2d + \frac{1}{2}\beta \sqcap \frac{4d+\beta}{2}, \text{ et } l^2 \sqcap \frac{16d^2 + 8d\beta + \beta^2}{4}. l^2 - \beta^2 \sqcap d^2 + \frac{1}{2}\beta d, \text{ ergo} \quad 20$$

$$\frac{\overbrace{16}^{12} d^2 + \overbrace{8}^{6} d \beta \overbrace{+ \beta^2}^{3} - \overbrace{4}^{3} \beta^2}{\not{4}} \sqcap \frac{\overbrace{4d^2}^{3} + \overbrace{2\beta d}^{3}}{\not{4}} \text{ sive } 4d^2 + 2d\beta \sqcap \beta^2, \text{ sive } d^2 + \frac{1}{2}d\beta + \frac{1}{16}\beta^2 \sqcap$$

$$\frac{1}{16}\beta^2 + \frac{\beta^2}{4} \sqcap \frac{5\beta^2}{16} \text{ et erit } d + \frac{1}{4}\beta \sqcap \frac{\beta\sqrt{5}}{4}, \text{ sive } d \sqcap \frac{\beta\sqrt{5}, -\beta}{4}.$$

4+7 2 erg. Hrsg. zweimal 8 2e erg. Hrsg. 9 ipsius f. (1) eademque methodo (2) pariter
L

Maioris certitudinis causa cum hac serie conferamus (ex qua ista: $y^2 + ly + l^2$ facta

$-\beta^2$

$$+ \frac{1}{2}f\beta$$

est):
$$\begin{array}{rcl} y^2 & \left\{ \begin{array}{l} +2ga \quad y \\ +f\beta \quad .. \\ \hline f \end{array} \right. & \left\{ \begin{array}{l} +g^2a^2 \quad , \text{ fiet: } 2df \left[+\frac{1}{2}\beta f \right] \sqcap 2ga + [+f\beta]. \\ +f\beta ga \\ \hline f^2 \end{array} \right. \end{array}$$

5

Unde $4df - f\beta \sqcap 4ga$, sive $f \sqcap \frac{4ga}{4d - \beta}$ et $f^2 \sqcap \frac{16g^2a^2}{16d^2 - 8d\beta + \beta^2}$.

Iam $2d^2f^2 + \beta df^2 \sqcap 2g^2a^2 + 2f\beta ga$.

$$\begin{array}{c} 16g^2a^2 \\ \hline 16d^2 - 8d\beta + \beta^2 \end{array} \qquad \begin{array}{c} 4ga \\ \hline 4d - \beta \end{array}$$

Unde:

10
$$\begin{array}{c} 24 \\ \hline 32 \\ \hline 16 \\ \hline \end{array} \beta dg^2a^2 \sqcap \begin{array}{c} 32d^2g^2a^2 \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} -16d\beta g^2a^2 \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} +2\beta^2g^2a^2 \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} +8\beta g^2a^24d \\ \hline \end{array} -$$

$\begin{array}{c} 6 \\ \hline 8 \end{array} \beta g^2a^2\beta$ fiet $4d \sqcap -\beta$ seu $d = \frac{-\beta}{4}$. Sed ita ex formula proposita $y^2 + 2dy + d^2$ fiet:

$$+ \frac{1}{2}\beta.. + \frac{1}{2}\beta d$$

1–4 ex qua ... facta est: Leibniz übernimmt die folgende Formel aus N. 38₁₆ S. 529 Z. 2.

10 Leibniz übersieht den Faktor 4 im vorletzten Term der rechten Seite der Gleichung, deren Reduktion $0 = -6\beta^2g^2a^2$ ergäbe. Im weiteren Verlauf treten zusätzliche Rechenfehler auf: Konsequent gerechnet müßte in S. 605 Z. 1 $y^2 - \frac{\beta^2}{16}$ stehen, in S. 605 Z. 3 $f \sqcap \frac{4ga}{8d}$ sowie $f \sqcap \frac{-2ga}{\beta}$; in S. 605 Z. 12–14 fehlt der Term $+16\beta^2gay$ hinter der Klammer und in S. 605 Z. 14 müßte $-4g^2a^2\beta y$ im Nenner des ersten Bruches stehen.

$$y^2 - \frac{\beta}{2}y + \frac{\beta^2}{16}, \text{ sive } y^2 * -\frac{\beta^2}{8}.$$

$$+ \frac{\beta}{2} \dots - \frac{\beta^2}{8}$$

$$\text{At } f \sqcap \frac{ga}{8d} \text{ sive } f \sqcap \frac{-ga}{2\beta}.$$

$$\begin{aligned} & \text{Igitur ex quantitate: } \ddagger \frac{cy + da}{fy + ga} \mp \frac{+da}{fy + f\beta} \text{ fiet: } \ddagger \frac{cy - \frac{\beta a}{4}}{-\frac{ga}{\beta}y + ga} \mp \frac{-\frac{\beta a}{4}}{\frac{-ga}{2\beta}y + \boxed{\square} \frac{ga}{2}} \\ & \qquad \qquad \qquad \boxed{+ga} \end{aligned} \quad 5$$

$$\text{sive: } \ddagger \frac{4c\beta y + 4c\beta^2}{-2gay + 4ga\beta} \mp \frac{-\beta^2 a}{-2gay + 2ga\beta}.$$

$$\begin{aligned} & \ddagger \left\{ \begin{array}{l} -8c\beta gay^2 + 2\beta^2 a^2 gy \\ -8c\beta^2 ga.. - 2\beta^3 a^2 g \end{array} \right. \\ & \ddagger \left\{ \begin{array}{l} -8c\beta ga.. - 8c\beta^2 ga.. + 16ga\beta^3 c \\ \hline 2ga^2\beta^2.. - 4ga^2\beta^3 \end{array} \right. \text{ sive } \frac{\ddagger 16ga\beta^3 c \mp 2ga^2\beta^3, \cup 4g^2a^2}{y^2 - 4\beta y + 2\beta^2}. \end{aligned} \quad 10$$

$1+3 - \frac{\beta^2}{8}$. (1) Sed hoc nihil noceret, nisi inde quantitas ipsius f. fieret infinita, nam $4d - \beta \sqcap 0$
(2) At L

5 ex quantitate: Leibniz übernimmt die folgende Formel aus N. 38₁₆ S. 530 Z. 1–8.

42. DE GENERALIBUS CALCULIS CONSTITUENDIS

[Oktober 1674 – Januar 1675]

Überlieferung:

L Notiz: LH 35 XIII 1 Bl. 228. 1 Ausschnitt ca 20,9 x 1,2 cm. 1 1/2 Z. auf Bl. 228 r°. Bl. 228 v°

5 leer. — Spuren fremden Textes an der oberen und unteren Schnittkante.

E (mit dt. Übs.): KNOBLOCH, *Übersicht*, S. 4.

Cc 2, Nr. 1514

Datierungsgründe: Die schwer zu datierende Notiz ist offenbar während des Parisaufenthalts entstanden. Mit der Summierung von Reihen mittels der Berechnung von Momenten befaßt sich Leibniz

10 hauptsächlich ab Oktober 1674 (vgl. N. 38, N. 40, N. 45). Ähnliche Überlegungen wie in der vorliegenden Notiz äußert Leibniz detaillierter im Schlußabschnitt von N. 43₃ vom Januar 1675. N. 42 dürfte also in der Zeit von Oktober 1674 bis Januar 1675 entstanden sein.

Constituendi generales calculi de s u m m i s , e t s u m m i s s u m m a r u m et
momentis ex basi vel vertice. Hinc praeclara admiranda et generalia habebuntur.

43. DE SERIEBUS SUMMABILIBUS

Januar 1675

Die folgenden drei Stücke stehen in einem engen Zusammenhang und sind von Leibniz unter eine Überschrift gestellt worden. Den im ersten Teilstück durchgeföhrten Ansatz überprüft er im zweiten mittels Kontrollzahlen, wobei er im ersten Teilstück Kontrollzahlen, Neunerproben und Nebenrechnungen sowie eine Schlußbemerkung nachträgt. Das dritte Teilstück setzt die Betrachtung fort.

5

43₁. DE SERIEBUS SUMMABILIBUS PARS PRIMA

Januar 1675

Überlieferung: L Konzept: LH 35 VIII 4 Bl. 1. 1 Bl. 1°. 1 S. auf Bl. 1 r°. Bl. 1 v° leer. Links 10
Rand max. 6 cm. Am Rande Nebenrechnung zu N. 43₂ (= S. 625 Z. 6–18).
Cc 2, Nr. 892 tlw.

Januar. 1675

D e s e r i e b u s s u m m a b i l i b u s ,
et in specie hac: $\frac{1}{z^2 + \frac{\beta}{2}z}$ ① 15 *

Reperi duo maxima geometriae problemata reduci ad summam huius seriei numerorum rationalium decrescentis in infinitum productae, $\frac{1}{z^2 + \frac{\beta}{2}z}$ ponendo z esse in-

$$\frac{1}{z^2 + \frac{\beta}{2}z} *$$

determinatam progressionem arithmeticam crescentem, sive primanam, 1.2.3.4.5. etc. vel 1.3.5.7. etc. vel 2.5.8.11. etc. et β esse huius arithmeticæ progressionis intervallum, ac proinde quantitatem eandem perpetuo et constantem.

20

15 ① erg. L 17 f. indeterminatam (1) geometrica (2) progressionem L

16 problemata: Gemeint sind die Kreis- und die Hyperbelquadratur; s. u. N. 43₃.

Ut autem appareat, an haec series sit summabilis, nullam hactenus aliam novi methodum, quam ut omnium serierum summabilium, ipsi seriei datae, aut eius multiplae similium, fiat enumeratio. Reperta enim a me ratio est, si quis laborem calculi subire velit, enumerandi series numerorum summabiles omnes. Nimirum series sunt summabiles, quae sunt differentiae serierum. Itaque series *puras*, atque *rationales*, id est in quibus quantitas indeterminata non ingreditur ullam radicem, enumerare incipiemus, earumque differentias investigare. Quod si hac methodo res non succedit, videndum est, quibus casibus effici potest, ut serierum irrationalium aut non purarum, differentiae tamen fiant rationales et purae.

10 Incipiemos a rationalibus et puris, ex quibus simplicissima,

$$\textcircled{I} \frac{y+d}{y+g}: \text{et differentia: } \textcircled{II} \frac{y+d}{y+g} + \frac{d}{y+\beta} \text{ qua reducta multiplicando per crucem}$$

$$+ g$$

(\times) fiet \textcircled{III} $\frac{\frac{dy}{y^2}}{\frac{dy}{y^2}} + \frac{\beta d}{y^2} \sim y^2 + 2gy + g^2$ et destructis destruendis at-

$\frac{dy}{y^2}$	$\frac{\beta d}{y^2}$	$y^2 + 2gy + g^2$
$\frac{dy}{y^2}$	$\frac{g..}{y^2}$	$+ \beta .. + \beta g$
$\frac{dy}{y^2}$	$\frac{g..}{y^2}$	
$\frac{\beta d}{y^2}$	$\frac{g..}{y^2}$	
$\frac{dy}{y^2}$	$\frac{g..}{y^2}$	
$\frac{dy}{y^2}$	$\frac{g..}{y^2}$	

que ordinando in modum fractionis fiet: $\textcircled{IV} \frac{\frac{\beta d + g\beta}{y^2 + 2gy + g^2}}{y^2 + 2gy + g^2} + \beta .. + \beta g$.

$$\text{Quod si ab initio posuissemus } \textcircled{V} \frac{y+d}{fy+ga} \text{ habuissemus: } \textcircled{VI} \frac{\frac{\beta df + g\beta a}{f^2y^2 + 2fagy + a^2g^2}}{f^2y^2 + 2fagy + a^2g^2} + f^2\beta .. + agf\beta$$

Idque utilius arbitror. Porro quoniam inventa haec series, cuius formula \textcircled{N} eundem constantem habet numeratorem, negligi poterit ille, et formula eius conferri cum hac,

3 a me erg. L 4 numerorum erg. L 5 differentiae (1) summab (2) serierum L 12 reducta
| fiet *streicht Hrsg.* | multiplicando L

$\frac{1}{f^2y^2 + f^2by + f^2ca}$. Unde quoniam termini primi iidem, conferendo secundos, fiet aequatio haec: $2ag + f\beta \sqcap fb$. Unde $g \sqcap f, \sim \frac{b - \beta}{2a}$ et $a^2g^2 \sqcap \frac{f^2}{4} \sim b^2 - 2b\beta + \beta^2$, eosque valores inserendo in aequationem $a^2g^2 + agf\beta \sqcap f^2ca$ ex terminis ultimis collatis natam, fiet, $a^2f^2 \sim \frac{b^2 - 2b\beta + \beta^2}{4}, +f^2\beta \sim \frac{b - \beta}{2} \sqcap f^2ca$. et ipsa f^2 per divisionem evanescente fiet $c \sqcap \frac{b^2 - 2b\beta + \beta^2 + 2b\beta - 2\beta^2}{4a}$ sive $\underline{c} \sqcap \frac{b^2 - \beta^2}{4a}$. Itaque formula omnis, cuius series, 5 summatrix, pura et rationalis, poterit reduci ad hanc: $\textcircled{B} \frac{1}{y^2 + by + \frac{b^2 - \beta^2}{4}}$. Ex hoc calculo apparet, etiam f . fuisse inutilem. Iam cum hac serie inventa \textcircled{B} , conferri non potest data $\textcircled{1}$. Sequeretur enim $\frac{\beta}{2} \sqcap b$. ex collatis terminis secundis, ponendo $z \sqcap y$ et $\beta \sqcap b$ ex collatis ultimis. Quod implicat. Quod si explicemus z per $y + d$. ex formula $\textcircled{1}$, fiet $\textcircled{P} \frac{1}{y^2 + 2dy + d^2}$. Unde collatis formulis \textcircled{P} et \textcircled{B} , ob terminos secundos, fiet: 10

$$\begin{aligned} &+ \frac{\beta}{2} .. + \frac{\beta d}{2} \\ b \sqcap \frac{4d + \beta}{2}, \text{ sive } b^2 \sqcap \frac{16d^2 + 8d\beta + \beta^2}{4}. \text{ Sed ob terminos ultimos, fiet alius valor, ipsius } \\ &b^2, \text{ nempe } 4d^2 + 2\beta d + \beta^2. \text{ Contradiccio ergo, sive differentia inter hos duos valores est } \\ &\frac{3\beta^2}{4}. \text{ Eadem autem erat supra contradictio sive differentia, inter duos ipsius } b^2, \text{ valores } \end{aligned}$$

4 $\sqcap f^2ca$. (1) destructaque omn (2) in (3) et $L = 4f$. evanescente (1) fiet $c \sqcap (2)$ et ponendo $b - a \sqcap d$. (quoniam nulla hic confusio metuenda, quandoquidem superiore ipsius d significatione non amplius opus habemus,) sive $\underline{b} \sqcap d + a$. fiet $\underline{c} \sqcap \frac{ad^2 + d\beta^2}{\beta^2}$. Formula ergo omnis, cuius series summatrix pura et rationalis, non assurgit ultra primanos; ad hanc reduci potest: $\frac{1}{y^2 + dy + ad^2}$ (3) fiet $L = 8$ data $+a.. + \beta^2 d$

$\textcircled{1}$. (1) ponendo enim $\frac{\beta}{2} \sqcap b$. Ergo $\frac{\beta^2}{4} \sqcap b^2$ ob terminos secundos, impossibile est ergo esse $b \sqcap \beta$ ut sequeret (2) Sequeretur $L = 10$ terminos (1) ultimos, fiet (2) secundos $L = 12$ terminos (1) primos (2) ultimos, | fiet: *streicht Hrsg.* | fiet L

nempe $\frac{\beta^2}{4}$ et β^2 . Patet ergo explicationem impossibilitati non mederi. Quod generaliter demonstrari operae pretium foret. Plurimum enim calculos contrahit haec observatio. Demonstrabitur autem optime conferendo formulam quandam indeterminatam, modo explicatam, modo non explicatam, cum quadam alia indeterminata: Hoc modo: Sit formula: $y^3 + by^2 + acy + a^2d$. conferenda cum formula alia simili $y^3 + ey^2 + afy + a^2g$, vel eius explicatione, si in locum ipsius y in posteriore substituatur $y + h$, ita enim non desinet esse similis: sed ita aio si collatio inter non explicatas impossibilis, fore et inter explicatas; nam si non explicatas conferas, literae fiunt eaedem, erit enim $b \sqcap e$. et $c \sqcap f$. et $d \sqcap g$. (in quibus valoribus continetur impossibilitas). Idem ergo est conferre aequationem explicatam cum alia, quod conferre cum se ipsa non-explicata; explicatio ergo mutat nihil.

Nempe [si] pro $z^2 + \frac{\beta}{2}z$ *. ponas $z^2 + z + ac$, et cum eo conferas $y^2 + by + \frac{b^2 - \beta^2}{4}$ sive si id cum $y^2 + 2dy + d^2$ conferas, sive conferas cum $y^2 + ly + am$. Itaque antea conferas has duas
 $+ e \dots + ed$
 $+ ac$

novissimas formulas, nempe ex secundis $e \sqcap l - 2d$. ergo erit $am \sqcap \boxed{d^2} + ld, -\boxed{2}d^2 + ac$. Unde $y^2 + ly + ld$, adeoque $l \sqcap b$. etc. Sed nota si explicatio mutet gradum formulae, ut
 $- d^2$
 $+ ac$

si pro z ponatur y^2 etc. aliterve tunc fieri posse, ut postea succedat collatio. Sed haec obiter.

Uno iam gradu altius ad formulam quadratricem altiorem assurgamus:

$$\text{(VII)} \quad \frac{y^2 + ny + ap}{\frac{q}{a}y^2 + ry + as} \text{ et differentia erit: } \text{(VIII)} \quad \frac{y^2 + ny + ap}{\frac{q}{a}y^2 + ry + as} \mp \frac{\frac{q}{a}y^2 + 2\beta\frac{q}{a}y + \frac{q}{a}\beta^2}{\frac{q}{a}y^2 + ry + as} + ap \\ \quad + r \dots + r\beta \\ \quad + as$$

6 in (1) eius locum substitu (2) locum L 11 si streicht L , erg. Hrsg. 11 et (1) conferas cum
 $\frac{1}{y^2 + by}$ (2) cum L 16 explicatio (1) contineat praetera (2) mutet L 21 altius (1) | assurgamus
 streicht Hrsg. | ad formulam: (2) ad L

Qua formula reducta apparebit, non assurgi altius quam si $l.$ et $n.$ fuissent $\sqcap 0.$ nempe etsi in speciem nominator huius differentiae reductae assurgat ad quadratoquadratum, tamen quadratoquadrato, et cubo destructis, in numeratore restabit tantum quadratus cum radice. Nominator vero utique ad quadratoquadratum assurget. Facta ergo multiplicatione per crucem, fiet numerator IX

$$\begin{array}{rccccc}
 -50 & \frac{qn}{a}\beta & y^2 & -6 & \frac{2qp\beta}{a}y & -3 & \frac{qp\beta^2}{a} \\
 & & & -2 & .. \frac{qn}{a}\beta^2 & .. & -12 .. rpa\beta \\
 +4[\wedge 25] & \frac{r\beta}{a} & .. & +12 & \frac{2as\beta}{a} & .. & +6 \frac{as\beta^2}{a} \\
 & +4 & & \underline{+4} & .. r\beta^2 & .. & \underline{+12} .. nsa\beta \\
 & & & 8 \wedge 5 & & 3 & \\
 & & & 40 & & & \\
 \boxed{q.n.r.} & & & \boxed{\begin{matrix} q.n.r. \\ p.s. \end{matrix}} & & \boxed{\begin{matrix} q.n.r. \\ p.s. \end{matrix}} & \\
 \end{array}$$

Quem conferamus cum alia formula, $ady^2 + a^2ey + a^3f.$ Hinc opeque huius collationis investigabimus literas, ipsi numeratori proprias, $n.$ et $p.$ nam reliquae, $q,$ $r,$ $s.$ sunt ipsi cum nominatore communes, nempe ex terminis primis $n \sqcap \frac{a^2d}{q\beta} + \frac{ra}{q} \sqcap \frac{a^2d + ra\beta}{q\beta}$ et

ob terminos secundos, $p \sqcap \frac{\frac{a^2e}{2} + ad\beta(-r\beta^2) + 2as\beta(+r\beta^2)}{2q\beta}$ et ob terminos ultimos,

6–11

$$\begin{array}{r}
 \text{Kontrollrechnung: } +50 \\
 +40 \\
 +3 \\
 \hline
 93 - 46 \sqcap 47
 \end{array}$$

3 in numeratore erg. $L = 8 \wedge 25$ erg. Hrsg. 14 Hinc (1) in collatis terminis primis $q \sqcap (2)$
opeque $L = 16$ ex ... primis erg. L

6–11 u. S. 612 Z. 1–3: Leibniz verwendet die Kontrollzahlen $a = q = \beta = 1,$ übernimmt von N. 462 S. 621 Z. 10 die Werte $y = 5, n = 2, p = 3, r = 4, s = 6$ und setzt $\frac{t}{a}$ gleich $-.$ Für die Neunerprobe in S. 612 Z. 1–3 kommen die Werte $e = 8$ und $d = 2$ hinzu. — Vgl. Erl. zu S. 613 Z. 6+7.

$$f \sqcap + q\beta a^2 e - q\beta ds\beta + 2q\beta s\beta + 2ds\beta^2, -2a^2 ds\beta \boxed{+ 2ra\beta s\beta}, \cup 2qa^2, \text{ et fiet nume-}$$

$ra \dots \quad ra \dots \quad \overbrace{(ra \dots)}$

$$ady^2 + a^2 ey + a\beta^2 s - \beta^2 d q + \beta a e q + 2\beta^2 qs$$

5

$$- a\beta \cdot r + a^2 \cdot r$$

$$- 2a^2 \cdot s$$

rator: $\frac{2q}{a}$

Nominator vero formulae VIII erit

$$\begin{aligned}
 & \textcircled{X} \quad 625) \frac{q^2}{a^2} y^4 8) + \frac{2qr}{a} \quad y^3 12) + 2qs \quad y^2 \\
 & \quad 16) + \quad r^2 \quad .. \quad 48) + 2rsa \quad y 36) + a^2 s^2 \\
 & \quad + \frac{2\beta q^2}{a^2} ... \quad \boxed{+ \frac{qr\beta}{a} ...} \\
 & \quad + \frac{3(\bar{2})\beta qr}{a} ... \quad + r^2\beta \quad . \\
 & \quad + 2\beta qs \quad . \quad + asr\beta \\
 & \quad + \frac{q^2}{a^2}\beta^2 \quad .. \quad + \frac{rq\beta^2}{a} . \quad + sq\beta^2
 \end{aligned}$$

9-14

<i>Neben- und Kontrollrechnungen:</i>	5	48	125	28
	<u>25</u>	<u>5</u>	<u>8</u>	<u>25</u>
	125	240	1000	140
	<u>5</u>			<u>56</u>
	625			700

² $\pm 2q\beta^2$: Richtig wäre $\pm 2qs\beta^2$; da Leibniz auf S. 613 Z. 5 $q = a$ setzt, wird der Fehler kompensiert.
 9–14 Vgl. Erl. zu S. 611 Z. 6–11 u. Z. 1–3.

Calculus cum eo, quem alibi inii consentit. Superest ut hanc quoque formulam X, cum alia generali, $y^4 + gy^3 + ah y^2 + a^2 ly + a^3 m$ [conferamus]. Nam terminum summae dimensionis per aliquam arbitrariam multiplicare nolui, quia non possunt eiusdem fractionis omnes termini tam in numeratore, ut supposuimus, quam in nominatore, assumi arbitra-
rii. Itaque $\underline{\underline{q}} \sqcap a$. Instituta iam collatione ex terminis 2^{dis} erit $r \sqcap \frac{g - 2\beta}{2}$, et ex terminis

5

tertiis fiet: $s \sqcap ah$

$$\left\{ \begin{array}{l} -g^2 - \cancel{(\beta)} \beta \sim \frac{g(-2\beta)}{2} \cancel{(\beta)} \beta^2, , \sim 2q \text{ sive } s \sqcap \frac{4ah - g^2 - 2\beta g + 4\beta^2}{8a} \\ \cancel{(+4g\beta)} \\ \cancel{(-4\beta^2)} \\ \hline 4 \end{array} \right.$$

612,9–14

	625	625
8	~ 125	~ 1000
12 }	~ 25	~ 700
16 }	~ 5	~ 240
	36	36
2	~ 125	~ 250
12	~ 25	~ 300
1	25	325
16		160
12		24
4		6
32	~ 5	~ 160
	24	3366
	6	

2 conferamus erg. Hrsg.

1 alibi: N. 38₁₆ S. 533 Z. 9 – S. 534 Z. 5.

$$\text{et } rs \sqcap \frac{4ahg - g^3 \left[-2\beta g^2 \right] \left[+4\beta^2 g \right] - 8a\beta h \left[+2\beta g^2 \right] + 8 \left(4 \right) \beta^2 g - 8\beta^3}{16a}.$$

Et $r^2 \sqcap$

$\frac{g^2 - 4g\beta + 4\beta^2}{4}$. Quos valores substituendo in aequatione ex terminis quartis collatis

nata, ex $l \sqcap \frac{2ars + \beta r^2 + 2\beta as + \beta^2 r}{a^2}$, fiet:

$$l \sqcap 4ahg - g^3 \left[-8a\beta h \right] \left[+8\beta^2 g \right] \left[-8\beta^3 \right], \left[+2\beta g^2 \right] \left[-8g\beta^2 \right] \left[+8\beta^3 \right], \left[+8\beta ah \right] \left[-2\beta g^2 \right]$$

5 $\left[-4\beta^2 g \right] \left[+8\beta^3 \right], \left[+4\beta^2 g \right] \left[-8\beta^3 \right], \sim 8a^2$, sive $l \sqcap 4ahg - g^3, \sim 8a^2$.

Eodem modo $m \sqcap a^2s^2 + \cancel{\phi}\beta rs + \cancel{\phi}\beta^2 s, \sim a^2\beta^2$. ex collatione ultimorum, et pro s . et rs . substituendo eorum valores, ac pro s^2 , ponendo:

$$\frac{4}{16a^2h^2 - 8ahg^2 - 16ah\beta g + 32ah\beta^2, +g^4 + 4\beta g^3 - 4 \left(-8 \right) \beta^2 g^2 \left[+4\beta^2 g^2 \right] - 16\beta^3 g, +16\beta^4}{64a^2}$$

10 fiet $\underline{m} \sqcap 16a^2h^2 - 8ahg^2 \left[-16ah\beta g \right] + 32ah\beta^2 + g^4 \left[+4\beta g^3 \right] \left[-4\beta^2 g^2 \right] \left[-16\beta^3 g \right] + 16\beta^4,$
 $\langle 3 \rangle \quad 4 \quad \cancel{5} \quad \cancel{7} \quad \cancel{1} \quad \cancel{4} \quad \cancel{5} \quad \cancel{7}$
 $\left[+16\beta ahg \right] \left[-4\beta g^3 \right] \left[-32a\beta^2 h \right] \left[+32\beta^3 g \right] \left[-32\beta^4 \right], \left[+32\beta^2 ah \right] - 12 \left(8 \right) \beta^2 g^2 \left[-16\beta^3 g \right] \left[+32\beta^4 \right],$
 \emptyset

$\sim 64a^3$. adeoque $m \sqcap 16a^2h^2 - 8ahg^2 + 32ah\beta^2 + g^4 + 16\beta^4 - 12\beta^2 g^2, \sim 64a^3$.

613,6f. Unter $s \sqcap \frac{2}{4ah - g^2 - 2\beta g + 4\beta^2}$: Causa erroris in seqq. quod hic pro $4\beta^2$.

scripseram β^2 .

613,6+7 $s \sqcap \frac{2}{4ah - g^2 - 2\beta g + 4\beta^2}$: Leibniz hat den Faktor 4 im letzten Term des Zählers zunächst vergessen. Der Fehler pflanzt sich fort bis S. 619 Z. 3. Auf S. 619 Z. 8f. entdeckt Leibniz eine andere Unstimmigkeit und überprüft daraufhin die Rechnung auf dem folgenden Bogen sowie durch Rechenkontrollen S. 611 Z. 6–11, S. 612 Z. 1–3, S. 612 Z. 9–14, S. 613 Z. 6, Z. 8–13 u. S. 619 Z. 2. In N. 43₂ S. 624 Z. 3f. erkennt er die Ursache des ersten Fehlers und verbessert von S. 613 Z. 7 – Z. 14. Die Neunerprobe S. 613 Z. 6 mit den Werten $g = 10$ und $h = 41$ von N. 462 S. 622 Z. 18 sowie die restliche Rechnung korrigiert er nicht. 8 Vgl. Erl. zu S. 613 Z. 6+7.

Formula ergo, cuius summatrix ascendit ad quadratum, ad hanc semper fractionem reduci poterit: $dy^2 + aey + a^2f \sim y^4 + gy^3 + ahg^2 + a^2ly + a^3m$, modo explicentur, $m, l, f.$ per solas a, β, d, e, g, h . Valores autem ipsarum m , et l , ita habemus inventos per has solas. Tantum ergo opus est, ut in valore ipsius f , ipsae $r.$ et $s.$ explicentur. $q.$ quoque explicanda est per a . Habebimus ergo hunc valorem ipsius f ,

5

$$f \sqcap \left[8a^2\beta e \right], + 4ga^2e \left[-8\beta a^2e \right], \left[-8a\beta^2d \right], \left[-4ga\beta d \right] \left[+8\beta ad\beta \right], \left[\pm 2qs\beta^2 + 2as\beta^2 \right], \\ -8a^2dh + 2adg^2 \left[+4ad\beta g \right] - 2ad\beta^2, \sim 16a^3, \text{ adeoque destructis destruendis, et depri-} \\ \text{mendo per } 2a, \text{ fiet } f \sqcap +2aeg - 4adh + dg^2 - \beta^2d, \sim 8a^2. \text{ Itaque formula quaelibet seriei} \\ \text{summabilis per aliam seriem quadraticem ad quadratum nec ultra assurgentem, reduci} \\ \text{poterit ad formulam hanc,}$$

10

(XI)

$$dy^2 + aey + \frac{2aeg - 4adh + dg^2 - \beta^2d}{8}, \sim y^4 + gy^3 + ahg^2 + \frac{4ahg - g^3 - 3\beta^2g}{8} y + \\ \frac{16a^2h^2 - 8ag^2h + 8a\beta^2h - 6\beta^2g^2 + g^4 - \beta^4}{64}.$$

Proposita autem formula seriei cuius summatrix quaeritur, ante omnia reddenda est huic formulae similis, ideoque necesse est dimensionum huius numerum non excedere; aut si excedat, debet divisibilis esse, sive debent numerator et nominator habere communem mensuram. Sin infra numerum dimensionum subsidat data; impleri poterit ille, vel multiplicatione vel adiectione; multiplicatione, multiplicando datam per quandam arbitrariam formulam; adiectione, addendo ei aut subtrahendo aliam cuius summatrix nota est: nam si productae summatrix inveniri poterit, eo ipso etiam propositae summatrix reperietur; auferendo vel addendo summaticem adiectae a summatrice productae. Ubi iam formula proposita formulae summabili, nempe (XI) similis redita est, instituenda est collatio, quae si succedit, habemus inventam seriem propositae summaticem. Sin vero collationes ducat ad impossibile, sequitur neque seriem propositae (aut productae ex proposita cum alia cognitae summaticis) summaticem huius cuius summatrix proposita, nempe 15
hoc loco quadratici gradus esse.

15

20

25

8 quaelibet (1) summabilis per aliam form (2) seriei L 9 nec ultra erg. L 16 debet (1)
numerator divisibilis esse, sive debet (2) divisibilis L 17 numerum (1) terminorum (2) dimensionum L
18 vel (1) additione (2) adiectione L 20 f. reperietur; (1) addendo (2) auferendo (a) si (b) vel L
22 proposita (1) quadrabili (2) formulae L

Haec iam in formula data 1, et summatrice XI. experiamur; ac primam seriem
 $\frac{1}{z^2 + \frac{\beta}{2}z}$ ponendo $z \sqcap y$ multiplicemus per $dz^2 + aez + \frac{2aeg - 4adh + dg^2 - \beta^2d}{8}$.

Fiet numerator productus idem cum numeratore formulae XI. ponendo esse $x \sqcap y$ quod
 alioqui necessarium erat, quia numerator formulae huius, 1, est 1. Ergo superest, ut nomi-
 natorem formulae 1, multiplicando per numeratorem formulae XI. conferamus productum
 cum nominatorem formulae XI. productum erit

$$\begin{aligned}
 \text{(XII)} \quad & dy^4 + \frac{d\beta}{2} y^3 & * \\
 & + ae \dots + \frac{ae\beta}{2} y^2 \\
 & + \frac{2aeg - 4adh + dg^2 - \beta^2d}{8} \dots + \frac{2aeg\beta - 4adh\beta + dg^2\beta - \beta d}{16} y & *
 \end{aligned}$$

Quae formula conferatur nominatori formulae XI. per d . multiplicato, $dy^4 + dg y^3 +$
 $adhy^2$ etc. etc. Unde termini primi iidem. Et conferendo secundos, $e \sqcap \frac{2gd - \beta d}{2a}$. Et ex
 collatis tertii fiet: $3(4)gd\beta - 2\beta^2d + 2gd^2[-\beta gd] - 4adh + dg^2 - \beta^2d, -8adh \sqcap 0$,
 sive fiet, $h \sqcap 3g\beta - 2\beta^2 + 2gd^2 + gd^2 - \beta^2d, \cup 12a\beta$.

Collatis quartis poterunt omnia dividi per d , proinde ipsa d . est inutilis, cumque
 duae supersint aequationes, una ex collatis quartis, altera ex collatis ultimis sive quintis
 terminis; arbitraria autem non nisi unica sit, quae restet, nempe g . cum d . sit inutilis;
 patet collationem impossibilem esse. Potuissem loco formulae 1 adhibere formulam 11,
 sed calculus erit prolixus, effectus vero quantum iudicare licet, idem.

Itaque ad alteram methodi partem recurrentum est, et ipsi $\frac{m}{\frac{s}{a}y^2 + \frac{\beta}{2}y}$ addenda
 formula 11, $\frac{n}{\frac{a}{s}y^2 + by + \frac{b^2 - \beta^2}{4}}$.
 $\frac{ma}{s}y^2 + mb y + \frac{mb^2 - m\beta^2}{4}$

2 ponendo $z \sqcap y$ erg. L 3 ponendo ... $x \sqcap y$ erg. L 11 Unde (1) conferendo terminos primos,
 sequitur esse $d \sqcap a$. et $e \sqcap g$ (2) termini L 14 quartis (1) habebitur pure ipsa d. nempe fiet $8ah$
 (2) poterunt L 15 collatis (1) tertii (2) quartis L 19 et (1) | ipsi streicht Hrsg. | (2) form (3)
 ipsi L

$$\text{Summa: } \frac{\frac{ns}{a} \dots + \frac{\beta n}{2} \dots}{y^4 + \frac{bs}{a} y^3 + \frac{s}{a} \wedge \frac{b^2 - \beta^2}{4} y^2} \quad (\text{XIII}) .$$

$$+ \frac{\beta a}{2s} \dots + \frac{\beta b}{2} \dots + \frac{\beta b^2 - \beta^3}{4} y *$$

Quae formula XIII. conferenda cum formula XI, numerator primum cum numeratore,

ubi conferendo terminos primos, fiet: $m \sqcap \frac{dsa - ns^2}{a^2}$, et ex secundis collatis fiet, $e \sqcap$

$2dsab - 2ns^2b + a^2\beta n, \sim 2a^3$; et ex tertiiis fiet: $2dsabg - 2ns^2bg + a^2\beta ng, -4a^3dh + da^2g^2 - \beta^2a^2d \sqcap +2dsab^2 - 2ns^2b^2, +2dsa\beta^2 - 2ns^3\beta^2$ (XIV). In qua aequatione num.

[XIV.] sunt arbitariae d, s, n, b, g, h , et cuiusnam autem valorem eius ope inveniri sat-
tis sit, patebit ex progressu. Nam ex istis 6 literis arbitrariis alicuius quae et in no-
minatore reperitur quaerendus est valor; nempe ex his, $s.b.g.h$. Si hae 4 literae in no-
minatore collationi non satisfaciunt, ut scilicet hoc modo, et reliquae, d, n , in nomi-
nato rem gliscant; sin illis careri potest, interest ad calculi compendium, ipsas in no-
minatore non intrare; id ergo primum in nominatore excutiendum est. Nimurum ex
 $b^2 \sqcap 4g^2a^2s^2 - 4ga^3s\beta + \beta^2a^4, \sim 4s^4$. Unde in terminis tertiiis fiet: $4g^2a^2s^2 - 4ga^3s\beta + \beta^2a^4, -4as^3\beta^2, +8\beta asgas - 4\beta as\beta a^2, \sqcap 16as^3ah$, cuius aequationis ope quaeri potest val-
or ipsius s , per extractionem radicis cubicae. Penultima dabit sequentem valorem ipsius
 h , nempe $h \sqcap +4s^4g^3 + 12s^4\beta^2g, +4g^2a^2s^2\beta - 4ga^3s\beta^2 + \beta^3a^4 - 4s^4\beta^3, \sim 16ags^4$. Et
denique ex ultimis fiet: $16a^2h^2 - 8ag^2h + 8a\beta^2h - 6\beta^2g^2 + g^4 - \beta^4 \sqcap 0$. Quarum trium
aequationum ope inveniri poterit valor trium incognitarum, nempe, s, h, g .

11 Über gliscant: intret. Am Rande: Imo frustra efficiemus ut literae numeratoris
intrent in nominatorem, nam si semel literarum quales sunt collatio impossibilis, erit
etiam impossibilis valore quolibet substituto.

1 (1) Numerator (2) Summa $L = 4 \frac{dsa - ns^2}{a^2}$, (1) et ex secundis $\frac{2dsab - 2ns^2bg + \beta na^2}{2a^2} \sqcap 2a^3e$,
sive $n \sqcap \frac{2ae - 2db}{2a^2}$ (2) et $L = 6f$. num. (1) XIV. (2) | XIII. ändert Hrsg. | sunt $L = 8$ progressu.

(1) Nam si ipsius nominatoris literae, in (2) Nam $L = 12f$. Nimurum (1) bs (2) ex (a) primis (b)
secundis $L = 14$ terminis (1) secundis (2) tertiiis $L = 16$ cubicae. (1) Et quoniam duae quae restant
aequationes collatiae, ex terminis penultimis et ultimis, ipsam s. non amplius continent. Missa ergo
tantisper hac aequatione, reliquas duas excutiamus, et (2) Penultima | quidem gestr. | dabit L

Quod si nulla harum trium aequationum impossibilis, habebimus desideratum. Quod si aliter rem instituamus, et ope XIV quaeramus h . tunc omnes reliquae, *d.n.s.g.b.* ingredientur in nominatorem, et cum aequationes collatitiae in nominatore futurae sint tantum quatuor; erunt indeterminatae quinque, ac proinde una supernumeraria, cuius 5 ope poterit ultima aequatio reddi quam simplicissima, et si licet pura, quo facto et reliquae omnes literae pure habebuntur. Sed antequam absolvendi eius calculi sic satis prolixii laborem suam, operae pretium erat investigare in numeris veritatem formularum 7 et XI. Et quidem quod ad formulam 7, quae coincidit formulae IV. illud reperimus, si qua data sit series cuius formula reducta ad 7, vel sumto numeratore ex IV, nominatore ex 10 7, ad hanc, $\frac{\beta d + gb}{2a} \sim y^2 + by + \frac{b^2 - \beta^2}{4}$, vel (: pro g substituendo eius valorem supra inventum, $\frac{fb - f\beta}{2a}$:) ad hanc:

$$\odot \frac{\beta d + fb^2 - f\beta b}{2a} \sim y^2 + by + \frac{b^2 - \beta^2}{4}, \text{ tunc formulam seriei summatrixi-}$$

cis esse (I) nempe $y + d \sim y + g$, vel (: explicando g :) $y + d \sim y + \frac{fb - f\beta}{2a}$. Eodem modo reperimus si seriei summatae formula sit reducibilis ad hanc

$$15 \quad \textcircled{XI} \quad dy^2 + aey + \frac{2aeg - 4adh + dg^2 - \beta^2 d}{8}, \sim y^4 + gy^3 + ah y^2 + \frac{4ahg - g^3 - 3\beta^2 g}{8} y + \frac{16a^2 h^2 - 8ag^2 h + 8a\beta^2 h - 6\beta^2 g^2 + g^4 - \beta^4}{64}$$

formulam seriei summatrixis fore VII, $[y^2 + ny + ap \sim y^2 + ry + as]$. Est autem ex superioribus

1 trium erg. L 3 et (1) habebitur denique (2) cum L

10 $\frac{\beta d + gb}{2a}$: Der Zähler von \textcircled{IV} lautet richtig $\frac{\beta d + g\beta}{2a}$. Der Fehler wirkt sich auf Z. 12 aus. Durch die Kontrollrechnung S. 619 Z. 4–9 erkennt Leibniz die Unstimmigkeit, vermutet aber eine andere Ursache. Zu Beginn von N. 43₂ führt er die Rechnung korrekt durch. 10 supra: S. 609 Z. 2.

♀ $\underline{n} \sqcap \pm 2ad + g\beta - 2\beta^2 \cup 2\beta$. Et $\underline{p} \sqcap \pm 4a^2e \pm 4ad\beta + 4\beta ah - \beta g^2 - 2\beta^2g + 4\beta^3 \cup 8a\beta$. Et
 $\underline{r} \sqcap g - 2\beta, \cup 2$, et $\underline{s} \sqcap 4ah - g^2 - 2\beta g + \beta^2, \cup 8a$.

Primum ergo ut veritatem relationis inter duas formulas \odot et \oslash in numeris exploremus, ponamus $b \sqcap 2$. $d \sqcap 3$. $f \sqcap 4$. $a \sqcap 1$. $\beta \sqcap 1$. et ex formula \oslash fiet in numeris,

$y + 3 \cup , y, [\underline{+8 - 4}] + 4 \cup 2 \sqcap y + 3 \cup y + 2$, et ponendo $y \sqcap 5$, fiet: $8 \cup +7 \sqcap \frac{8}{7}$,

ponendo vero $y \sqcap 6$, fiet $\frac{9}{8}$, quarum differentia $\frac{1}{56} \sqcap \odot$. Quod videamus an sit verum:

$\pm 3, \pm 16 \pm 8, \cup 2 \sqcap \pm 3 + 4, \sqcap 1$. quia $\pm \sqcap -$. ex formula (II). Numerator ergo 1. Nominator vero $25 + 10 \frac{+4 - 1}{4}$ in quo cum sit error necesse erit calculum hunc \odot et \oslash concernentem resumere scheda sequente, adiectis statim numeris. Calculus verus fuit sed error in numeris. Posito b non 2 sed 5 res successit. Vide initium plagulae sequentis, ubi et calculum sequentem ♀ et ♀ non fere nisi uno in loco comperi corruptum, ac restitui.

1 Faktor 4 vor β^3 erg. L 10–12 Calculus ... initium (1) paginae (2) plagulae ... restitui erg. L
 12 nisi | in streicht Hrsg. | uno L

1 f. Zur Kontrollrechnung $\pm l$ unter $4\beta^3$ s. Lesart zu Z. 1. 10 f. Calculus ... successit: s. o. Erl.
 zu S. 612 Z. 2 – Vide: s. o. Erl. zu S. 613 Z. 6+7.

43₂. DE SERIEBUS SUMMABILIBUS PARS SECUNDA

Januar 1675

Überlieferung: L Konzept: LH 35 VIII 4 Bl. 2 1 Bl. 1°. 1 S. auf Bl. 2 r°. Bl. 2 v° leer.
Cc 2, Nr. 892 tlw.

5 Januar. 1675

Pars II. schediasmatis de seriebus summabilibus,

et in specie hac: $\frac{1}{z^2 + \frac{\beta}{2}z}$ *

$$\begin{aligned} & + \beta_5 y + 1\beta_5 y + 5y + 1\beta_5 + \beta_5 y + 3d + 5y + 2g_5 \quad \square \\ & + 3d \qquad \qquad + 2g \\ & 5 + 4 \cup 5 + 3 - 5 + 3 \cup 5 + 2 \\ & 9 \qquad \cup \qquad 8 \qquad - \qquad 8 \qquad \cup \qquad 7 \qquad \square \qquad \frac{9}{8} - \frac{8}{7} \square - \frac{1}{56} \end{aligned}$$

$$+ \left\{ \begin{array}{l} 25y^2 + 1\beta \ 5y + 2g1\beta \\ \quad + 3d \dots \boxed{..3d} \\ \quad + 2g \dots \end{array} \right\} \quad 25y^2 + \textcircled{2} 2g \ 5y + 4g^2$$

$$+ \quad 1\beta \dots + 1\beta 2g,$$

$$\frac{\dagger 3d1\beta + 2g1\beta}{25y^2 + \textcircled{2} 2g5y + 4g^2} \sqcap [-] \frac{1}{56}$$

+ 1 β .. + 1 β 2g

Quae formula ita producta conferatur quoad nominatorem cum hac generali: $25y^2 + 5b5y + 6ca$. Termini primi iidem sunt, collatis secundis $2g \sqcap 5b - 1\beta, \cup \textcircled{2}$. et $4g^2 \sqcap 25b^2 - \textcircled{2}5b1\beta + 1\beta^2, \cup \textcircled{4}$; unde $6ca \sqcap 25b^2 - \textcircled{2}5b1\beta + 1\beta^2, +\textcircled{4}1\beta \sqcap 2g, \cup \textcircled{4}$. Et ex-

$\overbrace{5b - 1\beta, \text{v}}$ ②

19 — erg. Hrsg. 23 2g, √ ④. (1) Unde ex formula generali fiet haec: $25y^2 + 5b5y$ (2) Unde ex formula (3) Et L

plicando g , erit $6ca \sqcap 25b^2 \underbrace{[-\textcircled{2} 5b1\beta]}_{\parallel} \underbrace{[+1\beta^2]}_{\parallel}, \underbrace{[+\textcircled{2} 1\beta5b]}_{\parallel} - \underbrace{\textcircled{1} [\textcircled{2}]}_{\parallel} 1\beta^2, \cup \textcircled{4}$. Unde ex formula generali fiet haec ad rem accommodata, nempe $25y^2 + 5b5y + \frac{25b^2 - 1\beta^2}{\textcircled{4}}$. Adeoque si formula seriei cuiusdam datae reduci queat ad hanc

$$\boxed{\dagger 3d1\beta, \dagger 5b1\beta \dagger 1\beta^2, \cup 2, \cup \dots, 25y^2 + 5b5y, + 25b - 1\beta^2, \cup 4} \odot$$

erit formula seriei summatricis $\dagger 5y + 3d \cup 5y + 2g$, sive explicando g , fiet:

$$+ 1\beta \quad + 1\beta$$

$$\boxed{\begin{array}{l} 5y + 3d \cup 5y + \frac{5b - 1\beta}{2} \\ + 1\beta \quad + 1\beta \end{array}} \quad \text{D.}$$

Procedamus nunc ad examen formularum ♀ et ♀.

Sit formula summatrix $\left(\frac{38}{51}\right) 25y^2 + 2n5y + 3pa \cup 25y^2 + 4r5y + 6sa$. et differentia eiusdem formulae ab alia in qua in locum $5y$ substituta sit quantitas $5y + 1\beta$ erit

$$\begin{aligned} \dagger_1 25y^2 + \textcircled{2} 1\beta 5y + 1\beta^2 &\cup 25y^2 + \textcircled{2} 1\beta 5y + 1\beta^2, \\ + 2n \dots + 2n1\beta &+ 4r \dots + 4r1\beta \\ + 3pa &+ 6sa \end{aligned}$$

(51 \cup 66)

15

$$\begin{aligned} \dagger_1 25y^2 + 2n 5y + 3pa &\cup 25y^2 + 4r 5y + 6sa, \\ (38 \cup 51) \end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{51}{66} - \frac{38}{51} \sqcap \frac{31}{1122}}$$

Multiplicando per crucem reducemos ad unam fractionem,

18 Nebenrechnungen: $\frac{38}{51} \times \frac{51}{66} \quad \frac{93}{3366} \Big| \frac{31}{1122}$

19–622,1 fractionem, (1) cuius numerator, (2) $\dagger 4r1\beta L$

$$\begin{array}{lll}
 \dagger \ 4r1\beta \ 25 \ y^2 & \dagger \ \textcircled{2}1a6s1\beta \ 5y & \dagger \ 1a6s1\beta^2 \\
 \dagger \ 2n1\beta \ \dots & \cdot \ 4r1\beta^2 \ \dots & \cdot \ 2n6s1a1\beta \\
 & \dagger \ \textcircled{2}1a3p1\beta \ \dots & \dagger \ 1a3p1\beta^2 \\
 & \cdot \ 2n1\beta^2 \ \dots & \cdot \ 4r3p1a1\beta \\
 5 \ \left(\underbrace{+4-2}_{+2} \right) & \left(\underbrace{+12+4-6-2}_{+8} \right) \ \underbrace{\dots}_{5 \ \square +40} & \left(\underbrace{+6+12-3-12}_{+3} \right) \\
 & (50+40+3 \ \square 93) &
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 625y^4 + \textcircled{2}4r \ 125y^3 + \textcircled{2}a6s \ 25y^2 + \textcircled{2}4r6sa \ 5y + 36s^2a^2 \\
 + \ 16r^2 \ \dots
 \end{aligned}$$

10 (625) (1000) (700) (240) (36) \sqcap 2601 \sqcap 51 \wedge 51

$$\begin{aligned}
 & + \textcircled{2}\beta \ \dots \dots + \textcircled{3}4r\beta \ \dots \dots + \ 16r^2\beta \ \dots + a6s4r\beta \\
 & + \ \beta^2 \ \dots \dots + \textcircled{2}\beta a6s \ \dots + 6sa\beta^2 \\
 & + \ 4r\beta^2 \ \dots
 \end{aligned}$$

(2601) (250) (325) (160) (30) \sqcap 3366

15

(93 \cup 3366)
(31 \cup 1122)

Haec fractio producta, ut quam licet simplicissime enuntietur, conferatur cum alia generali sibi simili, $\frac{2d25y^2 + 8ea5y + a^23f}{625y^4 + 10g125y^3 + a41h25y^2 + a^280l5y + a^366m}$, numerator

$$\begin{array}{ccc}
 51 & 38 & 51 \\
 \underline{66} & \underline{66} & \underline{51} \\
 306 & 228 & 51 \\
 \underline{306} & \underline{228} & \underline{255} \\
 3366 & 2508 & 2601 \\
 & \underline{2508} & \\
 & & 93
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 2 \\
 \textit{Gestrichene Nebenrechnung: } \cancel{3} \cancel{3} 6 6 \cancel{f} 10 \\
 \cancel{3} \cancel{1} \cancel{1} 1 \\
 \cancel{3} 3
 \end{array}$$

scilicet numeratori et nominator nominatori; sed antequam calculum superioris plagulae sine necessitate repetamus, poterimus eius conclusionem nempe formulas \wp et φ iam tum per numeros examinare; nam si consentient, non erit cur calculum repetamus. Formula \wp erat:

$$\begin{aligned} & 2d25y^2 + 8ea5y + \frac{\textcircled{2}a8e10g - \textcircled{4}a2d41h + 2d100g^2 - \beta^22d}{8}, \cup 625y^4 + 10g125y^3 + 5 \\ & a41h25y^2 + \frac{\textcircled{4}a41h10g - 1000g^3 - \textcircled{3}\beta^210g}{8}5y + \\ & \frac{\textcircled{16}a^21681h^2 - \textcircled{8}a100g^241h + \textcircled{8}a\beta^241h - \textcircled{6}\beta^2100g^2 + 10000g^4 - 1\beta^4}{64} \end{aligned}$$

Ut ergo consentiat calculus, necesse est ut terminus numeratoris tertius faciat 3. quod est falsum facit enim $\frac{30}{8}$. Ergo in calculo erratum est. Eodem modo terminus nominatoris penultimus facere debet 80, quod non facit, quemadmodum sine ullo calculo ex sola novenarii proba colligo. Ultimus facere debet 66, quod itidem non facturum statim novenarius indicat. Unde intelligitur quanta sit necessitas methodi cuius ope omnes calculi errores evitari possint.

Repetendus ergo calculus superior adhibitis numeris, et invenimus $2n \sqcap \textcircled{1}\textcircled{2}a2d + 10g\beta - \textcircled{2}\beta^2 \cup \textcircled{2}\beta$. Recte. $4r \sqcap 10g - \textcircled{2}\beta, \cup \textcircled{2}$. Recte. At s . supra male, itaque resumatur ex terminis tertii nominatorum, $6s \sqcap a41h - 16r^2 - \textcircled{3}4r\beta - \beta^2, \cup \textcircled{2}a$, et explicando r , fiet:

5–8

$$\begin{array}{r} \text{Nebenrechnungen: } 25 \quad 41 \quad 41 \quad 82 \quad 160 \\ \underline{16} \quad \underline{25} \quad \underline{41} \quad \underline{4} \quad \underline{200} \\ 41 \quad 205 \quad 41 \quad 328 \quad 360 \\ \underline{82} \quad \underline{164} \quad \underline{2} \quad -330 \\ 1025 \quad 1681 \quad 330 \quad 30 \end{array}$$

1 scilicet (1) primum (2) numeratori L

2 formulas \wp et φ : N. 43₁ S. 618 Z. 15 – S. 619 Z. 3. 16 supra: N. 43₁ S. 619 Z. 3; vgl. Erl. N. 43₁ S. 613 Z. 6+7

6s $\sqcap a41h \frac{-100g^2 + \textcircled{4}10g\beta - \textcircled{4}\beta^2}{\textcircled{4}} \frac{-\textcircled{3}10g\beta + \textcircled{6}1\beta^2}{\textcircled{2}} - \beta^2$, $\cup \textcircled{2}a \sqcap \textcircled{4}a41h -$
 $100g^2 \left[+\textcircled{4}10g\beta \right] \left[-\textcircled{4}\beta^2 \right] - \textcircled{2} \left[\textcircled{6}10g\beta + \textcircled{4} \left[\textcircled{12} \right] \beta^2 \right] \left[-\textcircled{4}\beta^2 \right]$, $\cup \textcircled{8}a \sqcap \textcircled{4}a41h -$
 $100g^2 - \textcircled{2}10g\beta + \textcircled{4}\beta^2$, $\cup \textcircled{8}a$. Error autem in superioribus fuerat quod pro $\textcircled{4}\beta^2$, scripsit β^2 . Iam ergo $3p \sqcap \textcircled{4}a^28e + \textcircled{4}a2d\beta + \textcircled{4}\beta a41h - \beta 100g^2 - \textcircled{2}10g\beta^2 + \textcircled{4}\beta^3$,
5 $\begin{matrix} 4 \\ \textcircled{4} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 8 \\ \textcircled{2} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 2 \\ \textcircled{8} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 7 \\ \textcircled{4} \end{matrix}$
 $\cup \textcircled{8}a\beta$. ubi rursus idem error, nempe β^3 pro $\textcircled{4}\beta^3$ et

$$3f \sqcap \textcircled{4}\phi\beta a8e \left[-\textcircled{4}\phi\beta 2d\beta \right] - 2d(\textcircled{4}\phi a41h + \phi 2d100g^2 + \phi 2d(\textcircled{2}10g\beta - \phi 2d(\textcircled{4}\beta^2)) \cup 8a^2$$

$$\dots 4r\phi\dots - \dots 4r\phi\dots$$

$$3 \sqcap \begin{matrix} 7 \\ \textcircled{4} \end{matrix} \begin{matrix} 5 \\ \textcircled{2} \end{matrix} \begin{matrix} 4 \\ \textcircled{2} \end{matrix} \begin{matrix} 2 \\ \textcircled{8} \end{matrix} \cup 8$$

$$10 \text{ sive } 3f \sqcap \textcircled{4}\beta a8e + \textcircled{4}4ra8e - \textcircled{4}4r2d\beta - \textcircled{4}2da41h + 2d100g^2 + \textcircled{2}2d10g\beta - \textcircled{8}2d\beta^2, \cup \textcircled{8}a^2$$

$$\text{Et explicando } r, \text{ fiet:}$$

$$3f \sqcap \left[\textcircled{4}\beta a8e \right] + \textcircled{2}a8e10g \left[-\textcircled{4}a8e\beta \right] \left[-\textcircled{2}d\beta 10g \right] - \left[+ \right] \textcircled{4}2d\beta^2 - \textcircled{4}2da41h + 2d100g^2$$

$$3 \sqcap \begin{matrix} 7 \\ \textcircled{4} \end{matrix} \begin{matrix} 1 \\ \textcircled{5} \end{matrix} \begin{matrix} 2 \\ \textcircled{2} \end{matrix} \cup 8$$

$$15 \quad \left[+ \right] \textcircled{2}d10g\beta \left[-\textcircled{8}2d\beta^2 \right], \cup \textcircled{8}a^2$$

ac proinde denique $3f \sqcap \textcircled{2}a8e10g - \textcircled{4}2d\beta^2 - \textcircled{4}2da41h + 2d100g^2 \cup 8a^2$. Qui valor rursus per omnia consentit cum priore, excepto quod pro $\textcircled{4}2d\beta^2$ supra erat $2d\beta^2$.

Supersunt duae investigandae literae l , et m ; et reperi quidem

$$80l \sqcap \textcircled{4}a41h10g - 1000g^3, \cup 8a^2 \text{ ac denique } 66m \sqcap \textcircled{16}a^241 \wedge 41h^2 - \textcircled{8}a41h100g^2 +$$

$$20(8 \wedge 80 \sqcap \begin{matrix} 1640 \\ 7 \end{matrix} - \begin{matrix} 1000 \\ 7 \end{matrix} \sqcap \begin{matrix} 640 \\ 7 \end{matrix}) \quad \begin{matrix} \emptyset \\ 1 \end{matrix} \quad \begin{matrix} 4 \\ 7 \end{matrix} \quad \begin{matrix} \emptyset \\ 5 \end{matrix}$$

$$\textcircled{32}a41h\beta^2 + 10000g^4 + \textcircled{16}\beta^4 - \textcircled{12}\beta^2100g^2, \cup +\textcircled{64}a^3.$$

Itaque si qua data sit serie i summa n d a e formula, reducibilis ad hanc \wp :

9–15 Nebenrechnungen zur Neunerprobe:

$$9 \quad 6 \sqcap \begin{matrix} 8 \\ \emptyset \end{matrix} \sqcap \begin{matrix} 3 \\ 24 \end{matrix} \sqcap 6$$

$$13+15 \quad \boxed{5+1 \sqcap \begin{matrix} 8 \\ 3 \end{matrix} \sqcap 24 \sqcap 6}$$

3 Error: s. o. N. 43₁, Erl. zu S. 613 Z. 6+7. 17 supra: N. 43₁ S. 615 Z. 8. 20+22 Bei der Neunerprobe setzt Leibniz $66 \equiv 3(\text{mod } 9)$ mit $-66 \equiv 6 \pmod{9}$ auf die rechte Seite der Gleichung.

$$\left. \begin{aligned} & \frac{2d25y^2 + a8e5y + \frac{\textcircled{2}a8e10g - \textcircled{4}2d\beta^2 - \textcircled{4}2da41h + 2d100g^2}{\textcircled{8}}}{625y^4 + 10g125y^3 + a41h25y^2 + \frac{\textcircled{4}a41h10g - 1000g^3}{\textcircled{8}}5y} \\ & \frac{\textcircled{16}a^241h41h - \textcircled{8}a41h100g^2 + \textcircled{32}a41h\beta^2 + 10000g^4 + \textcircled{16}\beta^4 - \textcircled{12}\beta^2100g^2}{\textcircled{64}} \end{aligned} \right\}$$

loco $\left\{ \frac{2d25y^2 + a8e5y + a^23f}{625y^4 + 10g125y^3 + a41h25y^2 + a^280l5y + a^366m} \right.$ tunc formula seriei summatricis erit:

624,19–21 Nebenrechnungen auf Bl. 1 r^o:

5

	410	41	41	66	
	<u>4</u>	<u>41</u>	<u>8</u>	<u>64</u>	
	1640	41	−328 + 328	254[!]	
	<u>1000</u>	<u>164</u>	<u>4</u>	[bricht ab]	
8 ^ 80 □	640	1681	+ 328		10
		<u>16</u>	3		
		10086	<u>984</u>		
		1681			
	[26896]	16a ² h ²			
	984	−8hg ² + 32ahβ ²			15
	1	+g ⁴			
	4	+16β ⁴ − 12β ² g ²			
	[27885]				

624,19 ∘ 8a² (1) et 66m □ 16a²h² − 8ahg² + 32ahβ² + g⁴ + 16β⁴ − 12β²g², ∘ 64a³ (2) ac L
8–12 vorletzte Spalte −328 (1) | + 328 streicht Hrsg. | (2) +328 L 14 26876 L ändert Hrsg.

$$\frac{4}{656} \qquad \qquad \qquad \frac{3}{984}$$

18 27885 L ändert Hrsg.

Quod si iam series aliqua proposita sit cuius formula velut $\frac{3m}{\frac{5s}{a}25y^2 + \frac{4\beta}{(2)}5y *}$ et

5

quaeratur formula seriei summatricis (: nota: literae m.s.n.b. hic novam [recipiunt] significationem, ut et aliae si quae repetantur :) hoc per ea quae superiore plagula dixi non

potest fieri commodius, quam si addatur ei alia formula, ut

$$\frac{7n}{\frac{a}{5s}25y^2 + 6b5y + \frac{36b^2 - 16\beta^2}{(4)}}$$

$\left| \frac{7}{40} \right|$. Literae β . demus imposterum numerum 4, ut eius significationem distinguamus a

- litera *a*. quod imposterum semper inter calculandum servabimus. Ita enim minus facilis lapsus, si nulla aequivocatio. Explicui tamen tam *y*. quam *s*. per 5, quia *y*. caeteris minus miscet nec facile in illo lapsus.

$$5+8 \quad \text{Nebenrechnung: } \frac{3}{135} + \frac{7}{40} \equiv \frac{120 + 945}{5400} \equiv \frac{1065}{5400}$$

4 iam (1) formula (2) series aliqua proposita (a) sit velut $\frac{3m}{\frac{4s}{a}25y^2 + \frac{4\beta}{2}y}$ * cuius quaeritur formula
 summatrix (b) sit L 6 f. (nota: (1) litera m hic novam recipit (2) literae ... novam | recipit ändert
 Hrsg. | significationem $L = \frac{13}{135} + (1) \frac{5}{40} \sqcap (a) \frac{3}{17+8} \vee 5 (b) \frac{3}{27} (c) \frac{3}{17} + \frac{5}{8}, \vee 5 \sqcap (aa) \frac{3}{15} (bb)$
 $\frac{24+85}{17 \cap 8} \sqcap \frac{109}{136 \cap 5}$ sive $\frac{109}{8800} (d) \frac{120+675}{5400} \sqcap \frac{795}{5400} (2) \frac{7}{40} L$

7 superiore plagula dixi: N. 431 S. 616 Z. 18 f.

Addendo has duas formulas producetur haec:

$$\begin{aligned}
& \frac{3ma}{5s} 25y^2 + 3m6b5y + \frac{3m36b^2 - 3m16\beta^2}{(4)} \dots \\
& + \frac{7n5b}{a} \dots + \frac{4\beta7n}{(2)} \dots \\
& \emptyset \quad 7 \quad \emptyset \quad \dots \\
& 35 + \frac{3}{5} \cap 25 \quad 32 \cap 5 \quad 15 \quad \dots \\
& \sim 625y^4 + \frac{6b5s}{a} 125y^3 + \frac{5s}{(4)a}, 36b^2 - 16\beta^2, 25y^2 + \frac{4\beta36b^2 - 64\beta^3}{8} 5y \quad * \\
& + \frac{4\beta a}{(2)5s} \dots \dots + \frac{4\beta6b}{(2)} \dots \dots \\
& \sim 4 \quad 2 \quad 7 \quad \emptyset \\
& \sim 625 \quad 30\frac{2}{5} \cap 125 \quad 37 \cap 25 \quad 10 \cap 5 \\
& \quad - \frac{102}{5}\delta \quad +4\theta
\end{aligned}$$

Quae formula producta conferetur cum formula β modo in dicta formula β explicetur ipsa β . numero adscripto 4.

Sed ut probatio per numeros institui possit adiciendae sunt literae quaedam probatoria, quo utrobique numeri cognitae termini cuiuslibet numeris cognitae termini respondentis aequivalent. Id vero ante omnia in nominatore faciemus, nam in solo nominatore

15

2-5

$$\begin{array}{r}
 \text{Nebenrechnungen:} \\
 \begin{array}{r}
 35 & 35 & 18 \\
 -5 & 25 & 14 \\
 \hline
 175 & 175 & 32 \\
 \hline
 & 70 & \\
 & 875 & \\
 \hline
 & 15 & \\
 & 890 &
 \end{array}
 \end{array}$$

6–9 *Divisionszeichen wiederholt Hrsg.* 14 *cognitae erg. L zweimal*

difficultatem habet collatio, quia tot in eo aequationes collatitiae, quatuor scilicet terminorum, quot incognitae, nempe *s.b.g.h.*.

Sed video mutandum esse aliquid, antequam veniatur ad collationem, nam in una dedi ipsi β . valorem 1, in altera valorem 4. Itaque alterutrubi corrigendum, et facilius est 5 in novissima formula efficere ut β . valeat tantum 1, et ita stabit:

$$\begin{aligned}
 & \frac{3ma}{5s} \quad 25y^2 \quad + 3m6b5y \quad + \frac{3m36b^2 - 3m\beta}{(4)} \quad \dots \\
 & + \frac{7n5s}{a} \quad \dots \quad + \frac{\beta7n}{(2)} \quad \dots \\
 & 625y^4 + \frac{6b5s}{a} \quad 125y^3 + \frac{5s}{a} \sim 36b^2 - \beta^2 \sim 25y^2 + \frac{\beta36b^2 - 3\delta a^2 - \beta^3}{(8)} 5y \quad * \\
 & \frac{10\gamma\beta}{(2)5s} \quad \dots \dots \quad + \frac{\beta6b}{(2)} \quad \dots \dots \\
 & \text{10} \quad \frac{(31)}{} \quad \frac{(178)}{} \quad \frac{(4)}{} \quad \frac{(0)}{} \\
 & -21\lambda \quad -137\mu a \quad +76a^2\xi \quad +66m
 \end{aligned}$$

ubi $\frac{10\gamma\beta}{(2)5s}$ loco $\frac{\beta a}{(2)5s}$, ut fractionem auferam, inter calculandum utique examen novenarium facilius reddatur. Eodem modo ascripsi $-3\delta a^2$. Etsi sub finem calculi poni debent $\gamma \sqcap a$, et $\delta \sqcap 0$. Eodem modo et literae $\lambda.\mu.\xi.m.$ sub finem calculi habebuntur pro 15 nullis, adiectae interim, ut numeri cognitarum formulae \wp et huius, sint iidem. His iam quatuor collationibus totidem quaerenda sunt incognitae ut dixi, *b.h.g.s.* ac primum

11 Nebenrechnung: 178

$$\frac{41}{137}$$

2 f. s.b.g.h. (1) Ut er (2) Ut ergo ad collationem veniamus, (a) termini (b) nominatoris formulae \wp cum nominatore formulae novissimae, utique primi termini iidem sunt itaque non est opus (aa) adiecto termino (bb) adiecta litera probatoria, in 2^{dis} vero differentia. Nam terminus secundus (aaa) form (bbb) nominatoris formulae \wp habet 10g. cum in formula novissima sit $30 + \frac{2}{5}$, (aaaa) vel (bbbb) itaque ipsi 10g addatur $20 + \frac{2}{5}\delta$, vel $\frac{102}{5}\delta$. | Eodem modo in termino tertio formulae \wp habetur 41h. et in respondentie novissimae, 31. Huic ergo addatur 4θ . in termino tertio *gestr.* | (3) Sed *L*

valores ipsarum $g.$ et $h,$ statim habentur sine ullo calculo, nempe $10g \sqcap \textcircled{2} 6b25s^2 +$
 $10\gamma\beta a - \textcircled{2} 21\lambda a5s, \cup \textcircled{2} a5s$ et $41h \sqcap \textcircled{2} 5s36b^2 - \textcircled{2} 5s\beta^2 + \beta a6b - \textcircled{2} 137\mu a^2, \cup \textcircled{2} a^2.$
 $\not\wedge \quad \not\emptyset \quad \not\wedge \quad 0 \quad \not\wedge \quad \not\emptyset \quad \not\wp$

$$\left. \begin{array}{l} 1000g^3 \sqcap \textcircled{8} 16b^3 25^3 s^6, + \textcircled{12} 36b^2 25^2 s^4 10\gamma\beta a - \textcircled{24} 36b^2 25^2 s^4 21\lambda a5s, \\ 8 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \\ + \textcircled{6} 6b25s^2 100\gamma^2 \beta^2 a^2 + \textcircled{24} 6b25s^2 21^2 \lambda^2 a^2 25s^2, \\ 0 \quad 0 \\ - \textcircled{24} 6b25s^2 10\gamma\beta a 21\lambda a5s, \cup \textcircled{8} a^3 125s^3 \\ 1 \\ - \textcircled{6} 100\gamma^2 \beta^2 a^2 21\lambda a5s - \textcircled{12} 10\gamma\beta a 21^2 \lambda^2 a^2 25s^2, \\ 0 \quad 0 \\ - \textcircled{8} 21^3 \lambda^3 a^3 125s^3 \\ 0 \end{array} \right\} \cup \textcircled{8} a^3 125s^3 \quad \begin{matrix} 5 \\ 10 \\ 15 \\ 20 \end{matrix}$$

Sed hinc disco observationem perutilem, non esse dandum literis valorem numerorum
 quos, aut quorum abiepto novenario residuis metitur ternarius, ut 3.6. nam hae vel in se
 ductae, vel in alias plerumque faciunt quantitatem quae abiepto novenario nihil relinquunt,
 ut $6^{\wedge} 6 \sqcap 36. \quad 3^{\wedge} 6 \sqcap 18. \quad 3^{\wedge} 3 \sqcap 9. \quad 3^{\wedge} 4 \sqcap 12,$ seu 3. $3^{\wedge} 5 \sqcap 15$ seu 6. $3^{\wedge} 7 \sqcap 21,$
 seu 3. $3^{\wedge} 8 \sqcap 24$ seu 6. $3^{\wedge} 9 \sqcap 27$ seu 0. Itaque literae $b.$ pro 6 dabimus 8. et literae $m.$
 pro 3 dabimus 4. Unde denique scribendo:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{4ma}{5s} 25y^2 + 4m8b5y + \frac{4m64b^2 - 4m\beta^2}{\textcircled{4}}, \cup \\ + \frac{7n5s}{a} \dots + \frac{\beta7n}{\textcircled{2}} \dots \end{array} \right.$$

17 alios (1) rursus (2) plerumque L

$$\begin{aligned}
& 625y^4 + \frac{8b5s}{a} 125y^3 + 64b^2 - \beta^2 \sim \frac{5s}{a} 25y^2 + \frac{64b^2\beta - \beta^3[-]\delta a^2}{(8)} 5y \quad * \\
& + \frac{10\gamma\beta}{(2)5s} \dots \dots + \beta 8b \sim (2) \dots \\
& \textcircled{(41)} \qquad \textcircled{(319)} \qquad \qquad \textcircled{(8)} \\
& -31\lambda \qquad -278\mu a \qquad \qquad +72a^2\xi \qquad \qquad +66ma^3 \\
5 & \text{Unde } 10g \sqcap (2)8b25s^2 + 10\gamma\beta a - (2)31\lambda a5s, \cup (2)a5s, \text{ et } 41h \sqcap (2)5s64b^2 - (2)5s\beta^2 + \\
& \not{s} \qquad \not{4} \qquad \not{\lambda} \qquad \not{\beta} \qquad \not{h} \qquad \not{l} \qquad \not{s} \\
& \beta a8b - (2)278\mu a^2, \cup (2)a^2. \\
& \not{s} \qquad \not{\mu} \\
& (8)a^3125s^3 \sim 1000g^3 \sqcap (8)\not{8b}\not{3}25^3s^6 + (\textcircled{12})64b^225^2s^410\gamma\beta a - (\textcircled{24})64b^225^2s^431\lambda a5s, \\
10 & \not{s} \qquad \not{l} \qquad \not{\beta} \qquad \not{\delta} \\
& + (\textcircled{6})8b25s^2100\gamma^2\beta^2a^2 + (\textcircled{24})8b25s^231^2\lambda^2a^225s^2 \\
& \not{\beta} \qquad \not{\beta} \\
& - (\textcircled{24})8b25s^210\gamma\beta a31\lambda a5s, \dots, + 1000\gamma^3\beta^3a^3, \\
& \not{\beta} \qquad \not{l} \\
15 & - (\textcircled{16})100\gamma^2\beta^2a^231\lambda a5s + (\textcircled{12})10\gamma\beta a31^2\lambda^2a^225s^2, \\
& \not{l} \qquad \not{\beta} \\
& - (8)31^3\lambda^3a^3125s^3 \\
& \not{s}
\end{aligned}$$

1–4

Nebenrechnungen:

319	63
<u>41</u>	<u>5</u>
325 [!]	
<u>4</u>	
329	
<u>41</u>	
278 [!]	

1 + L ändert Hrsg.

qui ipsius $1000g^3$ $\wedge \textcircled{8} a^3 125s^3$ valor auferatur a sequenti formula, quae est

$$\textcircled{4} a^3 s^3 41h10g \sqcap \textcircled{2} 25s^2 \textcircled{4} a \textcircled{2} 8b25s^2 \textcircled{2} 5s64b^2$$

$$-\textcircled{2} 5s\beta^2$$

$$+\beta a8b$$

$$-\textcircled{2} 278\mu a^2$$

5

$$+\textcircled{2} 25s^2 \textcircled{4} a \textcircled{12} 64b^2 25^2 s^4 10\gamma\beta a \textcircled{2} 5s64b^2$$

$$-\textcircled{2} 5s\beta^2$$

$$+\beta a8b$$

$$-\textcircled{2} 278\mu a^2$$

$$-\textcircled{2} 25s^2 \textcircled{4} a \textcircled{2} 31\lambda a5s \textcircled{2} 5s64b^2 .$$

10

$$-\textcircled{2} 5s\beta^2$$

$$+\beta a8b$$

$$-\textcircled{2} 278\mu a^2$$

Residuum a e q u a b i t u r huic:

$$a^3 125s^3 64b^2 \beta - a^3 125s^3 \beta^3 [-] a^3 125s^3 \delta a^2 + \textcircled{8} a^3 125s^3 72a^2 \xi$$

15

Quae aequatio collatitia orta est ex collatione terminorum penultimorum; ultimi termini dant aequationem hanc: $\textcircled{16} a^2 41^2 h^2 - \textcircled{8} a41h100g^2 + \textcircled{32} a41h\beta$ [bricht ab]

15 + L ändert Hrsg.

433. DE SERIEBUS SUMMABILIBUS PARS TERTIA

Januar 1675

Überlieferung: L Konzept: LH 35 VIII 4 Bl. 3. 1/6 Bl. 1°. 1 S. auf Bl. 3 r°. Bl. 3 v° leer.
Cc 2, Nr. 892 tlw.

5 Ianuar. 1675.

Pars III. schediasmatis de seriebus summabilibus

$$\text{et in specie hac: } \frac{1}{z^2 + \frac{\beta}{2}z *}$$

Edoctus experientia calculorum superiorum, videbo an errores quos illic commisi,
possim praevenire. Ac primum exponam de quo agatur. Repertum est a me, si series
10 fractionum numeratore unitate, nominatoribus numeris quadratis unitate minutis expo-
natur, tunc prout nunc continue nunc per saltus sumantur, aut absolute aut non nisi ex
supposita circuli et hyperbolae quadratura, haberi seriei summam,

I)	$\frac{1}{3}, \frac{1}{8}, \frac{1}{15}, \frac{1}{24}, \frac{1}{35}, \frac{1}{48}, \frac{1}{63}, \frac{1}{80}, \frac{1}{99}, \frac{1}{120}$	etc. $\pi \frac{3}{4}$
II)	$\cdot \frac{1}{8}, \cdot \frac{1}{24}, \cdot \frac{1}{48}, \cdot \frac{1}{80}, \cdot \frac{1}{120}$	etc. $\pi \frac{1}{4}$
15 III)	$\frac{1}{3}, \cdot \frac{1}{15}, \cdot \frac{1}{35}, \cdot \frac{1}{63}, \cdot \frac{1}{99}, \cdot$	etc. $\pi \frac{1}{2}$
IV)	$\frac{1}{3}, \cdot \cdot \cdot \frac{1}{35}, \cdot \cdot \cdot \frac{1}{99}, \cdot$	etc. $\pi \left\{ \begin{array}{l} \text{numero qui} \\ \text{quadratura} \end{array} \right\}$
V)	$\cdot \frac{1}{8}, \cdot \cdot \cdot \frac{1}{48}, \cdot \cdot \cdot \frac{1}{120}, \text{etc. } \pi$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{circuli} \\ \text{pendet ex} \\ \text{hyperbolae} \end{array} \right\}$

Haec alibi a me geometrice demonstrata sunt. Nunc series istas duas quae ex circuli
20 et hyperbolae quadratura pendent analyticè exprimamus, ut in earum summam inquiri

$$13 \frac{1}{120} | \frac{1}{143} \frac{1}{168} \frac{1}{195} \text{ gestr.} | \text{ etc. } L \quad 14 \frac{1}{120} | \cdot \frac{1}{168} \cdot \text{ gestr.} | \text{ etc. } L \quad 15 \frac{1}{99} \cdot | \frac{1}{143} \cdot \frac{1}{195} \text{ gestr.} | \text{ etc. } L \quad 16 \frac{1}{99} \cdot | \cdot \frac{1}{195} \text{ gestr.} | \text{ etc. } L$$

19 alibi: vgl. N. 15, N. 382, N. 3810 sowie die *Arithmetische Kreisquadratur*, LSB III, 1 N. 39 S. 165 f.
u. LQK prop. XLII S. 88 f.

possit. Si nimirum quadratis restituantur unitates ademtae, habebuntur in quarta serie, 4.36.100 et radices 2.6.10, quorum intervallum 4. Eodem modo ex quinta serie, 9.49.121. et radices, 3.7.11. quorum intervallum etiam 4. Itaque ponendo intervallum 4 esse β .

et unitatem $\sqcap a$. poterit utraque series sic enuntiari: $\frac{1}{y^2 - \frac{a\beta}{4}}$. Ponendo scilicet y . re-

praesentare numeros progressionis arithmeticæ, quorum intervallum β sit $\sqcap 4$, item sic: 5

$\frac{1}{y^2 - a^2}$. Sed et adhuc aliter, nam $y^2 - a^2 \sqcap y + a \wedge y - a$. Considerandum est itaque,

3.35.99. aequari $1 \wedge 3, 5 \wedge 7, 9 \wedge 11$, item 8.48.120. aequari $2 \wedge 4, 6 \wedge 8, 10 \wedge 12$. Itaque numeri progressionis arithmeticæ, quorum intervallum β , sit 4, undecunque orientur,

appellentur y . ut 1.5.9. vel 2.6.10. Itaque ratione ipsorum $\begin{cases} 1. 5. & 9. \\ 2. 6. & 10. \end{cases}$ ipsi $\begin{cases} 3. 7. & 11. \\ 4. 8. & 12. \end{cases}$ erunt

$y + \frac{\beta}{2}$, nam $\frac{\beta}{2}$ est 2, vel $y + 2a$. Unde $\begin{cases} 1 \wedge 3. & 5 \wedge 7. & 9 \wedge 11. \\ 2 \wedge 4. & 6 \wedge 8. & 10 \wedge 12. \end{cases} \sqcap y^2 + \frac{\beta}{2}y * \text{vel si } 10$

mavis $y^2 + 2ay$. adeoque tam circuli quam hyperbolæ series quadratrix ita exprimi pot-

erit[:] $\frac{1}{y^2 + \frac{\beta}{2}y} * \text{vel } \frac{1}{y^2 + 2ay}$. Habemus ergo repertas iam serierum formulas quatuor,

$\frac{1}{y^2 - \frac{a\beta}{4}}$ vel $\frac{1}{y^2 - a^2}$, vel $\frac{1}{y^2 + \frac{\beta}{2}y} * \text{vel } \frac{1}{y^2 + 2ay}$, et si vel unius ex eius reperiri possit

summa, habebimus circuli simul et hyperbolæ quadraturam.

Porro methodum inquirendi in serierum summas, ego primus omnium reperisse credo 15 universalem; ita ut datae cuiusque seriei, quae modo formula analytica certae dimensionis explicari possit[,] haberi summa, aut inveniri possit in-summabilitas ope conditarum quarundam tabularum, si quis modo calculi laborem subire velit. Res eo redit, quaeruntur s e r i e r u m propositarum seu s u m m a n d a r u m , s e r i e s s u m m a t r i c e s . Iam ex serie summatrice data haberi potest series eius summandæ; contra vero nemo 20

1 in (1) prima (2) quarta L 4 f. enuntiari: (1) $y^2 - \frac{\beta}{4}$ (2) $\frac{1}{y^2 - \frac{a\beta}{4}}$... scilicet y (a) esse (b)

repraesentare L 7 3.35.99. (1) fieri ex (2) aequari L 8 β , sit erg. L 9 appellantur y . (1) et proxime sequens erit $y + 2a$ (2) ut L

methodum explicit ex data serie summandae inveniendi summaticem; utendum ergo arte analytica generali, a qua et nomen habet; et sumtis seriebus summaticibus indeterminatis generalibus, inde derivandae earum series summandae, quas conferendo datis seu propositis; resolventur propositae series in partes quales res postulat. Series autem summatrices quantum licet generales assumendae sunt, quo minoribus tentaminibus quaesitum obtineamus. Et vero nondum mecum statui, an possint novis adhibitis characteribus excogitari [formulae], quae plurium imo omnium dimensionum formulas in se comprehendant unae.

7 formulas L ändert Hrsg.

44. DE SUMMA SERIEI FRACTIONUM DATAE

44₁. DE SUMMA SERIEI FRACTIONUM DATAE PARS PRIMA

3. März 1675

Überlieferung: L Konzept: LH 35 VIII 4 Bl. 4–5. 1 Bog. 2°. 4 S.
Cc 2, Nr. 915 A tlw.

5

3 Martii 1675

De summa seriei fractionum datae
cum formulae differentiarum comparatur

$$\begin{aligned}
 & \frac{\frac{cy + ad}{fy + ag} - \frac{cy + c\beta}{fy + f\beta}}{fy^2 + 2afgy + afg\beta} \sqcap \frac{\frac{c fy^2}{fy^2 + 2afgy + afg\beta} + \frac{ad}{fy^2 + 2afgy + afg\beta}y + \frac{adf\beta}{fy^2 + 2afgy + afg\beta}\beta}{\frac{cf\beta..}{fy^2 + 2afgy + afg\beta} + \frac{acf..}{fy^2 + 2afgy + afg\beta}y + \frac{acf\beta..}{fy^2 + 2afgy + afg\beta}\beta} \\
 & \qquad \qquad \qquad + \frac{a^2dg}{fy^2 + 2afgy + afg\beta} + \frac{a^2dg}{fy^2 + 2afgy + afg\beta}y + \frac{a^2dg}{fy^2 + 2afgy + afg\beta}\beta \\
 & \qquad \qquad \qquad + \frac{acg..}{fy^2 + 2afgy + afg\beta} + \frac{acg..}{fy^2 + 2afgy + afg\beta}y + \frac{acg\beta..}{fy^2 + 2afgy + afg\beta}\beta \\
 & \qquad \qquad \qquad + \frac{f^2\beta..}{fy^2 + 2afgy + afg\beta} + \frac{f^2\beta..}{fy^2 + 2afgy + afg\beta}y + \frac{f^2\beta\beta..}{fy^2 + 2afgy + afg\beta}\beta \\
 & \qquad \qquad \qquad + \boxed{\frac{afg..}{fy^2 + 2afgy + afg\beta}}_I
 \end{aligned}$$

10

15

sive $\sqcap \frac{\frac{cy + ad}{fy + ag} - \frac{cy + c\beta}{fy + f\beta}}{fy^2 + 2afgy + afg\beta}$.

7f. De (1) summis serierum (2) summa seriei | fractionum erg. u. gestr. | fractionum erg. | datae ... differentiarum | generali gestr. | comparatur L

Esto iam data formula $\frac{\pm adf\beta \pm acg\beta}{f^2z^2 + \frac{f^2}{2}\beta z}$. Cumque numeratores sint iidem, aut si

non essent[,] cum constantes sint, multiplicando dividendoque facile reddi possent iidem, restat ut nominatores conferamus, quod ut succedere possit, faciamus $z \sqcap y + d$, erit

$f^2z^2 \sqcap f^2y^2 + 2f^2dy + f^2d^2$, et $\frac{f^2\beta z}{2} \sqcap \frac{f^2\beta y}{2} + \frac{f^2\beta d}{2}$, et fiet nominator correctus:

$$\begin{aligned} 5 \quad & f^2y^2 + 2f^2d \quad y \quad + \quad f^2d^2 \quad \text{conferendus nominatori superiori:} \\ & + \quad \frac{f^2\beta}{2} \quad .. \quad + \quad \frac{f^2\beta d}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & f^2y^2 + 2afg \quad y \quad + \quad afg\beta \\ & + \quad f^2\beta \quad .. \quad + \quad a^2g^2 \end{aligned}$$

Primi terminii iidem sunt, collatis ergo secundis, fiet haec aequatio:

$$10 \quad 4fd(+f\beta) \sqcap 4ag + (2)f\beta \text{ sive } f \sqcap \frac{4ag}{4d - \beta}, \text{ et } f^2 \sqcap \frac{16a^2g^2}{16d^2 - 8d\beta + \beta^2}.$$

Collatis ultimis terminis aequatio haec habebitur: $2f^2d^2 + f^2\beta d \sqcap 2afg\beta + 2a^2g^2$.

$$\begin{array}{c} 16a^2g^2 \\ \hline 16d^2 - 8d\beta + \beta^2 \end{array} \qquad \begin{array}{c} 4ag \\ \hline 4d - \beta \end{array}$$

Substitutis ipsius f explicationibus, sublatisque fractionibus, fiet:

$$15 \quad \begin{array}{c} \boxed{32a^2g^2d^2} \quad \boxed{+16a^2g^2\beta d} \quad \sqcap \quad \boxed{2ag\beta 4ag4d} \\ \diagup \quad \diagup \\ 16 \quad \boxed{(32)a^2g^2\beta d} \end{array} \quad \begin{array}{c} \boxed{-2ag\beta 4ag\beta}, \quad \boxed{+2a^2g^216d^2} \\ \diagup \quad \diagup \\ -8a^2g^2\beta^2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \boxed{-2a^2g^28d\beta}, \quad \boxed{+2a^2g^2\beta^2} \\ \diagup \quad \diagup \\ +32a^2g^2d^2 \quad \boxed{-16a^2g^2d\beta} \end{array} \quad \begin{array}{c} \diagup \\ +2a^2g^2\beta^2 \end{array}$$

Unde fit denique aequatio impossibilis: inter 8 et 2.

Sic ergo exitus non datur, et remedium aliquod, si licet quaerendum est.

Ad originem ergo huius seriei ad summandum propositae redeamus. Ordinata cyclo-

cissoeidis erat $\frac{ax}{\sqrt{2ax \mp x^2}}$, multiplicetur quantitate assumta $\frac{e}{a}$, fiet: $\frac{ex}{\sqrt{2ax \mp x^2}} \sqcap y$.

$$14 \quad \boxed{+16a^2g^2\beta d} \quad \sqcap \quad (1) \quad 2ag\beta 4ag16d^2 - 2ag\beta 4ag8d\beta + 2ag\beta 4ag \quad \sqcap \quad 2ag\beta ad - 2ag\beta d \quad (2)$$

$$\boxed{2ag\beta 4ag4d} \quad L \quad 18 \quad \text{redeamus. (1) Aequatio (2) Ordinata } L \\ \boxed{16(32)a^2g^2\beta d}$$

Unde $\frac{e^2x^2}{2ax \mp x^2} \sqcap y^2 \sqcap \frac{e^2x}{2a \mp x}$. Unde $2ay^2 \mp xy^2 \sqcap e^2x$, vel $2ay^2 \sqcap e^2x \pm xy^2$, vel $\frac{2ay^2}{e^2 \pm y^2} [\sqcap x]$. Sed hinc video nil novi; rectius ita: $\frac{ax}{\sqrt{2ex \mp \frac{e}{a}x^2}} \sqcap y$. Unde $\frac{a^2x}{2e \mp \frac{e}{a}x} \sqcap y^2$.

Unde $a^2x \pm \frac{e}{a}y^2x \sqcap 2ey^2$ sive $\frac{2ey^2}{a^2 \pm \frac{e}{a}y^2} \sqcap x$. Unde et haec: $\frac{a^2}{a^2 \pm \frac{e}{a}y^2}$ vel $\frac{1}{1 + ey^2}$. ponendo

$a \sqcap 1$, et e in circulo signum $-$, in hyp. + continere. Unde $1 - ey^2 + e^2y^4 - e^3y^6$ etc.

Summae $b = \frac{eb^3}{3} + \frac{e^2b^5}{5} - \frac{e^3b^7}{7}$ etc. Ponatur $eb^2 \sqcap 1$. seu $b \sqcap \frac{1}{\sqrt{e}}$. Sin malis relinqu a^2 , 5

fiet: $1 - \frac{ey^2}{a^3} + \frac{e^2y^4}{a^5} - \frac{e^3y^6}{a^7}$ etc. Unde: $\frac{b}{a} = \frac{eb^3}{3a^4} + \frac{e^2b^5}{5a^7} - \frac{e^3b^7}{7a^{10}}$.

Sed video nihil his obtineri; nam aut $\frac{eb^2}{a^3}$ ponendo $\sqcap 1$. aut series in aequationem cogibilis inde fieri non potest.

Ad aliud ergo remedium configiendum tentandumque est, an aliqua series summa- 10
bilis addi possit datae, ita ut summa inde facta comparabilis summabili reddatur.

E. g. ad 4⁴ $\frac{h}{a^2y^2 + 2da^2y + d^2a^2}$ quaesitam, addatur $\frac{m}{f^2y^2 + 2afgy + a^2g^2}$ inventa.

$$\frac{a^2\beta}{2} \dots + \frac{\beta da^2}{2} \qquad \qquad \qquad + f^2\beta \dots + afg\beta$$

Summa ex ipsis formulae summabilium quadratoquadraticae in numeratore, quadraticae in numeratore comparetur; quo facto si in tanta arbitrariarum, d, f, g, h, m , et earum

praeterea, quae ex formula $\frac{ly^2 + ny + pa}{\frac{q}{a}y^2 + ry + s}$, peti possunt numero sex, vel saltem neglecto 15

l , numero 5, fient decem minimum arbitrariae, collationes autem sunt numero novem.

2 $\frac{2ay^2}{e^2 \pm y^2} \mid \sqcap x$ erg. Hrsg. | . (1) Sub (2) Sumatur iam: $\frac{y^2}{e^2 -} \quad (3)$ Sed $L \quad 11$ ad (1) $\frac{ca}{y^2 + \frac{1}{2}\beta y}$
addatur $\frac{d}{(2) \sqcap L} \quad 12 \quad (1) + a^2\beta \dots (2) + f^2\beta \dots L$

12 $f^2\beta \dots$: Leibniz ändert hier und in der Formel für b auf S. 641 Z. 24 punktuell den Faktor a^2 in f^2 .

Sed et unam adhuc arbitrariam forte facere licebit, forte; explicando y , in posteriore formula $\frac{m}{f^2y^2}$ etc. Imo si alias adhuc adicere velis formulas summabiles augebis numerum arbitrariarum, modo non augeatur et numerus dimensionum seu collatitiarum, quod difficile erit evitatu.

$$\begin{array}{ccc}
 5 & \odot & \mathbb{D} \\
 & \frac{l}{a}y^2 + 2ly\beta + \beta^2 & \\
 & \frac{l}{a}y^2 + ny & + ny + n\beta \\
 \frac{a}{q}y^2 + ry & \frac{q}{a}y^2 + \frac{2q}{a}\beta y + \frac{q}{a}\beta^2 & \left| \begin{array}{l} -\frac{ql}{a^2}y^4 - \frac{2lq\beta}{a^2}y^3 \\ + \frac{2q\beta l}{a^2}y^2 - \frac{nq}{a}y \\ + \frac{rl}{a}y \end{array} \right. \\
 & + r \dots + r\beta & \\
 \varnothing & \wp & \dots
 \end{array}$$

10 Patet ergo terminos duos altissimos destructum iri, et fore arbitrariarum undecim, *d.f.g; h.m.l; n.p.q; r.s;* collationum autem ($y^2.y.a$ in numeratore, $y^4 + y^3 + y^2 + y + a.$ in nominatore) in universum 8, et arbitrariae supernumerariae erunt tres, quarum ope si exitus reperiri non potest; has methodum in hunc quidem usum non ultra sollicitandas arbitror.

15 $\frac{\frac{\odot}{\varnothing}}{\wp} \pm \frac{\mathbb{D}}{\wp} \sqcap \frac{\frac{\odot\wp}{\varnothing\wp} \pm \frac{\wp}{\varnothing}}{\wp\wp}$. Iam ex iis quae schediasmatis *De seriebus et quadraturis* plag. 13. fine, et plag. XV. initio calculata sunt, et inter se consentiunt, erit ponendo pro $e \sqcap q. f \sqcap r. g \sqcap s. b \sqcap l. c \sqcap n. d \sqcap p.$

3 modo (1) earum nominator (2) non L 13 usum (1) mittendas arbitror (2) non L
 15f. *quadraturis* (1) parte (2) plag. 13. L

5–9 Leibniz vergibt in den Formeln \odot u. \mathbb{D} den Term $+pa$, in \wp u. $\wp\wp$ den Term $+sa$; er bemerkt den Fehler auf S. 642 Z. 7 und schreibt anschließend die vollständige Formel neu an. 15 *De seriebus et quadraturis*: N. 38₁₅ S. 525 Z. 1 – S. 526 Z. 9 u. N. 38₁₇ S. 539 Z. 11 – S. 541 Z. 8.

1	2	3	
$\pm \frac{qn\beta}{a}$	y^2	$\pm 2qp\beta$	y
$\pm \frac{lr\beta}{a}$	\dots	$\pm \frac{qn\beta^2}{a}$	\dots
		$\pm 2ls\beta$	\dots
		$\pm \frac{lr\beta^2}{a}$	\dots
		$\pm nsa\beta$	5
$\boxed{q.n.r.}$	$\boxed{q.n.r.p.s.}$	$\boxed{q.n.r.p.s.}$	

4	5	6	7	8	
$\frac{q^2}{a^2}$	$y^4 + \frac{2q^2\beta}{a^2}y^3 + \frac{q^2\beta^2}{a^2}y^2$	$+ \frac{qr\beta^2}{a}$	y	$+qs\beta^2$	
	$+ \frac{2qr}{a} \dots + \frac{3qr\beta}{a} \dots$	$+r^2\beta \dots$	\dots	$+rsa\beta$	10
$\boxed{q.r.}$	$+2qs \dots$	$+2rsa \dots$	\dots	$+s^2a^2$	
	$+r^2 \dots$	$+2qs\beta \dots$	\dots	$\boxed{q.r.s.}$	
	$\boxed{q.r.s.}$	$\boxed{q.r.s.}$			

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 1 & & 2 & & 3 \\
 & & hf^2 & & y^2 & +2afgh & y +a^2g^2h \\
 & & & & & +a^2\beta h & .. +afg\beta h \\
 & & +ma^2 & .. & +2da^2m & .. +d^2a^2m \\
 & & & & +\frac{a^2\beta m}{2} & .. +\frac{\beta da^2m}{2} \\
 \hline
 5 & Iam 4 + \hbar \sqcap & \frac{4}{a^2f^2y^4} & \frac{5}{+2afga^2y^3} & \frac{6}{+a^2g^2a^2} & \frac{7}{y^2 +a^2g^22da^2} & \frac{8}{y +a^2g^2d^2a^2} \\
 & & +a^2\beta a^2 & .. & +afg\beta a^2 & .. +afg\beta 2da^2 & .. +afg\beta d^2a^2 \\
 & & +f^22da^2 & .. & +2afg2da^2 & .. +\frac{a^2g^2a^2\beta}{2} & .. +a^2g^2\frac{\beta da^2}{2} \\
 & & +\frac{f^2a^2\beta}{2} & .. & +a^2\beta 2da^2 & .. +\frac{afg\beta a^2\beta}{2} & .. +\frac{afg\beta \beta da^2}{2} \\
 & & & & +\frac{2afga^2\beta}{2} & .. & +2afgd^2a^2 .. \\
 & & & & +\frac{a^2\beta a^2\beta}{2} & .. & +a^2\beta d^2a^2 .. \\
 & & & & +d^2a^2f^2 & .. & +\frac{2afg\beta da^2}{2} .. \\
 & & & & +\frac{\beta da^2}{2}f^2 & .. & +\frac{a^2\beta \beta da^2}{2} ..
 \end{array}$$

In his duabus formulis inter se conferendis, sunt cognitae, a, β ; quaesitae: $q, n, l, r, p,$
 15 $s, h, m, f, d, g.$

Ante omnia per 4, erit $f \sqcap q.$ Literae quae saepissime occurrunt rectius in postremum differuntur.

h occurrit vicibus 5 semper simpliciter cum $f^2.fg.g^2$
 m cum $d.d^2$

14 cognitae, $a, \beta;$ (1) arb (2) indetermi (3) quaesitae L 16 $f \sqcap q.$ (1) m per 1 (2) m per (1),
 et h.s.q.n.l.r. d per (2) in (3) Literae L 17f. differuntur. (1) Saepissime autem occurrunt h , et m ,
 proxime q , inde r, h occurrit vicibus 5, semper pure (2) h ... semper (a) pure (b) simpliciter L

$$\begin{array}{llllll}
\underline{f} f^2 h. & fg h. & f^2 d. & f^2 d^2 & \underline{l} l q & \underline{r} r l. r^2 \\
& fg .. & fg .. & .. r & .. n & \\
& & & \underline{n} n q & .. q & \\
\underline{g} g^2 h. & gf h & & .. r & & \\
.. d & d & & & & 5 \\
.. d^2 & d^2 & \underline{q} q l. q^2 & .. n & & \\
& & & .. n & & \\
\underline{d} d m. & d^2 m & & .. r & & \\
.. f^2 & .. f^2 & & & & \\
.. fg & .. fg & & & & 10 \\
.. g^2 & .. g^2 & & & & \\
\\
\text{Repetam: } & \underline{h} h f g & 2.3 & \underline{m} m d & 3. & \underline{d} d m & 2.3 & d^2 m & 3. \\
.. f^2 & 1. & & .. d^2 & 3. & .. f^2 & 5.6 & .. f^2 & 6. \\
.. g^2 & 3. & & \bullet & 1.2 & .. f g & 6.7.8. & .. f g & 7.8 \\
& & & & & .. g^2 & 7.8 & .. g^2 & 8. \\
& & & & & \bullet & 6.7 & \bullet & 7. \\
& \underline{l} l q & \underline{n} n q & \underline{q} q l & q^2 & \underline{r} r l & r^2 & \underline{f} & \underline{g} \\
.. r & .. r & .. n & .. n & & .. n & & .. q & \\
& & & .. r & & & & & 20
\end{array}$$

Sed cum nullum magnopere ex allegatione copta usum videam, eam non perfeci.

Quoniam tamen in calculo tam prolixo opus est compendio, ideo seriem \mathfrak{h} , ita exhibemus: $\frac{m}{y^2 + by + ca}$ ponendo scilicet multiplicatam per f^2 fractionem \mathfrak{h} . Fractionem $\frac{h}{y^2 + ey + a\varepsilon}$ ita exprimemus: $\frac{h}{y^2 + ey + a\varepsilon} \equiv \frac{2afg + f^2\beta}{f^2}$, et $c \equiv \frac{a^2g^2 + afg\beta}{f^2}$, et $e \equiv 2d + \frac{a^2}{2}$, et $\varepsilon \equiv d^2 + \frac{\beta d}{2}$ unde $d \equiv \frac{2e - a}{4}$.

$$\begin{array}{llll}
1 \quad (1) f \text{ vicibus 3 semper cum } h; \text{ bis cum } g, \text{ semel secum ipso } (2) \underline{f} L & 24 \quad b \equiv (1) \frac{2afg + a^2\beta}{f^2} \\
(2) \frac{2afg + f^2\beta}{f^2} L & 25 \quad \text{unde } d \equiv \frac{2e - a}{4} \text{ erg. } L
\end{array}$$

$$+my^2 + emy + a\varepsilon m$$

$$+ h \dots + bh \dots + eah$$

$$+ e \dots + eb \dots + a\varepsilon b \dots$$

$$+ a\varepsilon \dots$$

5 Unde patet in fractione ex \odot et \oslash facta, nempe $\frac{\frac{1}{a}y^2 + ny + pa}{y^2 + ry + sa}$ posse audacter poni $q \sqcap a$

cognitae seu unitati. Videamus tamen an non et hanc brevius exprimere liceat, nempe:
Nota \odot et $[?]$ non bene supra expressae quia in ipsis omissae p et s . Sic ergo:

\odot

$$\frac{l}{a}y^2 + \frac{2l\beta}{a}y + \frac{l\beta^2}{a}$$

$$+ n \dots + n\beta$$

$$\begin{aligned} & \frac{l}{a}y^2 + ny + pa \\ & \frac{y^2 + ry + sa}{y^2 + 2\beta y + \beta^2} \\ & + r \dots + r\beta \\ & + sa \end{aligned}$$

φ

\wp

641,24 Zu $b \sqcap \frac{2afg + f^2\beta}{f^2}$, et $c \sqcap \frac{a^2g^2 + afg\beta}{f^2}$: Ergo $g \sqcap \frac{fb - f\beta}{2a}$ et $c \sqcap a^2, \wedge$
 $\frac{b - \beta}{2a} \square, +a\beta, \wedge \frac{b - \beta}{2a}$. Ergo c . non est quantitas separata, sed pendens a b .

6 f. nempe (1) \odot manebit $\frac{\frac{1}{a}y^2 + ny}{a}$ (2) Nota \odot et | \oslash ändert Hrsg. | non L

641,24 f. $e \sqcap 2d + \frac{a^2}{2} \dots d \sqcap \frac{2e - a}{4}$: Richtig wäre $e = 2d + \frac{\beta}{2}$ bzw. $d = \frac{2e - \beta}{4}$. Die fehlerhaften Werte für d bzw. e gehen in S. 647 Z. 16 f. und in N. 442 S. 653 Z. 3–6 in die weitere Rechnung ein.
7 Nota: s. Erl. zu S. 638 Z. 5–9.

Et ut compendio consulamus licebit \mathbb{D} ita enuntiare: $\frac{\frac{l}{a}y^2 + \lambda y + \pi a}{y^2 + \varrho y + \omega a} \mathbb{D}$. Tantum ergo notemus; $\underline{\varepsilon}$ pendere ex e . $\underline{\varrho}$ ex r . $\underline{\omega}$ ex r et s . $\underline{\lambda}$ ex l et n . et $\underline{\pi}$ ex $l.n.p$. Igitur $\frac{\odot\mathfrak{Y} + \mathbb{D}\mathfrak{Y}}{\mathfrak{Y}\mathfrak{Y}}$ faciet:

$$\begin{aligned} \mathfrak{Y} &\left\{ \begin{array}{l} pay^2 \\ + \varrho n .. + \varrho pay \\ + \omega l .. + \omega an .. + \omega a^2 p \end{array} \right\} \sqcap \odot\mathfrak{Y} \\ \mathfrak{Y} &\left\{ \begin{array}{l} + \pi a .. \\ + r\lambda .. + r\pi a .. \\ + sl .. + sa\lambda .. + sa^2 \pi \end{array} \right\} \sqcap \mathbb{D}\mathfrak{Y} \end{aligned}$$

Sed iam ex numeratore $\odot\mathfrak{Y} + \mathbb{D}\mathfrak{Y}$ intelligo conferendo cum calculo superiore, nullum hic a compendio seu brachylogia haberi lucrum, nisi forte in nominatore, cum hic per brachylogiam tantum novem habeantur quantitates, partes formulae, supra vero 14.

Itaque retento superiore numeratore, quia nullum a comprehensione seu brachylogia lucrum, nominatorem novum adhibeamus, multiplicando: $y^2 + ry + sa$, per $y^2 \varrho y + \omega a$. Sed ne in lapsum proclives simus describendo ob affinitatem r et ϱ , et s et ω , satius ergo pro

ϱ adhibere φ et pro ω adhibere γ . et $y^2 + ry + sa$, multiplicata per $y^2 + \varphi y + \gamma a$, dabit:

5

10

15

12 f. habeantur (1) termini, supra autem (2) qua (3) quantitates, (a) hic vero (b) partes formulae, (aa) hic vero (bb) supra vero 14. (aaa) Commodius ergo sic exprimemus $\mathfrak{Y} \frac{\odot}{\mathfrak{Y}} \frac{\frac{1}{a}y^2 + ny + pa}{y^2 + ry + sa}$

$$\begin{aligned} \mathfrak{Y} &\frac{\frac{1}{a}y^2 + \lambda y + \lambda\beta}{y^2 + \varrho y + \varrho\beta} \frac{\mathbb{D}}{\mathfrak{Y}} \text{ ponendo } \lambda \sqcap \frac{2\beta}{a} + n \text{ et } \varrho \sqcap 2\beta + r. \text{ Unde fiet multiplicando per crucem, } \frac{1}{a}y^4 \text{ (bbb)} \\ &+ sa \\ &\frac{\frac{1}{a}y^2 + \frac{1}{a}\beta y + \lambda\beta}{y^2 + \beta y + \beta\varrho} \\ &+ \lambda .. + pa \\ \text{Posses et } \mathfrak{Y} &\text{ sic exprimere: } \frac{\frac{1}{a}y^2 + \beta y + \beta\varrho}{y^2 + \beta y + \beta\varrho} \text{ Sed nec hinc compendium valde notable; (ccc) Commodis-} \\ &\text{simum (ddd) Itaque } L = 14 + \omega a \text{ (1), unde fiet: (2) Sed } L \end{aligned}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{nominator} \\ y^4 + r \ y^3 + sa \ y^2 + \varphi sa \ y + \gamma sa^2 \\ + \varphi \dots + \varphi r \dots + \gamma ar \dots \\ + \gamma a \dots \end{array} \right\} \text{qui est denominator fractionis cuius numerator est,}$$

5 numerator

$$\begin{aligned} & \pm n\beta y^2 \mp 2ap\beta y \mp ap\beta^2 \\ & \pm \frac{lr\beta}{a} \dots \mp n\beta^2 \dots \mp rpa\beta \\ & \qquad \qquad \qquad \pm 2ls\beta \dots \pm ls\beta^2 \\ & \pm \frac{lr\beta^2}{a} \dots \pm ns a\beta \end{aligned}$$

10 Quae fractio conferenda est cum superiore cuius

nominator		numerator
$\frac{1}{4}$	$\frac{b}{y^4} + b ..$	$\frac{1}{y} + ma ..$
$\frac{b}{y^3} + ca ..$	$y^2 + cae ..$	$\frac{2}{y^2} + ema ..$
$\frac{7}{y^2} + cae ..$	$y + ca^2\varepsilon ..$	$a^2\varepsilon m ..$
$\frac{8}{y} + ca^2\varepsilon ..$		
$+ e .. + e\beta .. + a\varepsilon\beta ..$		$+ ha .. + bha .. + ca^2h ..$
$+ a\varepsilon ..$		

Ex coll. 5, erit $b \sqcap [r + \varphi]2r + 2\beta - e$. ex 6, erit $c \sqcap \frac{sa + \varphi r + \gamma a - e\beta - a\varepsilon}{a}$. Ex 1, erit

18 Nebenbetrachtung: $\varepsilon \leq \frac{d^2 + \beta d}{2}$. Est autem $d \leq \frac{2e - a}{4}$. $\varphi \leq 2\beta + r$. $\gamma \leq \frac{\beta^2 + r\beta + sa}{a}$.

Inveni errorem in eo commissum, quod *c* velut literam separatam, a *b* independentem supponi, quod non est.

10 superiore: S. 642 Z. 1–4. 19 $\varepsilon = \frac{d^2 + \beta d}{2}$: Leibniz übernimmt die Werte für ε und d von

S. 641 Z. 25 (vgl. Erl.), für φ und γ aus der Formel § S. 642 Z. 11–13. Beim Übertragen der Gleichung für ε unterlief ihm ein Schreibfehler; der fehlerhafte Wert geht in die Berechnung von ε in S. 646 Z. 1 f. ein, wobei weitere Unstimmigkeiten auftreten. Das Ergebnis beeinträchtigt die Rechnung in N. 442 ab S. 658 Z. 1.

$$\underline{m} \sqcap \frac{\pm n\beta a \pm lr\beta - ha^2}{a^2}, \text{ ex } \underline{2}, \text{ erit}$$

$$\underline{p} \sqcap \frac{\pm n\beta a^2 e \pm lr\beta ea - ha^3 e + 2rha^3 + 2\beta ha^3 \pm n\beta^2 a^e \pm 2ls\beta a^2 \pm lr\beta^2 a}{\mp 2a^3 \beta}. \text{ Ex } \underline{7}, \text{ fiet:}$$

$$2\beta sa + rsa + r\beta^2 + r^2\beta + rsa \sqcap esa \boxed{+e\varphi r} + 2\beta er + 2r^2 e + e\beta^2 + er\beta + esa + 2ra\varepsilon + 2\beta a\varepsilon - ea\varepsilon \text{ adeoque } \underline{s} \sqcap \frac{+3\beta er + 2r^2 e + e\beta^2 + 2ra\varepsilon + 2\beta a\varepsilon - ea\varepsilon - r\beta^2 - r^2\beta}{2\beta a + 2ra - 2ea}. \text{ Ex aequatione}$$

autem 8, fiet:

5

$$\left. \begin{aligned} & 3\beta er^2 + 2r^2 e \beta^2 + e\beta^2 \beta^2 + 2ra\varepsilon \beta^2 + 2\beta a\varepsilon \beta^2 - ea\varepsilon \beta^2 - r\beta^2 \beta^2 - r^2 \beta \beta^2 \\ & \dots r\beta + \dots r\beta + \dots r\beta + \dots r\beta - \dots r\beta - \dots r\beta - \dots r\beta \\ & \dots sa + \dots sa + \dots sa + \dots sa - \dots sa - \dots sa - \dots sa \end{aligned} \right\} \sqcap$$

$$\begin{aligned} & sa^2 e 2\beta \not{a} + \boxed{\varphi} rae 2\beta \not{a} + \boxed{\gamma} a^2 e 2\beta \not{a} - 2\beta \not{a} - e^2 a \beta 2\beta \not{a} - a^2 e \varepsilon 2\beta \not{a} \\ & 2r \not{a} \quad \overbrace{2\beta + r} \quad 2r \not{a} \quad \overbrace{\beta^2 + r\beta + sa} \quad 2r \not{a} \quad 2r \not{a} \quad 2r \not{a} \\ & - 2e \not{a} \quad - 2e \not{a} \end{aligned}$$

10

Sed cum duae literae sint in mea potestate, utile videtur, ponere, $s \sqcap 0$. et fiet ex coll. 7:

$$\oplus r^2 \left\{ \begin{array}{l} +3\beta er \\ \boxed{+2a\varepsilon..} \\ -\beta^2.. \\ \hline 2e - \beta \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} +e\beta^2 \\ \boxed{+2\beta a\varepsilon} \\ -ea\varepsilon \\ \hline 2e - \beta \end{array} \right. \sqcap 0 \text{ et ex coll. 6[:]}$$

15

$$13 \text{ Kontrollbetrachtung mit Nebenrechnungen: } (e \sqcap -\frac{15}{2}) 3\beta e \sqcap \frac{-45 \boxed{24}^2}{\boxed{2}} \sqcap$$

$$-90, -16 \sqcap -106. -19 \sqcap 2e - \beta. \quad \frac{15}{120} \quad \frac{\not{120}}{\not{19}} \not{f} 6 \quad \frac{4[!]}{19} \quad \frac{e\beta^2 \sqcap -15^2}{-19 \sqcap 2e - \beta} \sqcap 6 \frac{4[!]}{19}. \text{ Ex}$$

quo calculo apparet r esse quantitatem realem, quod desiderabatur.

$$644,18 \underline{s} \sqcap \frac{sa + \varphi r + \gamma a - e\beta - a\varepsilon}{a}. (1) \text{ Ex 7. explicando } \varphi \sqcap 2\beta + r, \text{ ex coll. 7. fiet: (2) } 2\beta 3sa$$

$$(3) \gamma (4) \text{ Ex 8, } \gamma \sqcap \frac{sa^2 \varepsilon + \varphi r \not{a} \varepsilon + \gamma a^2 \varepsilon - e\varepsilon \beta - \not{a} \varepsilon^2}{sa} (4) \text{ Ex } \underline{1} L \quad 644,19 d \sqcap \frac{2e - a}{4}. (1) \text{ ergo}$$

$$\varepsilon \sqcap \frac{4e^2 - 4ea + a^2}{32} + (2) \varphi \sqcap 2\beta + r L$$

+3(2) $\beta r + r^2 + \beta^2 [r\beta] - e\beta - a\varepsilon \sqcap 0$. Est autem $\varepsilon \sqcap \frac{4e^2 - 4ea + a^2}{32} + \frac{2\beta e - \beta a}{2a}$
 vel $\varepsilon \sqcap \frac{4e^2 - 4ea + a^2 + 32\beta e - 16\beta a}{32a}$. Unde ex coll. 6 fiet: $96\beta r + 32r^2 + 32\beta^2 - e\beta - 4e^2 + 4ea - a^2 - 32\beta e + 16\beta a \sqcap 0$ sive

$$\left. \begin{array}{l} e^2 + \beta e - 96\beta r \\ - 4a.. - 32r^2 \\ + 32\beta .. - 32\beta^2 \\ + a^2 \\ - 16\beta a \end{array} \right\} \sqcap 0.$$

5

Ex priore aequatione, coll. 7. substituendo pro ε eius valorem, fiet:

$$\begin{aligned} 10 \quad & r^2 + 96\beta e r + 32e\beta^2 \sqcap 0. \\ & + 8e^2 + 8\beta e^2 \\ & - 8ea - 8ea\beta \\ & + 2a^2 + 2\beta a^2 \\ & + 64\beta e + 64\beta^2 e \\ 15 \quad & \frac{-32\beta a}{-32\beta^2} \frac{-32\beta^2 a}{-4e^3} \\ & + 4e^2 a \\ & - ea^2 \\ & - 32\beta e^2 \\ 20 \quad & \frac{+ 16e\beta a}{64e - 32\beta} \end{aligned}$$

15

Sed aliter quoque et credo brevius: Ponendo, ut dixi $s \sqcap 0$. fiet et $ca^2\varepsilon \sqcap 0$. Ergo
 vel $c \sqcap 0$. ut paulo ante, vel potius divisa aequatione per c . fiet $\varepsilon \sqcap 0$. Quo facto exitus
 habetur planus, quia fiet: $\sigma \underline{e^2} - ae + \frac{a^2}{4} \sqcap 0$. Habetur ergo e pure, sine r , et proinde \underline{r}
 25 $+ 8\beta - 4\beta a$
 quoque.

6+9 $\sqcap 0$. (1) Eodem modo in priore aequatione (a) subst (b) Ex coll. 7 (aa) fiet (bb) fiet (3) Ex L
 23 facto (1) ad utrius (2) exitus L

645,16 ($e \sqcap -\frac{15}{2}$): Leibniz verwendet die Gleichung von S. 647 Z. 17 mit den Werten $\beta = 4$ und
 $a = 1$. 1 f. Est autem ε : S. Erl. zu S. 644 Z. 19.

Aequationibus \oplus ex coll. 7, et σ ex coll. 8 inventis restat aequatio invenienda ex coll. 3. ubi quia s et ε sunt $\sqcap 0$. ponendo etiam $p \sqcap 0$. restabit ex coll. 3. $ca^2h \sqcap 0$. id est vel $c \sqcap 0$. vel $h \sqcap 0$. Sed non licet ponere $c \sqcap 0$. quia in valore ipsius c . ex coll. 6. non continentur aliae incognitae quam r . et e . quae iam sunt inventae, erit ergo ex coll. 3. $h \sqcap 0$. Sed iam video id non licere, neque h neque m facere $\sqcap 0$. Quare nec p licebit ponere $\sqcap 0$. fiet ergo: ex coll. 3. $\nexists ap\beta^2 \nexists rpa\beta \sqcap ca^2h$. vel

$$\begin{array}{ccccccccc} \nexists n\beta ae\beta & \pm n\beta^2 a\beta & \pm lr\beta e\beta & \boxed{\nexists 2ls\beta a\beta} & -hae a\beta & \nexists lr\beta^2 a & +2rha a\beta & +2\beta ha a\beta \\ \dots ar & \dots ar & \dots r & \dots ra & \dots ra & \dots r & \dots ra & \dots ra \\ \sqcap 2ca^2h, \end{array}$$

sive $\sqcap [2sa^3h] + 2\varphi ra^2h + 2\gamma aa^2h - 2e\beta a^2h [-2a\varepsilon a^2h]$. Ac primum parenthesi inclusa evanescunt, quia s et $\varepsilon \sqcap 0$. per superiora. Supersunt incognitae, h, n, l ex quibus duae sunt supernumerariae, non tamen licet ponere $h \sqcap 0$. neque n simul cum l . Optimum ergo erit ponere vel l vel n aequale $\sqcap 0$. et h . arbitriae valorem quandam ascribere, per quem aequatio reddatur simplicior. Hac ergo in parte manifeste habetur exitus, tantum unum excutendum superest, an e et r sint quantitates verae, an imaginariae. Imo de e non metuendum, nam si $\varepsilon \sqcap 0$ fiet per superiora $d \sqcap -\beta$. ut idem $d \sqcap \frac{2e-a}{4}$. Ergo $e \sqcap \frac{a-4\beta}{2}$. nam divisibilis est aequatio σ per d , aut per $\frac{2e-a}{4}$.

16 per superiora: Leibniz verwendet die fehlerhafte Gleichung für ε von S. 644 Z. 19.

442. DE SUMMA SERIEI FRACTIONUM DATAE PARS SECUNDA

3. März 1675

Überlieferung: L Konzept: LH 35 VIII 4 Bl. 6–7. 1 Bog. 2°. 3 S. Bl. 7v° leer. Datum
u. Überschrift ergänzt. — Auf Bl. 7r° außerhalb des Textes 3 Skizzen in Blindtechnik,
5 möglicherweise zur Rechenmaschine (hier nicht wiedergegeben).
Cc 2, Nr. 915 A tlw.

3 Martii 1675

Pars 2^{da} De seriei fractionum summa
cum formulae differentiarum comparatur

- 10 His ita pulchre in speciem procedentibus, denique errorem aliquem subesse deprehendi, non quidem calculi, sed quod peius ratiocinationis, nam praecipitato nonnihil iudicio sumi b . et c . velut a se invicem independentes, cum tamen sit $b \sqcap \frac{2ag + f\beta}{f}$. Unde
 $g \sqcap f, \hat{\gamma} \frac{b - \beta}{a}$. Iam $c \sqcap \frac{a^2g^2 + afg\beta}{f^2}$, ergo $c \sqcap \frac{a^2, \hat{\gamma} f^2, \hat{\gamma} \frac{b - \beta}{2a}}{f^2} \square, + a\beta, \hat{\gamma} f^2, \hat{\gamma} \frac{b - \beta}{2a}$,
sive $c \sqcap \frac{b^2 - 2\beta b + \beta^2}{4} + \frac{b\beta - \beta^2}{2}$ sive $c \sqcap \frac{b^2 - 2b\beta + \beta^2, + 2b\beta - 2\beta^2}{4}$ sive $c \sqcap \frac{b^2 - \beta^2}{4}$.
- 15 Ergo omnium serierum, quarum numerator constans, nominator vero: $y^2 + by + \frac{b^2 - \beta^2}{4}$,
ut $\frac{1}{y^2 + by + \frac{b^2 - \beta^2}{4}}$ iniri potest summa. Unde si sit series $\frac{1}{y^2 + 2\mu y + \mu^2}$. conferendo
erit: $\mu \sqcap \frac{b}{2}$. et $\mu^2 \sqcap \frac{b^2}{4}$. Ergo $\frac{b^2}{4} \sqcap \frac{b^2}{4} - \frac{\beta^2}{4}$. Ergo $\beta \sqcap 0$. quod est absurdum.

8 Pars 2^{da} (1) De (a) serierum (b) seriei summa (2) De L

Videamus an habeatur series: $\frac{1}{y^2 + 2\mu y + \mu^2}$. Unde conferendo: $\mu \sqcap \frac{b}{2}$ et $\mu^2 \sqcap \frac{b^2}{4}$.
 $+ \xi^2$

Iam $\frac{b^2}{4} + \xi^2 \sqcap \frac{b^2}{4} - \frac{\beta^2}{4}$. Erit $\xi^2 \sqcap -\frac{\beta^2}{4}$. quod est absurdum.

$y^2 + by + \frac{b^2 - \beta^2}{4}$ conferenda cum: $y^2 + 2dy + d^2$ fiet $d \sqcap \frac{2b - \beta}{4}$, et $d^2 \sqcap$
 $+ \frac{\beta}{2} + \frac{\beta d}{2}$

5

$\frac{4b^2 - 4b\beta + \beta^2}{16}$. Unde $\boxed{4b^2} \cancel{(-4b\beta)} + \beta^2 \cancel{(+4b\beta)} - 2\beta^2 \sqcap \boxed{4b^2} - 4\beta^2$ aequatio absurdia. Ergo
ne ista quidem series.

Sumamus seriem polygonorum, et videamus quarumnam ex illis fractionum haberi possit summa. Porro ut alibi ex Gosselino calculavi, si numerus angulorum sit B , latus z ,

numerus polygonus erit: $\frac{2a + B}{2} z^2 \left\{ \begin{array}{l} + 4a^2 \\ - Ba \\ \hline 2 \end{array} \right.$ Explicetur z per $y + \mu$, fiet:

$$\left\{ \begin{array}{l} 2a y^2 \\ +B .. \\ \hline 2 \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} +2a \wedge 2\mu y \\ +B \\ \hline 2 \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} +2a \mu^2, \\ +B .. \\ \hline 2 \end{array} \right. \text{divisisque omnibus per } \frac{2a + B}{2}, \text{ fiet:}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} +4a^2 .. \\ -Ba .. \\ \hline 2 \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} +4a^2 \mu \\ -Ba \mu \\ \hline 2 \end{array} \right.$$

15

$$y^2 + \mu y \mu^2. \text{ Erit } \mu \sqcap \frac{2ab + Bb - 4a^2 + Ba}{2a + B}. \text{ et}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} +4a^2 .. \\ -Ba .. \\ \hline +2a \\ +B \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} +4a^2 \mu \\ -Ba .. \\ \hline +2a \\ +B \end{array} \right.$$

15

4–651,3 $y^2 + by \dots$ [irrationalem]: Leibniz versucht nacheinander drei Zahlenfolgen durch Koeffizientenvergleich auf die Ausgangsformel zurückzuführen. Ab Z. 16 unterlaufen ihm einige Fehler, welche die Überlegungen beeinträchtigen. 9 alibi ex Gosselino: Leibniz exzerpiert den Satz über die Polygonalzahlen aus *De arte magna*, 1577; Bl. 11 r° [Marg.] und übersetzt ihn in eine analytische Formel in N. 41₂ S. 601 Z. 8–18. 16–650,15 $+\mu y$: Leibniz vergißt den Faktor 2. Der Fehler geht in die weitere Rechnung ein und beeinträchtigt zusammen mit weiteren Unstimmigkeiten in der Gleichung S. 650 Z. 10 f. die Berechnung von b in S. 650 Z. 14 f.

$$\mu^2 \vdash \frac{4a^2b^2 + 4abBb - 16aba^2 + 4abBa, + B^2b^2 - 8Bba^2 + 2B^2ba, + 16a^4 - 8a^2Ba + B^2a^2}{4a^2 + 4aB + B^2}.$$

$$\begin{array}{r} \text{Unde fiet: } 4a^2b^2 + 4abBb \text{ etc., } + 2ab, \wedge + 4a^2 \sqcap \\ \quad + Bb \quad - Ba \quad \left\{ \begin{array}{l} + b^2 \wedge + 4a^2 \\ - \beta^2 + 4aB \end{array} \right. \\ \quad - 4a^2 \quad \quad \quad 4 \quad + B^2 \\ \quad + Ba \end{array}$$

5

$$\text{Compendii causa rectius ita procedemus: Ponendo } \mu \sqcap \frac{2ab + Bb - 4a^2 + Ba}{2a + B} \text{ vel}$$

$$b - \frac{4a - B, \hat{a}}{2a + B} \text{ erit } \mu^2 \sqcap b^2 - 2ba \frac{4a - B}{2a + B} + \frac{4a - B[\hat{a}]}{2a + B} \square. \text{ Ergo } b^2 - 2ba \frac{4a - B}{2a + B} +$$

$$\frac{4a - B[\hat{a}]}{2a + B} \square + \boxed{\frac{4a - B, \hat{a}\mu}{2a + B}} \frac{4a - B,, \hat{b} 2a + B,, - 4a + B, \hat{a}}{2a + B, \square} \sqcap \frac{b^2 - \beta^2}{4}.$$

Multiplicentur omnia per $16a^2 + 16aB + 4B^2$, fiet:

$$10 \quad \boxed{16a^2b^2} \boxed{+16aBb^2} \boxed{+4B^2b^2} - 2ba4a4a - 2ba4a2B + 2baB4a + 2baB2B + 64a^4 - \\ 32a^3B + 4a^2B^2 \sqcap \boxed{16a^2b^2} \boxed{+16aBb^2} \boxed{4B^2b^2} - 16a^2\beta^2 - 16aB\beta^2 - 4B^2\beta^2.$$

Unde patet huius aequationis ope regulariter inveniri posse b . Adeoque regulariter summam numerorum fractionum polygonalium inveniri posse; fiet

$$b \sqcap \frac{-16a^2\beta^2 - 16aB\beta^2 - 4B^2\beta^2 - 64a^4 + 32a^3B - 4a^2B^2}{-32a^3 \boxed{-16a^2B + 8a^2B} + 4aB^2}.$$

15

Exemplo ut amur pentagoni cuius formula: $y^2 + 7\mu ay + 7\mu^2$. Ergo $\mu \sqcap \frac{b-a}{7}$. et

$$\mu^2 \equiv \frac{b^2 - 2ba + a^2}{49}. \text{ Unde } \frac{b^2 - \boxed{2}ba \boxed{+a^2} + \boxed{ab} \boxed{-a^2}}{7} \equiv \frac{b^2}{49}$$

7f. , ^ a erg. Hrsg. zweimal 13 numerorum (1) polygonorum (2) fractionum L 13 posse;
(1) fiet enim b n (2) ponamus (3) sed nos e diverticulo in viam redeamus (4) fiet L

16–651,3 formula: Die Formel für die Fünfeckszahlen ist fehlerhaft und beeinträchtigt zusammen mit Flüchtigkeitsfehlern in Z. 16 (in der Gleichung für μ fehlt der Faktor a im Nenner) und in S. 651 Z. 1

(in der zweiten Gleichung der Kette müßte $+\frac{7}{3}a^2$ stehen) die Überlegung bis S. 651 Z. 3.

$$3 \quad 3(\overline{b}^2 - 7a^2) \text{ sive } b^2 + \frac{4}{3}ab + \frac{4}{9}a^2 \sqcap \frac{4}{9}a^2 + 7a^2 \sqcap \frac{4a^2 + 63a^2}{9} \sqcap \sqrt{\frac{67a^2}{9}} \sqcap b + \frac{2}{3}a \text{ sive}$$

$b \sqcap \frac{a\sqrt{67} - 2a}{3}$. Et notabile est infinitorum numerorum rationalium summae sic aequalem haberi [irrationalem].

$\frac{1}{y^2 - 1} + \frac{1}{y + 1} \sqcap \frac{\overline{1} + y^2 \overline{-1}}{y^2 - 1, \wedge y + 1}$, huius seriei momentum ex $y + 1$ est $\frac{y^2}{y^2 - 1}$ quod haberi potest. Eiusdem momentum ex $y - 1$, est: $\frac{y^2}{y^2 + 2y + 1}$. Haec ergo pendet ex

$\frac{1}{y + 1} \cdot \frac{y^2 + 2y + 1}{y^2 + 2y + 1} \sqcap 1$. et $\frac{y + 1}{y^2 + 2y + 1} \sqcap \frac{1}{y + 1}$. Ergo $\frac{y}{y^2 + 2y + 1}$ pendet etiam ex $\frac{1}{y + 1}$.

$\frac{da}{y^2 - \beta^2} + \frac{c}{y + \beta} \sqcap \frac{da + cy - c\beta}{y^2 - \beta^2}$, seu $\frac{+da}{y^2 - \beta^2}$ vel $\frac{+ \frac{c}{y^2 - \beta^2}}{y^2 - \beta^2}$. Pone $-\beta + \frac{da}{c} \sqcap \beta$ fiet:

$$\frac{da}{c} \sqcap 2\beta.$$

$$\frac{1}{y + \beta} - \frac{1}{y - \beta} \sqcap \frac{y - \beta - y - \beta}{y^2 - \beta^2} \sqcap \frac{[-2\beta]}{y^2 - \beta^2}$$

Operae pretium foret invenire indicium unde pateat an aequatio impossibilis etiam ante collationem.

$$bf \sqcap 2ga + f\beta, \text{ et } f^2c \sqcap g^2a + f\beta g. \text{ Ergo } g \sqcap \frac{bf - f\beta}{2a}, \text{ et } g^2 \sqcap \frac{b^2f^2 - 2bf^2\beta + f^2\beta^2}{4a^2}.$$

Iam $f^2c \sqcap \frac{b^2f^2 \overline{[-2bf^2\beta]} + f^2\beta^2}{4a^2}$, $\wedge \neq, + \frac{\overline{[f\beta bf]} - f^2\beta^2}{2}$. $c \sqcap \frac{b^2 \overline{[+\beta^2 - 2\beta^2]} - \beta^2}{4}$. Aliter:

3 rationalem L ändert Hrsg. 4 huius (1) figurae (2) seriei L 11 $2\beta^2 L$ ändert Hrsg.

4–7 $\frac{1}{y^2 - 1} + \frac{1}{y + 1}$: Leibniz vergißt auf der rechten Seite der Gleichung im Zähler den Term $+y$; die Überlegung bzgl. der Momente wird dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt.

$$f \sqcap \frac{2ga}{b-\beta} \text{ et } f^2 \sqcap \frac{4g^2a^2}{b^2 - 2b\beta + \beta^2}. c \sqcap \frac{\cancel{g}a - \frac{2\cancel{g}a \wedge \beta \cancel{g}}{b-\beta}}{\frac{4\cancel{g}a^2}{b^2 - 2b\beta + \beta^2}} \sqcap \frac{b\cancel{g}[-\beta a + 2\beta a] + \beta \cancel{g}, \wedge b - \beta}{4a\cancel{g}}.$$

$$\text{Ergo } c \sqcap \frac{b^2 - \beta^2}{4a}.$$

Redeamus ad nostram collationem:

	\cancel{g}	\cancel{g}	\cancel{g}	\cancel{g}	\cancel{g}	\cancel{g}	\cancel{g}
5	$\pm n\beta y^2$	$\pm 2ap\beta y$	$\pm ap\beta^2$	y^4	$+2ry^3$	$+2sa$	y^2
	$\pm n\beta^2 ..$	$\pm rpa\beta$		$+2\beta ..$	$+3\beta r ..$	$+3rsa ..$	$+r\beta sa$
	$\pm \frac{lr\beta}{a} ..$	$\pm 2ls\beta ..$	$\pm ls\beta^2$		$+ r^2 ..$	$+ \beta^2 r ..$	$+ s^2 a^2$
	$\pm \frac{lr\beta^2}{a} ..$	$\pm nsa\beta$		$+ \beta^2 ..$	$+ r^2 \beta ..$		
10	$+ma y^2$	$+ema ..$	$+a^2 \varepsilon m$	y^4	$+ b y^3$	$+ \frac{b^2}{4} y^2$	$+ \frac{b^2}{4} e y$
	$+ha ..$	$+bha ..$	$+ \frac{b^2 ah}{4}$		$+ e ..$	$- \frac{\beta^2}{4} ..$	$- \frac{\beta^2}{4} e ..$
			$- \frac{a\beta^2 h}{4}$			$+ e\beta ..$	$+ a\varepsilon b ..$
						$+ a\varepsilon ..$	

$$b \sqcap 2r + 2\beta - e \text{ per coll. 5. } m \sqcap \frac{\pm n\beta a \pm lr\beta - ha^2}{a^2} \text{ ex coll. 1.}$$

$$\underbrace{2r + 2\beta - e}_{\cancel{2a^2\beta}}$$

$$15 \quad p \sqcap \frac{\pm en\beta a \pm elr\beta - eha^2 + bha^2 \pm n\beta^2 a \pm 2ls\beta a \pm lr\beta^2}{\cancel{2a^2\beta}} \text{ ex coll. 2.}$$

m et h non possunt poni $\sqcap 0$. singulatim, aut simul.

Pone $s \sqcap 0$. fiet ex 8. $b \sqcap \frac{\beta}{2}$ et $e \sqcap \frac{4r + 3\beta}{2}$, nisi malimus ex 8, $\varepsilon \sqcap 0$: Habebitur e pure, sine alia incognita ex coll. 8. Nimirum fiet: $e \sqcap \frac{a - 4\beta}{2}$. ut praecedentis plagulae

17–653,1 $b \sqcap \frac{\beta}{2}$ et $e \sqcap \frac{4r + 3\beta}{2}$: Aus dem Koeffizientenvergleich ergibt sich $b = \beta$ und $e = 2r + \beta$.

Leibniz übernimmt anschließend jedoch den ebenfalls fehlerhaften Wert für e aus N. 44₁ S. 647 Z. 17.

fine ostendi. Ponendo igitur $s \sqcap 0$. et $\varepsilon \sqcap 0$. poterit iam r inveniri nulla alia incognita implicata, nisi e , quae pro cognita haberi potest.

$$\frac{a - 4\beta}{2} \quad \frac{a - 4\beta}{2}$$

Nimirum ex coll. 7: $4\beta^2r + 4r^2\beta \sqcap b^2e - \beta^2e$.

$$\overbrace{4r^2 + 8r\beta - 4re, +4\beta^2 - 4\beta e, +e^2}^{\begin{array}{c} \text{---} \\ | \end{array}} \quad \frac{a - 4\beta}{2} \quad \frac{\overbrace{a^2 - 8a\beta + 16\beta^2}^4}{4}$$

5

Ex qua aequatione reducta, fiet:

$$\begin{aligned} & \left[\frac{16\beta^2r}{II} \right] \left[+16r^2\beta \right] \sqcap 8r^2a - 48 \left[\frac{32}{I} \right] r^2\beta, +48 \left[\frac{32}{I} \right] r\beta a - 144 \left[\frac{80}{II} \right] \left[\frac{64}{II} \right] r\beta^2 - 4ra^2 \left[+4ra4\beta \right] \\ & \quad \left[+4r4\beta a \right] \left[-4r4\beta4\beta \right] + 62 \left[\frac{8}{I} \right] \beta^2a - 120 \left[\frac{32}{II} \right] \beta^3 - 10 \left[\frac{8}{II} \right] \beta a^2 \left[+32\beta a\beta \right] \\ & \quad \left[-64\beta^3 \right] + \frac{a^3}{2} \left[-a^224\beta - 48a\beta a \right] \left[+48a\beta4\beta \right] \left[+816\beta^2a \right] \left[-816\beta^24\beta \right] \quad 10 \\ & \quad \left[-2\beta^2a \right] \left[+8\beta^3 \right] \text{ seu colligendo:} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \left[+8a \right] r^2 \left\{ \begin{array}{l} + 144\beta^2 r \\ - \frac{4a^2}{+8a - 48\beta} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} + 62\beta^2a \sqcap 0. \text{ et ordinando ad extractionem:} \\ - 120\beta^3 \\ - 10\beta a^2 \\ + \frac{a^3}{2} \\ + 8a - 48\beta \end{array} \right\} \quad 15 \end{aligned}$$

652,18 ex coll. 8 erg. L

$$r^2 \left\{ \begin{array}{l} + 144\beta^2 r \\ - 4a^2 \\ \hline 8a - 48\beta \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} + 20736\beta^4 \\ - 1152\beta^2 a^2 \\ + \frac{16a^4}{64a^2 - 768a\beta + 2304\beta^2}, \wedge 4 \end{array} \right\} \square$$

5

$$\left\{ \begin{array}{l} + 20736\beta^4 \\ - 1152\beta^2 a^2 \\ + \frac{16a^4}{64a^2 - 768a\beta + 2304\beta^2}, \wedge 4 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} - 62\beta^2 a \\ + 120\beta^3 \\ + 10\beta a^2 \\ - \frac{a^3}{2} \\ \hline 48\beta - 8a \end{array} \right\}$$

Ergo $\pm r \approx \frac{2300}{184} \square \sqrt{\frac{4290000}{184}, 2, \square} + \frac{6108}{184} - \frac{1}{2}$ ponendo $a \approx 1$. et $\beta \approx 4$. Unde patet

hactenus nullam occurrisse impossibilitatem.

10 Quemadmodum ergo $e \approx -\frac{3}{2}$, ita $r \approx \pm \sqrt{31 + \frac{3}{4} + 33\frac{1}{5} - \frac{1}{2}} - 12\frac{1}{2}$ seu $r \approx \pm 8 - 12\frac{1}{2} \approx -4\frac{1}{2}$ vel $-20\frac{1}{2}$.

1–7 Nebenrechnungen und Zusätze s. S. 660 Z. 1 – S. 662 Z. 3.

10 f. Nebenrechnungen:

1	23	
20	54	
46	3786	
2300	$\frac{92}{[184]}$	$\left \begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \right. \quad \left \begin{array}{c} 9 \\ 46 \end{array} \right. \quad \left \begin{array}{c} 18 \\ 92 \end{array} \right. \quad \left \begin{array}{c} 9 \\ 46 \end{array} \right.$
1844	1844	
18	18	

10 f. $e \approx -\frac{3}{2}$: Aus $\beta = 4$ folgt gemäß S. 652 Z. 18 $e = -\frac{15}{2}$. Für die Berechnung von r verwendet Leibniz Näherungswerte.

Brevius enuntiando p , erit $p \sqcap \frac{ema + bha \pm n\beta^2 \mp 2ls\beta \mp lr\frac{\beta^2}{a}}{\mp 2a\beta}$ per coll. 2.

$s \sqcap \frac{a^2\varepsilon m + \frac{b^2ah}{4} - \frac{a\beta^2h}{4}, \pm p + \frac{2ls\beta}{\mp 2a\beta}, \wedge a\beta^2 + ra\beta}{\mp l\beta^2 \pm na\beta}$ coll. 3.

Sed iam video quia quatuor aequationes collatitias 5.6.7.8. non nisi totidem incognitae r.s.e.b. ingrediuntur, ex illis solis aliquam enasci posse impossibilitatem frustaque caeteras misceri, itaque resumamus. 5

Ex aequatione 5, erit ut ante $b \sqcap 2r + 2\beta - e$.

Ex aequatione 6, erit $2as \sqcap \frac{\left(\frac{b^2}{4}\right) \left(4r^2\right) \left(+8r\beta\right) - 4re, \left(+4\beta^2\right) \left(-4\beta e\right) + e^2}{4} - \frac{\beta^2}{4} \left(+e\beta\right) + a\varepsilon, -\left(\frac{3}{2}\right) \beta r \left(-r^2\right) \left(-\beta^2\right)$ sive $s \sqcap \frac{-4re + e^2 - \beta^2 + 4a\varepsilon - 4\beta r}{8a}$.

Ex aequatione 7, $\frac{\left(-4re\right) \left(+e^2\right) - \beta^2 + \left(4a\varepsilon\right) \left(-4\beta r\right)}{4} \beta +$

$\frac{\left(-12r^2e\right) + 11\left(\frac{3}{2}\right)re^2 - 3r\beta^2 - 4\left(\frac{+12}{2}\right)ra\varepsilon - 4\left(\frac{12}{2}\right)\beta r^2}{8} \left(+\beta^2r\right) \left(+r^2\beta\right) \sqcap$ 10

$\frac{10\left(\frac{4}{2}\right)r^2e + 12\left(\frac{8}{2}\right)r\beta e \left(-4re^2\right) + 3\left(\frac{4}{2}\right)\beta^2e - 5\left(\frac{4}{2}\right)\beta e^2 + e^3}{4} + a\varepsilon b \left(-\frac{\beta^2e}{4}\right)$.

$\overline{\left[2r\right] + \left[2\right]\beta - e}$

654,14–19 (1) | 2 3 0 0 f (a) 13 (b) 12 78 | 184 | 39 | 4 | 1 | 8 | 78 (!) streicht Hrsg. | (2) 2 3 0 0 f 12 | 182 ändert
 $\begin{matrix} 1 \\ 2 \\ \cancel{3} \\ 4 \\ 1 \\ 8 \\ 4 \\ 1 \\ 8 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 96 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 4 \\ \cancel{6} \\ 1 \\ 8 \\ 4 \\ 1 \\ 8 \end{matrix}$

Hrsg. | $\left|\frac{1}{2}\right. L \quad 1 \quad (1) m \sqcap \mp ap\beta^2 \mp rpa\beta \mp ls\beta^2 \mp nsa\beta - 1 \quad (2) \text{Brevius } L \quad 4 \text{ r.s.e.b. erg. } L \quad 4 \text{ solis}$

(1) apparer (2) aliquam enasci posse | aliquam gestr. | impossibilitatem (a) quo (b) frustaque L

Et multiplicatis omnibus per 8. fiet:

$$\begin{aligned}
 -2\beta^3 + 11re^2 - 3r\beta^2 - 4r\textcircled{a}\varepsilon - 4\beta r^2 &\sqcap 20r^2e + 24r\beta e + 6\beta^2e \\
 &\quad - 10\beta e^2 + 2e^3 + 8\textcircled{a}\varepsilon\beta - 8\textcircled{a}\varepsilon e \\
 4e^2 - 4ae + a^2 \\
 + 32\beta.. - 16\beta a \\
 \hline
 32\textcircled{a}
 \end{aligned}$$

5

$$-2\beta^3 + \frac{21}{2} \underbrace{(11)}_{\text{III}} re^2$$

$$-3r\beta^2 - 4\textcircled{a}r\varepsilon - 4\beta r^2 \sqcap 20 \underbrace{\textcircled{24}}_{\text{II}} r\beta e + 14 \underbrace{\textcircled{6}}_{\text{I}} \beta^2 e$$

$$-17 \underbrace{- 9 \underbrace{\textcircled{10}}_{\text{II}}}_{\text{IV}} \beta e^2 + \underbrace{\textcircled{2}}_{\text{I}} e^3$$

$$+ 8\textcircled{a}\beta\varepsilon$$

$$- 8\textcircled{a}e\varepsilon$$

$$\underbrace{\frac{4e^2}{\text{III}} - 4ae + a^2}_{\text{III}}$$

$$\underbrace{\frac{4e^2}{\text{II}} \underbrace{- 4ae}_{\text{III}} + a^2}_{\text{II}}$$

$$\underbrace{\frac{4e^2}{\text{I}} - 4ae + a^2}_{\text{I}}$$

$$\underbrace{+ 32\beta.. - 16\beta a}_{\text{II}}$$

$$\underbrace{+ 32\beta.. - 16a\beta}_{\text{I}}$$

$$\underbrace{+ 32\beta.. - 12 \underbrace{16}_{\text{IV}} a\beta}_{\text{II}}$$

$$\hline 32\textcircled{a}$$

10

Ordinando et multiplicando omnia per 32. fiet:

$$\begin{aligned}
 32e^3 - \frac{32, 21}{2} re^2 + 32, 20r^2e - 32, 17\beta e^2 + 32, 4\beta r^2 &\sqcap 0 \\
 + 8, 4a.. &
 \end{aligned}$$

15

$$\begin{aligned}
 - 16a er + 32, 13\beta^2 r + 32, 14\beta^2 e + 32, 2\beta^3 \\
 + 32, 28\beta.. + 4a^2.. - 8a^2.. + 8\beta a^2 \\
 - 4, 16\beta a.. + 8, 12a\beta..
 \end{aligned}$$

2–11 $-2\beta^3$: Leibniz verwendet für ε den fehlerhaften Wert aus N. 44₁ S. 646 Z. 2.

Restat aequatio 8:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\left[-\beta^2 4re \right]_{\text{II}} + \left[\beta^2 e^2 \right]_{\text{II}} + \left[-\beta^2 \beta^2 \right]_{\text{II}} - 3 \left[4 \right] \beta^2 a\varepsilon - 4 \beta^2 \beta r}{\cancel{\left[.. r\beta .. \right]_{\text{X}} + \left[.. r\beta .. \right]_{\text{I}} + \left[-r\beta .. \right]_{\text{III}} + \left[4r\beta .. \right]_{\text{V}} + \left[.. r\beta .. \right]_{\text{VII}}}} \\
 & \qquad \qquad \qquad \cancel{\beta^2} \\
 & + 16r^2 e^2 - 8re^3 - 24 \left[+8 \right] re\beta^2 \left[-32rea\varepsilon \right]_{\text{II}} \left[+32re\beta r \right]_{\text{X}} \\
 & + e^4 + 6 \left[-2 \right] e^2 \beta^2 - 8 \left[+8 \right] e^2 a\varepsilon \left[-8e^2 \beta r \right]_{\text{I}} - 7 \left[+ \right] \beta^4 \\
 & \left[-8\beta^2 a\varepsilon \right]_{\text{II}} \left[+8\beta^3 r \right]_{\text{III}}, +16a^2 \varepsilon^2 \left[-32a\varepsilon \beta r \right], +48 \left[16 \right] \beta^2 r^2 \\
 & \qquad \qquad \qquad \cancel{\beta^4 16} \\
 & \frac{4r^2 a\varepsilon + 8r\beta a\varepsilon - 2 \left[4 \right] rea\varepsilon \left[+4\beta^2 a\varepsilon \right]_{\text{II}} - 4\beta ea\varepsilon \left[e^2 a\varepsilon \right]_{\text{III}}}{\cancel{\beta}} \left[-\beta^2 a\varepsilon \right]_{\text{II}}
 \end{aligned}$$

5


Unde post destructiones ordinando et explicando ε^2 :

2-7 Nebenrechnung zum Reduktionsschritt II:

$$\frac{+32 - 8 - 48}{16} \sqcap -\frac{24}{16} \sqcap -\frac{3}{2}$$

1 aequatio (1) 8 in (a) 64 (b) 3 (!) ubi (2) 8: L

$$\begin{aligned}
 & + e^4 & -\frac{31}{4} \left[\begin{smallmatrix} -8 \\ \text{III} \end{smallmatrix} \right] r & e^3 & +15 \frac{1}{2} \left[\begin{smallmatrix} 16 \\ \text{II} \end{smallmatrix} \right] r^2 & e^2 & -32 \left[\begin{smallmatrix} -24 \\ \text{X} \end{smallmatrix} \right] \beta^2 r & e & -32 \beta^3 r \\
 & \boxed{\frac{1}{4}} .. & + \left[\begin{smallmatrix} \frac{1}{2} \\ \text{II} \end{smallmatrix} \right] a .. & + \frac{77}{8} \left[\begin{smallmatrix} +6 \\ \text{III} \end{smallmatrix} \right] \beta^2 .. & - & \frac{1}{4} a^3 .. & -7 \beta^4 \\
 & -\frac{7}{2} \left[\begin{smallmatrix} - \boxed{+4} \\ \text{IV} \end{smallmatrix} \right] \beta .. & + \frac{18}{4} \left[\begin{smallmatrix} +4 \\ \text{I} \end{smallmatrix} \right] a^2 .. & +3 + \frac{1}{8} \left[\begin{smallmatrix} +3 \\ \text{II} \end{smallmatrix} \right] \beta a^2 .. & + \frac{1}{64} a^4 \\
 & & -67 \left[\begin{smallmatrix} -64 \\ \text{II} \end{smallmatrix} \right] \beta a .. & -18 + \frac{3}{8} \left[\begin{smallmatrix} -16 \\ \text{IV} \end{smallmatrix} \right] \beta^2 a .. & -\frac{1}{2} \beta a^3 \\
 & & +256 \beta^2 .. & & +48 \beta^2 r^2 \\
 & & \boxed{+ \frac{3}{4} a^2} .. & & +4 + \frac{3}{32} \left[\begin{smallmatrix} 4 \\ \text{IV} \end{smallmatrix} \right] \beta^2 a^2 \\
 & & \boxed{-7a\beta} .. & & \\
 & & +16 \beta^2 .. & &
 \end{aligned}$$



Aequatio haec facta ex 8 data iungatur factae ex 7^{ma} data in quarum utraque $r.$ et $e.$ et alterutra incognita tolletur.

657,8–658,2 Nebenrechnungen:

$$\begin{aligned}
 657,8 \quad & 16e^4 - 32a e^3 + 8a^2 e^2 - 8a^3 e + a^4 \\
 & + 256\beta \dots - 128a\beta \dots + 128\beta a^2 \dots - 32\beta a^3 \\
 & + 16a^2 \dots + 64\beta a^2 \dots + 256\beta^2 a^2 \\
 & - 256\beta a \dots - 1024\beta^2 a \dots \\
 & + 1024\beta^2 \dots \\
 16a^2 \varepsilon^2 \sqcap \quad & \frac{}{(1024\cancel{\alpha}^2 \cup 16\cancel{\alpha}^2)64} \\
 \\
 256 & \cancel{4}\cancel{6} \\
 \underline{4} & \cancel{1}\cancel{0}\cancel{2}\cancel{4} \cancel{f} 64 \\
 1024 & \cancel{1}\cancel{0}\cancel{0}\cancel{8} \\
 & \cancel{1}
 \end{aligned}$$

658,2

$$\begin{aligned}
 \text{etc.} - 4 + \frac{3}{8} \sqcap 6 \\
 \text{etc.} \sqcap 10 - \frac{3}{8} \\
 \frac{80 - 3}{80} \sqcap \frac{77}{8}
 \end{aligned}$$

1 facta (1) ex (a) 8 (b) 7^{ma} | data streicht Hrsg. | (2) ex L

657,8–658,2 explicando ε^2 : S. Erl. zu S. 656 Z. 2–11. Leibniz führt die Umformung der Gleichung 8 nicht vollständig und fehlerfrei durch und bricht die Reduktion ab. Im folgenden Teilstück N. 443 überzeugt er sich von der Durchführbarkeit der Rechnung.

[Nebenrechnungen und Zusätze zu S. 654 Z. 1–8]

	144	$\times \curvearrowleft$	144	48	48	2304	20736	2 2
	<u>144</u>		<u>8</u>	<u>16</u>	<u>48</u>	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>10931</u>
	576		1152	288	384	13824	124416	<u>331776</u> f144
5	576			<u>48</u>	<u>192</u>	<u>2304</u>	<u>20736</u>	<u>230444</u>
	<u>144</u>			768	2304	36864	331776	<u>2300</u>
	20736					<u>+ 64</u>		23
						<u>36928</u>		
						<u>− 768</u>		
10							<u>4</u>	
							2	[bricht ab]
	20736			64		62	48	184
	<u>256</u>			<u>120</u>		<u>16</u>	<u>4</u>	<u>184</u>
	124416			1280		372	192	736
15	103680			<u>64</u>		<u>62</u>	<u>− 8</u>	1472
	<u>41472</u>			7680		992	184	<u>184</u>
	<u>5308416</u>					<u>62</u>		33856
	−1152					+1612		
	<u>16</u>					−7680		33856
20	6912					<u>− 40</u>		<u>4</u>
	<u>1152</u>					−6108		135424
	−18432							
	<u>16</u>							
	<u>− 18416</u>							
25	<u>4290000</u>		+	<u>6108</u>	$-\frac{1}{2}$			
	<u>33856</u> ^ 4							

25 $\frac{4290000}{33856^4}$: Im Zähler müßte 5290000 stehen; der Fehler und weitere Flüchtigkeiten beeinträchtigen die folgenden Rechnungen.

$\frac{2}{52}$	1			
$\frac{3749}{26188}$	$\frac{19285}{22726}$	356		
$\frac{4290000}{1844444}$ f 23309	$\frac{4290000}{135424}$ f 31	$\frac{91856}{135424}$	$\frac{135424}{44678}$ f 1	5
$\frac{18888}{111}$	$\frac{1354244}{13542}$	91856		
3	1			
$\frac{448}{15730}$	$\frac{2}{157}$	2		10
$\frac{91856}{4356}$ f 21	$\frac{380}{4356}$	$\frac{4356}{380}$ f 11	$\frac{176}{380}$	$\frac{380}{176}$ f 2
$\frac{43566}{435}$	$\frac{3800}{38}$	$\frac{176}{22}$	$\frac{176}{8}$	22
21	$1 + \frac{11}{231} \frac{242}{231}$	231	$\frac{231}{473}$	15
$\frac{11}{21}$	$\frac{242}{473}$			
$\frac{21}{231}$				
31	$\frac{1}{1 + \boxed{\frac{4356}{91856}} + \frac{1}{21 + \frac{380}{4356}}}$	31	$\frac{1}{1 + \frac{1}{21 + \frac{1}{11 + \frac{1}{2 + \frac{1}{8}}}}}$	$\frac{4290000}{135424}$
				20

2 $\frac{2}{52}$: Leibniz liest statt der 2 eine 1. 4 $\frac{44678}{135424}$: Leibniz vergißt, die 8 als letzte Ziffer des Restes in die folgende Division zu übernehmen. 11 $\frac{1}{142}$: Richtig wäre $\frac{1}{148}$. 20 rechter Ausdruck: Leibniz übernimmt die fehlerhafte Kettenbruchentwicklung mit einem Abschreibefehler in *Wallisi's series interpolanda pro circulo, LSB VII, 1 N. 851 S. 570.*

Unde intelligi potest fractionem istam diminui posse per 8. item per $2 + \frac{1}{8}$. item per $11 + \frac{1}{2 + \frac{1}{8}}$ etc. Eadem et in terminis analyticis servint ad fractas formulam datam dividentes inveniendas quorum usus esse potest in construendo.

44₃. DE SUMMA SERIEI FRACTIONUM DATAE PARS TERTIA

5 [3. März 1675 oder unmittelbar danach]

Überlieferung: L Konzept: LH 35 VIII 4 Bl. 8. 1 Bl. 4°. Goldschnitt. 1 S. auf Bl. 8 r°. Bl. 8 v° leer. Überschrift ergänzt.
Cc 2, Nr. 915 B

Ad schediasma 3 martii 1675.

10 Pertinet ad schediasma de seriei fractionum summa cum formula differentiarum comparatur.

Ope harum 5 aequationum, etiam 5 incognitas *r. s. e. b. ε.* comprehendentium:

$$(1) e + b \sqcap 2r + 2\beta$$

$$(2) a\epsilon + e\beta - \frac{\beta^2}{4} + \frac{b^2}{4} \sqcap \beta^2 + r^2 + 3\beta r + 2sa$$

$$(3) ab\epsilon - \beta^2 \frac{e}{4} + \frac{b^2 e}{4} \sqcap r^2 \beta + \beta^2 r + 3rsa + 2\beta sa$$

$$(4) \frac{-\beta^2 a\epsilon + b^2 a\epsilon}{4} \sqcap s^2 a^2 + r\beta sa + \beta^2 sa$$

15 10 fractionum *erg. L*

1 diminui posse: Leibniz hält die Quotienten des Euklidischen Algorithmus irrtümlich für gemeinsame Teiler von Zähler und Nenner des Bruches. 12–663,1 Ope harum 5 aequationum: Die Gleichungen (1) – (4) übernimmt Leibniz aus dem Koeffizientenvergleich in N. 44₂ S. 652 Z. 4–12, die Gleichung (5) aus N. 44₁ S. 646 Z. 2.

$$(5) \varepsilon \sqcap \frac{4e^2 - 4ae + 32\beta e + a^2 - 16\beta a}{32a}$$

inveniendi sunt valores quatuor incognitarum, *r.s.e.b.* puri scilicet et absoluti, id est ut in earum valore nulla ex his quinque incognitis supra dictis *r.s.e.b.ε.* comprehendatur.

Quaeratur autem *b* per aequationem 1. Valor eius per dictam aequationem 1. repertrus, substituatur in eius locum in aequatione 2^{da}, atque ita per dictam aequationem 2^{dam} ita reformatam, inveniatur valor ipsius *s*. 5

Valores reperti ipsius *s*. pariter et ipsius *b*. in ipsarum harum literarum locum substituantur in aequatione 3^{tia} et ita ex aequatione 3^{tia} alia fiet aequatio, in qua duae tantum restabunt incognitae, *ε*, et *r*. Pro *ε* substituatur eius valor sumtus ex aequatione quinta, et ita ex dicta aequatione 3^{tia} alia fiet aequatio, in qua duae tantum supererunt incognitae, *r*. et *e*. 10

Eodem modo in aequatione quarta pro *b*, *s*, *ε* substituendo eorum valores inventos ex aequationibus 1. 2. 5. habebitur rursus aequatio duarum tantum incognitarum, *r* et *e*. Quas duas aequationes duarum incognitarum invicem iungendo, inde fiet unica unius tantum incognitae, et habebitur vel *r*. absolute, vel *e*. absolute. Quos valores absolutos in ipsarum *b.s.* valoribus substituendo etiam ipsarum *b.s.* ac proinde omnium quatuor, *b.s.e.r.* valores sine ulla harum quinque: *b.s.e.r.ε.* mentione habebuntur, quod quaerebamus. 15

2 valores (1) 5 li (2) quatuor *L* 9 3^{tia} (1) et ex aequatione 4^{ta} alia (a) fiat (b)
fiet aequatio (2) et *L* 10 valor (1) ex aequatione 4^{ta}, ita (2) sumtus *L* 17 ipsarum (1) *b.s.ε*
valoribus substituendo etiam *b.s.ε* ac proinde omnium quinque, (2) *b.s L*

10 duae tantum: Leibniz vergißt hier die dritte Unbekannte *e*, argumentiert aber in der Folge korrekt.

45. DE SERIERUM SUMMA PER DIFFERENTIARUM MOMENTA

[Januar – Ende April 1675]

Überlieferung: L Konzept: LH 35 XII 2 Bl. 135. 1 Bl. 2°. Längs- und Querfaltung. 1 Spalte auf Bl. 135 v° rechts, linke Spalte leer bis auf 7 Zeilen Textergänzung. Auf Bl. 135 r° LSB VII, 1 N. 77.
 5 Cc 2, Nr. 929

Datierungsgründe: Das vorliegende Stück ist vor der Querfaltung des Blattes geschrieben, das ab Ende April 1675 entstandene *Problema Davenantii*, LSB VII, 1 N. 77, danach. Das Wasserzeichen des Papiers ist von Januar bis August 1675 belegt.

10 $\frac{1}{y^2 - 1} \sqcap \frac{1}{y+1, y-1}$. Si $y \sqcap 2, 6, 10$. [14] etc.


$$\frac{1}{4-1} \quad \frac{1}{36-1} \quad \frac{1}{100-1} \quad \frac{1}{196-1} \text{ etc.}$$

Momentum huius seriei ex A est:

$$\frac{1}{y-1} \text{ seu } \frac{1}{2-1} \quad \frac{1}{6-1} \quad \frac{1}{10-1} \quad \frac{1}{[14]-1} \text{ etc.}$$

Momentum eiusdem seriei ex B est:

15 $\frac{1}{y+1} \sqcap \frac{1}{2+1} \quad \frac{1}{6+1} \quad \frac{1}{10+1} \quad \frac{1}{[14]+1} \text{ etc.}$



[Fig. 1]

11 Nebenrechnung:

14

14

56

14

196

10–15 16 L ändert Hrsg. dreimal

$$\frac{y}{y-1} - \frac{1}{y-1} \sqcap 1. \text{ Ergo } \frac{1}{y-1} \sqcap \frac{1}{y} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{y^3} + \frac{1}{y^4} + \frac{1}{y^5} \text{ etc.}$$

et $\frac{1}{y+1} \sqcap \frac{1}{y} - \frac{1}{y^2} + \frac{1}{y^3} - \frac{1}{y^4} + \frac{1}{y^5} \text{ etc.}$

Ergo $\frac{1}{y-1} - \frac{1}{y+1} \sqcap \bullet + \frac{2}{y^2} \bullet + \frac{2}{y^4} \bullet \text{ etc. } \sqcap \frac{2}{y^2-1}$

$$\pm \left\{ \begin{array}{l} \frac{c}{a} y^2 + \frac{c}{a}\beta y \\ + d \cdot \\ + \frac{bc}{a} \cdot \end{array} \right\} + \frac{c}{a} b\beta$$

5
+ bd

$$\pm \left\{ \begin{array}{l} \frac{c}{a} y^2 + \frac{c}{a}\beta \cdot \\ + \frac{cb}{a} \cdot \\ + d \cdot \end{array} \right\} + d\beta$$

10
+ db

$$\pm \frac{y+b}{\frac{c}{a}y+d} \pm \frac{y+\beta+b}{\frac{c}{a}y+\frac{c}{a}\beta+d} \quad \text{---}$$

$$\text{Unde } \frac{\frac{c}{a}b\beta [-] d\beta}{\frac{c^2}{a^2}y^2 + \frac{2cd}{a}y + d^2}. \text{ Quaeratur ergo: } \frac{1}{y^2 + \frac{2da}{c}y + \frac{d^2a^2}}. \text{ Ergo}$$

$$+ \frac{c^2}{a^2}\beta \cdot + \frac{cd}{a}\beta \quad + \beta \cdot + \frac{ad}{c}\beta$$

conferendo cum $\frac{1}{y^2-1}$ fiet: $2da + \beta c \sqcap 0$ sive $d \sqcap \frac{-\beta c}{2a}$ et $d^2 \sqcap \frac{\beta^2 c^2}{4a^2}$. Ergo $\frac{\beta^2}{4} - \frac{\beta^2}{2} \sqcap 1$

sive $\frac{2\beta^2 - \beta^2}{4} \sqcap 1$ sive $\frac{\beta^2}{4} \sqcap 1$. Ergo $\beta \sqcap 2$. Quando ergo differentia ipsarum y est 2 summa omnium $\frac{1}{y^2-1}$ habetur hoc modo.

13 + L ändert Hrsg.

Si collationis causa loco $\frac{1}{y^2 - 1}$ fiet: $\frac{1}{y^2 + 2yf + f^2}$ conferendo fiet: $f \sqcap \frac{da}{c} + \frac{\beta}{2}$.
 $- 1$

Ergo f^2 fiet: $\frac{d^2a^2}{c^2} + \frac{da\beta}{c} + \frac{\beta^2}{4}$. Unde fiet rursus $\beta^2 \sqcap 4$ et patet cur explicatio nil mutet quia intervallum determinatum mutari explicando non potest.

5 $\frac{y+b}{c} \sqcap \frac{x}{a}$. Ergo $ya + ba \sqcap \frac{c}{a}yx + da$. Unde: $y \sqcap \frac{da - ca}{a - \frac{c}{a}x}$.

$$\dagger \frac{a\sqrt{by+ca} + dy + ea}{hy + la} \dagger \frac{a\sqrt{by+b\beta} + dy+d\beta}{hy+h\beta} \\ + ca + ea + la$$

$$ahy\sqrt{by+ca} \boxed{+dhy^2} \\ + eah y + h\beta a \sqrt{by+ca} + e a h\beta \\ + h\beta d \cdot + la \cdot \cdot \quad \boxed{+ \cdot \cdot la} \\ + la \cdot \cdot$$

10

$$hay \sqrt{by+b\beta} \boxed{+dhy^2} \\ + ca \quad \boxed{+d\beta h y} + la^2 \sqrt{by+b\beta} + l a d \beta \\ + ea \cdot \cdot \quad \sqrt{+ca} \quad \boxed{+laea} \\ + lad \cdot \cdot$$

15

$$\dagger \left\{ \begin{array}{l} ah y \sqrt{by+ca} \\ hba \\ la^2 \end{array} \right. \dagger \left\{ \begin{array}{l} hay \\ + la^2 \end{array} \right. \sqrt{by+b\beta} \dagger eah\beta \\ + ca + lad\beta$$

Unde $\frac{va^2}{va^2} \sqcap z$.

1-4 Si ... potest erg. L 6 (1) $\frac{x}{a} \sqcap (2) \dagger \frac{a\sqrt{by+ca} + dy + ea}{a\sqrt{fy+ga} + hy + la} \dagger \frac{a\sqrt{by+b\beta} + dy + d\beta}{a\sqrt{fy+f\beta} + hy + h\beta} + la$

$$a \sqrt{by+ca, fy+f\beta + ag} + da \sqrt{fy+f\beta + ag} + ea \sqrt{fy+f\beta + ag} (3) \dagger \frac{a\sqrt{by+ca} + dy + ea}{hy + la} L$$

5 $+da$: Richtig wäre $+dx$. Konsequent gerechnet müßte in der folgenden Gleichung für y im Zähler $da - ba$ stehen.

Unde quadrandi causa ordinando:

$$\begin{aligned}
 & \dagger \left\{ \begin{array}{l} la^2 \quad \sqrt{by+ca} + \omega a^3 - z^2 av \\ hba \\ ah y \end{array} \right. \dagger \left\{ \begin{array}{l} hay \quad \sqrt{by+b\beta} \quad \text{sive} \\ + la^2 \quad \sqrt{by+ca} \\ \end{array} \right. \\
 & l^2 a^4 \quad \wedge by + ca \quad \dagger 2la^2 \quad \wedge \quad \omega a^3 \quad \sqrt{by+ca} + \omega^2 a^6 [-] q2\omega a^3 z^2 av + z^4 a^2 v^2 \quad 5 \\
 & + 2la^2 hba \quad \quad \quad 2hba \quad - z^2 av \\
 & + 2la^2 ah y \quad \quad \quad 2ah y \\
 & + h^2 b^2 a^2 \\
 & + 2hba ah y \\
 & + a^2 h^2 y^2 \quad \quad \quad 10 \\
 & \square \\
 & h^2 a^2 y^2 \quad \wedge by + b\beta . \\
 & + 2hala^2 y \quad \quad \quad + ca \\
 & + l^2 a^4
 \end{aligned}$$

Calculus fit nimis prolixus.

15

5 + L ändert Hrsg.

46. DETERMINATIONUM PROGRESSIO IN INFINITUM

[Anfang November 1675]


Überlieferung: L Konzept: LH 35 XIV 1 Bl. 305. 1 Bl. 2°. 11/3 S.
Cc 2, Nr. 777

- 5 Datierungsgründe: Die in Teil 1 u. 3 auftretenden Differential- und Integralsymbole hat Leibniz schrittweise ab dem 29. Oktober 1675 (*Analyseos tetragonisticae pars 2da*, Cc 2, Nr. 1092, gedr. *LBG* S. 151–156) eingeführt; die Fehlerhaftigkeit der in Teil 3 verwendeten Produktregel für die Differentiation erkennt er am 11. November 1675 in *Methodi tangentium inversae exempla* (Cc 2, Nr. 1120, gedr. *LBG* S. 161–167).

10

[Teil 1]

$$\begin{aligned} AB \sqcap y. \quad BC \sqcap c - y. \\ AC \sqcap c. \quad BD \sqcap \omega \sqcap \frac{yc - y^2}{c}. \end{aligned}$$



[Fig. 1]

- 11 (1) $AB \sqcap x. \quad CB \sqcap b - y.$ Pon (2) $EB \sqcap y. \quad CB \sqcap b - z. \quad EC \sqcap b.$ (a) $BD \sqcap$ (b) $AB \sqcap e. \quad BD$
(3) $AB \sqcap y.$ (4) $AB \sqcap y \ L$

12–669,4 $BD \sqcap \omega \sqcap \frac{yc - y^2}{c}$: Richtig wäre $\omega = \frac{yc - y^2}{\omega}$. Die Überlegung wird dadurch bis S. 669 Z. 4, in der Flüchtigkeitsfehler hinzutreten, hinfällig.

$EB \sqcap e$. Sit $y \sqcap e+b$ et erit $\omega \sqcap \frac{ce+cb-e^2-2eb-b^2}{c}$ et pro ω ponatur $v+\frac{cb-b^2}{c}$
fiet $v \sqcap +c$ $e-e^2, \cup c$. Sit eius portionis, quam metimur maxima abscissa E , $\sqcap c-2b$ seu
 $-2b$

$b \sqcap \frac{c-E}{2}$ et fiet: $v \sqcap Ee-e^2, \cup 2$ adeoque $\int v \sqcap \frac{E^3}{2}-\frac{E^3}{3}$. Sed hoc in altioribus non
aeque facile.

5

[Teil 2]

1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 etc. accedunt ad \odot .

maior	\odot	minor
$1t$		$\overline{1-2t}$
$\overline{1-2+3t}$		$\overline{1-2+3-4t}$
$\overline{1-2+3-4+5t}$		$\overline{1-2+3-4+5-6t}$

10

$$y - \frac{y^3}{3a^2} + \frac{y^5}{5a^4} - \frac{y^7}{7a^6} + \frac{y^9}{9a^8} - \frac{y^{11}}{11a^{10}} + \frac{y^{13}}{13a^{12}} - \frac{y^{15}}{15a^{14}} \text{ etc. } \sqcap \frac{\odot}{a}.$$

$\frac{y}{1}$ maior quam \odot . Ergo $y \sqcap 1\odot$. $\frac{y}{1} - \frac{y^3}{3a^2} \sqcap \odot$. seu $\frac{y}{1} \sqcap \frac{y^3}{3a^2} + \odot$. seu $\frac{y^3}{3a^2} \sqcap \frac{y}{1} - \odot$.

$$\frac{y}{1} - \frac{y^3}{3a^2} + \frac{y^5}{5a^4} \sqcap \odot. \text{ Pro } \frac{y^3}{3a^2} \text{ ponatur } \frac{\odot^3}{3a^2}, \text{ fiet: } \frac{y}{1} + \frac{y^5}{5a^4} \sqcap \odot + \frac{1\odot^3}{3a^2}.$$

$$\frac{y}{1} - \frac{y^3}{3a^2} \left(\frac{y^5}{5a^4} \right) - \frac{y^7}{7a^6} \sqcap \odot. \text{ Pro } + \frac{y^5}{5a^4} \text{ ponatur quod est minus: } + \frac{\odot^5}{5a^4}, \text{ manebit}$$

$$+ \frac{\odot^5}{5a^4}$$

$$\text{minus, et erit } y + \frac{\odot^5}{5a^4} \sqcap \odot + \frac{y^3}{3a^2} + \frac{y^7}{7a^6}.$$

$$\frac{y}{1} - \frac{y^3}{3a^2} + \frac{y^5}{5a^4} - \frac{y^7}{7a^6} + \frac{y^9}{9a^8} \sqcap \odot. \text{ seu } \frac{y}{1} + \frac{y^5}{5a^4} + \frac{y^9}{9a^8} \sqcap \odot + \frac{1\odot^3}{3a^2} + \frac{\odot^7}{7a^6}.$$

$$- \frac{\odot^3}{3a^2} \quad - \frac{\odot^7}{7a^6}$$

20

Adeoque determinationum progressio in infinitum talis erit:

N

\boxed{I}	y	\boxed{II}
-------------	-----	--------------

$$\begin{array}{c}
 \frac{y}{1} \sqcap \odot \\
 \frac{y}{1} + \frac{y^5}{5a^4} \sqcap \odot + \frac{\odot^3}{3a^2} \\
 \frac{y}{1} + \frac{y^5}{5a^4} + \frac{y^9}{9a^8} \sqcap \odot \frac{1}{1} + \frac{\odot^3}{3a^2} + \frac{\odot^7}{7a^6} \\
 \frac{y}{1} + \frac{y^5}{5a^4} + \frac{y^9}{9a^8} + \frac{y^{13}}{13a^{12}} \sqcap \odot \frac{1}{1} + \frac{\odot^3}{3a^2} + \frac{\odot^7}{7a^6} + \frac{\odot^{11}}{11a^{10}}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \frac{y}{1} \sqcap \odot + \frac{y^3}{3a^2} \\
 \frac{\odot^5}{5a^4} \sqcap \odot \frac{1}{1} + \frac{y^3}{3a^2} + \frac{y^7}{7a^6} \\
 \frac{\odot^9}{9a^8} \sqcap \odot \frac{1}{1} + \frac{y^3}{3a^2} + \frac{y^7}{7a^6} + \frac{y^{11}}{11a^{10}} \\
 \frac{\odot^{13}}{13a^{12}} \sqcap \odot \frac{1}{1} + \frac{y^3}{3a^2} + \frac{y^7}{7a^6} + \frac{y^{11}}{11a^{10}} + \frac{y^{15}}{15a^{14}}
 \end{array}$$

Ex quibus determinationibus cum habeatur pure valor ipsius \odot ex data y . rationis est haberi et y . ex data \odot .

$y \sqcap \odot$. Per y vel \odot multiplicare dividere est.

Si ita continuetur in infinitum, fient tantum ex duabus ultimis aequationes.

$$\text{Ponatur autem ex } \frac{y^5}{5a^4} + \frac{y^9}{9a^8} + \frac{y^{13}}{[13a^{12}]} \text{ etc. fieri } \overline{zy}. \quad 5$$

$$\frac{\odot^5}{5a^4} + \frac{\odot^9}{9a^8} + \frac{\odot^{13}}{[13a^{12}]} \quad \text{fieri } \overline{z\odot}.$$

$$\text{et ex } \frac{\odot^3}{3a^2} + \frac{\odot^7}{7a^6} + \frac{\odot^{11}}{11a^{10}} \text{ etc. faciamus } \overline{v\odot}.$$

$$\frac{y^3}{3a^2} + \frac{y^7}{7a^6} + \frac{y^{11}}{11a^{10}} \quad \text{faciamus } \overline{vy}.$$

Habebimus denique duas ultimas determinationes tales: $y + \overline{zy} \sqcap \odot + \overline{v\odot}$ et $y + \overline{z\odot} \sqcap \frac{\odot}{1} + \overline{vy}$ vel mutatis his determinationibus in aequationes fiet: $y + \overline{zy} \sqcap \odot + \overline{v\odot}$. et 10

$y + \overline{z\odot} \sqcap \odot + \overline{vy}$. $y \sqcap \odot + \overline{v\odot} - \overline{zy} \sqcap \overline{vy} - \overline{z\odot}$ et fiet: $\overline{v\odot} + \overline{z\odot} \sqcap \overline{vy} + \overline{zy}$. Unde sequeretur

\odot et y esse aequales quod absurdum est utique. Ideo error aliquis admissus, is utique in

eo quod mutabamus determinationes in aequationes, quod non videtur permissum sine demonstratione, nec in infinitum progrediendo, hoc loco quia $y \sqcap \odot$; $y + \overline{zy} \sqcap \odot + \overline{v\odot}$.

Ergo explicando \odot et $y + \overline{zy} \sqcap y + \overline{z\odot} - \overline{vy}$. Ergo $\overline{zy} + \overline{vy} \sqcap \overline{z\odot}$ quod patet per se. Nihil ergo ex his duci poterit, nisi aliud quiddam accedat. 15

Ut pergere liceat, opus erit sumi adhuc aliam ipsius \odot determinationem, quemadmodum enim ad explicandum hac usi sumus $y \sqcap \odot$. ita adhibenda erit et haec: $\frac{y^3}{3a^2} \sqcap \odot$.

vel adhuc melius si qua $\frac{y^2}{...a^2}$. Imo potius $\frac{y}{...}$. Certum est tangentes semper magis crescere quam arcus, si ergo appareat octantem certa sui tangentis id est radii parte esse

maiores, utique et caeteri erunt. Est autem octans $\omega \sqcap \frac{\pi}{8}$, radius $\sqcap \frac{1}{6}\pi$. Ergo $\pi \sqcap 6$ rad. 20

5 f. 15a¹⁴ L ändert Hrsg. zweimal 11 Unde (1) reperitur eodem modo componi (2) sequeretur L
13 f. sine demonstratione erg. L 14 quia $y \sqcap \odot$ erg. L 15 explicando \odot erg. L 19 $\frac{y}{...}$. (1)

Iam certum est tangentes continuo magis crescere quam arcus, adeoque si tangens octantis (2) Ponatur autem arcus in (3) Certum L 20 appareat (1) tangentem octantis certa arcus par (2) octantem L

21 $\sqcap \frac{1}{6}\pi$. (1) Ita $\pi \sqcap 8\omega$: (2) Ergo L

Ergo $\omega \sqcap \frac{6 \text{ rad.}}{8}$. Ergo $\omega \sqcap \frac{3}{4} \text{ rad.}$ Ergo arcus octanti minor maior est tribus quartis sui tangentis, seu $\odot \sqcap \frac{3}{4}y.$ posito, ut semper $y.$ non excedere radium. Unde et $\odot \sqcap \frac{y}{2}.$ et $\odot \sqcap y.$ Harum duarum determinationum ope, poterit inveniri $y.$ ex data $\odot.$ et $y \sqcap \frac{4\odot}{3}.$ Ergo in determinationibus I et II ponendo semper potentiam a $\frac{4}{3}\odot$ in locum potentiae ipsius $y.$ maius scilicet in locum maioris, manebit maioritas, et ita stabit:

\boxed{I}	
$y \sqcap \odot$	
$y \sqcap \odot$	$+ \frac{\odot^3}{3a^3} - \frac{4^5 \odot^5}{3^5, 5a^4}$
$y \sqcap \odot$	$+ \frac{\odot^3}{3a^3} - \frac{4^5 \odot^5}{3^5, 5a^4} + \frac{\odot^7}{7a^6} - \frac{4^9 \odot^9}{3^9, 9a^8}$
10 $y \sqcap \dots$	$\dots \frac{\odot^{11}}{11a^{10}} - \frac{4^{13} \odot^{13}}{3^{13}, 13a^{12}}$
etc.	

$$\begin{aligned}
 & y \sqcap \odot \left| + \frac{4^3 \odot^3}{3^3, 3a^2} \right. \\
 & y \sqcap \odot \left| + \dots - \frac{\odot^5}{5a^4} + \frac{4^7 \odot^7}{3^7, 7a^6} \right. \\
 & y \sqcap \dots \left| - \frac{\odot^9}{9a^8} + \frac{4^{11} \odot^{11}}{3^{11}, 11a^{10}} \right. \\
 & y \sqcap \dots \left| - \frac{\odot^{13}}{13a^{12}} + \frac{4^{15} \odot^{15}}{3^{15}, 15a^{14}} \right.
 \end{aligned}$$

3 data ⊙. (1) Quanti hae sint (a) $\langle \text{maxim} \rangle$ (b) momenti (2) et L 12 [II] erg. Hrs.

6–16 **I**: In der Vorlage stehen die Tabellen **I** u. **II** nebeneinander.

Si utrobique iidem prodiissent termini, tunc habita fuissest aequatio ultimarum determinationum inter se, adeoque singulae in aequationes transiissent.

Poterit fieri, ut proprius accedatur ad scopum, etsi non ideo ausim dicere, prorsus attingi, si, ubique ad determinationem sequentem reddendam puram non determinatio pura omnium prima, sed proxime praecedens, substituatur. Video tamen cur ne sic quidem

perfecte attingatur scopus: Quando scilicet aliquid, ut $\odot \sqcap \frac{3}{4}y$. forinsecus assumimus.

Sed iam video si nihil forinsecus assumatur, sed solae ex aequatione nostra determinationes coniungantur rem successuram. Duobus modis rem tentare decreveram uno, ut ope quatuor primarum per crucem, inveniatur pura, quae in tertia pari substituta det rursus puram. Et ita porro, sed iam video id non licere, quia errores primi omnes simul


in ultimum refunduntur. Vera ergo in eo consistit via, utut ex duabus semper pluribusve sibi oppositis aut vicinis valorem purum eliciamus.

5

10

15

[Teil 3]



$$\odot \sqcap \overline{dt} \int \frac{a^3}{a^2 + t^2}. \text{ Ergo } \overline{d\odot} \sqcap \frac{a^2}{a^2 + t^2} \overline{ddt} \text{ identicum seu } \overline{\overline{d\odot}} \sqcap \frac{a^2}{a^2 + t^2}.$$

[Fig. 2] et $d\odot a^2, +t^2 d\odot \sqcap a^3$. et $t^2 \sqcap \frac{a^3 - \overline{d\odot} a^3}{d\odot}$.

$$\int \overline{dt} \odot \sqcap (\odot)(T) - \int \odot dt. \text{ Ergo } \int \frac{\odot^2}{a^3} \sqcap \int \overline{dt} \odot \sqcap (\odot) \text{ult}, - \int \odot dt.$$

16 Unter (T)ult, gestrichen: diff

2 singulae (1) dedissent aeq (2) in L 3 dicere, (1) non poterit (2) prorsus L 4 puram (1) (prim) (2) non omnium prima, sed proxime praecedens, quippe quae haud dubie minus aberrat, substituatur. (2) non L 9 ope (1) duarum (2) quatuor L 14 (1) y \sqcap (2) a (3) $\odot \sqcap L$

14 Ergo $\overline{d\odot} \sqcap \frac{a^2}{a^2 + t^2} \overline{ddt}$: Leibniz differenziert das Produkt zunächst falsch; in der weiteren Überlegung nähert er sich trotz zweier Fehler der richtigen Formel.

Hinc modus ostenditur ex duobus factis inveniendi differentiam, ut diff. $(\odot) \cap (T)$ addatur
 $- \text{diff. } \int \odot dt$ et diff. erit $\overline{dt} \odot$. Ergo diff. $(\odot) \cap (T)$ erit $\overline{dt} \odot - d \int \overline{\odot dt}$.

[Teil 4]

$A \sqcap B$. $A \sqcap C$. Ergo differentia inter A et C , minor quam differentia inter A et B et
5 inter B et C . Ergo error non maior quam $A - C$, quam dicitur $A \sqcap B$.

Videamus an non ex duabus determinationibus oppositis affectis, in tabula **N** parallelis possit haberi pure valor ipsius y , ex dato valore ipsius \odot . Primae duae oppositae parallelaeque determinationes sunt $y \sqcap \odot$ et $y \sqcap \odot + \frac{y^3}{3a^2}$. Pro \odot ponamus ω . Ex priore quia $y \sqcap \omega$ erit $y^3 \sqcap \omega^3$, et fiet $y \sqcap \omega + \frac{\omega^3}{3a^2}$. Imo sic non procedit res. Tentemus aliter
10 $y \sqcap \odot$ et $y \sqcap \odot + \frac{y^3}{3a^2}$. Ergo $y \sqcap \odot + \frac{y\odot^2}{3a^2}$. Hoc succedit sed malum in eo quod \odot in fractiones valorum ipsius y . ingredietur, quod nolle. Videndum tamen fiet: $y \sqcap \frac{\odot}{1 - \frac{\odot^2}{3a^2}}$.

Imo error, non succedit. Invertimus determinationem.

Si a tabulae **N** partis seu seriei **I** terminis auferantur termini proxime praecedentes seriei **II** habebimus pro serie **I**.
15 $+y \sqcap \odot \left| \begin{array}{l} +y + \frac{y^5}{5} \sqcap +\odot + \frac{\odot^3}{3} \\ -0 \quad -0 \end{array} \right|$. Sed iam video omnino his determinationibus tabulae **N** non esse utendum, sed rediri debere ad primas:

4 (1) $\odot \sqcap y$. (2) $A \sqcap B$. $A \sqcap C$. (a) | Ergo streicht Hrsg. | $A + A - C$ (b) Ergo L 5 B et C . (1)
 $AB \sqcap AC$. $A - C \sqcap A - B$ (2) Ergo L 7 ipsius \odot |, vel ob erg. u. gestr. | . Primae L 8f. ponamus
 ω . (1) Sit $y \sqcap$ (2) Si (3) Ex priore (a) $y^3 \sqcap \omega^3$, et $y \sqcap \odot +$ (b) quia L 11f. $y \sqcap \frac{\odot}{1 - \frac{\odot^2}{3a^2}}$. (1)

ex. duabus sequentibus: (2) Imo L 13 Si a (1) terminis tabulae **I** (2) tabulae L 13 auferantur
| ordine gestr. | termini L

10–12 Ergo $y \sqcap \odot + \frac{y\odot^2}{3a^2}$: Die Folgerung ist nicht zulässig, wie Leibniz schließlich bemerkt.

$$\begin{array}{ll} \odot \sqcap \frac{y}{1} & \odot \sqcap \frac{y}{1} - \frac{y^3}{3} \\ \odot \sqcap \frac{y}{1} - \frac{y^3}{3} + \frac{y^5}{5} & \odot \sqcap \bullet \quad \bullet + \frac{y^5}{5} - \frac{y^7}{7} \\ \odot \sqcap \bullet \quad \bullet \quad \bullet - \frac{y^7}{7} + \frac{y^9}{9} & \odot \sqcap \bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad \bullet + \frac{y^9}{9} - \frac{y^{11}}{11} \end{array}$$

Ubi si pro $\frac{y^3}{3}$ ponatur $\frac{\odot^3}{3}$, nescio an liceat dicere: $\odot \sqcap \frac{y}{1} - \frac{\odot^3}{3}$ seu $\frac{y}{1} \sqcap \odot + \frac{\odot^3}{3}$. Sed quamvis id non liceret in his primis licebit tamen in postremo omnium, quia postrema determinationum pro aequatione est. Verum hac ratione prima inveniri aut scribi non poterit nisi praecedentes faciant partem, eademque semper repetantur (: alioqui nunquam primum eius terminum scribere poterimus :) aut nisi etiam inferiores determinationes sint probae. Sed exaltatio per ductum in se ipsum non procedit ad altiores.

$\odot y^2 \sqcap \frac{y^3}{1} - \frac{y^5}{3}$. Ergo $y^5 \sqcap \frac{y^3}{1} - \odot y^2$. Rursus $y^5 \sqcap \odot - \frac{y}{1} + \frac{y^3}{3}$. Sed non ideo ausim scribere alterum horum altero maius. Si maius dividias per minus, et minus per maius manebit maius, et fiet: $\frac{y^5}{y^3 - \odot y^2} \sqcap \frac{\odot - y + y^3}{y^3}$ et $y^8 \sqcap \odot y^2 - y^3 + y^5, -\odot^2 + y\odot - y^3\odot$.

Si minor multiplicetur per minorem et maior per maiorem, manet determinatio itaque $\odot \sqcap \frac{y}{1} - \frac{y^3}{3}$ multiplicetur per $y^2 \sqcap \odot^2$, fiet: $y^2 \odot \sqcap \frac{\odot^2 y}{1} - \frac{y^3 \odot^2}{3}$, vel $y \sqcap \odot - \frac{y^2 \odot}{3}$.

10–12 Ergo $y^5 \sqcap \frac{y^3}{1} - \odot y^2$: Leibniz vernachlässigt wiederholt den Nenner von Termen, hinzukommt ein Rechenfehler, der die letzte Ungleichung des Absatzes beeinträchtigt.

47. INFINITUM

[Anfang November 1675]

Überlieferung:

L Konzept: LH 4 V 10 Bl. 58. Ausschnitt ca 20 x 23 cm ohne linke untere Ecke (ca 11 x 8 cm). 1 S. auf Bl. 58v°. Bl. 58r° leer. Wasserzeichen vorhanden. Schema sowie Figuren zuerst auf dem Bl., Text darum herumgeschrieben. Isolierte Bemerkungen am linken u. am unteren Rand. Überschrift ergänzt.

E Teildruck: LFC S. 147f. = S. 677 Z. 1–9.
Cc 2, Nr. 1408

Datierungsgründe: Das Wasserzeichen des Papiers ist für den Zeitraum November 1675 bis Anfang Februar 1676 belegt. Das zu *Fig. 1* gehörige Problem behandelt Leibniz ausführlich in *Methodi tangentium inversae exempla*, datiert 11. November 1675 (Cc 2, Nr. 1120, gedr. LBG S. 161–167).

In finit um

$\left\langle \frac{1}{1} \right\rangle$	$\left\langle \frac{1}{1} \right\rangle$	$\left\langle \frac{1}{1} \right\rangle$			1	1	1
15 $\left\langle \frac{1}{2} \right\rangle$	$\left\langle \frac{1}{3} \right\rangle$	$\left\langle \frac{1}{4} \right\rangle$			3	27	$\frac{1}{4}$
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{10}$	1	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{9}$
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{20}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	10 1000
$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$	etc.	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{9}$	$\left[\frac{1}{16} \right]$	$\frac{1}{16}$
etc.			etc.	etc.	etc.	etc.	
20 $\frac{1}{0}$	$\frac{2}{1}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{1}{0}$	$\frac{2}{1}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{4}{3}$

14 f. Textverlust durch Zerschneiden erg. Hrsg. 18 16 L ändert Hrsg.

13–677,9 In finit um: Fast wörtlich erscheint diese Argumentation wieder in einem Brief an Erhard Weigel vom September 1679 (*LSB* II, 1 N. 212 S. 486 u. III, 2 N. 345 S. 838f.).


$\frac{1}{0}$ est quantitas infinita, hinc credibile est summam seriei huius: $1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4}$ etc. esse infinitam.

At summa seriei $\frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1}$ etc. est etiam $\frac{1}{0}$ sive infinita. Ergo sequeretur quia $\frac{1}{0}$ ipsi $\frac{1}{0}$ aequale fore $\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$ etc. $\sqcap \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{1}$ etc. quod est absurdum.

Videtur enim $\frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1}$ etc. ipso $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3}$ etc. infinites esse maius. Dicendum ergo $\frac{1}{0}$ et $\frac{1}{0}$ non aequivalere seu 0 non posse esse quantitatem minimam, sed esse infinite parvam, ut una 0 sit alia maior. Et hic videtur hoc modo oblatum nobis exemplum quo infinitum unum alio infinites maius est. Et videtur summa omnium fractionum, summae omnium unitatum et inter finitam quantitatem quodammodo media esse.


[Figuren außerhalb des Haupttextes]

10



[Fig. 1]

$$\frac{AC}{(A)(C)} \sqcap \frac{(A)(P)}{AP}$$



[Fig. 2]

1 f. esse (1) finitam (2) infinitam (3) infinitam L 4 absurdum. (1) Dicendum ergo (2)
Videtur L

12 $\frac{AC}{(A)(C)} \sqcap \frac{(A)(P)}{AP}$: Die Bedingung läuft darauf hinaus, daß das Produkt aus Ordinate und Subnormale konstant ist, und wird durch die kubischen Parabeln erfüllt.

[*Isolierte Bemerkungen*]

[*Am unteren Rand:*]

$$a^y \sqcap y^a \quad y^z \sqcap zy, \quad 2^2 \sqcap 2, 2$$

[*Am linken Rand, gegenläufig:*]

5 $\begin{array}{r} 2\ 3 \\ -1\ 7 \\ \hline 1\ 6\ 1 \\ -2\ 3 \\ \hline 3\ 9\ 1 \end{array}$

48. AEQUATIONES INFINITAE PRO FIGURIS ETIAM ORDINARIIS

[November 1675]

Überlieferung: L Konzept: LH 35 XIV 1 Bl. 117. 1 Zettel 19,2 x 7 cm. 1 S. auf Bl. 117r°.

Bl. 117v° leer. An oberer und unterer Schnittkante Reste fremden Textes.

Cc 2, Nr. 1206

5

Datierungsgründe: Das Wasserzeichen des Papiers ist für November 1675 belegt. Das Stück ist vor dem auf Juni 1676 datierten N. 62 geschrieben, das in S. 786 Z. 3 auf N. 48 verweist und auf S. 793 Z. 15 f. die Reihenentwicklung von Z. 10 übernimmt.

Aequationes infinitae pro figuris etiam ordinariis, sit
 $a + x \wedge a - x \sqcap y^2$, sive $\frac{y^2}{a+x} \sqcap a - x$. fiet: $a - x \sqcap \frac{y^2}{a} - \frac{y^2x^2}{a^2} + \frac{y^2x^4}{a^3}$ etc. Res apparent 10
difficilior si sit $x^2y + x^3 \sqcap y^2a$, fiet $x^2 \sqcap \frac{y^2a}{x+y}$ fiet: $x^2 \sqcap \frac{y^2a}{x} - \frac{y^3a}{x^2} + \frac{y^4a}{x^3} - \frac{y^5a}{x^4}$ etc. Sed
quoniam praeterea etiam: $x^3 \sqcap y^2a - x^2y$ sive $\frac{x^3}{ya - x^2}$ fiet: ⊙
 $\odot x^3 \sqcap \frac{x^3}{ya} + \frac{x^5}{y^2a^2} + \frac{x^7}{y^3a^3}$ etc. Unde duos valores ipsius x^2 aequando: Fiet
 $\frac{y^2a}{x} - \frac{y^3a}{x^2} + \frac{y^4a}{x^3}$ etc. $\sqcap \frac{x^2}{ya} + \frac{x^5}{y^2a^2} + \frac{x^7}{y^3a^3}$ etc.

Quod si omnes fractiones reducere vellemus ad communem denominatorem foret 15
exponens potentiae cuiusque termini infinitus, certo quodam demto. Et tamen eiusmodi
aequationis infinitae dari poterit summa, seu expressio finita. Si sint aequationes in qui-
bus plures excitari possunt analogiae, plures etiam in unam addi poterunt formulae. Et

15 f. foret (1) potentia cuiusque infinita (2) exponens L 16 eiusmodi (1) seri (2) aequationis
L 18 formulae (1); quia et ex duabus (2). Et L

12 sive $\frac{x^3}{ya - x^2}$: Leibniz berechnet den Wert für y und setzt ihn irrtümlich gleich x^3 . Der Fehler
beeinträchtigt die Überlegung bis Z. 14, wo konsequent gerechnet in den Zählern der letzten beiden Terme
der rechten Seite x^4 und x^6 stehen müßten.

ita enumerando possibles poterimus iudicare de summis eiusmodi serierum si quando occurrant.

1 *Fragment fremden Textes unter summis: $x - 1$* ^

49. PROGRESSIO HARMONICA
[Oktober – Dezember 1675]

Die Gesprächsaufzeichnung N. 49₁ und die Aufzeichnung von Tschirnhaus N. 49₂ stehen in engem Zusammenhang: Die Betrachtungen der Teile 1 u. 2 von N. 49₁ werden in Teil 1 u. 2 von N. 49₂ weitergeführt. Die Wasserzeichen der beiden Teilstücke sind in den Leibniz-Handschriften bisher nur mit einem einzigen weiteren Träger belegt: Die Aufzeichnung von Tschirnhaus N. 49₂ ist auf Papier mit demselben Wasserzeichen geschrieben wie Leibniz' *Regle pour trouver les feries* (Cc 2, Nr. 1502 A, B), in der aus gegebenen Kalenderdaten die zugehörigen Wochentage berechnet werden. Leibniz behandelt darin den 1. Januar 1676 und den 15. August 1676 als Daten der Zukunft, den 1. Mai 1615 (geändert aus 1. Mai 1675) als Datum der Vergangenheit. Da Tschirnhaus sich seit Ende September 1675 in Paris aufhielt, dürften die beiden Teilstücke in der Zeit von Oktober bis Dezember 1675 entstanden sein.

5

10

49₁. NOTAE

Überlieferung: *LuT* Gesprächsaufzeichnung (Leibniz und Tschirnhaus): LH 35 XII 1 Bl. 256.

1 Bl. 2°. Obere Hälfte links Ausriß von max. 3 x 7,5 cm. Ca 1 1/2 S. Untere Hälfte von Bl. 256 r° leer. Textfolge Bl. 256 r° oberes Viertel, Bl. 256 v° rechte Hälfte des unteren Drittels, Bl. 256 r° zweites Viertel, Bl. 256 v° linke Hälfte des unteren Drittels, Bl. 256 v° obere zwei Drittel.
Cc 2, Nr. 1340

15

20

[Teil 1]

20

[Leibniz]

$\frac{1}{y}$	$\frac{1}{y}$	$\frac{1}{y}$	$\frac{1}{y}$	$\frac{1}{y}$
$\frac{2}{y}$	$\frac{1}{y}$	$\frac{1}{y}$	$\frac{1}{y}$	$\frac{1}{y}$
$\frac{3}{y}$	$\frac{3}{2y}$	$\frac{1}{y}$	$\frac{1}{y}$	$\frac{1}{y}$
$\frac{4}{y}$	$\frac{6}{3y}$	$\frac{4}{3y}$	$\frac{1}{y}$	$\frac{1}{y}$
Productum inferiorum $\frac{5}{y} + \frac{10}{3y} \sqcap \frac{15 + 10 \sqcap 25}{1, 3y} \sqcap \frac{4}{y} + \frac{6}{3y} + \frac{4}{3y} + \frac{1}{y}$				$y \sqcap 1$
				$y \sqcap 2$
				$y \sqcap 3$
				$y \sqcap 4$

25

$$\text{Productum inferiorum } \frac{5}{y} + \frac{10}{3y} \sqcap \frac{15 + 10 \sqcap 25}{1, 3y} \sqcap \frac{4}{y} + \frac{6}{3y} + \frac{4}{3y} + \frac{1}{y}$$

[Tschirnhaus] [Leibniz]

$$\begin{array}{rcc}
 1 & 2 & 3 \\
 \underline{1} & \underline{1} & \underline{2} \\
 1 & 2 & 6 \\
 5 & 1 & 3 & 3 & 1 & | & 9 & 1.2.3.4 \sqcap 24 \sqcap 1,3,3,1,,4 \\
 & & & & & & \underline{4} \\
 & & & & & & 36
 \end{array}$$

[Tschirnhaus]

$$\begin{array}{rrrrrrrr}
 \frac{1}{1} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & 24 & 24 & \overline{} & 50 & \overline{} & 36 & 25 \\
 10 & & & & 12 & & 4 & & & & \frac{3}{[75]} \\
 & & & & 8 & & 6 & & 9 & & \\
 & & & & \underline{6} & & 3 & & & & \\
 & & & & \frac{50}{24} & & 2 & & 3 & & \frac{[75]}{36} \\
 & & & & & & 1 & & & & \\
 & & & & & & & & & &
 \end{array}$$

15 [Auf der Rückseite:]

$$[\text{Zu Z. 9–14 , Spalte 5 gehörig:}] \quad \frac{6 + 8 + 12 + 24}{24}$$

$$\begin{array}{rrrrrrrr}
 \frac{1}{1} & \frac{3}{2} & \frac{11}{6} & \frac{50}{24} & 1 & & & 1 + 6 + 11 + 6 \not\propto 24 \\
 1 & 2 & 6 & 24 & & & & \\
 \frac{1}{1} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \begin{array}{c} 1 & 1 \\ \searrow & \swarrow \\ 1 & 3 & 2 \end{array} & & \frac{4}{4} & \frac{3}{3} & \frac{2}{2} & \frac{1}{1} \\
 20 & & & & 1 & 6 & 11 & 6 & & & \\
 & & & & 1 & 10 & 35 & 50 & 24 & & \\
 & & & & & & & & & & 4 + 18 + 22 + 6 \not\propto 50 \\
 & & & & & & & & & & \\
 & & & & & & & & & & 1 + 6 + 11 \\
 & & & & & & & & & & \frac{6}{6} & \frac{3}{3} & \frac{1}{1} \\
 & & & & & & & & & & & & & 6 + 18 + 11 \not\propto 35 \\
 & & & & & & & & & & & & & \\
 25 & & & & & & & & & & & & & 1 + 6 \\
 & & & & & & & & & & & & & \frac{4}{4} & \frac{1}{1} \\
 & & & & & & & & & & & & & & 4 + 6 \not\propto 10
 \end{array}$$

[*Teil 2*]

[*Leibniz*]

$$\begin{array}{ccccccccc}
 a & b & c & d & e & & a & \sqcap & 1 \\
 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & & ab & \sqcap & 1 + a \\
 1 & 1+a & 1+b & 1+c & 1+d & & abc & \sqcap & 1 + a + ab \\
 & & & & & & & & 5 \\
 & & & & & & & + b & \\
 & & & & & & & abcd & \sqcap 1 + a + ab + abc \\
 & & & & & & & + b + ac & \\
 & & & & & & & + c + bc &
 \end{array}$$

[*Tschirnhaus*]

10

$$\begin{array}{rcccl}
 bc \wp & 1 + a & & b \wp & 1 + a \\
 & \underline{b} & & & \underline{cd} \\
 & b + ab & & & cd + acd \\
 & 2b & & & 2cd
 \end{array}$$

[*Auf der Rückseite:*]

15

$$\begin{array}{rrr}
 \frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{5} & \frac{1}{1} \frac{1}{1+a} \frac{1}{1+b} & \frac{2+a}{1+a} \frac{1}{1+b} \\
 abc & & 3 + 2a + ab \\
 abcd & & + 2b \\
 & & \hline
 & & 1 + a + ab \\
 & & + b
 \end{array}$$


682,5 \sqcap 24 \sqcap (1) 1 + 3 + 3 + 1 (2) 1,3,3,1,,4 L 682,11+13 65 T ändert Hrsg. zweimal
 $\frac{4}{\overline{4 \quad 12 \quad 12 \quad 4}}$

11 f. bc \wp (1) b + a (2) 1 + a T
 $\frac{b}{b}$

11–14 bc \wp : Tschirnhaus setzt auf der rechten Seite zunächst den Faktor c richtig gleich $b + a$, ändert dann jedoch in $1 + a = b$, ohne den zweiten Faktor in $1 + b = c$ zu ändern, und berechnet so b^2 anstatt bc .

[Teil 3]

[Tschirnhaus]




5

[Fig. 1]

$$\begin{aligned}
 y &\rightsquigarrow \frac{x-1}{x} & y &\rightsquigarrow \frac{\frac{x}{2}-1}{x} \\
 xy &\rightsquigarrow x-1 & y &\rightsquigarrow \frac{x-2}{2x} - \frac{4}{12} \\
 &&& 2xy &\rightsquigarrow x-2 \\
 x &\rightsquigarrow \frac{1}{0} & \frac{y}{0} &\rightsquigarrow \frac{1}{0}-1 & \frac{2y}{0} &\rightsquigarrow \frac{1}{0}-2 \\
 && y &\rightsquigarrow 1-\emptyset & 2y &\rightsquigarrow 1-\emptyset \\
 &&&& y &\rightsquigarrow \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

10



[Fig. 2]

[Tschirnhaus]

1 2 4 8 16

[Leibniz]

$\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{8}$

12 Fig. 2: Zwei Vorstufen der Figur werden nicht wiedergegeben.

$\begin{array}{r} [Tschirnhaus] \\[1ex] \begin{array}{r} 4 & 5 \\[-1ex] 1 & 2 \\ \hline 4 & 2 \\[-1ex] 1 & 2 & 3 \end{array} \end{array}$	$\begin{array}{l} [Leibniz] \\[1ex] \text{natur.} \\[1ex] y, \underbrace{\frac{y+1}{2}}, \underbrace{y+2}_{\text{natur.}} \quad [\text{bricht ab}] \end{array}$
---	---

492. PROGRESSIO HARMONICA

5

Überlieferung: *T* Aufzeichnung (Tschirnhaus für Leibniz): LH 35 XII 1 Bl. 255. 1 Bl. 2°.
 Rechts unregelmäßige Rißkante. Ca 1 1/3 S. Untere zwei Drittel von Bl. 255 v° leer bis
 auf vier Zeilen quer zur Schreibrichtung. Auf Bl. 255 r° über und unter S. 687 Z. 5–10
 Nebenrechnungen zu nicht aufgefundenem Schema. — Überschrift von Leibniz ergänzt.
 Cc 2, Nr. 1181

10

P r o g r e s s i o h a r m o n i c a

[Teil 1]

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & 1 & & & \\
 & & 1 & & 1 & & \\
 & 1 & & 2 & & 1 & \\
 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\
 1 & & 4 & & 6 & & 4 & 1 \\
 1 & & 5 & & 10 & & 10 & 5 & 1
 \end{array}$$

15

	$\frac{a}{y}$	$\frac{1}{y}$			
	$\frac{b}{y}$	$\frac{a}{y}$			
5	$\frac{c}{y}$	$\frac{g}{b2y}$	$\frac{a}{y}$		
	$\frac{d}{y}$	$\frac{h}{c3y}$	$\frac{l}{g3y}$	$\frac{a}{y}$	
10	$\frac{e}{y}$	$\frac{i}{d4y}$	$\frac{m}{h6y}$	$\frac{o}{l4y}$	$\frac{a}{y}$
	$\frac{f}{y}$	$\frac{k}{e5y}$	$\frac{n}{i10y}$	$\frac{p}{m10y}$	$\frac{q}{o5y}$
	$\frac{a}{y}$	$\frac{b}{y} + \frac{a}{y} \wp \frac{a+b}{y}$	$\frac{c}{y} + \frac{g}{by} + \frac{a}{y} \wp \frac{a+c}{y} + \frac{g}{by} \wp \frac{ab+bc+g}{by}$	$\frac{d}{y} + \frac{h}{cy} + \frac{l}{gy} + \frac{a}{y} \wp$	
	$\frac{a+d}{y}$	$\frac{h}{cy} + \frac{l}{gy} \wp \frac{a+d}{y} + \frac{gh+cl}{cgy} \wp \frac{cga+cgd+gh+ch}{cgy}$	$\frac{e}{y} + \frac{i}{dy} + \frac{m}{hy} + \frac{o}{ly} +$		
15	$\frac{a}{y} \wp \frac{a+e}{y}$	$\frac{i}{dy} + \frac{o}{ly} + \frac{m}{hy} \wp \frac{a+e}{y} + \frac{li+do}{dly} + \frac{m}{hy} \wp \frac{a+e}{y} + \frac{hli+hdo+dml}{hdly} \wp$	$\frac{hlla+hdle+hli+hdo+dml}{hdly}$	$\frac{f}{y} + \frac{k}{ey} + \frac{n}{iy} + \frac{p}{my} + \frac{q}{oy} + \frac{a}{y} \wp$	
	$aeimo + efimo + kimo + nemo + peio + eimq$	$eimoy$			

14 $\frac{cga+cgd+gh+ch}{cgy}$: Der letzte Term im Zähler müßte $+cl$ lauten; Tschirnhaus übernimmt den fehlerhaften Wert in die vierte Spalte des Schemas S. 687 Z. 1–3.

$$\frac{1}{y} \left| \begin{array}{c} 1+b \\ 1 \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} b+bc+g \\ by \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} cg+cgd+gh+ch \\ cgy \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} hdl+hdle+hli+hdo+dlm \\ hdly \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} eimo+efimo+kimo+nemo+peio+eimq \\ eimoy \end{array} \right|$$

$$\frac{a}{y} \left| \begin{array}{c} a+b \\ y \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} b+bc+c \\ by \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} cc+ccd+2ch \\ cgy \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} hdd+hdde+2hdi+ddi \\ hdly \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} eeii+eefii+kiie+neii+keei+eiik \\ eimoy \end{array} \right|$$

$$\frac{a}{y} \left| \begin{array}{c} a+b \\ y \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} b+bc+c \\ by \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} c+cd+2h \\ cy \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} dh+hde+2hi+di \\ hdy \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} ei+eif+ki+ni+ke+ik \\ eiy \end{array} \right|$$

$$\frac{a}{y} \left| \begin{array}{c} a+b \\ y \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} a+2b+ab+bb \\ by \end{array} \right|$$

$$\frac{1}{y} \left| \begin{array}{c} 1+b \\ y \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} b+bc+c \\ by \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} 3c+cd+d \\ cy \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} 2dec+4cd+2kc+2ec+dd \\ 2cdy \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} ad+2cc+fed+2fec+fd+ \\ 2cf+1d+2ad+2ke+ee+ \\ ad+2cc+de+dd+2ad+2ce+ \\ 2ad+4cc+2de+4ec \\ 5ed+10ec+4cd+fed+2fec+ \\ fd+2cf+ee+dd+4cc \end{array} \right|$$

5

$$\frac{1}{y} \left| \begin{array}{c} 1+b \\ y \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} b+bc+c \\ by \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} 3c+dc+d \\ cy \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} 2cde+2cd+2cd+4cc+ \\ 2ce+dd+2ad \\ 2cde+6cd+2ce+dd+4cc \\ 2cdy \end{array} \right|$$

10

$$5 \quad (1) \frac{2dec+2cd+2kc+2ec+dd}{2cdy} \quad (2) \frac{2dec+4cd+2kc+2ec+dd}{2cdy} \quad T \quad 9 \quad (1) 3ed+6ec \quad (2) 5ed+10ec \quad T$$

1–13 Neben dem fehlerhaften Wert $+ch$ in der vierten Spalte von Z. 1–3 beeinträchtigt eine Reihe von Versehen die Rechnungen. Trotz Kontrollbetrachtungen und Neuansätzen gelingt es Tschirnhaus nicht, die Unstimmigkeiten zu beseitigen.

687,5 Darunter und darüber Nebenrechnungen zu nicht gefundenem Schema:

$$\begin{aligned}
 i &\not\propto 2c \quad o \not\propto 2k \quad r \not\propto 2p \\
 i &\not\propto 2c \quad k \not\propto d + 2c \quad l \not\propto e + d + 2c \quad o \not\propto 2k \quad m \not\propto f + e + d + 2c \\
 p &\not\propto e + d + 2c + 2k \quad n \not\propto g + f + e + d + 2c \quad q \not\propto f + 2e + 2d + 2c + 2k \\
 5 \quad r &\not\propto 2e + 2d + 4c + 4k
 \end{aligned}$$

Auf der Rückseite, quer zur Schreibrichtung:

$$\begin{array}{ccccccccc}
 y & y & by & cy & 2cdy & 2d + 2ce \text{ in } y & e + d + 2c \\
 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & \underline{2d + 4c} \\
 & & & & & & 2de + 2dd + 8dc + 4ce + 8cc \\
 10 & & & & & & 2def + 2ddf + 8dcf + 4cef + 8ccf \text{ in } y
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 e + 3d + 6c \\
 \underline{f + e + d + 2c} \\
 ef + 3fd + 18cd + ee + 4de + 8ce + 3dd + 12cc \\
 efg + 3fdg + 18cdg + eeg + 4deg + 8ceg + 3ddg + 12ccg
 \end{aligned}$$

1 Schema: Grundlage der Gleichungen und der Nebenrechnungen ist ein achtzeiliges Dreiecks-schema, entsprechend dem auf S. 686, mit den Werten $a = 1, \dots, h = 8, i = 6, k = 10, l = 15, m = 21, n = 28, o = 20, p = 35, q = 56, r = 70$. 13 +18cd: Richtig wäre +12cd + 6cf; der Fehler wird in die folgende Zeile übernommen.

[Teil 2]

$$\frac{1}{a} \frac{1}{b} \frac{1}{c} \frac{1}{d} \quad \frac{a+b}{ab} \quad \frac{1}{c} \left| \begin{array}{c} ac + bc + ab \\ abc \end{array} \right. \quad \frac{1}{d} \left| \begin{array}{c} acd + bcd + abd + abc \\ abcd \end{array} \right.$$

687,13 Kontrollbetrachtungen und Nebenrechnungen:

1. Ansatz:

$$\begin{aligned} & \frac{e}{y} + \frac{3}{y} + \frac{e}{cy} + \frac{d}{2cy} + \frac{2c}{dy} \\ & \frac{y}{y} + \frac{3}{y} + \frac{y}{cy} + \frac{d}{2cy} + \frac{2c}{dy} \\ & \frac{5}{5} + \frac{3}{5} + \frac{1}{3} + \frac{4}{-} \quad [\text{bricht ab}] \end{aligned}$$

$$\begin{array}{rrr} c & d & e \\ 3 & 4 & 5 \\ \hline & 12 & \\ & 60 & \\ & \underline{-2} & \\ 120 & & \\ & 72 & \\ & 30 & \\ & 16 & \\ & \underline{36} & \\ 274 & & \\ & 120 & \end{array}$$

2. Ansatz:

$$\begin{aligned} & \frac{e}{y} + \frac{3}{y} + \frac{e}{dy} + \frac{d}{2cy} + \frac{2c}{dy} \\ & \frac{y}{1} + \frac{3}{5} + \frac{y}{4} + \frac{2}{15} + \frac{3}{10} \\ & \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{y}{4} + \frac{1}{5} \\ & \frac{3}{5} + \frac{2}{15} + \frac{3}{10} \not\approx \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} \\ & \frac{17}{15} + \frac{3}{10} \not\approx \frac{5}{6} + \frac{1}{5} \\ & 170 \\ & \frac{45}{215} \\ & \frac{215}{250} \not\approx \frac{31}{30} \not\approx 55 \quad [\text{bricht ab}] \\ & 5 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{rcl}
 4 + 3a + 2ab + abc & 3 + 2a + ab + abcd & 2 + a + 2abcd - abc \\
 + 3b + 2ac & + 2b + ac & + b \\
 \hline
 + 3c + 2bc & + 2c + bc & + c \\
 abcd \cancel{\varphi} 1 + a + ab + abc & 1 + a + ab [+abc] & \\
 5 & + b + ac & + b + ac \\
 & + c + bc & + c + bc
 \end{array}$$

$$\frac{2abcd + 1 + c - ab}{1 + a} \quad \frac{a + c + 2abcd}{abcd}$$

1–8 Nebenbetrachtungen:

$$\begin{array}{rcl}
 4 + 3a + 2ab + abc & 4 + 3a + 2ab + abc & \\
 + 3b + 2ac & + 3b + 2ac & \\
 + 3c + 2bc & + 3c + 2bc & \\
 \\
 1 + a + ab + abc & & \\
 + b + ac & & \\
 + c + bc & & \\
 \hline
 2 + a + [bricht ab] & & \\
 + b & & \\
 + c & &
 \end{array}$$

$$4 + abc \text{ erg. Hrsg.} \quad 10–12 \quad (1) 3+2a+ab+abcd \quad (2) 4+3a+2ab+abc \quad T$$

$+2b+ac$	$+3b+2ac$
$+2c+bc$	$+3c+2bc$

1–8 Tschirnhaus berechnet (wie in N. 49₁ Teil 2 skizziert) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}$ für $a = 1$, $b = 1 + a$, $c = 1 + b$, $d = 1 + c$ und formt den Zähler des Bruches sukzessive um. Im letzten Schritt müßte a mit negativem Vorzeichen in den Zähler des resultierenden Bruches übernommen werden.

50. TANGENTIUM APPLICATIO AD NUMERORUM SERIES

Dezember 1675

Überlieferung: *L* Konzept: LH 35 V 7 Bl. 1. 1 Bl. 2°. 1 1/3 S. Rechter Rand (Außenseite des ursprünglichen Bogens) um ca 1 cm beschnitten. Erste Überschrift und Hervorhebungen Z. 8–11 (durch doppeltes Unterstreichen) mit anderer Tinte ergänzt.

Cc 2, Nr. 1186

5

Xb. 1675.

T a n g e n t i u m a p p l i c a t i o a d n u m e r o r u m s e r i e s
u t i n q u a d r a t u r i s

P r o g r e s s i o n e s n u m e r o r u m g e o m e t r i c e t r a c t a n d a e

10

Q u a e r i t u r f i g u r a s e u p o l y g o n u m r e g u l a t u m , p r o g r e s s i o n i s
h a r m o n i c a e . I n t e r v a l l a t e r m i n o r u m s i n t a e q u a l i a $A B \sqcap B(B)$ e t c . $\sqcap \beta$. I p s a u n i t a s s i t
 $A D$. R e l i q u i t e r m i n i $B C$, $(B)(C)$, $((B))((C))$ e r u n t $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$. e t c . E x D e r i g a t u r i n
c o n t r a r i a s i p s i s B , p a r t e s r e c t a $D E$, i n q u a s u m a n t u r $D E$, $D(E)$, $D((E))$, $D(((E)))$ i p -
s i s $A B$, $A(B)$, $A((B))$ e t c . a e q u a l e s . I u n g a n t u r $B E$, $B(E)$, $B((E))$ q u a e s e c a b u n t i p s a m


15

$A D$ i n p u n c t i s F , (F) , $((F))$ e t c . E r u n t $A F$. $A(F)$. $A((F))$ e t c . $\sqcap \frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$ e t c . a d e o q u e
i p s a e $B C$, $(B)(C)$ e t c . t a n t u m i p s i s s u m a n d a e s u n t a e q u a l e s .

E x c u i u s l i b e t o r d i n a t a e t e r m i n o, u t (C) i n o r d i n a t a m p r o x i m e m a i o r e m $B C$, d e -
m i t t a t u r p e r p e n d i c u l a r i s $C L \sqcap (B)B \sqcap A B$ c o n s t a n t i . E r u n t i p s a e $L C$, v e l $(L)(C)$ e t c .
d i f f e r e n t i a e $\sqcap \frac{1}{2} \frac{1}{6} \frac{1}{12} \frac{1}{20}$ e t c . S i t $G B \sqcap y$. E r i t $B C \sqcap \frac{1}{y}$ e t $L C \sqcap \frac{1}{y} - \frac{1}{y + \beta} \sqcap \frac{\beta}{y^2 + \beta y}$.

20

D u c a n t u r t a n g e n t e s f i g u r a e , s e u p r o d u c a n t u r l a t e r a p o l y g o n i h u i u s d u m , u t r i q u e a x i s c i l .
 $A B$, e t e i c o n i u g a t o , o c c u r r a n t i n (Θ) e t (T) .



[Fig. 1, tlw. Blindzeichnung]

691,22–693,1 et (T). (1) Erit (a) $(F)(T)$ (b) $\frac{(B)(T)}{(B)(C)}$ \sqcap (aa) $\frac{L(C)}{LC}$ (bb) $\frac{LC}{L(C)}$ (cc) $\frac{L(C)}{LC}$ sive
 $(B)(T) \sqcap (aaa) \frac{1}{y+\beta} \wedge y^2 + \beta$ (bbb) $\frac{\beta}{y^2 + \beta y}$ (2) Ergo $(B)(T) \sqcap \frac{\beta}{y+\beta} \sqcap \frac{1}{\frac{\beta}{y^2 + \beta y}}$ $\sqcap \frac{1}{y}$. Ergo erit $(B)(T) \sqcap$
(3) $\frac{BT}{BC \sqcap \frac{1}{2\beta}} \sqcap (a) \left\langle \frac{\beta}{\beta} \right\rangle$. et BC \sqcap BT (b) $\mid \frac{\beta}{2}$. ändert Hrsg. | et L

$$\frac{BT}{BC \sqcap \frac{1}{2\beta}} \sqcap \frac{\beta}{2[\beta^2]} \text{ et } BT \sqcap \beta. \text{ Eodem modo: } \frac{(B)(T)}{(B)(C) \sqcap \frac{1}{3[\beta]}} \sqcap \frac{\beta}{\frac{\beta}{6 \sqcap 2, 3[\beta^2]}} \text{ et}$$

$$(B)(T) \sqcap 2\beta \text{ et generaliter } \frac{(BT)}{(BC) \sqcap \frac{1}{y+\beta}} \sqcap \frac{L(C) \sqcap \beta}{LC \sqcap \frac{\beta}{y^2 + \beta y}}. \text{ Ergo } (BT) \sqcap y \sqcap GB \sqcap$$

$A(B)$. Eodem modo $((B))((T)) \sqcap A((B))$ et ita in caeteris.

Quaeritur iam $A\Theta$. intervallum scilicet inter tangentes et punctum A , in axe coniugato. Sed statim patet fore $A\Theta \sqcap 2BC$ quia $AT \sqcap 2BT$.

Iungantur $AC. A(((C)))$. Erit summa omnium $A(\Theta)$, γ in β dupla spatii $AC(C)$ etc. $((C))A$, at eadem dupla omnibus BC . Ergo spatium $AC(C)$ etc. $((C))A$ spatio $BC \dots ((C))((B))[B]$ aequale quod aliunde patet, quia et $A(((B)))((C)) \sqcap ABC$ perpetuo. Ideo in figura harmonica nihil hinc duci potest. At, videamus an non in aliis hac methodo quae in geometricis mihi utilis fuit, aliquid detegi queat:

5

10

[Es folgt die Fig. 2 auf S. 694.]

$$\text{Sit } AC \sqcap 1. GB \sqcap GA \sqcap \beta \sqcap (yB)(\overline{y+1}B). GB \sqcap y. BC \sqcap \frac{1}{y^2}.$$

$$\int \frac{\beta}{y^2} \sqcap \int \square(yB)(\overline{y+1}B)(\overline{y+1}C)(yC).$$


$$LC \sqcap \frac{1}{y^2} - \frac{1}{y^2 + 2y\beta + \beta^2} \sqcap \frac{2y\beta + \beta^2}{y^4 + 2y^3\beta + y^2\beta^2} \sqcap \frac{2\beta}{y^3 + 2y^2\beta + y\beta^2} + \boxed{2} \frac{\beta}{y + \beta}. \text{ Habe-} \\ \text{tur autem } \int LC. \text{ Ergo ad habendum } \int \overline{\boxed{2} \frac{\beta}{y + \beta}} \text{ tantum opus haberi } \int \frac{1}{y^3 + 2y^2\beta + y\beta^2}. \quad 15$$

Si omnes in infinitum quaerantur $\int \overline{LC}$ erit summa eorum $\sqcap 1$. Si finitus numerus fiet

$$1 \beta \text{ erg. Hrsg.} \quad 1 \beta^2 \text{ erg. Hrsg.} \quad 2 \sqcap \frac{L(C) \sqcap \beta}{LC \sqcap \frac{\beta}{y^2 + \beta y}} (1) \sqcap \frac{1}{y} = (a) \sqcap (b) \text{ Ergo } (2) \text{ Ergo } L$$

6 dupla (1) omn (2) spatii L 7 dupla (1) spatii B (2) omnibus L

14 f. Im Nenner von \mathfrak{D} fehlt der Faktor y ; der Fehler beeinträchtigt die Rechnung bis S. 695 Z. 3.



[Fig. 2, tlw. Blindzeichnung]

1 Fig. 2: Der mit (L) bezeichnete Punkt entspricht dem Punkt L im Text; der Punkt L der Figur tritt im Text nicht auf.

$1 - \frac{1}{y^2}$. Ergo $\int \overline{\odot + \mathbb{D}} \sqcap 1 - \frac{1}{y^2} \cdot \int \frac{\odot y \beta}{2} \sqcap \int \mathbb{D} \cdot \int \frac{\beta \odot \wedge y + \beta}{2} \sqcap \int \frac{\beta^2}{y \wedge y + \beta} \sqcap \beta - \frac{\beta}{y}$. Iam
 $- \int \frac{\beta \odot y}{2} + \int \frac{\beta \odot}{2} \wedge y + \beta \sqcap \int \frac{\beta^2 \odot}{2}$. Ergo $\int \frac{\beta^2 \odot}{2} \sqcap \beta - \frac{\beta}{y} - \int \mathbb{D}$. At $\int \mathbb{D} \sqcap 1 - \frac{1}{y^2} - \int \odot$.
Ergo $\int \frac{\beta^2 \odot}{2} \sqcap \beta - \frac{\beta}{y} - 1 + \frac{1}{y^2} + \int \odot$. Qui calculus si rectus habebitur $\int \odot$. adeoque et
 $\int \mathbb{D}$. quae quaerebatur. Eademque methodus ad caeteras potentias poterit applicari et
ni fallor alibi probavi ex data $\int \frac{1}{y^2}$. dari summam finitam $\frac{1}{y}$.

5

Altera methodus, quae geometrica est, et latitudinem sive spatium considerat, erit
quaeremus BT . nempe $\frac{BT}{BC} \sqcap \frac{\beta}{2y\beta + \beta^2}$ at $BC \sqcap \frac{1}{y^2}$. Ergo $BT \sqcap \frac{\beta y^2 + 2\beta^2 y + \beta^3}{2y\beta + \beta^2} \sqcap$
 $\boxed{2}, y \wedge y + \beta$

$\beta + \frac{\beta y^2}{2y\beta + \beta^2}$ cui si addatur $AB \sqcap y - \beta$ fiet $AT \sqcap \frac{3y^2 + \beta y}{2y + \beta}$. Eritque $\frac{A\Theta}{BC} \sqcap \frac{AT}{BT} \sqcap$
 $\frac{3y^2 + \beta y}{y^2 + 2\beta y + \beta^2}$ ponendo Θ esse in AC et fiet $A\Theta \sqcap \frac{3y + \beta}{y^3 + 2\beta y^2 + \beta^2 y} \sqcap \frac{3}{y^2 + 2\beta y + \beta^2} +$
 $\frac{\beta}{y^3 + 2y^2\beta + y\beta^2}$. Quorum summa si habeatur, poterit iterum haberri area spatii. Et 10
notabile quod ad eandem redditur hic figuram, $\frac{1}{y \odot, \boxed{2} y + \beta}$, ita ut hae duae methodi
aut singulae, aut iunctae rem conficere videantur. Nec dubium eadem et in caeterarum
potentiarum reciprocis datur.


$$\begin{aligned} 1 \sqcap 1 - \frac{1}{y^2}. (1) \int \frac{\odot y}{2} \sqcap \int \mathbb{D} \cdot \int \frac{\odot \wedge y + \beta}{2} \sqcap \int \frac{\beta}{y \wedge y + \beta} \sqcap 1 - \frac{1}{y}. \text{ Iam } - \int \frac{\odot y}{2} + \int \frac{\odot}{2} \wedge y + \beta \sqcap \\ \int \frac{\beta \odot}{2}. \text{ Ergo } \int \frac{\beta \odot}{2} \sqcap 1 - \int \mathbb{D} - \frac{1}{y}. \text{ At } \int \mathbb{D} \sqcap 1 - \frac{1}{y^2} - \int \odot. \text{ Ergo } \int \frac{\beta \odot}{2} \sqcap (\underline{1 - 1}) + \frac{1}{y^2} + \int \odot - \frac{1}{y} \\ (2) \int \frac{\odot y \beta}{2} \sqcap \int \mathbb{D} L \end{aligned}$$

5 alibi: Leibniz erinnert sich vermutlich ungenau an ein Ergebnis aus der *Analysis tetragonistica ex centrobarycis*, dat. 25./26. Okt. 1675 (Cc 2, Nr. 1089/1090; LBG S. 151): „Omn. $\frac{a}{x}$ \sqcap ult.
 $x \overline{\text{omn. }} \frac{a}{x^2} = \overline{\text{omn. }} \frac{a}{x^2}$ “.

Pulcherrima est haec tangentium applicatio ad numerorum series. Vel ideo quod ita seriei numericae alia aequivalens exhibetur, quod alias difficile, quia numeri non tractabiles ut figurae quoniam differentiae non negligendae.

Hac methodo etiam poterunt investigari triangulorum centra gravitatis, et eorum distantiae duci in triangulum, et productae seriei summa habebitur, si momenta aliunde habentur, vel contra. Haec geometriae et arithmeticæ communia.

Caeterum est aliquid arithmeticæ peculiare, ut scilicet figuræ propositæ exhibeatur aequivalens; elementis seu differentiis alia quadam ratione distributis, ut



[Fig. 3]

- 10 quid prohibet aliam componi seriem ex elementis seu differentiis, alia plane ratione in lineam rectam compositis, ut scilicet lineas duxi. Putem haec ad geometriam quoque applicari posse. Quemadmodum poterit ad geometriam quoque applicari illa mira ratiocinatio, qua summae inveniuntur in se ipsas replicatae; ope tangentium. Quemadmodum etiam ope eiusmodi diversae descriptionis arithmeticæ ad geometriam translatae poterunt forte aliquando exhiberi figuræ transcendentes, seu quarum descriptio non est in potestate, aequales illis quae describi possunt v. g. figuræ ananalyticae habebuntur, si non possit dari summa differentiarum secundum lineas quas vides iunctarum, ad facientes per earum summationem novas ordinatas.

15 aliquando (1) mutari figuræ hac (2) exhiberi figuræ (a) mechanicae a (b) transcendentis (c) transcendentibus L 16 figuræ (1) non (2) ageometricæ (3) analy (4) ananalyticae L

12 f. illa mira ratiocinatio: J. GREGORY, *Vera circuli et hyperbolae quadratura*, 1668, S. 19–24 [Marg.].

51. DE INVENTIONE THEOREMATUM ELEGANTIUM

[November 1675 – Februar 1676]

Überlieferung: L Konzept: LH 35 XII 2 Bl. 119. Ca. 2/3 Bl. 2°. 1 S. auf Bl. 119 r°. Bl. 119 v° leer. Linker Rand (im Falz des ursprünglichen Bogens) leicht bogenförmig. An der oberen, schrägen Schnittkante Buchstabenreste fremden Textes.
Cc 2, Nr. 1341

5

Datierungsgründe: Das Wasserzeichen des Papiers ist für den Zeitraum November 1675 bis Anfang Februar 1676 belegt.

Inventio theorematum elegantium et demonstrationum ex calculo concinnandarum in eo consistit, ut unam formulam in varias formulas aequipollentes mutemus eas in primis, quarum iam nota natura et proprietates.

10

Ut si proponam tibi terminos continuabiles in infinitum nempe:

a	b
(a)	$\sqcap \sqrt{ab}$
$((a))$	$\sqcap \sqrt{(a)(b)}$
etc.	etc.
	(b)
	$\sqcap \frac{2b\sqrt{ab}}{b + \sqrt{ab}}$
	$((b))$
	$\sqcap \frac{2(b)\sqrt{(a)(b)}}{(b) + \sqrt{(a)(b)}}$
	etc.

15

Utique erit elegantior enuntiatio si dicas, esse (a) medium geometricum inter a. b. et (b) medium harmonicum inter b. et (a).

12 terminos (1) : (2) continuabiles L 17 esse (a) (1) progressionis (2) medium (a) arith (b) geometricum L

9f. demonstrationum ex calculo concinnandarum: vgl. Fr. van SCHOOTEN, *Tractatus de concinnandis demonstrationibus geometricis ex calculo algebraico*, 1661, DGS II S. 341 bis 420. 12 terminos: vgl. J. GREGORY, *Vera circuli et hyperbolae quadratura*, 1668, prop. XI S. 25–28; ders., *Excercitationes geometricae*, 1668 S. 2 f. [Marg.]; in seinem Handexemplar, *Niedersächs. Landsbibl.* Ms IV, 377, hat Leibniz auf S. 2 die Reihenfolge der Berechnung der zweiten Terme der Doppelfolge aus den vorhergehenden durch Verbindungsstriche angedeutet.

Quod patebit si pro \sqrt{ab} in valore ipsius (b) substituas id cuius valor est \sqrt{ab} nempe (a) et fiet (b) $\frac{2b(a)}{b + (a)}$. et erunt b (b) (a) progressionis harmonicae,
quod sic patet b $\frac{2b(a)}{b + (a)}$ (a).

Est autem $\frac{2b(a)}{b + (a)}$ formula medii harmonici duplum scilicet rectanguli per summam

- 5 divisi. Hae scilicet formulae simplices notandae et in catalogos referendae, et nominibus designandae sunt, ut scilicet cum earum ope elegantiora obtineamus theorematum, et utendo theorematis formularum eiusmodi notarum iam demonstratis, faciliores obtineamus demonstrationes. Imo et constructiones, dum iam pulchra problemata plerumque circa formulas eiusmodi notas et celebratas habentur. Porro ut in nostro exemplo obiter
10 dicam cum communis mensura non mutet progressionis dividendo tres terminos per ba , fiet:

$$\frac{1}{a} \quad \frac{2}{b+a} \quad \frac{1}{b} \quad \text{vel} \quad \frac{1}{2a} \quad \frac{1}{a+b} \quad \frac{1}{2b}.$$

Quorum trium terminorum novissimorum nominatores sunt progressionis arithmeticæ, nempe:

15 $\frac{1}{2a} \quad \frac{1}{2a, + - a + b} \quad \frac{1}{2a, + 2 - a + b}.$

Ita si omnia multiplicemus per $b + a$ fiet ex tribus scilicet terminis initio, quorum medius fractio, fiet inquam:

$$b^2 + ab \quad 2ab \quad ba + a^2$$

sive $b + a, b \quad 2ab \quad b + a, a.$

- 20 Si a primo auferas medium fiet $b^2 - ab$. Si a secundo tertium fiet: $ab - a^2$, id est fiet illic $b \wedge b - a$, hic $a [^\wedge] b - a$, quae sunt ut b . ad a , cum ipse terminus primus sit etiam ad tertium ut b . ad a .

13f. *Under arithmeticæ: Progressio harmonica arithmeticæ est reciprocæ.*

L 6 cum (1) | offeruntur streicht Hrsg. | earum ope (2) earum ope (a) pulcheriora obt (b) elegantiora
6f. et (1) ob lemma (2) utendo L 21 a; b - a L ändert Hrsg.

Hinc porro sequitur si addantur duo numeri integri progressionis harmonicae uno interiecto distantes, esse aut quadratos aut quadratorum multiplos. Nam $b^2 + ab + ab + a^2$, seu $b^2 + 2ab + a^2$ quadratus. Quadrati sunt cum progressio primitiva est.

Et differentiae eorum sunt differentiae duorum quadratorum. Hinc solutio cuiusdam problematis, perelegans. Quaeritur series numerorum, in quibus id contingat, in infinitum, ut sint quadrati simul vel multipli; et generaliter loquendo multipli quadratorum; summae; et differentiae vel multipli differentiarum quadratorum sint differentiae, terminorum uno intervallo dissitorum. Hae sunt quaestiones longe difficiliores quam simplices.

5

1 f. uno . . . distantes erg. L 5 perelegans. (1) Sit quaerenda vero num (2) Quaeritur L
6 quadratorum (1) et |sint streicht Hrsg.| (2) summae L

52. PRO SUMMA PROGRESSIONIS HARMONICAE


[November 1675 – Februar 1676]

Überlieferung: *L* Konzept: LH 35 XII 1 Bl. 254. 1 Bl. 2°. 1 S. auf Bl. 254 r°. Bl. 254 v°. leer.
Cc 2, Nr. 1185

- 5 Datierungsgründe: Das Wasserzeichen des Papiers ist für den Zeitraum November 1675 bis Anfang Februar 1676 belegt.


[Teil 1]

Pro summa progressionis harmonicae



[Fig. 1]

8 Pro erg. L



[Fig. 2]

$$\begin{array}{ccccccc}
 \frac{1}{1} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\
 \left[\begin{matrix} 1 \\ 1 \end{matrix} \right] & \frac{1}{4} & \frac{1}{9} & \frac{1}{16} & \frac{1}{25} \\
 \hline
 \frac{1}{3} & \frac{1}{8} & \frac{1}{15} & \frac{1}{24} & \text{etc.} \\
 \frac{1}{1} & \frac{1}{8} & \frac{1}{27} & \frac{1}{64}
 \end{array}$$

5

3 $\frac{1}{1}$ gestr. L, erg. Hrsg.

¹ Fig. 2: vgl. die Darstellungen der figura segmentorum und der figura angulorum in LQK S. 42 u. 46.

$$\frac{a}{a[-ay]} \sqcap 1 + y + y^2 + y^3$$


$$\frac{1}{1} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{8} \quad \frac{1}{16} \quad \text{etc.} \quad \sqcap \quad \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} \quad \sqcap \quad \frac{2}{1} \quad \sqcap \quad 1 \quad + \quad \frac{1}{1}$$

$$\frac{1}{1} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{9} \quad \frac{1}{27} \quad \frac{1}{81} \quad \text{etc.} \quad \sqcap \quad \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} \quad \sqcap \quad \frac{3}{3-1} \quad \sqcap \quad \frac{3}{2} \quad \sqcap \quad 1 \quad + \quad \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{1} \quad \frac{1}{5} \quad \frac{1}{25} \quad \frac{1}{125} \quad \frac{1}{625} \quad \text{etc.} \quad \sqcap \quad \frac{1}{1 - \frac{1}{5}} \quad \sqcap \quad \frac{5}{5-1} \quad \sqcap \quad \frac{5}{4} \quad \sqcap \quad 1 \quad + \quad \frac{1}{4}$$

$$\begin{array}{ccccccc} 5 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\ \hline & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\ & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\ & \frac{1}{9} & \frac{1}{16} & \frac{1}{25} & \frac{1}{36} \\ & \frac{1}{27} & \frac{1}{64} & \frac{1}{125} & \frac{1}{216} \\ & \frac{1}{81} & \frac{1}{256} & \frac{1}{625} & \frac{1}{1296} \\ 10 & \text{etc.} & \text{etc.} & & & & \end{array}$$

In arithmeticis progressionibus non potest alia commode fieri aequatio referens ad alium axem.



$$\frac{a}{y} - \frac{a}{y+\beta} \sqcap \frac{\overline{ay} + a\beta\overline{-ay}}{y^2 + \beta y} \sqcap \frac{a\beta}{y^2 + \beta y} \text{ cuius momentum}$$

est: $\int \frac{a\beta}{y+\beta} \sqcap \int \beta \text{ [bricht ab]}$

[Fig. 3]

1 + y L ändert Hrsg.

[Teil 2]

Sit numerus quantuscunque, quaeritur an multiplicari possit per alium, ut productum fiat minus quam summa omnium productorum possibilium ex omnibus numeris minoribus.

$$\begin{array}{l} y^3 + b y^2 + bc y + bcd \\ \quad c \quad + bd \\ \quad d \quad + cd \end{array}$$

5

Videndum an differentia inter productum continuorum, et summa productorum omnium numerorum minorum superare possit quemlibet numerum datum.

Producti continuorum logarithmus habetur addendo logarithmos omnium numerorum inferiorum. 10

[Isolierte Gleichung]

$$y^z * * * \text{ etc. } e \sqcap \frac{s}{y}$$

5–7 Nebenbetrachtung:

$$\begin{array}{l} a b c d \\ a b c \\ a b d \\ a c d \\ b c d \end{array}$$

2 quantuscunque, (1) multiplicetur per (2) quaeritur L

10 f. Producti . . . inferiorum: vgl. N. MERCATOR, *Logarithmotechnia*, 1668, S. 34. In Leibniz' Handexemplar ist der Absatz unter der entsprechenden Aussage mit Bleistift angestrichen.

53. DE TRIANGULO HARMONICO

Die folgenden drei Stücke stehen in einem engen inneren und zum Teil auch äußerem Zusammenhang: N. 53₃ ist als erstes entstanden, vermutlich kurz vor dem auf Dezember 1675 datierten

Stück N. 53₁, in dem es erwähnt wird.

Bei der Abfassung von N. 53₂, datiert Februar 1676, hat Leibniz auf N. 53₃ verwiesen sowie umgekehrt einen Hinweis auf N. 53₂ in N. 53₃ ergänzt. Anschließend hat er dieses Blättchen in N. 53₂ wie in einen Brief eingefaltet und den so entstandenen Umschlag mit einer beide Stücke betreffenden Aufschrift (= S. 708 Z. 7–10) versehen.

53₁. DE PROGRESSIONE HARMONICA

10 Dezember 1675

Überlieferung: *L* Konzept: LH 35 XII 1 Bl. 250. 1 Bl. ca. 18,5 x 16 cm. Obere und untere Schnittkante unregelmäßig. 1 S. auf Bl. 250 v°. Datum und Überschrift über dem Schema S. 706 Z. 2–19 ergänzt. — Auf Bl. 250 v° teilweise zerschnittene numerische Divisionen mit verschiedenen Rechenproben. Druck in einem späteren Band der Reihe.

15 Cc 2, Nr. 1180 tlw.

Decemb. 1675

P r o g r e s s i o n a l h a r m o n i c a

20	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">1</td><td></td><td style="padding-right: 10px;">1</td><td></td><td style="padding-right: 10px;">1</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td style="padding-right: 10px;">1</td><td></td><td style="padding-right: 10px;">2</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">2</td><td style="padding-right: 10px;">1</td><td></td><td style="padding-right: 10px;">3</td><td style="padding-right: 10px;">4</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td style="padding-right: 10px;">2</td><td style="padding-right: 10px;">1</td><td></td><td style="padding-right: 10px;">6</td><td style="padding-right: 10px;">8</td></tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">4</td><td style="padding-right: 10px;">2</td><td style="padding-right: 10px;">1</td><td></td><td style="padding-right: 10px;">9</td><td style="padding-right: 10px;">12</td><td style="padding-right: 10px;">16</td></tr> <tr> <td></td><td style="padding-right: 10px;">4</td><td style="padding-right: 10px;">2</td><td></td><td style="padding-right: 10px;">18</td><td style="padding-right: 10px;">24</td><td></td></tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">8</td><td style="padding-right: 10px;">4</td><td></td><td></td><td style="padding-right: 10px;">27</td><td style="padding-right: 10px;">36</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td style="padding-right: 10px;">8</td><td></td><td></td><td></td><td style="padding-right: 10px;">54</td><td></td></tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="padding-right: 10px;">81</td><td></td></tr> </table>	1		1		1			1		2			2	1		3	4			2	1		6	8	4	2	1		9	12	16		4	2		18	24		8	4			27	36			8				54		16					81	
1		1		1																																																								
	1		2																																																									
2	1		3	4																																																								
	2	1		6	8																																																							
4	2	1		9	12	16																																																						
	4	2		18	24																																																							
8	4			27	36																																																							
	8				54																																																							
16					81																																																							

Progressio geometrica proxime inferior est series differentiarum transversalium progressionis geometricae propositae. Nec tantum differentiarum transversalium primarum seu primarum, sed et secundarum etc.

Series differentiarum rectarum progressionis geometricae est eiusdem progressionis geometricae. Si ope differentiarum transversalium inveniri possunt summae, sequitur hoc applicari posse ad geometricas; nam si seriei differentiarum transversalis primae quaeratur rursus series differentialis prima, et huius rursus, venietur tandem ad primam quae est unitatum; ubi differentiae sunt 0. seu exhauientur. Sed si progressio non sit per numeros, non venietur unquam ad unitates:

5

704,17 *Unter Progressio harmonica*: Adde schedam exiguum de inventiendis theorematis.

706,5–15 *Nebenrechnungen zum Schema*:

$$5 \quad \frac{1}{6} - \frac{1}{12} \sqcap \frac{12-6}{6,12} \sqcap \frac{1}{12}$$

$$7 \quad \frac{1}{12} - \frac{1}{20} \sqcap \frac{20-12}{12,20} \sqcap \frac{8}{12,20} \sqcap \frac{2}{3,20} \sqcap \frac{1}{30}$$

$$10 \quad 105 \sqcap 5, 21 \qquad \qquad \frac{105-60}{60,105} \sqcap \frac{45 \sqcap 5,9}{\cancel{3},2,\cancel{3},7,10} \sqcap \frac{1}{140}$$

$$11 \quad \frac{12}{30,42} \sqcap \frac{1}{7,15} \sqcap \frac{1}{105}$$

$$13 \quad \frac{14}{42,56} \sqcap \frac{1}{6,28} \sqcap \frac{1}{168} \qquad \qquad \frac{21}{168}$$

$$15 \quad \frac{72-}{16} \qquad \qquad \frac{16}{56,72} \sqcap \frac{\cancel{2},\cancel{8}}{7,\cancel{8},\cancel{2},36} \sqcap \qquad \qquad \frac{36,7 \sqcap 252}{252} \qquad \qquad \frac{28}{252}$$

6 si (1) diff (2) seriei | differentiarum erg. | transversalis L 10 Adde (1) schediasmata (2) schedam L

10 schedam exiguum: N. 53₃.

	$\frac{1}{1}$					
		$\frac{1}{2}$				
	$\frac{1}{2}$		$\frac{1}{3}$			
		$\frac{1}{6}$		$\frac{1}{4}$		
5	$\frac{1}{3}$		$\frac{1}{12}$		$\frac{1}{5}$	
		$\frac{1}{12}$		$\frac{1}{20}$		$\frac{1}{6}$
	$\frac{1}{4}$		$\frac{1}{30}$		$\frac{1}{30}$	
		$\frac{1}{20}$		$\frac{1}{60}$		$\frac{1}{42}$
	$\frac{1}{5}$		$\frac{1}{60}$		$\frac{1}{105}$	
10		$\frac{1}{30}$		$\frac{1}{140}$		$\frac{1}{168}$
	$\frac{1}{6}$		$\frac{1}{105}$			$\frac{1}{252}$
		$\frac{1}{42}$				$\frac{1}{360}$
	$\frac{1}{7}$		$\frac{1}{168}$			
		$\frac{1}{56}$				
15	$\frac{1}{8}$		$\frac{1}{252}$			
		$\frac{1}{72}$				
	$\frac{1}{9}$		$\frac{1}{360}$			
		$\frac{1}{90}$				
	$\frac{1}{10}$					

Series secunda habet denominatores ex ductu duorum primorum proximorum, series tertia, ex ductu terminorum seriei primae, in terminos numero antecedentes seriei

secundae sed per primum divisos, ut $\frac{1}{3}, \frac{1}{2} \sim \frac{1}{2} \sqcap \frac{1}{3}$
 $\frac{1}{4}, \frac{1}{6} \sim \frac{1}{2} \sqcap \frac{1}{12}$
 $\frac{1}{5}, \frac{1}{12} \sim \frac{1}{2} \sqcap \frac{1}{30}$.

5

Si quaelibet series differentiarum descendens per primum terminum suum dividatur, fient reciproci numerorum combinatoriorum.

1 ex (1) facto (2) ductu L 2 ex (1) facto terminorum seriei (2) ductu (a) termini se (b) terminorum L 2 in (1) terminum (2) terminos (a) respondentes (b) *in* (c) numero L 7 differentiarum descendens *erg.* L

53₂. TRIANGULUM HARMONICUM ET TRIANGULUM PASCALII

Februar 1676

Überlieferung: *L* Konzept: LH 35 VIII 27 Bl. 2. 1 Bl. 4°. Goldschnitt. Brieffaltung. 1 S. auf Bl. 2 r°. Datum auf Bl. 2 r° oben ergänzt. Überschrift auf Bl. 2 v° Mitte. 10 Z.
 5 Cc 2, Nr. 1337

Feb. 1676.

Triangulum harmonicum respondens triangulo arithmeticō Pascalii, quo ostenditur quomodo numerorum figuratorum reciprocī seu fracti, possint addi in summam. Patet et quomodo saepe
 10 ex simplicibus divinemus composita.

Ingeniosissimus Pascalius tractatum scripsit de triangulo arithmeticō: de summis, et summis summarum, et summis ex summis summarum, etc. numerorum progressionis arithmeticāe.

Ego singulari quadam ratione incidi in triangulum harmonicum; de differentiis et
 15 differentiis differentiarum, et differentiis ex differentiis differentiarum, etc. numerorum progressionis harmonicae.

Cumque numeri progressionis harmonicae sint reciproci, sive fracti numerorum progressionis arithmeticāe, factum est miro naturae cōsilio, ut etiam reliquae totius trianguli harmonici series (t a n t u m c e r t o m o d o m u l t i p l i c a t a e) serierum
 20 respondentium trianguli arithmeticī reciprocae essent, atque iidem sint numeri trianguli arithmeticī et harmonici, eo tantum discriminē quod termini trianguli arithmeticī sint integri, id est fracti habentes figuratum, (id est trigonalem, pyramidalem, trigono-trigonalem, etc.) pro numeratore, et unitatem pro nominatore; contra termini trianguli harmonici habeant unitatem pro numeratore, numerum figuratum pro nominatore.

25 Reliqua ex tabulae inspectione patent, quae deducere demonstrationibus non est operaē pretium. Hodie enim quivis characteristicāe analyseos cultor facile deprehendit et demonstrat, qualia multis ratiociniis Pascalius ostendit.

17 progressionis (1) arithmeticāe (2) harmonicae *L* 18 ut | reciproci *gestr.* | etiam *L* 26 f. et demonstrat *erg. L*

8 Pascali: *Traité du triangle arithmétique*, 1665 [Marg.] (PO III, S. 433–593).

<p>T r i a n g. a r i t h m e t.</p> <p>P a s c a l i i</p> <p>servit ad inveniendas summas integrorum finitorum figuratorum, et quadraturas parabolaram rationalium, omnium graduum, quae sunt figurae carentes asymptotis.</p>	<p>T r i a n g. h a r m o n.</p> <p>m e u m</p> <p>servit ad inveniendas summas fractorum figuratorum, finitorum et infinitorum summam finitam habentium et quadraturas hyperbolaram rationalium, omnium graduum, quae spatia 5 habent finitae magnitudinis, at ob asymptotos, infinitae longitudinis. 10</p>
--	---

708,24 Nach nominatore Tabelle gestr. L:

1	1	1	1	$\frac{1}{1}$	
5	4	3	2	$\frac{1}{2}$	
15	10	6	3	$\frac{1}{3}$	
35	20	10	4	$\frac{1}{4}$	
70	35	15	5	$\frac{1}{5}$	
126	56	21	6	$\frac{1}{6}$	

5 rechte Spalte figuratorum, (1) etc. (2) finitorum L 9 rationalium, (1) (excepta prima, <minime>
quadrabili) (2) omnium L

							$\frac{1}{1}$	
			1				$\frac{1}{1}$	
		1					$\frac{1}{1}$	
			1				$\frac{1}{1}$	
				2			$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{1}$
5			1	3			$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{3}$
		1	4	3			$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$
		1	5	6			$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{6}$
		1	6	10	4		$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{10}$
	etc.	7	15	10			$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{10}$
10	etc.	21	20	5			$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{20}$
	etc.	35	15				$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{15}$
	etc.	35	6				$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{35}$
	etc.	21					$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{21}$
	etc.	7					$\frac{1}{7}$	etc.
15		etc.					$\frac{1}{1}$	etc.

16–711,14 Spalten- und Zeilenzählung erg. Hrsg. Die römisch numerierten Zeilen sind im Manuskript senkrecht unter die entsprechenden Spalten geschrieben. Die eckigen Klammern im Text bis S. 711 Z. 11 stammen von Leibniz selbst.

- [IV] etc.
- [V] Summae ex summis summarum seu $\nabla\nabla$ gonales
- [VI] Summae summarum seu pyramidales
- [VII] Summae arithmeticorum, seu trigonales [differentiae pyramidalium etc.]
- [VIII] Progressio arithmeticorum [differentiae trigonalium et differentiae differentiarum pyramidalium, etc.] 5
- [X] Progressio harmonica seu reciproci arithmeticorum [summae fractionum seu reciprocorum trigonalium per $\frac{2}{1}$ divisorum; summae summarum reciprocorum pyramidalium per $\frac{2}{1}$ in $\frac{3}{2}$ id est per 3 divisorum etc.]
- [XI] Differentiae harmonicorum multiplicatae per $\frac{2}{1}$ [seu reciproci triangularium, 10 seu summae pyramidalium per $\frac{3}{2}$ divisorum]
- [XII] Differentiae differentiarum multiplicatae per [3]
- [XIII] Differentiae inter differentias differentiarum multiplicatae per [4]
- [XIV] etc.

Adde quae alibi scripsi de trianguli harmonici numerorum summis in scheda exigua, 15 huic involuta.

4 [differentiae ... etc.] erg. L 5 f. [differentiae ... etc.] erg. L 7 seu reciproci arithmeticorum erg.
 L 7–9 [summae ... per $\frac{2}{1}$ divisorum; | summae summarum erg. | reciprocorum ... etc.] erg. L 10
 (1) Progressio (2) Differentiae L 10 f. [seu ... divisorum] erg. L 12 Differentiae (1) harmonicorum
 (2) differentiarum L 12 $\frac{3}{2}$ L ändert Hrsg. 13 Differentiae (1) ex (2) inter L 13 $\frac{4}{3}$ L ändert
 Hrsg.

53₃. SCHEDA EXIGUA

[Dezember(?) 1675 – Februar 1676]

Überlieferung:*L* Überarbeitetes Konzept: LH 35 VIII 27 Bl. 1. Ein Zettel 4,5 x 17,5 cm. 2 S.5 *E* P. COSTABEL, *Leibniz et les séries numériques*, 1978, S. 90–91.Teildruck in dt. Übersetzung: D. MAHNKE, *Zusätze aus den ungedruckten Handschriften*, 1931, S. 31–33 (= Z. 14 – S. 713 Z. 9 und S. 713 Z. 13 – S. 714 Z. 15).

Cc 2, Nr. 1336

[Teil 1]

10 Origo inventionis trianguli harmonici.

Anno 1673 Hugenius mihi proposuerat summam fractionum triangularium inveniendam quam particulari sed valde memorabili solutione deprehenderat. Cum ergo in ea essem meditatione forte notavi[:]

Si exponatur

<i>A</i> □	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$
	—————/—————/—————/—————/—————				
<i>B</i> □	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{15}$

15 et si dimidii termini *B* addantur terminis ex *A*, per lineas quas vides iunctis, reddi terminos ex *A*, terminis ex *B* superscriptos. Quod in mentem primum venerat, quod viderem primum terminum nempe 1 ipsius *B*, dimidiatum, additum iuncto per lineam

10 trianguli harmonici *erg. L* 11 f. inveniendam *erg. L* 12 solutione (1) invenerat (2)
deprehenderat 18 nempe 1 *erg. L*

11 Anno 1673: Das Gespräch hat wahrscheinlich im September 1672 stattgefunden; vgl. in der Einleitung S. XXV sowie N. 36 u. *Historia et origo calculi differentialis*, 1714 (LMG V S. 404). Huygens' Lösung des Problems ist abgedruckt in *HO XIV*, S. 144–150.

ex A , nempe $\frac{1}{2}$ facere 1, seu primum ex A . Item quod nominatores proximi ex A in se ducti, faciunt semper numeratorum ex B duplos, ut

$$\begin{array}{cccc} 1,2 & \sqcap & 2,3 & \sqcap 6. \quad 3,4 & \sqcap 12. \\ & & 1 & & 3 & & 6 \end{array}$$

Quod autem in caeteris seriebus sumenda sint $\frac{2}{3}C, \frac{3}{4}D$, etc. ita facile divinavi, quia 5

$\frac{2}{3}$ primi termini ex C et $\frac{3}{4}$ primi termini ex D , id est semper unitatis, addita secundo termino seriei praecedentis, faciunt semper unitatem. Unde patet quomodo simplicium auxilio s a e p e c o m p o s i t a d i v i n e m u s . Ex hoc autem theoremate inductione deprehenso, summas eleganti satis ratiocinio inveni. Et ex his porro exstruxi ∇^{lum} harmonicum cuius cum arithmeticico mirus consensus. De quo alibi. 10

[Teil 2]

Demonstratio. Summae serierum trianguli arithmeticci reciproci seu trianguli harmonici.

Sit $A \sqcap \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5}$ etc.

$$B \sqcap \frac{1}{1} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10} + \frac{1}{15} \text{ etc.}$$

$$C \sqcap \frac{1}{1} + \frac{1}{4} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{35} \text{ etc.}$$

$$D \sqcap \frac{1}{1} + \frac{1}{5} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \frac{1}{70} \text{ etc.}$$

etc. \sqcap etc.

Erit $A - 1 \sqcap + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5}$ etc.

$$\frac{1}{2}B \sqcap + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} \text{ etc.}$$

15

1 facere (1) duplos (2) 1 L 2 semper | sequentiam *gestr.* | numeratorum L 2 B (1) dimidios
 (2) duplos 6 C | seu unitatis *gestr.* | et L 9f. Et ... alibi. *erg.* L 12 serierum (1) reciproce
 triangulo-pyramidalium etc. (2) trianguli L 13 Sit *erg.* L

10 De quo alibi: N. 53₂.

Iam per theorema $A - 1 + \frac{1}{2}B \sqcap 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ etc.

Ergo $A - 1 + \frac{1}{2}B \sqcap A$. Ergo $B \sqcap \frac{2}{1}$. Adeoque habetur totius seriei B summa.

Eodem modo $B - 1 + \frac{2}{3}C \sqcap B$. Ergo $C \sqcap \frac{3}{2}$.

$C - 1 + \frac{3}{4}D \sqcap C$. Ergo $D \sqcap \frac{4}{3}$. Et ita porro in infinitum.

5 Ergo ut in unum contrahamus:

	\underbrace{A}	\underbrace{B}	\underbrace{C}	\underbrace{D}	etc.
	1	1	1	1	1
	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$
	1	1	1	1	1
	$\frac{1}{1}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{5}$	
	1	1	1	1	1
	$\frac{1}{1}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{10}{15}$	
	1	1	1	1	1
	$\frac{1}{1}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{10}{20}$	$\frac{20}{35}$	
	1	1	1	1	1
	$\frac{1}{1}$	$\frac{5}{15}$	$\frac{15}{35}$	$\frac{35}{70}$	
	etc.	etc.	etc.	etc.	etc.

		summa		
	0	1	2	3
	\dots	0	$\frac{1}{1}$	$\frac{2}{2}$

15 conjecturalia certa

1 theorema: s. o. S. 712 Z. 14–17.

54. NUMERI PROGRESSIONIS HARMONICAE

8. Februar 1676

Überlieferung: L Konzept: LH 35 XII 1 Bl. 243–244. 1 Bog. 2°. 4 S. Zusatz am linken Rand von Bl. 244 r° u. unten auf Bl. 243 v° quergeschrieben. Geringer Textverlust durch Ausrisse im Falz. Überschrift ergänzt.

5

Cc 2, Nr. 1303

8. Feb. 1676.

Numeri progressionis harmonicae
et
proprietas quaedam in earum progressionem observatae 10
et
summa circiter vera
[Teil 1]

Progressionis harmonicae natura est, ut tribus quibuslibet sumtis terminis continuis, sit primus ad tertium, ut differentia primi et secundi ad differentiam secundi et tertii: 15

a, b, c sint characteres algebraici erit: $\frac{a}{c} \sqcap \frac{a-b}{b-c}$. et $a, b - a, c \sqcap a, c - b, c$. et $(\mathcal{Q}), a, c \sqcap a, b + b, c$. cuius aequationis ope, quaerere possumus valorem vel a . vel b . vel c , itaque

$b \sqcap \frac{(\mathcal{Q}), a, c}{a+c}$. id est medius trium terminorum progressionis harmonicae est duplus facti

ex extremis, divisi per summam. Quaeramus et extremos, erit scilicet $a \sqcap \left[\frac{b, c}{(\mathcal{Q}), c, - b} \right]$.

15 f. tertii: (1) 1.2.3.4.5.6.7 sint characteres algebraici (a) p s t (b) erit: $\frac{1}{3} \sqcap \frac{1-2}{2-3}$. et $1, 2 - 1, 3$

$\sqcap 1, 3 - 2, 3$. et $(\mathcal{Q}), 1, 3 \sqcap 1, 2 + 2, 3$. et erit $2 \sqcap \frac{(\mathcal{Q}), 1, 3}{1+3}$ id est numerus medius (2) a b c L 17 vel (1)

1. vel 2. vel 3. Sed satius quaerere valorem ipsius 2, sive medii, nam nulla est ratio cur alter extremorum

prae altero eligatur, itaque $2 \sqcap \frac{(\mathcal{Q}), 1, 3}{1+3}$ (2) a. vel b. L 19–716,1 scilicet (1) 1 $\sqcap \frac{2, 3}{(\mathcal{Q}), 1, 3, - 1, 2}$. et

$3 \sqcap \frac{1, 2}{(\mathcal{Q}), 1, 2, - 2, 3}$ (2) 1 $\sqcap \frac{2, 3}{(\mathcal{Q}), 3, - 2}$ et $3 \sqcap \frac{1, 2}{(\mathcal{Q}), 1, - 2}$. Sit 1 $\sqcap a$. et 2 $\sqcap b$. erit $3 \sqcap \frac{ab}{(\mathcal{Q}), a - b}$. a b

$\frac{ab}{2a - b}$ sive $\frac{ab}{b}$ $\frac{ab}{a}$ $\frac{ab}{2a - b}$ (3) | a $\sqcap \frac{b, c}{(\mathcal{Q}), b, - c}$ ändert Hrsg. | et L

et $c \sqcap \frac{a, b}{\textcircled{2}, a, -b}$. Ergo assumendo a, b . sequens seu tertius habebitur et ita stabit

$a - b - \frac{ab}{2a - b}$ sive reducendo ad unum numeratorem, quod etiam aliquando utile est,

quemadmodum alias ad unum nominatorem, fiet $\frac{ab}{b} - \frac{ab}{a} - \frac{ab}{2a - b}$. Sunt autem nominatores $b, a, 2a - b$, termini progressionis arithmeticæ, nam duplus medius, aequatur summae extremorum.

Medium harmonicum $\frac{2ac}{a + c}$ reciprocum est dimidiae summae fractionum sub extremis $\frac{1}{2a} + \frac{1}{2c}$. seu $b \sqcap \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{c}}$.

Sed quoniam progressio quaelibet eadem manet si tota per aliquam quantitatatem dividatur, ideo resumendo: $\frac{ab}{b} - \frac{ab}{a} - \frac{ab}{2a - b}$ etc. et totum dividendo per ab , fiet: $\frac{1}{b} - \frac{1}{a} - \frac{1}{2a - b}$.

10 Sit quartus terminus $\frac{1}{c}$ quaeritur c quam sic inveniemus scribendo: $\frac{1}{b} - \frac{1}{B \sqcap a} - \frac{1}{A \sqcap 2a - b}$

3 nominatores erg. $L = 5$ f. extremorum (1): Et quoniam b et a pro arbi (2). (a) Divisis omnibus per ab , fiet: $\frac{1}{ab^2} - \frac{1}{a^2b} - \frac{1}{2a^2b - ab^2}$. Sit (aa) quartus (bb) continuatae huius progressionis quartus, vel vel
 $\frac{1}{AB^2} - \frac{1}{A^2B}$
 $\frac{1}{c}$, appellando secundum $\frac{1}{AB^2}$. et tertium $\frac{1}{A^2B}$, fiet quartus $\frac{1}{2A^2B - AB^2}$ et $c \sqcap 2A^2B - AB^2$. Hinc $A \sqcap \frac{a^2b}{B^2}$. et $A^2 \sqcap \frac{a^4b^2}{B^4}$. et $A^2 \sqcap \frac{2a^2b - ab^2}{B}$. fiet $B^3 \sqcap \frac{a^3b}{2a - b}$. Ergo $\frac{b}{2a - b}$ debet esse cubus. Quod praestabitur si ponatur $a \sqcap 1$. et $b \sqcap 1$. erit enim $\frac{b}{2a - b} \sqcap 1$. qui primus est casus, et oritur progressio harmonica prima 1.1.1. (aaa) Aliter (bbb) Proximus (aaaa) gradus (bbbb) casus est, ut ponendo $b \sqcap 1$. fiet $a \sqcap 5$. et fiet: $\frac{1}{5} - \frac{1}{25} - \frac{1}{45}$ etc. sive omnia multiplicando per $ab \sqcap 5$, fiet $\frac{1}{1} - \frac{1}{5} - \frac{1}{9} - \frac{1}{15}$ etc. (b) Medium L scribendo erg. L

6 f. Medium ... $b \sqcap \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{c}}$: vgl. N. 55 S. 733 Z. 16.


$\frac{1}{c \sqcap 2A - B}$. Fit enim quartus ex secundo et tertio, ut tertius ex primo et secundo, ergo inserendo valores A et B in valore c , fiet $c \sqcap 4a - 2b, -a \sqcap 3a - 2b$. Fiet ergo progressio harmonica: $\frac{1}{b} \frac{1}{a} \frac{1}{2a-b} \frac{1}{3a-2b} \frac{1}{4a-3b}$ etc. id est eius termini sunt fractiones, quorum nominatores sunt progressionis arithmeticæ incipientis a b . et continue crescentis, differentia $a - b$. Unde patet etiam omnes possibles progressiones harmonicas enumerari posse, quia a . et b . sumi possunt pro arbitrio, modo a , maior quam b . Deinde sequitur hinc progressionem numerorum integrorum harmonicorum non posse continuari in infinitum. Nam ut in integris exhibeatur progressio harmonica reducenda sunt fractiones ad communem denominatorem. Quo abieco habebuntur numeri progressionis harmonicae integri. Sed patet eos longe alios fieri, prout aliis atque aliis sumuntur denominator. Alius autem aliis oritur denominator, quando aliae atque aliae sumuntur fractiones, quod fit, quando nunc plures nunc pauciores fractiones assumuntur. Hinc difficultimae tractationis haec progressio est, ob continuam variationem, ut tamen in eius naturam in integris per compendiosas inductiones inquirere possimus, operaे pretium erit, incipere ordine enumerare omnes series integrorum harmonicorum finitas, quae ex infinita unica fractionum $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{5}$ etc. fieri possunt. Ex primo fit 1. ex duabus primis, invento et abieco communi denominatore, 2.1. ex tribus primis, 6.3.2. expressa in tabula adiecta per \odot , ex quatuor primis, 24.12.8.6. expressa in tabula adiecta per \oslash . Atque ita continuari tabula intellige inquisitis cuiuslibet seriei differentiis, et differentiarum differentiis, ut factum vides. Eumque in finem n o t a n d a , tabulae subscripta, consulantur.

series harmonica	$\frac{1}{1}$
$\frac{1}{1} \frac{1}{2}$	$\frac{1}{1}$
$\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{2}$	$\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{6} \frac{3}{2}$
$\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{6} \frac{3}{2}$	$\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{6} \frac{3}{6} \frac{2}{6}$
diff. 1.	\odot
$\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{6} \frac{3}{2}$	$\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{6} \frac{3}{6} \frac{2}{6}$
diff. 2.	\oslash

14 incipere erg. L
fractionem (2) 2.1. ex L

16 invento et erg. L

17 denominatore, (1) et reducendo ad unam



Notanda in tabula

- Differentiae sunt, primi secundi tertii gradus quae includuntur rectis *aa*, (*a*)*(a)* etc.
 Incrementa primi secundi tertii gradus quae includuntur rectis *bb*, (*b*)*(b)* etc.
 Decrementa primi secundi tertii gradus quae includuntur rectis *cc*, (*c*)*(c)* etc.
 Differentiae incrementa, decrementa, simpliciter, significant ea quae primi gradus. 5
 In progressione harmonica termini decrementis differentiae primae, incrementis se-
 cundis, 2^{dae} tertii coincidunt, sive generaliter, series horizontales coincidunt obliquis
 decrementalibus, in progressione harmonica.
- Difficile foret a priori invenire progressionem quae hoc praestaret, si nesciremus esse
 harmonicam. 10
- In serie qualibet incrementalis termini ab extremis aequidistantes coincidunt.
- Continuatio tabulae per series, seu progressio progressionum harmonicarum sive se-
 rierum. Series sequens quaesita fiet ex praecedente, si ultimus praecedentis, fiat primus
 sequentis, et reliqui sequentis, sint omnes praecedentis per suum ordinalem numerum
 naturalem ordine seriei quaesitae respondentem, multiplicati, ut ⊕ est tertia in ordine,
 adeoque naturalis ei respondens, sive ordinalis eius, 3. Primus eius terminus est 2. maxi-
 mus seriei praecedentis, sequentes, 3.6. sunt facti ex terminis seriei praecedentis, 1.2. in
 o r d i n a l e m seriei quaesitae, 3. 15
- Continuatio tabulae per incrementa, seu progressio progressionum incrementalium,
 sive incrementorum harmonicorum. Primus et ultimus (coincidentes) iam habentur, sunt
 enim iidem cum primo termino seriei seu ultimo seriei praecedentis. Reliqui sic fient.
 Incrementalium praecedentis seriei primus multiplicetur per 1. secundus per 2. tertius per
 3. etc. et ita in medium usque ab utroque enim extremo fit idem. Ita series incrementalis
 ♀, nempe ⟨24.6.⟩4. sic fiet. 24. terminus seriei primus (est semper factus ⟨—⟩ ⟨om⟩nium
 ordinalium), reliqui ex ⟨—⟩ ⟨prae⟩cedentis, 6.2. per 1.2. ordine multiplicatis. 20
 25
- Quoniam autem incrementorum progressionem invenimus, non est opus nunc quidem
 tabulam longius continuari, nam incrementa videntur simplicioris esse naturae, quam
 ipsae series, adeoque supererit ut inquiramus in progressionis incrementorum proprietata-

2 (1) Tabula facile continuari poterit, si (2) Differentiae *L* 2 includuntur (1) lineis, (2) rectis *L*
 5 decrementa, (1) intellige (2) simpliciter *L* 10f. harmonicam. (1) Continuatio tabulae: (2) In *L*
 13 quaesita erg. *L* 13 si (1) primus (2) ultimus *L* 14 suum ordinalem erg. *L* 15 quaesitae
 erg. *L* 24f. ⟨om⟩nium (1) naturali (2) ordinalium *L* 25 ex (1) terminis seriei | increment⟨—⟩
 erg. | ⟨—⟩ ⟨prae⟩cedentis, ordine, (2) ⟨—⟩ ⟨prae⟩cedentis *L*

tes. Nam quando series quaedam tractatur, utile est quaeri eius differentias, et differentias differentiarum, et differentias tertias, seu quas ipsae habent differentiae differentiarum, idque tamdiu, donec vel ultimae differentiae sint 0. et habemus quaesitum, hoc enim sufficit ad naturam progressionis propositae investigandam, ita enim et aequatione potest exprimi, et summae terminorum possunt inveniri, quae sunt primaria in qualibet progressionе quaesita. Vel differentiae nunquam evanescunt quamdiu termini suppetunt, et tunc inquirendum est in seriem incrementorum, vel decrementorum; illorum, si series ab initio proposita in infinitum crescere potest, horum, si in infinitum potest decrescere: utrorumque, si finita est. Hoc loco differentias nunquam exhaustum iri patet nisi cum terminis, et series proposita harmonica finita est, adeoque incrementorum simul et decrementorum series, examinanda, quae utraque etiam finita, sed aequidiuturna cum ipsa serie terminorum, imo series decrementorum mirabili sane proprietate coincidit cum serie terminorum.

Superest ergo tantum examinanda series incrementorum separatim; quoniam enim eius naturam ac progressionem certa quadam regula invenimus, sola per se incrementa iam novam tabulam possumus quaerere, extra tabulae superioris continuationem.

$$\begin{array}{r}
 & & 1 \\
 & & \overline{1 \quad 1} \\
 & & 0 \\
 \hline
 & 2 & 1 & 2 \\
 & -1 & 1 \\
 & 2 \\
 \hline
 & 6 & 2 & 2 & 6 \\
 & -4 & \cancel{0} & +4 \\
 & +4 & +4 \\
 & 0
 \end{array}$$

2 differentiarum, et (1) differentiae quam ipsae (1) differentias (a) secundas seu (b) tertias L
 3 vel (1) incideamus in (2) ultimae $L = 6$. Vel (1) nulla inveniri potest differentia (2) diff (3) differentiae $L = 6$ quamdiu ... suppetunt erg. $L = 7$ f. decrementorum; (1) si pro (2) illorum, si series | (a) pro data (b) ab initio proposita erg. | in $L = 9$ f. nisi ... terminis erg. $L = 11$ utraque erg. L

$$\begin{array}{ccccccc}
 24 & & 6 & \diagup 4 & & 6 & 24 \\
 & -18 & & -2 & & 2 & 18 \\
 & 16 & & 4 & & & 16 \\
 & & -12 & & 12 & & \\
 & & & & 24 & &
 \end{array}$$

5

$$\begin{array}{ccccccc}
 120 & 24 & 12 & 12 & 24 & 120 \\
 -96 & -12 & 0 & 12 & 96 \\
 +84 & +12 & +12 & 84 \\
 \hline
 -72 & 0 & 72 & 72 \\
 & 72 & 72 \\
 & & 0
 \end{array}$$

10

$$\begin{array}{ccccccc}
 720 & 120 & 48 & 36 & 48 & 120 & 720 \\
 -600 & & -72 & -12 & 12 & 72 & \\
 +528 & & +60 & & 24 & 60 & 528 \\
 \hline
 -468 & & -36 & & 36 & 468 & \\
 \hline
 432 & [72] & 432 & & & & \\
 \hline
 [-360] & [360] & & & & & \\
 & [720] & & & & &
 \end{array}$$

15

25

18 0 L ändert Hrsg. 19 432 L ändert Hrsg. zweimal 20 0 L ändert Hrsg. 23 360 L
 ändert Hrsg. 24 3960 L ändert Hrsg. 24 264 L ändert Hrsg. 25 3696 L ändert Hrsg.

Hic illud primum notabile est (ut in triangulo arithmeticō), quod idem ab utraque extremorum parte diverso.

Calculo producitur:

ut	6	2	2	6
	1	2	3	4 per
24	6	4	6	24
	1	2	3	4 5 per
120	24	12	12	24 120

Notandae, et differentiae negativae, quae hic occurrunt.

Caeterum quoniam differentiae incrementorum ad magnos denique numeros ascen-
10 dunt, non est cur sic pergamus. Et referenda huc quae alibi calculavi, ubi certa quadam ratione differentiae exhaūsiri videbantur.

In omni progressionē harmonica, ut $\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \frac{1}{9}, \frac{1}{10}$ excerpti per intervalla aequalia sunt etiam harmonici, ut $\frac{1}{2}, \frac{1}{5}, \frac{1}{8}, \frac{1}{11}$ etc.

Quare idem est et in integris, quando fractiones ad communem denominatorem re-
15 ducuntur.

14 f. *Nebenbetrachtung, gestrichen:*

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \sqcap \frac{\textcircled{2}, \frac{1}{3}}{\frac{1}{1} + \frac{1}{3}} \text{ seu } 1 \sqcap \frac{\textcircled{2}, 2, \frac{1}{3}}{\frac{3,1}{1} + \frac{1,1}{1}} \sqcap 4 \\ \frac{1}{3} \sqcap \frac{\textcircled{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{4}} \sqcap \frac{\textcircled{2}, \frac{1}{1}, \frac{1}{5}}{\frac{1}{1} + \frac{1}{5}}. \text{ Ergo } \cancel{\frac{\textcircled{2}}{3}} \sqcap \cancel{\frac{\textcircled{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{4}}} + \cancel{\frac{\textcircled{2}, \frac{1}{1}, \frac{1}{5}}{\frac{1}{1} + \frac{1}{5}}} \text{ et } 3 \sqcap \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{4}}{\frac{1}{2}, \frac{1}{4}} (?) \\ \left(\sqcap \frac{\frac{4}{1} + \frac{2}{1}}{2} \right). \text{ Reducendo ad unum numeratorem } \frac{1}{3} \sqcap \frac{1}{4+2} + \frac{1}{5+1} \sqcap \frac{2}{6} \end{aligned}$$

14 integris, | ut arbitror *gestr.* | quando *L*

10 alibi calculavi: vgl. N. 22 Teil 2.

[Teil 2]

Summae progressionum finitarum omnium quarum
formulae rationales aequabiles, licet fractae.
Quod hactenus nemo.

Cum diu laborassem frustra in summis reciprocarum progressionum, seu fractionum, investigandis, tandem subito lucem quandam hausit. Diu constabat mihi ex Mercatoris methodo posse appropinquando exhiberi summam terminorum harmoniae finitorum, id enim cum hyperbolae quadratura in numeris propinquis exhibita, coincidit, sed nondum appropinquationis ope ad exactam summam quaesitam veniri posse cogitaveram. Quod nuper in mentem venit, et nunc explicabo.

Nam sit: $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{6} \frac{1}{7}$ etc. seu

$$\frac{1}{1} - \frac{0}{1} + \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{1} - \frac{2}{3} + \frac{1}{1} - \frac{3}{4} + \frac{1}{1} - \frac{4}{5} + \frac{1}{1} - \frac{5}{6} + \frac{1}{1} - \frac{6}{7}$$
 etc. seu
 $7, -\left(\underbrace{\frac{0}{1} + \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{5}{6} + \frac{6}{7}}_{\odot}\right)$. Ergo si series \odot inveniatur invenietur et \odot , nam $\odot \sqcap 7 - \odot$.

5

10

10

15

3 Am Rande: Aequabiles formulae, quae aequationem certi gradus seu lineam non transcendentem dare possunt.

2–4 Summae progressionum (1) formularum ra (2) finitarum ... rationales | aequabiles erg., licet ... nemo erg. $L = 5$ reciprocarum | arithm erg. u. gestr. | progressionum $L = 6$ f. Mercatoris (1) regul (2) methodo $L = 8–10$, sed ... explicabo erg. L

11 etc. (1) seu (2) seu $1 - \frac{2}{1} + 1 - \frac{3}{2} + 1 - \frac{4}{3} + 1 - \frac{5}{4} + 1 - \frac{6}{5} + 1 - \frac{7}{6} +$
 $1 - \frac{8}{7}$ (3) seu L

6f. ex Mercatoris methodo: N. MERCATOR, *Logarithmotechnia*, 1668, prop. XV S. 29f. [Marg.], entwickelt $\frac{1}{1+a}$ durch fortgesetzte Division in die Reihe $1 - a + a^2 - a^3 + a^4$ etc.

Fractionum in \odot contentarum numeratores, 0.1.2.3. etc. appellemus y . erit $\odot \sqcap$
 $\frac{y}{1+y} + \frac{(y)}{1+(y)}$ etc. Iam $\frac{y}{1+y} \sqcap y - y^2 + y^3 - y^4 + y^5 - y^6 [+y^7 - y^8 + y^9 - y^{10}]$ etc.

Et quanquam hoc modo subtrahenda addendis maiora, si in infinitum continuetur
 5 series potentiarum; attamen si appropinquatio tantum quaeratur non est opus iri in infi-
 nitum; sed finiri potest in potentia affirmativa, adeoque et series tota harum potentiarum
 $y - y^2 + y^3 - y^4 + y^5$ erit affirmativa seu nihilo maior et continuari poterit, donec ab $\frac{y}{y+1}$
 minus differat quam aliqua quantitas data. Iam si idem fiat in singulis y , habebimus:

$$\begin{aligned} y \sqcap 1 & \quad \frac{y}{1+y} & \text{¶ } y - y^2 + y^3 - y^4 + y^5 \\ y \sqcap 2 & \quad \frac{(y)}{1+(y)} & \text{¶ } (y) - (y)^2 + (y)^3 - (y)^4 + (y)^5 \\ 10 \quad y \sqcap 3 & \quad \frac{((y))}{1+((y))} & \text{¶ } ((y)) - ((y))^2 + ((y))^3 - ((y))^4 + ((y))^5 \\ & \text{etc.} & \text{etc.} & \text{etc.} & \text{etc.} & \text{etc.} \\ y \sqcap 100 & \frac{\overbrace{(100(y)_{100})}^{\text{100 Klammern}}}{1+\overbrace{(100(y)_{100})}^{\text{100 Klammern}}} & \text{¶ } \overbrace{(100(y)_{100})}^{\text{100 Klammern}} - \overbrace{(100(y)_{100})}^{\text{100 Klammern}}^2 + \overbrace{(100(y)_{100})}^{\text{100 Klammern}}^3 - \overbrace{(100(y)_{100})}^{\text{100 Klammern}}^4 + \overbrace{(100(y)_{100})}^{\text{100 Klammern}}^5 \end{aligned}$$

Iam haberi potest nullo negotio, summa omnium y . seu 1.2.3. etc. ab 1 ad 100
 et omnium y^2 seu 1.4.9. etc. ab 1 ad 100^2 , et ita quoque cuborum etc. Cum ergo in
 15 singulis aequationibus eousque produci possint potentiae, ut sit error minor dato, poterit

8–12 Am Rande: \sqcap maior. Et ¶ est paulo maior.

2 f. $-y^6 | -y^7 + y^8 - y^9 + y^{10}$ ändert Hrsg. | etc. (1) Iam quia numerum ipsarum y supponimus esse finitum, haberi potest in numeris $\int y$ | seu sum. omnium y erg. |, (et $\int y^2$ et $\int y^3$, et sum. y^4 etc. Unde sequitur, (2) Sed quoniam hoc modo subtrahenda addendis maiora, ideo aliter procedemus (3) Et $L = 3$ maiora, (1) si (2) cum y sit integer, (3) si $L = 4$ potentiarum erg. $L = 4$ si (1) in affirma (2) subsistatur in po (3) appropinquatio $L = 7$ Iam | si streicht Hrsg. | si $L = 13$ seu ... etc. erg. L

12 $\frac{\overbrace{(100(y)_{100})}^{\text{100 Klammern}}}{1+\overbrace{(100(y)_{100})}^{\text{100 Klammern}}}$: Die Symbole bedeuten die Anzahl der Klammern. Die Bezeichnungsweise ist

nicht völlig in Übereinstimmung mit der linken Spalte. Um Konsequenz zu erzeugen, müßten entweder einfache Klammern bereits in Z. 8 oder 99 Klammern in Z. 12 stehen.

in singulis error tam fieri parvus, ut et in summa sit minor dato. Et ita habebitur summa

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \text{etc.} + \frac{1}{100} \text{ quantitate quantumlibet verae propinqua.}$$

Sed hic video erratum, quia enim y est integer, hinc tantum abest, ut continuando appropinquemus, ut contra quo longius continuamus, hoc longius absit error a vero.

Huic malo elegans remedium inveni, ponendo $y \sqcap \frac{1. \text{ vel } 2. \text{ vel } 3.}{1000,000 \text{ etc.}}$ ita, ut id quod unitas

5

erat, sit pars $\frac{1}{1000,000^{\text{ma}}}$, quantitatis alterius quae ipsam vicibus tot continet. Quod semper in problemate dato effici potest. Et ita postremae potestates negligi poterunt, et appropinquabimus pro libitu.

Habemus ergo viam exhibendi quantitatem, quae a summa reciprocorum arithmeticæ progressionis differat minus quam quantitas data. Haec quantitas sit:

10

$\frac{z \text{ quantitas verae appropinquans}}{1000,000,000,000,000,000}$ seu $\frac{z}{1000^6}$. Quia ivimus ad y^5 . eritque z . integer. Iam

idem $\sqcap \frac{\text{integris } \sqcap v}{1.2.3. \text{ etc. } 100.1000,000}$ erit $\frac{z}{1000^6} \sqcap \frac{v}{1.2.3. \text{ etc. } 100.1000^2}$.

Error autem ponatur minor quam $\frac{1}{1000^2}$, seu $v \sqcap \frac{z.1.2.3. \text{ etc. } 100}{1000^4} + \frac{1}{1000^2}$, seu
si omnia rursus per 1000^2 multiplicata intelligamus, per quae ante diviseramus, $v \sqcap \frac{z.1.2.3. \text{ etc. } 100}{1000^2}$ et $v \sqcap \frac{z.1.2.3. \text{ etc. } 100}{1000^2} + 1$.

15

Et numerus integer cadens inter hos duos ipsius v valores, (qui non nisi unus esse potest, quoniam non nisi unitate differunt) erit quaesitus. Is vero numerus statim reperi-

5 f. Zusatz s. S. 729 Z. 22 – S. 730 Z. 15

3 hic | rursus *gestr.* | video $L = 11$ integer (1), reductis (2). Iam $L = 13$ Error (1) ergo ponatur inventus minor quam 1, (2) autem $L = 15$ f. +1. (1) Debet maximus numerus integer cadens inter hos duos, esse quaesitus (2) Et $L = 17$ quaesitus. (1) Sed illud agitur (2) Is L

11–726,5 $\frac{z \text{ quantitas verae appropinquans}}{1000,000,000,000,000}$... potest: vgl. N. 55 S. 732 Z. 7–9

tur fractionem quantumlicet ad integros reducendo. Quare res eo tandem redit tantum,
ut inveniendus sit numerus maximus integer in $\frac{z \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \text{etc. } 100}{1000^2}$ contentus, eique addenda

unitas; is enim maior quam $\frac{z \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \text{etc. } 100}{1000^2}$, et minor quam $\frac{z \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \text{etc. } 100}{1000^2} + 1$. Satisfacit
ergo, et solus, satisfacit, quia inter duas quantitates sola unitate differentes plus quam
5 unus integer consistere non potest.

Adeoque infallibiliter habebimus exactam et veram progressionis harmonicae propositae finitae, summam.

Hoc iam inventum immensos pariter in geometria et arithmetica habere usus, paucis
ostendam. Ac primo hinc dabitur summa omnium serierum, quae ex huius seriei terminis
10 affirmatis negatisque componunturque, quales sunt plurimae, ut:

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} \text{ etc. vel } 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} \text{ etc. quarum prior exhibit}$$

quadraturam hyperbolae, posterior circuli. Et hinc iam reperta est via per quam solis
numerorum additionibus, mira facilitate veniri poterit, ad appropinquationem, etiam si
quis velit Ludolphina exactiorem. Idque admoneri operae pretium erit in mea *Quadratura*

15 *arithmetica*. Iam $\frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11}$ etc. etiam sic poterunt exprimi, $\frac{2}{3} + \frac{2}{35} + \frac{2}{99}$

etc. sive: $\frac{2}{2^2 - 1} + \frac{2}{6^2 - 1} + \frac{2}{100^2 - 1}$ etc. quorum denominatores duplorum ab imparibus
quadrata unitate minuta.

Si naturales y . erunt pares $2y$. impares, $2y - 1$, eorum dupli, $4y - 2$, et horum quadrata,
16 $y^2 - 16y$ $\begin{pmatrix} +4 \\ -1 \end{pmatrix}$ + 3. Ergo omnium $\frac{1}{16y^2 - 16y + 3}$ haberi potest summa; videndum an
20 non hoc modo datae cuiuslibet, $\frac{1}{b^2y + cy + d}$ haberi possit summa, verum quia iam scio,
non posse hoc modo haberi summam huius $\frac{1}{y^2 + 2cy + c^2}$. Ideo ut hanc formam exclu-

4 differentes (1) una maior (2) plus L 16 f. imparibus (1) radices (2) quadrata L

14 Ludolphina: LUDOLPH van Ceulen, *Vanden Circkel*, 1596; seine beste Approximation überliefert
W. SNELL, *Cyclometricus*, 1621, S. 55. 14 f. *Quadratura arithmeticæ*: vgl. *LQK*, Scholium zu prop.
XXXII S. 80.

damus, ideo quaeramus tantum huiusmodi seriei summam $\frac{1}{z^2 + d}$. Semper enim ad eam reduci potest formula, ubi si d extet, non potest comprehendendi $y^2 + 2cy + c^2$. Sit ergo numerorum arithmeticæ progressionis undecunque incipientium, forma, $fy + g$. sit differentia, e , erit terminus harmonicae progressionis, $\frac{1}{fy + g}$. et $\frac{1}{fy + g} - \frac{1}{fy + fe}$ debet aequari
 $+ g$

5

$\frac{h}{z^2 + d}$ fiet: $\frac{(fy) + fe(+g)(-fy)(-g)}{f^2y^2 + 2fgy + g^2}$ et $h \sqcap fe$. Potest autem h fieri qualem velimus, nec
 $+ f^2e . + feg$

nos turbat. Porro $fy \sqcap z$. $2g + fe \sqcap 0$. seu $fe \sqcap -2g$. et $g^2(+feg) - 2g^2 \sqcap d$. sive

$g \sqcap \sqrt{-d}$. Ponamus $-d \sqcap D$. erit $d \sqcap -D$. Ergo $g \sqcap \sqrt{D}$. $e \sqcap \frac{\pm 2\sqrt{D}}{f}$ et $y \sqcap \frac{1}{f}z$. Ergo
 quaelibet fractio quadraticæ huius formæ $\pm \frac{2\sqrt{D}}{z^2 - D}$ exprimi poterit terminis progressionis

10

harmonicae, huiusmodi: $\frac{1}{\frac{1}{f}z + \sqrt{D}}$ sed alternatim affirmatis et negatis. Videamus iam si

data sit forma: $\frac{1}{\frac{1}{f}x^2 + bx + c}$. quae cum hac: $\frac{1}{z^2 - D}$. comparari possit: Sit $z \sqcap x + l$. fiet

$\frac{1}{f}z^2 - D \sqcap \frac{1}{f}x^2 + \frac{2l}{f}x + l^2$. ergo $\frac{l}{f} \sqcap \frac{b}{2}$ et $D \sqcap l^2 - c$. et erit $f \sqcap \frac{2l}{b}$. Data ergo forma:

 $-D$

$\frac{\pm 2\sqrt{l^2 - c}}{\frac{b}{2l}x^2 + bx + c}$. erit harmonica eius $\frac{1}{+\frac{b}{2l}x + \sqrt{l^2 - c}}$. Eodem modo et formularum fracta-

15

 $+\frac{b}{2}$

3 sit (1) unitas $\sqcap e$ (2) differentia L 9 erit ... $g \sqcap \sqrt{D}$. erg. L 10 quaelibet (1) formul (2)
 fractio quadraticæ (a) reduci potest ad differentiam (b) huius L 10 poterit (1) differentia duarum
 (a) harmo (b) harmonicarum (2) terminis L 15 modo (1) formulae (2) fractionum cubicarum et
 quadraticarum (3) et L

rum ad cubum aut [quadratoquadratum] assurgentium haberi poterunt summae, vel eodem magis, nimirum tres harmonicas addendo subtrahendoque a se invicem. Quin imo poterunt additiones misceri subtractionibus, item series addendae aut subtrahendae antea multiplicari. Videntur tamen haec irrelevantia, seu varietatem arbitrariarum non auctura.

- ⁵ Sed verbo: Maxima varietas in eod fingi potest, ut faciamus:

$\frac{qy + b}{fy + g} + \frac{ry + c}{ly + m} (\dagger) \frac{sy + d}{ny + p}$ etc. quot scilicet opus ad formulam conficiendam proposita similem, cuius summa quaeritur, dum scilicet omnes hae ad communem denominatorem reducuntur. Unde si formula sit $\frac{y^3 + \alpha y^2 + \beta y + \gamma}{\delta y^3 + \varepsilon y^2 + \theta y + \lambda}$, poterit huiusmodi progressionis iniri summa: dum ostendetur summae trium praecedentium harmonicarum, vel ab harmonicis cognita quantitate differentium aequari.

Quanquam et singularum partium iniri possunt summae, ut separatim portio:

$\frac{y^3}{\delta y^3 + \varepsilon y^2 + \theta y + \lambda}$ quae rursus resolvi potest in has duas: $\frac{1}{\delta} - \frac{\frac{\varepsilon}{\delta}y^2 + \frac{\theta}{\delta}y + \left[\frac{\lambda}{\delta}\right]}{\delta y^3 + \varepsilon y^2 + \theta y + \lambda}$. Quam rursus dissolvamus in partes tres, secundum $y^2.y.\left[\frac{\lambda}{\delta}\right]$ et tribus residuis partibus prioris

$$+ \alpha y^2 + \beta y + \gamma \quad + \alpha y^2$$

$$- \frac{\varepsilon}{\delta} \cdot - \frac{\theta}{\delta} \cdot - \left[\frac{\lambda}{\delta}\right] \quad + \frac{\varepsilon}{\delta} \cdot$$

addamus, fient: $\frac{- \frac{\varepsilon}{\delta} \cdot - \frac{\theta}{\delta} \cdot - \left[\frac{\lambda}{\delta}\right]}{\delta y^3 \text{ etc.}}$. Ex his rursus excerptendo: $\frac{\delta y^3 + \varepsilon y^2 + \theta y + \lambda}{\delta y^3 + \varepsilon y^2 + \theta y + \lambda}$.

Singulorum separatis methodo eadem iniri possunt summae, sed satius arbitror sine di-
vulsione priori methodo insisti. Interea hinc excipiendi casus $\frac{1}{y^2}$. et $\frac{1}{y^3}$. etc. qui hoc modo
tractari non possunt, quia tunc $l^2 - c \sqcap 0$. Huic rei duplex remedium circumspicio; pri-
mum, quod eodem modo cum quadratis, cubis aliisque formis agi potest, quo ab initio pa-
ginae praecedentis, cum ipsis harmonicis egimus. Et hoc est remedium generale omnium

1 quadratoquadratoquadratum L ändert Hrsg. 3 subtractionibus (1) (videtur tamen haec ineve
 (2), item L 12 $\frac{y^3}{\delta y^3 + \varepsilon y^2 + \theta y + \lambda}$ (1) | fiet: streicht Hrsg. | $\sqcap \frac{1}{\delta}$, (2) quae L 12 λL ändert
 Hrsg. 13 $y^2.y.$ $|\lambda$ ändert Hrsg. | (1) numeratoris, et (2) et L 15 λL ändert Hrsg.

19 f. ab ... praecedentis: s. o. S. 723 Z. 5

formularum; alterum est, ut sumamus formulas illas quarum tam finitarum quam infinitarum per regulas aliunde notas datur summa, nempe $\frac{1}{y \wedge y + 1}$ et $\frac{1}{y \wedge y + 1 \wedge y + 2}$ et
 $\frac{1}{y \wedge y + b \wedge y + 2b \wedge y + 3b}$ aliaeque tales nempe quarum nominatores sunt numeri combinatorii; imo una cum integris y . vel y^2 . y^3 . etc. in unum, aut ad harmonicas addantur; ita enim ex additione tot serierum, quarum singularum habetur summa, poterit credo cuilibet formulae rationi fractae vel ex integris fractisque utcunque mixtae, similis exhiberi. Imo quoniam numeri triangulares aliique figurati sive combinatorii sunt differentiae harmonicorum; poterunt et investigari differentiae quadratorum vel cuborum etc. ab harmonicis, unde novae formae facile summabiles. Ope ergo harmonicorum, quos arithmeticē summa(mus) et aliorum quales triangulares et pyramidales etc. quos summamus analyticē, additis si opus integris, non dubito formulas alias omnes excitari posse. Unde illud commodum habebimus, ut calculatis semel per tabulam harmonicorum summis, omnes aliae summae perfacile inveniantur per traditam tabulam analyticā, quae generaliter usum tabulae harmonicae in caeteris ostendat. Tabula harmonica, si condenda sit, hoc fieri posset per logarithmos; dum scilicet omnes multiplicationes tot numerorum, quibus opus in harmonicis, ope logarithmorum contraherentur facilius ope ingentis instrumenti in quo descripta hyperbola. Omnium optime si regulam analyticā adhuc inveniam pro summis harmonicorum. Caeterum et aliae ⟨— —⟩ demonstrationes hic resumenda, quibus videbar probare, ex datis harmonicis inveniri posse summam quadratorum finitorum ⟨— —⟩

5

10

15

20

[Zusatz zu S. 725 Z. 5f.]

Corrigendum hic aliquid scilicet quia y est fractio, ut $\frac{x}{1000}$, hinc $\frac{y}{1+y}$ foret $\frac{x}{1000+x}$
etc. Rectius ergo sic: Sumamus $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3}$ etc. faciamus: $\frac{1000}{1000-0} \frac{1000}{1000-1} \frac{1000}{1000-2}$ et con-

3 tales (1) infinitum; una cum inte (2) nempe (a) combi (b) quarum L 23 $\frac{1}{3}$ etc. (1) | multi-
plicemus streicht Hrsg. | super et infra per 1000, fiet $\frac{1000}{1000+0} \frac{1000}{1000+1}$ (2) faciamus L

22–730,15 Corrigendum . . . quaeritur: vgl. N. 55 S. 731 Z. 18 – S. 732 Z. 6.

tinuando usque ad $\frac{1000}{1000 - 1000 \sqcap 0}$ sive fient $\frac{1}{1 - \frac{1}{1000}}$ $\frac{1}{1 - \frac{2}{1000}}$ etc. usque ad $\frac{1}{1 - \frac{1000}{1000}}$

id est $\frac{1000}{1000} \frac{1000}{999} \frac{1000}{998}$ etc. usque ad $\frac{1000}{1}$. Quam progressionem facere possumus ex or-

dinaria: $\frac{1}{1000} \frac{1}{999} \frac{1}{998}$ etc. per $\langle 1000 \rangle$ multiplicata. Et ita ex data hac et ordinariae

summam habebimus. Et ob $1 - \frac{1}{1000}$ potentiae dividendo non alternis addentur et sub-

5 trahentur, sed semper addentur. Si ergo addendi sint termini 144 verbi gratia, tunc loco 1000 adhibendi 144. Possemus tamen semper \langle per \rangle 1000, et similes procedere, hoc modo.

Volumus summam inire huius seriei $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3}$ etc. $\frac{1}{144}$. Fingamus nos inire velle usque

ad $\frac{1}{1000}$ et incipiendo a $\frac{1000}{1 - \frac{x}{1000}}$ etc. seu $\frac{1000}{1 - \frac{1}{1000}} \frac{1000}{1 - \frac{2}{1000}}$ progrediamur usque ad

$\frac{1000}{1 - \frac{856}{1000}}$ et ineamus summam, deinde procedamus etiam alio calculo ab $\frac{1000}{1 - \frac{1}{1000}}$ us-

10 que ad $\frac{1000}{1 - \frac{1000}{1000}}$ et unam summam ab altera subtrahendo habebimus summam horum,

$\frac{1000}{144} \frac{1000}{143}$ etc. $\frac{1000}{1}$ quae quaerebatur. Pulcherrimum est specimen, et forte in aliis utile futurum reducendi calculum alioqui difficultatum, ob numeros multiplicandos, ad decimalem. Et hoc usui haberemus, quod una pars calculi, nempe incipiendo ab $\frac{1000}{1 - \frac{1}{1000}}$

usque ad $\frac{1000}{1 - \frac{1000}{1000}}$ serviet pro exemplis omnibus; et altera tantum variaretur, pro om-

15 nibus inquam exemplis, quando non amplius quam 1000 terminorum summa quaeritur.

1 f. $\frac{1}{1 - \frac{1000}{1000}}$ (1) sive dividendo (2) id L 12 reducendi (1) | rem streicht Hrsg. | al (2) calcu-

lum L

55. PROGRESSIONIS HARMONICAE PROPRIETAS

[Am oder kurz nach dem 8.] Februar 1676

Überlieferung: *LuT* Gesprächsaufzeichnung (Leibniz u. Tschirnhaus): LH 35 XII 1 Bl. 253.

Ca. 3/4 Bl. 2°. 1 S. auf Bl. 253 r°. Überschrift und Datum ergänzt. Datum links neben Z. 21 wiederholt. Am unteren Rand und auf der Rückseite Aufzeichnungen anderen Inhalts (Druck in einem späteren Band der Reihe). Ursprünglich bildete LH 35 II 1 Bl. 253 mit LH 35 XIII 1 Bl. 391 (*Tangentium calculus*, Cc 2, Nr. 00, Druck in einem späteren Band der Reihe) ein vollständiges Bl. 2°; der Text S. 733 Z. 18 wurde beim Zerschneiden des Blattes teilweise abgetrennt.

Cc 2, Nr. 1334 tlw.

5

10

Datierungsgründe: Die Gesprächsaufzeichnung bezieht sich mehrfach auf das auf den 8. Februar 1676 datierte Stück N. 54.

[Leibniz]

Pro gressio nis ha rmonica e proprie ta s et arithmetica e
summa naturali via de monstra ta accomodabilis et ad
alias summas.

Febr. 1676

$$\begin{array}{cccccc}
 \frac{100}{1-y} & y \sqcap \frac{1}{100} & & & & \\
 \frac{\frac{100}{0}}{1-\frac{1}{100}} + \frac{\frac{100}{1}}{1-\frac{1}{100}} + \frac{\frac{100}{2}}{1-\frac{2}{100}} + \frac{\frac{100}{3}}{1-\frac{3}{100}} & & & & & \\
 \hline
 \frac{100}{100-0} & \frac{100}{100-1} & \frac{100}{100-2} & \frac{100}{100-3} & \text{etc. } \frac{100}{100-99} & \\
 \frac{100}{100} & \frac{100}{99} & \frac{100}{98} & \frac{100}{97} & \text{etc. } \frac{100}{1} & \\
 \hline
 \frac{1}{1-\frac{1}{100}} \sqcap 1 + \frac{1}{100} + \frac{1}{100^2} + \frac{1}{100^3} + \frac{1}{100^4} \text{ etc.} & & & & &
 \end{array}$$

15

20

18–732,6 Vgl. N. 54 S. 729 Z. 22 – S. 730 Z. 15.

$$\begin{array}{cccccc}
 \frac{1}{1 - \frac{2}{100}} & \sqcap & 1 & + & \frac{2}{100} & + & \frac{4}{100^2} & + & \frac{8}{100^3} & \bullet \\
 \frac{1}{1 - \frac{3}{100}} & & 1 & & \frac{3}{100} & & \frac{9}{100^2} & & \frac{27}{100^3} & \bullet \\
 \hline
 \text{etc.} & & \bullet & & \bullet & & \text{etc.} & & \bullet & & \bullet \\
 \frac{100}{99} & & \frac{100}{99} + 1 & & 1 + \frac{1}{99} & & \frac{1}{100^5} + \frac{1}{100^7} + \frac{1}{100^9} \\
 5 & 1 + \frac{1}{99} & 2 + \frac{1}{99} & & 2 & & & & & & \\
 & & & 2 + \frac{1}{99} & & & & & & & \\
 v & \mathbb{P} & \frac{zc}{100^5} & . & v & \mathbb{P} & \frac{zc}{100^5} + 1. \\
 \frac{v}{c} & \sqcap & \frac{z}{100^5} & + & e. & \frac{v}{c} & \mathbb{P} & \frac{z}{100^5}. \text{ Ergo } \frac{v100^5}{c100^5} \mathbb{P} \frac{zc}{c100^5}. \\
 & & & & & \frac{v}{c} & \mathbb{P} & \frac{z}{100^5} + 1. & \frac{v100^5}{c100^5} [\mathbb{P}] \frac{zc}{c100^5} + 1.
 \end{array}$$

10 [Tschirnhaus mit Ergänzungen von Leibniz]

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} + \frac{1}{e}$$

9 \mathbb{P} L ändert Hrsg.

7–9 Vgl. N. 54 S. 725 Z. 11 – S. 726 Z. 5. — Die Bedeutung des Symbols \mathbb{P} erklärt Leibniz S. 724 Z. 16, entsprechend steht \mathbb{P} für „ein wenig kleiner“.

$$\begin{array}{rccccc}
 & & 1 & & 1 & \\
 & \frac{1}{a} & + & \frac{1}{b} & & 1 \quad 1 \\
 \frac{1}{1a} & + & \frac{2}{1a+(1)c} & + & \frac{1}{(1)c} & 1 \quad 2 \quad 1 \\
 \frac{1}{1a} & + & \frac{3}{2a+(1)d} & + & \frac{3}{1a+(2)d} & + & \frac{1}{(1)d} & 1 \quad 3 \quad 3 \quad 1 \\
 \frac{1}{1a} & + & \frac{4}{3a+(1)e} & + & \frac{6}{3a+(3)e} & + & \frac{4}{1a+(3)e} & + & \frac{1}{(1)e} & 5
 \end{array}$$

Pulcherrima progressio numerorum progressionis harmonicae.

$$\begin{array}{cccc}
 1 & 2 & 3 & 4 \\
 x & x+y & x+2y & \\
 x & x+y & x+2y & \text{sed sic naturalius}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
 \frac{a+[c]}{1} & & a+b & \\
 \frac{2a \mid a+c \mid 2c}{2} & & 2a+2b & \frac{3a+3c}{2} & \frac{3}{2} \\
 \frac{3a \mid 2a+c \mid a+2c \mid 3c}{3} & & 3a+3b & \\
 \frac{4a \mid 3a+c \mid 2a+2c \mid a+3c \mid 4c}{4} & & 4a+4b & \frac{10a+10c}{4} & \frac{5a+5c}{2} & \frac{5}{2}
 \end{array}$$

Modus progressionis arithmeticæ exprimendæ utilis ad inveniendas summas, et ideo
naturalis, sic utraque litera adhibita eodem modo componitur. 15

$$\text{Isoliert: } \frac{2ac}{a+c} \qquad \text{Am Rande, quer: } \frac{0}{1}$$

[Leibniz, am unteren Rand und auf LH 35 XIII 1 Bl. 391 r°]

$$\frac{1}{y^2} \quad \frac{1}{1, -2y + y^2}$$

1 f. Obere zwei Zeilen des linken Schemas erg. L 6 Pulcherrima ... harmonicae. erg. L
9 sed ... naturalius erg. L 10 b T ändert Hrsg. 14 f. Modus ... componitur erg. L

16 $\frac{2ac}{a+c}$: vgl. N. 54 S. 716 Z. 6 f.

56. EXPRESSIO QUANTITATIS PER SERIEM

[Ende April 1676]

Überlieferung: *L* Konzept: LH 35 XII 1 Bl. 9–10. 1 Bog. 2°. 1/4 S. auf Bl. 10 r° oben. Auf dem Rest des Bogens N. 57₂.

5

Cc 2, Nr. 1399

Datierungsgründe: N. 56 ist vor dem auf Ende April datierten N. 57₂ geschrieben und dürfte unmittelbar vorher entstanden sein. Das Wasserzeichen des Papiers ist für die Monate April bis Juli 1676 belegt.

Omnis quantitas exprimi potest hoc modo: $by^z + cy^\omega + dy^v$ etc. si opus est in infinitum. Ergo et curvae cuiuslibet ordinata eodem modo potest exprimi. Ergo summa omnium ordinatarum secundum omnes y . erit: $\frac{by^{z+1}}{z+1} + \frac{cy^{\omega+1}}{\omega+1} + \frac{dy^{v+1}}{v+1}$ etc. Si vero ordinata fuisset: $by^{z+\varphi} + cy^{\omega+\varphi} + dy^{v+\varphi}$ fuisset summa $\frac{by^{z+\varphi+1}}{z+\varphi+1} + \frac{cy^{\omega+\varphi+1}}{\omega+\varphi+1} + \frac{dy^{v+\varphi+1}}{v+\varphi+1}$. Ponamus iam potentias ipsarum y esse progressionis arithmeticæ, ut by^z $cy^{z+\omega}$ $dy^{z+2\omega}$ etc. erit summa: $\frac{by^{z+1}}{z+1} + \frac{cy^{z+\omega+1}}{z+\omega+1} + \frac{dy^{z+2\omega+1}}{z+2\omega+1}$. Si fuisset $by^{z+\varphi} + cy^{z+\omega+\varphi} + dy^{z+2\omega+\varphi}$ foret summa: $\frac{by^{z+\varphi+1}}{z+\varphi+1} + \frac{cy^{z+\omega+\varphi+1}}{z+\omega+\varphi+1} + \frac{dy^{z+2\omega+\varphi+1}}{z+2\omega+\varphi+1}$ sed difficile erit eruere rationem harum summarum, tametsi hoc unum forte generale dici possit, quod reductis omnibus ad communem denominatorem, si z et ω sint numeri integri, necesse est, nominatores, quippe factos numerorum progressionis arithmeticæ habere quandam mensuram communem. Nisi forte in continua tantum, 7.9.11. non possunt dividi per 1.3.5. ergo necesse est esse continuos vel continuorum multiplos.

10 et (1) aequationis (2) curvae *L* 18 progressionis (1) geometricæ (2) arithmeticæ *L*

57. DE PROGRESSIONIS HARMONICAE SUMMA

Die beiden Teilstücke stehen in engem inneren und äußereren Zusammenhang mit den Exzerpten aus Pietro Mengolis *Circolo*, 1672, die Leibniz vermutlich vor dem auf Ende April 1676 datierten Stück N. 57₂ angefertigt hat. Der erste Teil der Exzerpte (Cc 2, Nr. 1383 A) ist bisher nicht aufgefunden; erhalten sind der zweite Teil (Cc 2, Nr. 1383 B) und eine Beilage (Cc 2, Nr. 1384, Druck in einem späteren Band der Reihe). Die Notiz N. 57₁ verweist darauf, daß N. 57₂ bei den Exzerpten abgelegt war; sie ist auf Papier aus Hannoverscher Zeit geschrieben und möglicherweise anlässlich einer erneuten Auseinandersetzung mit dem Thema in *De cyclometria per interpolatione*, LH 35 II 1 Bl. 68–73, datiert 26. März 1679 (Druck in einem späteren Band der Reihe), entstanden.

5

57₁. PROGRESSIONIS HARMONICAE SUMMA

10

[Ende 1676 – Ende März 1679]

Überlieferung: L Notiz: LH 35 VIII 30 Bl. 73. 1 Streifen ca 5,4 x 10,9 cm. Unten Rißkante.

15 Zeilen auf B. 73^r°. Bl. 73^v° leer.

Cc 2, Nr. 1403

Datierungsgründe: s. o. Z. 6–9.

15

Progressionis harmonicae summa

Hanc, vide inventam a me primum et ascriptam sub finem schediasmatis in fol. cui titulus: *Arithmetica infinitorum et interpolationum figuris applicata et summa harmoniorum sub finem adiecta*. Aprilis. 1676.

Hoc schediasma collocavi apud *Excerpta ex Mengoli Circolo*.

20

17 sub finem schediasmatis: s. u. N. 57₂ S. 746 Z. 10 – S. 748 Z. 12. 20 *Excerpta ex Mengoli Circolo*: s. o. Z. 2–5.

57₂. ARITHMETICA INFINITORUM ET INTERPOLATIONUM

Ende April 1676

Überlieferung: L Konzept: LH 35 XII 1 Bl. 9–10. Ca 3 S. Obere Hälfte von Bl. 9 r° u. unteres
 Viertel von Bl. 10 v° leer. Auf dem Rest des Bogens N. 56.
 Cc 2, Nr. 1398, 1400, 1401

5

(Fine April. 1676)

Arithmetica infinitorum et interpolationum figuris
 applicata et summa harmonicorum sub finem adiecta

			<i>t</i>				
10	<i>a</i>		<i>r</i>		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	
	a^2	ar	r^2		$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$
	a^3	a^2r	ar^2	r^3	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$
	a^4	a^3r	a^2r^2	ar^3	r^4	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{20}$
	a^5	a^4r	a^3r^2	a^2r^3	ar^4	r^5	$\frac{1}{6}$
15				tab. I			
							tab. II

15 Zu tab. I:


NB.

Nota pro ar . posset sumi $\frac{a}{r}$ item pro $r \sqcap 1 - a$. sumi potest $a - 1$. item pro $\sqrt{.}$ sumi
 potest $\sqrt[3]{.}$ $\sqrt[4]{.}$ etc. denique praecedentium omnium reciprocae.

8 sub finem: S. 746 Z. 10 – S. 748 Z. 12. 15 tab. I: vgl. P. MENGOLI, *Circolo*, 1672, § 10–15
 S. 4–6 und die Quarta Tauola Triangolare S. 7; tab. II: a. a. O. § 9 S. 4.


	1				
	2	2			
3	6	3			
4	12	12	4		
5	20	30	20	5	
6	30	60	60	30	6

tab. III



5

10



[Fig. 1]

Sit trilineum $ARDCA$ duabus rectis AR, RD . et curva ACD . inclusum. Recta AR tota sit \underline{t} . Abscissa AB sit \underline{a} . Residua BR sit \underline{r} . Ordinata BC sit \underline{y} .

Si ponamus iam esse $y \sqcap t$. ut si pro figura $ARDCA$ erit quadratum $ARDE$. Si y sit $\sqcap a$ vel r , seu si ordinata BF sit $\sqcap AB$. pro figura $ARDCA$, erit triangulum semiquadratum ARD .

$\sin y \sqcap \frac{a^2}{t}$. vel posita $t \sqcap 1$. si $y \sqcap a^2 \sqcap BG$.

pro figura $ARDCA$, erit $ARDGA$ trilineum parabolicum, et ita de caeteris altioribus, ut si y sit

a^3 , vel a^4 . Si vero sit $y \sqcap ar$. seu si ordinatae BH sint ut rectangula ABR . erit figura $ARHA$ proportionalis elementis hemisphaerii atque ita omnes termini tabulae I. ordine per figuram poterunt exhiberi, quarum ordinatas exprimant.

16 ARDE. (1) et ACD linea, (2) Si L
(b) hemisphaerii L

23 proportionalis (1) plan (2) elementis (a) sphaerae

7 tab. III: a. a. O. § 8 S. 3 f.; tab. IV: a. a. O. § 7 S. 3. 12 Recta $AR \dots$ sit: a. a. O. § 10 f. S. 4 f.

Porro quoniam harum figurarum omnium quarum ordinatae tab. I. exhibentur, datae sunt quadraturae (sunt enim omnes ex genere paraboloidum, quippe rationales integrae) ideo areas figurarum completarum seu summas omnium ordinatarum ab A . ad R . expressimus tab. II. Nempe omnes a . seu area ARD . est $\frac{1}{2}$ quadrati $ARDE$. Omnes a^2 ,
5 seu area $ARDGA$, est $\frac{1}{3}$ eiusdem; et ita de caeteris.

Si iam fractiones hae invertendo in integros transmutentur fiet tabula III. quam patet factam ex tab. IV. numerorum combinatoriorum, serie parallelia quavis in seriei numerum multiplicata, nam $1, \sqrt[3]{1} \sqcap 1, 1, \sqrt[3]{2} \sqcap 1, \sqrt[3]{2} \sqcap 2.2, 1.2.1, \sqrt[3]{3} \sqcap 3.6.3.$ etc.

Quoniam vero hoc modo reperiuntur tantum areae figurarum eiusmodi comple-
10 tarum; videndum est an non eodem modo et portiones quaelibet mensurari possint. Exempli causa: $BH \sqcap y \sqcap ar$. Est $r \sqcap t - a$. Ergo $y \sqcap at - a^2$ seu posita $t \sqcap 1$ erit $y \sqcap a - a^2$. Ergo $\overline{\text{summ}}y \sqcap \frac{a^2}{2} - \frac{a^3}{3} \sqcap \frac{3a^2 - 2a^3}{6} \sqcap a^2, \frac{1}{2} - \frac{a}{3}$. Eodem modo si sit $y \sqcap a^2r$: fiet $y \sqcap a^2 - a^3$. et $\overline{\text{sum}}y \sqcap \frac{a^3}{3} - \frac{a^4}{4} \sqcap \frac{4a^3 - 3a^4}{12}$. Unde brevius:
 $\int \overline{ar} \sqcap \frac{1}{2}a^2r + \frac{1}{6}a^3 \sqcap \frac{1}{3}a^2r + \frac{1}{6}a^2$. Et similiter: $\int \overline{a^2r} \sqcap \frac{1}{3}a^3r + \frac{1}{12}a^4 \sqcap \frac{1}{4}a^3r + \frac{1}{12}a^3$.
15 Eodem modo $\int \overline{a^2r} \sqcap \frac{1}{5}a^4r + \frac{1}{20}a^4$. Quaeramus et a^3r^2 . fiet $\sqcap a^3, 1 - 2a + a^2 \sqcap a^3 - 2a^4 + a^5$. et $\int \overline{a^3r^2} \sqcap \frac{a^4}{4} - \frac{2a^5}{5} + \frac{a^6}{6} \sqcap [a^4], \frac{1}{4} + \frac{2a}{5} + \frac{1a^2}{6} \sqcap \frac{1, 30, - 2, 24a + 20a^2}{4, 5, 6} [a^4]$.

Unde patet regula generalis, nempe[:] Ad habendam summam figurae, cuius ordinata sit verbi gratia, a^3r^2 . termini combinatorii valoris ipsius r^2 . suis affecti potestatibus, ut
1. $- 2a$. $1a^2$. ducantur ordine in harmonicos, seu fractiones unitatem pro numeratore,
20 arithmeticos continuos pro [denominatoribus] habentes; ita ut maximus denominator, sit [6.] (hoc loco), [unitate differat ab] exponentium potestatum a , et r . summa. Notandum

21–739,4 Zusatz s. S. 746 Z. 3–8

3 areas (1) integrarum (2) figurarum L 8f. etc. (1) Quoniam ergo ad hunc velut fontem pervenimus, iam ad tab. I. redeamus (a), in qua (b). Eam vero deficientem esse patet et posse suppleri. Exempli causa si detur figura, cuius ordinatae sint $\sqrt{a}, \sqrt{a^3}$. etc. (2) Quoniam L 16 a^3 L ändert Hrsg. zweimal 19 ordine erg. L 20 numeratoribus L ändert Hrsg. 20f. denominator, (1) unitate differat a (2) sit |5. ändert Hrsg. | (hoc loco), | unitate ... ab erg. Hrsg. | exponentium L

autem est, si ponatur ultima $a \sqcap t \sqcap 1$. seu si de figurae completiae summa agatur, tunc reductis omnibus fractionibus ad communem denominatorem semper fieri posse ut fractio non habeat nisi unitatem pro [numeratore], vel ideo quia in tabula II. id semper evenit: adeoque quoniam id semper evenire necesse est quomodocunque coniungantur, hinc poterimus ducere problema sane memorabile: scilicet si sint numeri combinatorii quicunque alternatim affirmati et negati ut $1 | - 3 | + 3 | - 1$. et ducantur in totidem fractiones harmonicas simplices continuas, ut $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{7}$ ut fiat $\frac{1}{4} - \frac{3}{5} + \frac{3}{6} - \frac{1}{7}$, reducta fractio ad communem denominatorem semper deprimi potest ut numeratorem habeat unitatem[:] 5 5, 6, 7 – 3, 4, 6, 7 + 3, 4, 5, 7 – 4, 5, 6. Et pro integris $210 - 504 + 420 - 120 \sqcap 6$. Hoc poterit condi theorema memorabile, si in seriem plenam numerorum combinatoriorum, (ut 1. 10 11. 121. 1331. etc.) ducantur totidem numeri harmonici; alterutris alternatim affirmatis et negatis, factus erit productum totidem, uno minus, numerorum ordine deinceps ab unitate sumtorum, ut $1 | - 2 | + 1$ in $30 | 24 | 20$. dat $2 \sqcap 1, 2$. $1 | - 3 | + 3 | - 1$ in $210 | [168] | [140] | 120$. dat $6 \sqcap 1, 2, 3$.

Unde mirabilis etiam ducetur aequatio. Nempe: Si in seriem plenam numerorum combinatoriorum alternatim affirmatam et negatam, ducantur totidem harmonici quicunque, semper proveniet idem.

9–14 Nebenrechnungen:

$$\begin{array}{rccccc}
 210 & 42 & 28 \} & \sqcap & 14 & 30 & 24 & 20 \\
 \underline{12} & \underline{15} & \} & & \underline{30} & 20 \\
 84 & & & & 420 & \\
 42 & & & & \underline{210} & \\
 504 & & & & 630 & \\
 & & 42 & & & \\
 & & \underline{624} & & & \\
 & & 6 & & &
 \end{array}$$

9–740,13 Zusatz s. S. 746 Z. 10 – S. 748 Z. 12

3 denominatore L ändert Hrsg. 6 alternatim ... negati erg. L 8 semper (1) reduci (2)
deprimi L 10 memorable, (1) si numeri progressionis harmonicae, ducantur in seriem (2) si in
seriem | plenam erg. | numerorum L 14 504 L ändert Hrsg. 14 420 L ändert Hrsg.

Et porro si series plena numerorum combinatoriorum, alternatim affirmatorum et negatorum in totidem differentias numerorum harmonicorum continuorum ordine sibi detractorum ducatur, factum aequabitur nihilo: ut si sumatur: $1 | -2 | 1$. ducaturque in

$$5 \quad \left. \begin{array}{rcc} -2, 3 & -1, 3 & -1, 2 \\ +5, 6 & +4, 6 & +4, 5 \\ \hline 24 & 21 & 18 \end{array} \right\} \sqcap 24.21.18. \quad \text{Nam} \quad \left. \begin{array}{ccc} +24 & +21 & +18 \\ \hline 1 & -2 & 1 \\ 24 & -42 & 18 \end{array} \right\} \sqcap 0.$$

Hinc aequatio duas habens radices aequales per hos numeros, ut 24. 21. 18 multiplicata manet aequatio. Unde conicio hos productos differentiarum respondentium harmonicorum semper dare numeros progressionis arithmeticæ. Et vicissim credibile est
10 differentias eiusmodi quatuor harmonicorum, semper dare numeros triangulares. Ratio quia arithmeticæ in $1 - 2 + 1$ ducti faciunt 0. et triangulares in $1 - 3 + 3 - 1$ ducti faciunt 0. Quod inventum denique conducere videbitur ad harmonicorum ineundas summas, quo posito spes est etiam ad quadratorum summas aliqua arte posse veniri.

Sed nunc ad figurarum incompletarum seu portionum summas redeamus: Scilicet

$$15 \quad \int \overline{a^3 r^2} \sqcap \frac{1, 30 - 2, 24a + 1, 20a^2}{4, 5, 6} [a^4] \text{ sive}$$

$$1, \frac{\boxed{5}, 6 - 2, 4, \boxed{5}}{4, \boxed{5}, 6}, , - 2a \frac{\boxed{4}, 6 - \boxed{4}, 5}{\boxed{4}, 5, 6}, , + \frac{\boxed{4}, 5}{\boxed{4}, 5, 6} r^2, , [a^4].$$

Sed videtur reductio ad r esse inutilis, et sufficere, ut exprimamus per a . Tabulam ergo summarum ordinatarum tabulae I. seu arearum pro figuris incompletis pariter et completis condemus hanc:

2 differentias (1) nu (2) serier (3) numerorum (a) combinatoriorum (b) harmonicorum L
8f. productos (1) harmonicorum in (2) differentiarum (a) divers (b) respondentium harmonicorum | in
+1 – 2 + 1 ductos gestr. | semper $L = 10$ eiusmodi (1) in $1 - 3 + 3 - 1$ dare numeros (2) quatuor L
14 ad (1) nostrum (2) nostras su (3) figurarum $L = 15$ f. $a^3 L$ ändert Hrsg. zweimal

					$\frac{a}{1}$
			$\frac{a^2}{2}$		
		$\frac{a^3}{3}$			$a^2, \frac{1}{2} - \frac{a}{3}$
		$\frac{a^4}{4}$		$a^3, \frac{1}{3} - \frac{a}{4}$	
	$\frac{a^5}{5}$		$a^4, \frac{1}{4} - \frac{a}{5}$		$a^3, \frac{1}{3} - \frac{2a}{4} + \frac{a^2}{5}$
$\frac{a^6}{6}$		$a^5, \frac{1}{5} - \frac{a}{6}$		$a^4, \frac{1}{4} - \frac{2a}{5} + \frac{a^2}{6}$	

tab. V.

5

					1
			a		
		a^2			$a, 1 - a$
		a^3		$a^2, 1 - a$	
	a^4		$a^3, 1 - a$		$a^2, 1 - 2a + a^2$
a^5		$a^4, 1 - a$		$a^3, 1 - 2a + a^2$	

tab. VI.

10

Nempe ex tabulae I. parte sinistra per lineam perpendiculararem resecta, (omissa dextra, quae tantum repetitio foret sinistrae, quia quod de r , idem dici potest de a , et contra) facio tabulam VI. pro t ponendo 1, et pro r . ponendo eius valorem, ($t - a$, vel) $1 - a$. et tabula V. areas figurarum tabulae VI, completarum pariter et incompletarum ordine exhibebit.

Porro hactenus earum tantum figurarum tab. I. et VI. areas tab. II. et V. exhibuimus quae sunt rationales. Quoniam vero et irrationales plurimae ipsis affines sunt notae, eas quoque in unam cum his tabulam redigamus.

15

20

21 quae (1) sumtae (2) sunt L

	$\sqrt{1}$											
	\sqrt{a}	\sqrt{r}						*	*			
	$\sqrt{a^2}$	\sqrt{ar}	$\sqrt{r^2}$					$\frac{2}{4}$	*	$\frac{2}{4}$		
	$\sqrt{a^3}$	$\sqrt{a^2r}$	$\sqrt{ar^2}$	$\sqrt{r^3}$				*	*	*	*	*
5	$\sqrt{a^4}$	$\sqrt{a^3r}$	$\sqrt{a^2r^2}$	$\sqrt{ar^3}$	$\sqrt{r^4}$			$\frac{2}{6}$	*	$\frac{2}{12}$	*	$\frac{2}{6}$
	$\sqrt{a^5}$	$\sqrt{a^4r}$	$\sqrt{a^3r^2}$	$\sqrt{a^2r^3}$	$\sqrt{ar^4}$	$\sqrt{r^5}$		*	*	*	*	*
	$\sqrt{a^6}$	$\sqrt{a^5r}$	$\sqrt{a^4r^2}$	$\sqrt{a^3r^3}$	$\sqrt{a^2r^4}$	$\sqrt{ar^5}$	$\sqrt{r^6}$	$\frac{2}{8}$	*	$\frac{2}{24}$	*	$\frac{2}{24}$
	tab. VII.						tab. VIII.					

Tabula ergo I. interpolata habebimus tab. VII.: Cuius tabulæ VII. termini extrahibile
 10 reddunt tabulam I. Eodem modo tantum tabulæ VI. terminis præfigi posset ✓. Huic
 tabulæ VII. e regione ponamus tabulam VIII. quae areas figurarum completarum tabu-
 lae VII. contineat quae ex tab. II. iam habentur reliquis vacuis relictis: Cuius tabulæ
 loca repleta coincidunt cum locis sive terminis tabulæ II. Loca vero vacua ut supplean-
 tur facilius operæ pretium erit, quemadmodum tabula II. habet fontem, tabulam IV,
 15 ita tabulam VIII. reduci ad fontem, nempe tabulam IX, quae respondeat tabulæ IV. ut
 tabula VIII. ipsi tabulæ II. Quod ut fiat facilius, consideranda est ipsorum terminorum
 tabulæ IV. origo. Constat autem aliunde numeros combinatorios fieri, hoc modo, nempe:
 Si consideres in ea series obliquas, erit prima $\frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1}$ etc. secunda vero $\frac{1}{1} \frac{2}{1} \frac{3}{1} \frac{4}{1}$ tertia
 20 $\frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{2} \frac{4}{2} \frac{5}{2}$ etc. [quarta] $\frac{1,2,3}{1,2,3} \frac{2,3,4}{1,2,3} \frac{3,4,5}{1,2,3} \frac{4,5,6}{1,2,3}$ etc. Unde omnibus duplicatis
 ita stabit[:]

13 loca (1) notata (2) repleta *L* 17 f. nempe: (1) 1. 1. ex $\frac{1,1}{1} \frac{1,1}{1}$ | 1. 2. 1. (2) Si 18 $\frac{1}{1} \frac{2}{1}$
 ... tertia erg. *L* 19 tertia *L* ändert Hrsg.

8 tab. VII: *a. a. O.* § 16 u. die Quinta Tauola Triangolare S. 6–8; tab. VIII: *a. a. O.* § 18 S. 8.

tab. IX.

The diagram consists of several rows of nodes, each row containing multiple nodes. The nodes are arranged in a grid-like structure with arrows indicating dependencies between them. The nodes themselves are either single values or expressions involving variables like a , b , c , d , e , f , g , h , and i . The expressions include terms like $\frac{a}{b}$, $\frac{a+b}{c}$, and $\frac{a}{b}(\frac{c}{d})$. The diagram is highly symmetric and follows a specific pattern of node placement and connection.

tab. X.

Cuius tabulae IX. loca plena coincidunt cum locis tabulae IV. eoque modo expressa sunt, ut appareat interpolandi via et copta interpolatione fiet tabula X. Ubi nota in tab. X. eandem fractionem aliquando bis expressam, pro dupli origine tum in loco in quo est, tum in reciproco.

8 tab. IX: *a. a. O.* § 21 S. 9. 17 tab. X: *a. a. O.* § 23 S. 9f.

Denique ut loca vacua in tabulae X. serie transverse descendens in ordine secunda

$1 * \frac{3}{2} * \frac{3,5}{2,4} * \frac{3,5,7}{2,4,6}$ etc. eiusque reciproca, item in serie transverse descendente in

ordine quarta $1 * \frac{5}{2} * \frac{5,7}{2,4} * \dots$ etc. eiusque reciproca, similiterque in caeteris parallelis,

compleantur ideo in serie transverse descendente secunda $1 * \frac{3}{2} * \frac{3,5}{2,4} * \frac{3,5,7}{2,4,6} *$

5 considerandum terminos qui iam adsunt esse, 1^{num} ad 3^{tum} ut 2 ad 3. seu ut 1 ad $\frac{3}{2}$.

tertium ad quintum, ut 4 ad 5, seu ut $\frac{3}{2}$ ad $\frac{3,5}{2,4}$, quintum ad septimum ut 6 ad 7. Ut ergo

omnes compleantur, numerorum sibi vicinorum rationes, quemadmodum fuit primus ad tertium ut 2 ad 3. ita facere necesse erit, a n t e - p r i m u m quendam imaginarium seu nullesimum (: nam nullesimus est ordinalis :), quem vocabimus c , ad secundum ut 1 ad

10 2 et secundum ad quartum, ut 3 ad 4. Tota ergo series interpolata ita stabit:

0	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---

c. 1. $\frac{2}{1} c.$ $\frac{3}{2} c.$ $\frac{2,4}{1,3} c.$ $\frac{3,5}{2,4} c.$ $\frac{2,4,6}{1,3,5} c.$ etc.

Iam quartus terminus huius seriei interpolatae, debet etiam esse primus sequentis interpolandae seu secundae transverse descendenter, quia ei ob reciprocum situationem

15 aequipollit, ut ex tabulae X. inspectione patet. Ergo series quarta transverse descendens

743,21–744,1 Zusatz zur Lesart s. S. 748 Z. 14–21

743,21–744,1 reciproco. (1) Denique ut loca vacua in tabulae X. seriebus $1 * \frac{3}{2} * \frac{3,5}{2,4} *$ etc.

et $1 * \frac{5}{2} * \frac{5,7}{2,4}$ etc. et parallelis earumque reciprocis, impleantur, ante 1. positam imaginando (a) b.

ante $\frac{3}{2}$ ponemus $\frac{2}{1} b.$ ante $\frac{3,5}{2,4}$ ponemus $\frac{2,4}{1,3} b.$ (b) c. ante $\frac{3}{2}$ ponemus $\frac{2}{1} c.$ ante $\frac{3,5}{2,4}$ ponemus $\frac{2,4}{1,3} c.$

Similiter in altera serie pro $\frac{5}{2}$ interpolabitur $\frac{4}{1}$, pro $\frac{7}{4}$ fiet $\frac{6}{3}$ (2) Denique L 1 serie (1) transversa

(2) transverse L 2 serie (1) transversa (2) transverse L 4 serie (1) transversa (2) transverse L

7f. ad (1) secundum (2) tertium L 8f. seu ... ordinalis :) erg. L 14 seu ... descendenter erg. L 15 series (1) secunda (2) quarta L

interpolanda ita incipiet copta interpolatione: 1 $\frac{2,4}{1,3}c$ $\frac{5}{2}$ * $\frac{5,7}{2,4}$ *. Facile ergo

compleri poterit, ut enim ex primo habeatur tertius, quintus, septimus, etc. faciendo 1^{mum} ad 3^{tum} ut 2 ad 5, tertium ad 5^{tum} ut 4 ad 7. 5^{tum} ad 7^{mum} ut 6 ad 9. Ita ex secundo habebuntur nullesimus[,] quartus, sextus, octavus etc. faciendo nullesimum ad 2^{dum} , ut 1 ad 4. secundum ad quartum, ut 3 ad 6. quartum ad sextum ut 5 ad 8. etc.

5

Et series haec transverse descendens quarta, ita stabit completa:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \frac{2}{3}c. & 1. & \frac{2,4}{3,1}c. & \frac{5}{2}. & \frac{2,4,6}{3,1,3}c. & \frac{5,7}{2,4}. & \text{etc. sive pro } \frac{2}{3}c \text{ ponendo } d. \text{ fiet } d. 1. \frac{4}{1}d. \frac{5}{2}. \\ \frac{4,6}{1,3}d. & \frac{5,7}{2,4}. & \frac{4,6,8}{1,3,5}d. & \text{etc.} \end{array}$$

Sexta series transverse descendens 1 * $\frac{7}{2}$ etc. eodem modo facile interpolabitur ex praecedentis, quia quartus praecedentis, et sextus antepraecedentis terminus coincidunt eius termino secundo. Ergo eius terminus secundus erit $\frac{4,6}{1,3}$. Porro in ea pri-

mus habetur ad tertium, ut 2 ad 7. tertius ad 5^{tum} ut 4 ad 9. 5^{tus} ad 7^{mum} , ut 6 ad 11. Eodem ergo modo erit nullesimus ad secundum, ut 1 ad 6. secundus ad quartum ut 3 ad 8. et ponendo nullesimum esse $e \sqcap \frac{4d}{3}$. erit series sexta transverse descendens

15

interpolata: $e 1 \frac{6}{1}e \frac{7}{2} \frac{6,8}{1,3}e 7$.

1 copta interpolatione erg. L 4 nullesimus erg. L 6 series (1) secunda (2) haec L
13 ad (1) secundum (2) tertium L 14 erit (1) secundus ad (2) nullesimus L

11 quartus praecedentis: Leibniz bezieht sich auf die 2., 4. und 6. Transversalfolge mit den zu interpolierenden Termen. Aus Symmetriegründen ist der 2. Term der 6. Folge gleich dem 6. Term der

2. Folge: $\frac{2,4,6}{1,3,5}c = \frac{4,6}{1,5}d$. Leibniz setzt ihn irrtümlich gleich dem 4. Term der 4. Folge $\frac{2,4,6}{3,1,3}c = \frac{4,6}{1,3}d$

und verfehlt so den Wert $e = \frac{4}{5}d$; die Formel für die 6. Folge ist aber korrekt.

[Zusätze]

[Zu S. 738 Z. 21 – S. 739 Z. 4:]

Videor tandem agnoscere rationem qua possit in toto pariter ac in singulis partibus haberi numerator simplex, erit ex. g. $a^3, \frac{1}{3} - \frac{2a}{4} + \frac{a^2}{5}$, si $a \sqcap 1$ dat $\frac{2}{3, 4, 5}$. Sed aliud 5 remedium. Si ponamus esse r non $\sqcap 1 - a$ sed $\sqcap v - a$ ponendo v esse ultimam a ; ipsa a semper variante; tunc enim ex. gr. r^4 erit $\sqcap v^4 - 4v^3a + 6v^2a^2 - 4va^3 + a^4$ et $\int \overline{r^4} \sqcap \frac{1v^5}{1} - \frac{4v^5}{2} + \frac{6v^5}{3} - \frac{4v^5}{4} + \frac{1v^5}{5}$. et $a^2r^2 \sqcap a^2, v^2 - 2va + a^2$. et $\int \overline{a^2r^2} \sqcap \frac{v^5}{3} - \left[\frac{2v^5}{4} + \frac{v^5}{5} \right] \sqcap \frac{2v^5}{3, 4, 5}$. et hoc iam pulcherrimum est maximique usus, si quid unquam, in geometria.

[Zu S. 739 Z. 9 – S. 740 Z. 13:]

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \underbrace{\frac{1}{1}}_{6}, \underbrace{\frac{2}{2}}_{3}, \underbrace{\frac{3}{3}}_{12}, \underbrace{\frac{4}{4}}_{8}, \underbrace{\frac{5}{5}}_{6}, \underbrace{\frac{6}{6}}_{24} & \text{etc.} \end{array}$$

$$6 \quad 3 \quad 2 \quad 30 \quad 24 \quad 20 \quad + 30 \quad + 24 \quad + 20 \quad 30 \quad 24 \quad 20 \quad 12 \quad 8 \quad 6$$

$$\begin{array}{r} \underbrace{}_{12}, \underbrace{}_{8}, \underbrace{}_{6} \\ - 6 \quad - 3 \quad - 2 \\ \hline 24 \quad 21 \quad 18 \end{array} \quad \begin{array}{r} \underbrace{}_{12}, \underbrace{}_{8}, \underbrace{}_{6} \\ 12 \quad 8 \quad 6 \\ \hline 18 \quad 16 \quad 14 \end{array} \quad \begin{array}{r} \underbrace{}_{6}, \underbrace{}_{3}, \underbrace{}_{2} \\ 6 \quad 3 \quad 2 \\ \hline 4 \end{array}$$

Ergo differentiae eiusmodi semper arithmeticci. Quid si inverso modo subtraha(mus)

$$\begin{array}{ccccccccc} 30 & 24 & 20 \\ \underline{2} & \underline{3} & \underline{6} \\ 28 & 21 & 14 & \text{sunt etiam arithmeticci.} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \underbrace{\frac{1}{1}}_{24}, \underbrace{\frac{2}{2}}_{12}, \underbrace{\frac{3}{3}}_{8}, \underbrace{\frac{4}{4}}_{6}, \underbrace{\frac{5}{5}}_{30}, \underbrace{\frac{6}{6}}_{24} & \end{array}$$

$$1| - 3| + 3| - 1, \wedge 24| 12| 8| 6 \sqcap 24| - 36| + 24| - 6 \sqcap 6$$

$$\begin{array}{ccccccccc} 60 & 40 & 30 & 24 \\ \underbrace{60}_{120}, \underbrace{40}_{90}, \underbrace{30}_{72}, \underbrace{24}_{60} & 1| - 3| + 3| - 1, \wedge 60| 40| 30| 24 \sqcap 60| - 120| + 90| - 24 \sqcap 6 \end{array}$$

$$4 \quad \frac{2}{3, 4, 5}. (1) \text{ et semper erit (2) Sed } L \quad 7 \quad \sqcap \frac{v^5}{3} - \mid \frac{v^5}{4} + \frac{v^5}{7} \ddot{\text{a}}ndert Hrsg. \mid \sqcap \frac{2v^5}{3, 4, 5}. L$$

$$\begin{array}{cccc}
 60 & 40 & 30 & 24 \\
 24 & 12 & 8 & 6 \\
 \hline
 36 & 28 & 22 & 18 \\
 (18 & 14 & 11 & 9) \\
 4 & 3 & 2
 \end{array}$$

5

Numeri 18. 14. 11. 9. a trigonalibus differunt octonario nam si auferas 8. fiet 10. 6. 3. 1.

Hinc differentiae quinque harmonicorum redibunt ad pyramidales et plurium ad altiores.

Hinc concluditur generaliter differentias has semper fore summabiles. Videamus iam an

hinc duci possit [aliquid] ad summam seriei harmonicae, sit $\underbrace{\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6}}_{\textcircled{\text{S}}} = \textcircled{\text{D}}$

10

cuius seriei invenienda est summa.

$$\begin{aligned}
 \frac{\textcircled{\text{S}}}{6} &\sqcap \frac{2, 3, 4, 5 + 1, 3, 4, 5 + 1, 2, 4, 5 [+1, 2, 3, 5] + 1, 2, 3, 4}{1, 2, 3, 4, 5, 6} \\
 \text{et } \textcircled{\text{D}} &\sqcap \frac{3, 4, 5, 6 + 2, 4, 5, 6, +2, 3, 5, 6 [+2.3.4.6] + 2, 3, 4, 5}{1, 2, 3, 4, 5, 6}.
 \end{aligned}$$

Iam $\frac{\textcircled{\text{S}}}{6} - \textcircled{\text{D}}$. haberi potest, differentiae enim respondentium ordine numeratorum dabunt numeros a pyramidalibus constanter differentes, adeoque summabiles. Ponamus ergo $\frac{\textcircled{\text{S}}}{6} -$

15

$$\begin{array}{ccccccccc}
 746,18 & & & & & & & & \\
 (1) & \underbrace{\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}}_{24} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & & & & & \\
 & 120 & 40 & 30 & 24 & & & & \\
 & \underbrace{24}_{120} & \underbrace{12}_{40} & \underbrace{8}_{30} & \underbrace{6}_{24} & & & & \\
 & 96 & 28 & 22 & 18 & & & & \\
 & 120 & 40 & 30 & 24 & (48 & 14 & 11 & 9) & & & \\
 & 360 & 90 & 72 & 60 & 34 & 3 & 2 & & & \\
 & & & & & 6 & 8 & 12 & 24 & & \\
 & & & & & 114 & 32 & 18 & 0 & & \\
 & & & & & 82 & 14 & & & & \\
 & & & & & & & & & &
 \end{array}$$

$$1 - 3 + 3 - 1 \quad 1| - 3| + 3| - 1| \hat{=} 120|40|30|24| \sqcap 120| - 120| + 90| - 24| \sqcap 66 \quad (2) \frac{1}{1} L$$

$48 - 42 + 33 - 9 = 9$ aliquis L ändert Hrsg. $13 + 1, 2, 3, 5$ erg. Hrsg. $14 + 2.3.4.6$ erg. Hrsg.

$$16-748,1 \frac{\textcircled{\text{S}}}{6} - \textcircled{\text{D}} \sqcap (1) \Omega \quad (2) -\Omega \quad (3) \Omega \quad L$$

$\mathbb{D} \sqcap \Omega$. Iam aliunde scimus esse $\odot - \mathbb{D} \sqcap 1 - \frac{1}{6}$. Ergo $\mathbb{D} \sqcap \odot + \frac{1}{6} - 1$. Eadem $\mathbb{D} \sqcap \frac{\odot}{6}[-]\Omega$. Ergo $\frac{\odot}{6} - \Omega \sqcap \odot + \frac{1}{6} - 1$. Ergo $\odot[-]6\Omega \sqcap 6\odot + 1 - 6$. et $\frac{5 - 6\Omega}{[5]} \sqcap \odot \sqcap \frac{5}{6} - \Omega$. Tandem ergo viam reperimus per quam progressionis harmonicae numerorum reperiri potest summa. Habetur enim \odot eodem modo et \mathbb{D} .

5 Cum opus sit ad eam rem inventione numeri figurati altissimi gradus, v. g. ad inventionem summae pyramidalium opus est triangulo-triangularibus. Ergo ad summam numerorum harmonicorum quinque opus est triangulo-triangulari numero id est assurgente ad quadrato-quadratum. Et pro 100 harmonicis opus foret formula assurgente ad 99 gradus. Huic malo succurremus primum per logarithmos, nam quia numeri figurati 10 fiunt ductu in se invicem continuorum hinc addemus tantum logarithmos numerorum continuorum: Imo datur compendium, inveniendi summas logarithmorum numerorum arithmeticice crescentium, quo utemur.

[Zur Lesart zu S. 743 Z. 21 – S. 744 Z. 1, nicht gestrichen:]

Sed nondum video quomodo hinc appropinquationes pro partibus quoque, aut infinitae series, earumque reciprocae duci possint, cum non appareat, qualis in casu partium sit b . neque enim b . ad eandem potest attolli potentiam, neque enim in casu ubi $v \sqcap 1$ fieret b^5 aeq. b et ita in caeteris, neque tamen poterit credo pro b fieri: bv^4 , vel bv^5 aliave. Imo forte poterit. Ut scilicet tota series horizontalis multiplicetur per v^5 vel per v^4 . Sed nec hoc procedere arbitror, sequeretur enim omnes b , fore inter se, ut ipsas v . Quod 20 non est. Forte aliquando hanc quoque difficultatem complanare licebit: Qua superata pulcherrimus interpolationum usus foret ad series.

$$1 \quad \mathbb{D} \sqcap \frac{\odot}{6} (1) - (2) | + L, ändert Hrsg. | \Omega L \quad 2 \quad \odot (1) - (2) | + L, ändert Hrsg. | 6\Omega L$$

2 6 L ändert Hrsg.

58. QUADRATURA ARITHMETICA CIRCULI ET HYPERBOLAE

3. Mai 1676

Überlieferung: L Konzept: LH 35 II 1 Bl. 125. 1 Bl. 2°. 11/2 S. Datum und Überschrift ergänzt.
Cc 2, Nr. 1412

5

3. Maii 1676.

Quadratura arithmetic a circuli et hyperbolae


[Teil 1]

$$x \sqcap \frac{y^2}{1+y^2} \sqcap y^2 - y^4 + y^6 - y^8 + y^{10} - y^{12} \text{ etc. Ponamus } y \sqcap 1-z. \text{ fiet}$$

$$\begin{array}{ccccccccc}
 x \sqcap +1 & -1 & +1 & -1 & \text{etc. etc.} & & & & 10 \\
 -2z & +4z & -6z & +8z & & & & & \\
 +1z^2 & -6z^2 & +15z^2 & -28z^2 & & & & & \\
 +4z^3 & -20z^3 & +56z^3 & & & & & & \\
 -1z^4 & +15z^4 & -70z^4 & & & & & & \\
 & -6z^5 & +56z^5 & & & & & & \\
 +1z^6 & -28z^6 & & & & & & & \\
 & +8z^7 & & & & & & & \\
 & -1z^8 & & & & & & & \\
 \end{array}
 \quad \text{vel } x \sqcap \left\{ \begin{array}{ccc} 0 & 0 & \text{etc.} \\ z, & +2 & 2 & \text{etc.} \\ z^2, & -5 & -13 \\ z^3, & 4 & 36 \\ & -1 & -55 \end{array} \right. \quad 15$$

10 etc. etc. (1) Et (2) Et summando erit (3) vel L

	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	1	3	6	10	15	21	28	36	45	55	66	78	91	105	120	136			
5	1	4	10	20	35	56	84	120	165	220	286	364	455	560	680	816			
	1	5	15	35	70														
	1	6	21	56	126														
	1	7	28	84	210														
	1	8	36	120	330														
	1	9	45	165	495														
10	1	10	55	220	715														
	1	11	66	286	1001														
	1	12	78	364	1365														
	1	13	91	455	1820														
	1	14	105	560															
15	1	15	120																
	1	16																	
	1																		



[Fig. 1]

21 Fig. 1: Die von Leibniz gezeichnete und hier wiedergegebene Figur entspricht nicht der Gleichung von S. 749 Z. 9, sondern $x = \frac{2y^2}{1+y^2}$. Die Unstimmigkeit wirkt sich nicht weiter aus.

Porro assumto quodam numero infinito (numerus enim maximus omnino assumi non potest); poterit tam omnium z , quam omnium z^2 , et z^3 etc. iniri summa, scilicet numerorum arithmeticorum secundas differentias aequales habentium, et tertias, et quartas etc. Taliū enim numerorum ex dato ultimo, hoc loco infinito semper haberi poterit summa, adeoque habebitur expressio ipsius x ope potestatum tum a z tum a numero infinito; numerus autem infinitus non potest coincidere cum numero infinitesimarum ipsius z quia is variat, alia atque alia assumta z , nisi et infinitesimas proportione putes. Et hinc iam haberi potest modus analyticus expressiones eiusmodi, infinito numero utentes convertendi in alias in quibus nullus sit numerus infinitus. Nam quae numerum habent infinitum hoc modo, earum ne partes quidem tractabiles sunt. Si vero possemus fingere numerum infinitum constantem semper eundem esse cum infinitesimarum ipsius z numero; ipsas autem infinitesimas alias esse pro alia z arithmeticèque crescere, tunc numerus infinitus aequivalebit z , et pro eius quadrato scribi poterit z^2 , et ita porro. Hoc si succedit pulchrum habebimus modum expressiones huiusmodi $y^2 - y^4 + y^6 - y^8$ etc. convertendi in alias. Ex quo plurima theorematā nova ducentur.

5

10

15

[Teil 2]

$y \sqcap b^l$. erit $l \sqcap \frac{y}{1} - \frac{y^2}{2b} + \frac{y^3}{3b^2} - \frac{y^4}{4b^3}$ etc. posito l . logarithmo. Porro $dl \sqcap \frac{b^2}{b+a}$. Unde in aequatione figurae logarithmicae $y \sqcap b^{\int \frac{b^2}{b+a}}$. nam $l \sqcap \int \frac{b^2}{b+a}$. Est autem a . quantitas variabilis, b . constans. $\int l \sqcap \frac{y^2}{1, 2} - \frac{y^3}{2, 3, b} + \frac{y^4}{3, 4, b^2} - \frac{y^5}{4, 5, b^3}$ etc.

Si generaliter indices serviant ad quadraturas, ut a Wallisio ex inductione iudicari coepit est, spes magna est posse omnes quadraturas exprimi ope talium serierum.

20

3 differentias (1), aequales (2) nullas (3) arith (4) aequales L 10 f. fingere (1) alium numerum infinitum assumi (2) numerum L 19 f. etc. (1) Unde sequeretur posita $y \sqcap b$. dari logarithmorum summa, adeoque et spatii eius. Si daretur (a) $x \sqcap \frac{e^3}{(b)}$ | $\varphi \sqcap \frac{e}{1} - \frac{e^3}{3b^2} + \frac{e^5}{5b^3} - \frac{e^7}{7b^5}$ streicht Hrsg. | (2)
Si L

20 Wallisio: *Arithmetica infinitorum*, 1656 (WO I S. 355–478).

$x \sqcap y^z$. Ergo $z \sqcap \frac{x}{1} - \frac{x^2}{2y} + \frac{x^3}{3y^2} - \frac{x^4}{4y^3}$ etc. Est aequatio ad paraboloeidem. Contra $x^{\frac{1}{z}} \sqcap y$. Ergo $\frac{1}{z} \sqcap \frac{y}{1} - \frac{y^2}{2x} + \frac{y^3}{3x^2} - \frac{y^4}{4x^3}$ etc. et generaliter ex huiusmodi aequationibus extrahi potest radix, et inveniri valor ipsius y . vel x . ut patet. Nemo autem facile crederet talem aequationem esse ad paraboloeidem; forent ad hyperboloeidem, si v. g. pro x .

5 ponatur $\frac{1}{x}$. aut pro y , $\frac{1}{y}$. Nec quisquam facile crederet: $\frac{x}{1} - \frac{x^2}{2y} + \frac{x^3}{3y^2} - \frac{x^4}{4y^3}$ etc. $\sqcap \frac{1}{\frac{y}{1} - \frac{y^2}{2x} + \frac{y^3}{3x^2} - \frac{y^4}{4x^3}}$. Genus aequationis identicae mirabilis, identica autem est, quia nihil ex illa duci potest, semperque vera est, quaecunque sumantur x . et y . adeoque nihil novae determinationis assumitur, tali aequatione assumta. Et videndum an hinc sequatur idem esse verum, quomodocunque per saltus progrediamur. Videndum si dicamus e. g.

10 10) $x \sqcap y^2 + cy + d$. an talis aequatio etiam sic exprimi possit, quasi logarithmo: $x \sqcap y^z$. Quod idem est ac: $\sqrt[2]{x + \frac{c^2}{4} - d} - \frac{c}{2} \sqcap y$. et fiet: $y^2 + cy + d \sqcap y^z$ vel $x \sqcap \sqrt[2]{x^2 + \frac{c^2}{4} - d} - \frac{c}{2}^z$. Videndum saltem si sumatur esse: $x \sqcap y + d$. an posito $x \sqcap y^z$. et $y + d \sqcap y^z$. vel $x \sqcap \overline{x-d}^z$ possit z . quaeri instar logarithmi modo supra dicto. Quod dicere non ausim.

15 Experiundum calculo, an diversae hae inquirendi in ipsius z . valorem rationes consentiant. Item, quia z . debet considerari quasi certus quidam numerus ideo idem provenire debet sumtis quibuscumque x . et y . modo ponatur $x \sqcap y + d$.

Redeam ad superiorem aequationem: $\frac{1}{z} \sqcap \frac{y}{1} - \frac{y^2}{2x} + \frac{y^3}{3x^2} - \frac{y^4}{4x^3}$ etc. Pro x . ponatur eius valor y^z , fiet: $\frac{y}{1} - \frac{y^{[2]-z}}{2} + \frac{y^{[3]-2z}}{3} + \frac{y^{[4]-3z}}{4}$ etc. $\sqcap \frac{1}{z}$. quae propositio semper vera esse debet, et identica, quaecunque sumatur y . et z . Nam si ex quadam aequatione 20 ducatur alia, et ope unius aliqua tollatur litera ex alia, proveniens aequatio est identica.

18 Nebenrechnung: $y^{1-z} \sqcap \frac{1}{y^{z-1}}$


3 ut patet erg. L 14 f. consentiant. (1) Unde illa (2) Item L 18 1 L ändert Hrsg. dreimal

Et hoc est exemplum mirabilis cuiusdam summationis si z . per numerum explicetur. Videndum tamen, ne inde sequatur absurdum. Quo vitato pulchrae hinc consequentiae ducentur. Superest adhuc, ut alterutrum x . vel y . inveniamus pure ope z , exponente non nisi numeros continente.

[Teil 3]

5

$$\int \frac{x}{\sqrt{1+y^2}} = y^3 - \frac{y^5}{5} + \frac{y^7}{7} - \frac{y^9}{9} \text{ etc.}$$



[Fig. 2]

$$x \stackrel{(1)}{\equiv} \frac{y^2}{1+y^2} \cdot \frac{y^2}{1+y^2} \stackrel{(2)}{\equiv} y^2 - y^4 + y^6 - y^8 + y^{10} - y^{12} \text{ etc. } x + y^2 x \stackrel{(3)}{\equiv} y^2 \text{ seu } x \stackrel{(4)}{\equiv} y^2 - y^2 x \text{ et } y^2 \stackrel{(5)}{\equiv} \frac{x}{1-x} \text{ Ergo pro aeq. 2. stabit}$$

10

$$\frac{y^2}{1+y^2} \stackrel{(6)}{\equiv} \frac{x}{1-x} - \frac{x^2}{1-2x+x^2} + \frac{x^3}{1-3x+3x^2-x^3} \text{ etc.}$$

Unde ut obiter patet aequationem hanc

$$x \stackrel{(7)}{\equiv} \frac{x}{1-x} - \frac{x^2}{1-2x+x^2} + \frac{x^3}{1-3x+3x^2-x^3} \text{ etc.}$$

esse identicam quodammodo cum non possit esse determinata.

$$\begin{aligned} x &\equiv \frac{\frac{x}{1-x}}{1+\frac{x}{1-x}} \equiv \frac{\frac{x}{1-x}}{\frac{1-x+x}{1-x}} \equiv x. \\ y &\equiv \sqrt{\frac{x}{1-x}} \equiv \sqrt{\frac{x}{1-x} - \frac{x^2}{1-2x+x^2} + \frac{x^3}{1-3x+3x^2-x^3}} \text{ etc. } \sim 1-x \end{aligned}$$

15

12 Unde ... hanc erg. L 14f. esse ... $\sqcap x$ erg. L

8 Fig. 2: Die Merkfigur gibt nicht die Kurve $x \equiv \frac{y^2}{1+y^2}$ wieder.

$\sqrt{x - \frac{x^2}{1-x} + \frac{x^3}{1-2x+x^2}}$ etc.
 $\frac{1}{1-x}$. Habetur autem summa omnium y aliunde ergo et sum-

ma haberi potest infinitarum. $\int \sqrt{x - \frac{x^2}{1-x} + \frac{x^3}{1-2x+x^2}}$ etc. $\sim 1-x$. Novum ergo
 habemus hic exemplum summae infinitae.

$$\text{arcus} \sqcap \frac{t}{1} - \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} - \frac{t^7}{7} \text{ etc.} \sqcap \int \overline{1-t^2+t^4-t^6} \text{ etc. Ergo } \overline{d \text{ arc}} \sqcap 1-t^2+t^4-t^6 \sqcap \frac{1}{1+t}$$

5 et $t \sqcap \frac{1-\overline{d \text{ arc}}}{\overline{d \text{ arc}}}$. $\text{arc} \sqcap \int \frac{1}{1+t}$. Ergo $\int \frac{1}{1+t} \sqcap \frac{1-\overline{d \text{ arc}}}{\overline{d \text{ arc}}} - \frac{\overline{1-\overline{d \text{ arc}}}[3]}{\overline{d \text{ arc}}^3} + \frac{\overline{1-\overline{d \text{ arc}}}[5]}{\overline{d \text{ arc}}^5}$.

Idem est 2^z , $[2]$, et 4^z . Iam $2^z[2] \sqcap 2^{2z}$ ergo $4^z \sqcap 2^{2z}$. Et generaliter erit $bb^z \sqcap b^{2z}$
 et $b, b^z \sqcap b^{z+1}$. Ex his variae haberi poterunt expressiones per infinitas series eodem
 redeuntes.

5 f. $+ \frac{\overline{1-\overline{d \text{ arc}}}[5]}{\overline{d \text{ arc}}^5} \cdot | \sqcap \frac{1}{\overline{d \text{ arc}}} - \frac{1}{\overline{d \text{ arc}}^3} + \frac{1}{\overline{d \text{ arc}}^5}$ gestr. $|$. Idem L

4 $\sqcap \frac{1}{1+t}$: Richtig wäre $\frac{1}{1+t^2}$; der Fehler beeinträchtigt die folgende Zeile, in deren abschließender Gleichung eine weitere Unstimmigkeit hinzukommt.

59. DE SUMMA SERIEI IN QUA NUMERATORES ARITHMETICI, NOMINATORES GEOMETRICI

24. Mai 1676

Überlieferung: L Konzept: LH 35 XII 1 Bl. 1. 1 Zettel ca. 21,2 x 6,6 cm. 1 S. auf Bl. 1 r°.

5

Unterkante geschwungen, Überschrift ergänzt. — Auf der Rückseite Fragment einer durch Zerschneiden verworfenen Gesprächsaufzeichnung mit Tschirnhaus. Druck in einem späteren Band der Reihe.


Cc 2, Nr. 1425 tlw.

24. Maii 1676.

S u m m a s e r i e i i n q u a n u m e r a t o r e s a r i t h m e t i c i ,
n o m i n a t o r e s g e o m e t r i c i

10

Invenire summam seriei $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{8}$ $\frac{5}{16}$ etc.



[Fig. 1]

13 Fig. 1: Leibniz verdeutlicht seine Überlegungen zur Summierung der Reihe anhand der Treppenfigur unter dem Kurvenbogen. Aus dem Text ergäbe sich eine Exponentialkurve. Leibniz zeichnet einen für ein allgemeines Kurvenstück stehenden Parabelbogen. Die zwei oberen Stufen der Treppenfigur hat Leibniz nachträglich ergänzt. Der Punkt P tritt daher im Text sowohl auf der Höhe von B wie als Endpunkt der Kurve auf.

Sint $GH \cdot EF \cdot CD \cdot AB$. ipsae $\left\{ \begin{array}{ccccc} GH & EF & CD & AB & \text{etc.} \\ \frac{1}{1} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{16} \end{array} \right.$ etc. earum summa HL .

Summae $\left\{ \begin{array}{ccccc} 2 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ HL & FM & DN & \text{etc.} \end{array} \right.$ etc. summa summarum 4.

Ergo spatium $PLHBP \sqcap 4$. si $QL \sqcap LM \sqcap MN \sqcap NP$.

Sit $GH \sqcap LQ \sqcap LM$ etc. $\sqcap FM \sqcap 1$. et totum spatium $PQSHBP$ erit $\frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{4} \frac{4}{8}$

⁵ $\frac{5}{16}$ etc. ipsae scilicet ductae $GH \sqcap 1$ in $[LQ] \sqcap 1$ et $EF \sqcap \frac{1}{2}$ in $MQ \sqcap 2$. et $CD \sqcap \frac{1}{4}$ in $NQ \sqcap 3$. etc.

At vero hoc idem spatium est, $PLHBP$ seu 4, $+LQSH \sqcap 2$. Ergo $\frac{1}{1} + \frac{2}{2} + \frac{3}{4} + \frac{4}{8} + \frac{5}{16}$ etc. $\sqcap 6$.

3 PLHBP $\sqcap 4$ (1) Si (2) Idem spatium componatur ductu ipsarum G (3) si L 5 LH L ändert Hrsg.

3 spatium $PLHBP$: Leibniz übersieht, daß die Ordinate LH allein nichts zur Fläche der Treppenfigur $PLGBP = 2$ hinzufügt, und stellt so in der Folge einen vermeintlichen Widerspruch fest.

60. SERIES CONVERGENTES SEU SUBSTITUTRICES

26. Juni 1676

Überlieferung: *L* Konzept: LH 35 XII 1 Bl. 346–347. Bl. 346 ein Bl. 4°. 1 1/2 S. Bl. 346a ein Zettel ca 17,5 x 10 cm. Auf Bl. 346a r° 2 Zeilen quer geschrieben. Bl. 346a v° leer. Bl. 347 ca 1/3 Bl. 4°. Oberkante schräg abgeschnitten. 2 S. Textfolge Bl. 346 r° oben, 347 v°, 347 r°, 346 r° unten, 346 v° tlw. durch Kustoden gesichert. Datum und erste Überschrift auf Bl. 347 v° oben ergänzt. Zweite Überschrift auf Bl. 346a. Bl. 346a ursprünglich mit Siegellack an Bl. 346 und an Bl. 347 befestigt.

5
Cc 2, Nr. 1453

26 Iunii 1676

10

Series convergentes seu substitutrices

Series convergentes et modus per illas inquirendi in aream ope numeri laterum polygoni

Aequatio inveniri potest, exprimens circuli magnitudinem, eaque valde simplex. In eam ingreditur numerus n . progressionis geometricae duplae quilibet: 1. 2. 4. 8. 16. etc. 15 et tanto erit exactior, quanto hic numerus maior.

Hinc admiranda ducentur pro sectione anguli et trigonometria. Item pro aliis curvis et quadraturis omnibus.

11 *Darunter:* Adde huc Greg. a S. Vincentio de polygonis [regularibus] figurae inscribendis methodum generalem quae portiones aequales abscindant. Videndum an et fieri possint eiusmodi quae arcus aequales abscindant.

12 in (1) summas (2) summam (3) aream L 13 numeri (1) polygonorum (2) laterum L
 14 exprimens (1) naturam circuli, (2) circuli L 15 n. (1) Erit valor (2) progressionis L 19 regularis
 L ändert Hrsg.

19 Greg. a S. Vincentio: vgl. Gr. de SAINT-VINCENT, *Opus geometricum*, 1647, Buch IV, prop. CXCIX u. CC, S. 349 f.; Buch V, prop. CCLXXXVII, S. 489; Buch VI, prop. CVI, S. 585 [Marg.]. — Saint-Vincent bezeichnet einer Figur einbeschriebene Polygone als regulär, wenn die Seiten (abgesehen von der Basis) gleiche Segmente abschneiden.

Forte aliquando tolli poterit numerus n ; et tunc id procedet pro illis scilicet curvis, in quibus dimensio in potestate.

Quaeritur an inter modos quibus quid eodem modo ex quibusdam quantitatibus componitur quo ex aliis, ut ex $a \cdot b$. quo ex $a^2 + b^2$. sit etiam inventio maximi et minimi,
5 sed non puto.

Absolvimus tandem et impossibilitatis demonstrationem in circuli quadratura.

Si datur formula eadem operatione proveniens ex $a \cdot b$. et ex \sqrt{ab} . $\frac{2ab}{a + \sqrt{ab}}$. datur

sectoris cuiuslibet quadratura per demonstrata a Iac. Gregorio. Ergo hinc dabatur regula generalis inveniendi sectorem ex datis $a \cdot b$. triangulo inscripto et trapezio circumscripto
10 huius formulae interventu expressa: at regula generalis huiusmodi est impossibilis, ut demonstravi de circulo, et ad ellipsis atque hyperbolam applicari potest; ergo formula eadem operatione proveniens ex $a \cdot b$. et ex \sqrt{ab} . $\frac{2ab}{a + \sqrt{ab}}$. est impossibilis, formula,
15 inquam, analytica finita. Hinc iam demonstro novis plane artibus, ipsam sectoris circulareis (eodemque modo elliptici et hyperbolici) impossibilem esse quadraturam. Nimirum quemadmodum Iac. Gregorius hoc problema solvit: ex data formula eadem operatione proveniente, invenire sectoris aream: ita ego contra: ex data sectoris area invenire formulam eadem operatione provenientem. Nam ut res concepta est a Gregorio in eo fuit eius


6 f. quadratura. (1) Sector eodem modo componitur ex $a \cdot b$. quo quaeri (2) Si L 7 datur (1) quantit (2) formula L 7f. datur (1) circu (2) sectoris L 8 quadratura | per demonstrata a Iac. Gregorio. (1) Hinc per (2) Ergo hinc erg. | dabiturque ändert Hrsg. | regula L 11 de ... potest erg. L 13f. sectoris (1) illius (2) circularis L 15 Iac. erg. L 16f. formulam (1) eodem modo compositam (2) eadem L

7 $\frac{2ab}{a + \sqrt{ab}}$: Richtig wäre $\frac{2b\sqrt{ab}}{b + \sqrt{ab}}$; Leibniz verwendet den falschen Wert bis S. 761 Z. 5 sowie in

N. 64 S. 800 Z. 15–18. 8 demonstrata a Iac. Gregorio: Vgl. J. GREGORY, *Vera circuli et hyperbolae quadratura*, 1668, Scholium nach prop. V, S. 15f. 11 demonstravi de circulo: Vgl. Cc 2, Nr. 1102, zweite propositio und LQK, prop. LI, S. 128. 15 quemadmodum Iac. Gregorius ... solvit: s. o. Erläuterung zu Z. 8, hier Prop. XI, S. 25–28 [Marg.].

demonstratio imperfecta; et neque Hugenium neque alios convincere potuit. Aliud est enim de quantitatibus aliud de formulis loqui: et potest quantitas eodem modo componi ex diversis, verbi gratia possibile est fortasse aliquam reperiri operationem, per quam eodem modo proveniat numerus 3 ex 4 et 6 quo ex 9 et 13, sed quis illam divinabit. Imo videtur nullus numerus esse, qui non forte eodem modo ex duobus paribus aliorum provenire possit, saltem per analyses quasdam transcendentes. Re igitur altius repetita, deprehendi, si sit quantitas aliqua a duabus dependens, sive iis determinatis determinata, sive ex illis datis calculabilis; posse formulam analyticam exprimi, qua ex iis componatur, eamque non variam vagamque sed certam constantem et unicam.

5



[Fig. 1]

10

1 potuit (1), ut si numerus 3 (a) eodem mo (b) eadem oper (2). Aliud L 6 igitur (1) profundius (2) altius L

1 neque Hugenium neque alios: Zum Streit vgl. GT, S. 51–53 und C. J. SCRIBA, *Gregory's converging double sequence*, 1983. Mit alios dürfte Leibniz neben Wallis auch sich selbst gemeint haben; vgl. Cc 2, Nr. 1102 Scholium zur zweiten propositio. — Den Zeitgenossen zugänglich waren die Rezensionen in den *Philosophical Transactions* III, 1668/69, Nr. 33 vom 16./26. März 1667/1668 S. 640–644 und im *Journal des Scavans* vom 2. Juli 1668 S. 361–368, die Stellungnahme von Huygens, a. a. O. vom 12. November 1668 S. 437–444, von Gregory in den *Philosophical Transactions* III, 1668/69, Nr. 37 vom 13./23. Juli 1668 S. 732–735 und Nr. 44 vom 15./25. Februar 1668/1669 S. 882–886 sowie in den *Exercitationes Geometricae*, 1668, Praefatio u. S. 1–8 [Marg.].

Sit ergo reperta quantitas aequalis sectori, seu sectoris alicuius quadratura, ea utique determina \langle ta \rangle erit lineis quibus sector determinatur, ut radio et sinu, vel radio et chorda; vel radio et sagitta vel tangente quae omnia eodem recidunt. Ponatur esse determinata radio et tangente semiarcus seu circumscripta sive inscripta, erit exprimibilis eius valor 5 per formulam (vel aequationem,) quam non alia ingreditur litera, quam r . et t . Sit illa aequatio verbi gratia z (sector) $\sqcap r^2 + bt^2 + frt + hr$. ubi duae tantum literae r . et t . at b . f. h . numeri qualescunque. Notabilis haec distinctio literarum lineas significantium a literis numeros significantibus.

Porro trapezium circumscriptum $ABDC$ aequatur radio in DC , quia angulus ACD 10 rectus ergo erit rt . Ex data t . ipsa CE , est $x \sqcap \frac{2rt^2}{r^2 + t^2}$. Sit G oppositum diametri punctum et GBF ducatur, erit $CF \sqcap 2t$. et $GC \sqcap 2r$. et $EG \sqcap 2r - x \sqcap 2r - \frac{2rt^2}{r^2 + t^2} \sqcap \frac{2r^3}{r^2 + t^2}$. et fiet: FC ad CG , seu DC ad AC , seu t . ad r . ut BE ad EG , seu ut BE ad $\frac{2r^3}{r^2 + t^2}$. Ergo $BE \sqcap \frac{2r^2t}{r^2 + t^2}$. Ergo triangulum $ABC \sqcap \frac{BE \wedge r}{2}$. seu $\frac{r^3t}{r^2 + t^2}$. Quemadmodum trapezium circumscriptum rt . sit $rt \sqcap b$. et $\frac{r^3t}{r^2 + t^2} \sqcap a$. Nempe a . triangulum, b . trapezium; 15 erit $a \sqcap \frac{br^2}{r^2 + t^2}$. Ope harum duarum aequationum quaeramus r . et t . ex a . et b . quod fieri posse patet. Erit $t \sqcap \frac{b}{r}$. et $a \sqcap \frac{br^2}{r^2 + \frac{b^2}{r^2}} \sqcap \frac{br^4}{r^4 + b^2}$. et reducendo: $r^4a + b^2a \sqcap br^4$. et $r^4 \sqcap \frac{b^2a}{b - a}$. sive $r \sqcap \sqrt[4]{\frac{b^2a}{b - a}}$. adeoque $t \sqcap b\sqrt[4]{\frac{b - a}{b^2a}}$. Quoniam ergo ex datis a . b . reperimus r . t . et ex datis r . t . calculo habuimus quantitatem sectoris ex hypothesi, habebimus etiam ex datis a . b . Ergo formulam habebimus analyticam eodem modo productam ex 20 a . b . quo ex \sqrt{ab} . $\frac{2ab}{a + \sqrt{ab}}$. Sed iam video non hinc sequi, quod eadem formula serviat pro

3 vel tangente erg. L 4 et (1) chorda (2) tangente L 8f. significantibus. (1) Porro triangulum aequatur radio (2) Porro L 19 modo (1) compositam (2) productam L 20 $\frac{2ab}{a + \sqrt{ab}}$. (1) Iam si formula ista sit pure analytica. (2) Sed L

quolibet alio sectore. Imo iam video id hinc sequi. Sufficit enim nos generaliter habere formulam eodem modo productam ex a . et b . quo ex duabus sequentibus, qualis ista est quam reperimus. Ut exacta sit ratiocinatio nostra. Reperta vel data area sectoris habetur valor eius expressus formula non continentem alias literas quam a . b . ut ostendi.

Duo sequentia polygona sint c ($\pi \sqrt{ab}$) et d ($\pi \frac{2ab}{a + \sqrt{ab}}$). Poterit ex c . et d . etiam calculo 5


reperiri idem sector quia similiter determinata omnia: eadem plane calculandi methodo. Quaeritur ergo, si ponamus v. g. esse sectorem $a^2 + b^2 + ma + nb$. an necesse sit idem provenire, si substituatur c . d . in locum a . b . Sed iam video id non esse necesse, nisi sciam quomodo isti numeri m . n . sint deducti, seu inventi. Itaque si quis mihi exhibeat quadraturam sectoris, non potero eum hac methodo refutare. Video tamen remedium. Demonstrabitur scilicet, me saltem eum refutare posse, si sciam quomodo inventa sit quadratura, seu posse demonstrare, quod impossibile sit, ut sciam quomodo sit inventa; tunc enim ubi id apparebit, nullo modo isti numeri particulares intrabunt, ita ut in iis ullo modo lateat virtualiter a . et b . Quod si ergo in iis nullo modo latet iam a . et b . tunc 10 verum erit me in locum a . et b . substituere posse c . et d . et erit formula eodem modo producta, inventa. Eadem autem formula semel reperta serviet mihi pro aliis omnibus sectoribus quod demonstratum est esse absurdum.

Caeterum una adhuc est difficultas: Possitne fieri ut formula reperiatur eodem modo composita ex polygonis duobus, et tamen ex ea data non possit reperiri sector. Ut si formula ista non possit accommodari ad casum aequalitatis. Quemadmodum reperi radiū 20

esse quantitatem eodem modo compositam ex quolibet trapezio cum suo triangulo, ergo est enim $r \pi \sqrt[4]{\frac{b^2a}{b-a}}$. posito trapezio b . triangulo a . Sed si novissime ea sint aequalia, et infinite parva, patet mira ratione omnia evanescere. Unde tamen forte deberet duci lux 25 \langle quaedam \rangle analytica. Et vero hinc incidit mihi in mentem an non et calculo inveniri possit radiū esse eodem modo compositum ex polygonis inscripto et circumscrip̄to quolibet: Quod ita indagabimus: Sumamus generaliter polygonum quodlibet regulare inscriptum, et circumscrip̄tum. Unumquodque eorum determinatum est ex suo ambitu, et fulcro. Quae omnia ad duas reduci possunt literas, quod quidem ea faciendum est

8 a. b. (1) Sed . . . necesse, quia isti numeri (2) Sed L 9 deducti, (1) ex (2) seu L 13 intrabunt, (1) neque in (2) ita L 25 ex (1) polygono inscripto sumto (2) polygonis L 28 et | radio gestr. | vel streicht Hrsg. | fulcro L 28 literas, (1) radiū, et alium. (2) quod L 25

arte, ut non ingrediatur numerus laterum polygoni, et ut nihilo minus possit area eius ex eiusmodi literis haberi, ut si sumamus ambitum non vero fulcrum.



[Fig. 2]

Ut regula quaedam facienda inveniendi aream polygoni ex ambitu in proxime inferiorem ambitum, aliaque id genus. Denique res ita instituenda, ut ex dato polygono inscripto et circumscripito, nulla mentione numeri laterum generaliter inveniri possit radius circuli. Est autem res determinata, quia in eodem circulo, non possunt duo esse polygona inscriptum et circumscripsum eodem modo. Res ita instituetur: Sunto polygona duo unum inscriptum *a*. alterum circumscripsum *b*. Ex iis quaeritur radius. Ponatur numerus laterum esse *n*. radius *r*. tangens semiarcus, seu circumscripta *t*. Hinc caetera calculare licebit. Scilicet hinc calculabimus aream polygoni inscripti, pariter et circumscripiti, verum ita duas tantum habebimus aequationes, cum opus sit tribus, unum ergo adiciendum est, ut exempli causa quantitas primi trianguli vel trapezii in ordine ad radium; ita duae tantum erunt incognitae, numerus laterum et radius. Verum sciendum est generaliter ex numero laterum et primo polygono quodlibet sequens non eodem modo posse componi, nisi per logarithmos, seu per expressionem transcendentem. Itaque non nisi per expressionem aliquam transcendentem radius inveniri potest ex datis *a*. *b*. quibuslibet posito primo dato. Qualiscunque sit, inveniatur. Nimirum numero invento per aequationem, tollatur ille, quoniam duae sunt aequationes dueque incognitae, donec tandem sit aequatio in qua sola *r*. incognita expressa ope *a*. *b*. Ponendo iam inverso modo *r*. cognitam, sed *a*. *b*. aequales et incognitas, eius ope invenientur *a*. vel *b*. inter se aequales seu sector. Hoc pulcherrimum. Habemus ergo *r*. quantitatem eodem modo compositam ex *a*. *b*. et ex $\sqrt{ab} \cdot \frac{2ab}{a + \sqrt{ab}}$. sed non ideo formulam quae non sit transcendens. Caeterum eligi possunt


4 in (1) fulcra (2) proxime *L* 8 instituetur: (1) Sumatur (2) Sunto *L* 10 n. (1) Hinc habebitur (2) radius *r*. (a) fulcr (b) tangens *L* 13 quantitas (1) omnium (2) primi *L* 17 datis (1) *a*. *b*. (supposito (2) *a*. *b*. *L* 18 inveniatur (1); eadem aequatio dabit quae situm sectorem (prae) (2). Nimirum *L* 22 ergo *r*. erg. *L*

modi convergendi, ut res fiat quam simplicissima, et ad solos si placeat logarithmos redeat, ut scilicet inveniendae sint tantum mediae proportionales. Numerus infinitus, n . eliminatus erit.

Hinc ergo apparet subtilissimum licet Gregorium rem non recte satis percepisse, quod quantitatem formulae confudit. Scilicet credidit data quantitate haberi formulam. At ego ipsi quantitatem dabo eodem modo compositam. Quae quantitas est radius. Sed nihil inde. Aliud videndum an non ex datis a, b, c, d , seu duobus proximis polygonorum paribus inveniri possit radius. Hoc fieri poterit sine istis logarithmis. Hinc si habeamus modum generalem quo radius componitur ex duobus paribus, quo ex duobus aliis paribus: at hinc etiam poterit inveniri sectoris area. Nam in ultimis omnia quatuor a se non differunt. Eodem modo sufficit ex tribus polygonis inscriptis tantum inveniri radium. Nec opus est seriebus convergentibus ullo modo.

5

10



[Fig. 3]

7 seu (1) polygonis inscripto et circumscripto vicinis sibi, ut (2) duobus L

4 Gregorium: s. o. Erl. zu S. 758 Z. 15 und S. 759 Z. 1.

Arcui BEC inscriptum triangulum ABC . Quadrangulum $ABEC \sqcap a^2$. Sexangulum $ABDEFC \sqcap b^2$ etc. $(\underbrace{2+1}_3 \quad \underbrace{2+2}_4 \quad \underbrace{2+4}_6 \quad \underbrace{2+8}_{10} \quad \underbrace{2+16}_{18})$. Decangulum [ABGDHELPMC] $\sqcap c^2$.

Triangulum ABD aequale $\frac{AD \text{ radio}}{2}$ in BN semichordam praecedentis polygoni.

- 5 Ergo ipsum $ABDE$ aequale radio in BN et $ABDEFC$, aequale radio in chordam polygoni praecedentis. Et generalis ex his oritur regula, polygonum sequens aequari radio in dimidium ambitum polygoni praecedentis. Sit polygonum $ABEC$ [\sqcap] a^2 . Dividatur per radium r . fiet $\frac{a^2}{r}$. polygoni praecedentis ambitus dimidius (ambitus demitis duobus radiis), BP . Ergo $\frac{2a^2}{r}$. eius ambitus $\sqcap BC$. Sit polygoni praecedentis numerus laterum n . Dividendo per n . fiet $\frac{2a^2}{rn}$. latus unum polygoni praecedentis ut BC , et BP eius [semichorda] erit $\frac{a^2}{nr}$. Iam ex data BP investigemus BN . Ipsam BP vocemus π . et AB vocemus r . Erit $AP \sqcap \sqrt{r^2 - \pi^2}$. et $PE \sqcap r - \sqrt{r^2 - \pi^2}$. cuius quadr. additum ad quad. π . dabit quad. BE . Ergo $r^2 - 2r\sqrt{r^2 - \pi^2} + r^2 - \pi^2 + \pi^2 \sqcap BE^2$. et $BN \sqcap \frac{\sqrt{2r^2 - 2r\sqrt{r^2 - \pi^2}}}{2} \sqcap \sqrt{\frac{r^2 - r\sqrt{r^2 - \pi^2}}{2}}$. et pro π . ponendo eius valorem
- 10 15 $\frac{a^2}{nr}$. fiet $BN \sqcap \sqrt{\frac{r^2 - r\sqrt{r^2 - \frac{a^4}{n^2r^2}}}{2}}$. $BN \sqcap \sqrt{\frac{r^2 - \frac{1}{n}\sqrt{r^4n^2 - a^4}}{2}}$. Hinc iam polygoni

1 a². (1) Hexangulu (2) Sexangulum $L = 2-4$ Decangulum | ABGDHELPFM ändert Hrsg.| $\sqcap c^2$. (1) Triangulum elementare voco (a), cuius (multi) (b) id ex quorum pluribus similibus et aequalibus in circulo polygonum componitur; ut triangulum ABE pro quadrangulo, ABD pro sexangulo ABG pro decangulo. (aa) Polygonum (bb) Triangulum (aaa) sequens (bbb) elementare aequatur (2) Triangulum $L = 7 \sqcap erg. Hrsg.$ 8f. (ambitus ... radiis) erg. $L = 9$ polygoni (1) a^2 (2) praecedentis $L = 11$ chorda L ändert Hrsg. 12 Erit (1) $NP \sqcap \sqrt{r^2 - \pi^2}$. et $DN \sqcap r - \sqrt{r^2 - \pi^2}$. (2) $AP \sqcap L = 12$ f. $\sqrt{r^2 - \pi^2}$. (1)

et (2) cuius quadr. (a) sublatum a (b) additum $L = 15 \sqrt{\frac{r^2 - \frac{1}{n}\sqrt{r^4n^2 - a^4}}{2}}$. (1) Eius duplum BE seu 2 BN multiplicetur (2) Hinc L

ABDEFC ambitum quaeremus. Nempe *BN* ducatur in numerum laterum polygoni [*ABEC*] qui est duplus numeri laterum polygoni praecedentis *ABC* seu duplus numeri *n*. Ergo *BN* ducatur in $2n$. numerum laterum polygoni *ABDEFC*, fiet dimidius ambitus, seu dimidium ipsius [*ABDEFC*], quod ductum in *r*. dabit aream polygoni *ABDEFC* \sqcap

5


$r\sqrt{2n^2r^2 - 2n\sqrt{r^4n^2 - a^4}}$ \odot b^2 . Et ita area polygoni tertii, *ABDEFC* $\sqcap b^2$, habebitur ex radio *r*, numero *n*. laterum polygoni primi *ABC*, et a^2 . area polygoni secundi, [*ABEC*]. Ergo eodem modo pro polygonis *ABC*. [*ABEC*]. *ABDEFC*. ponendo [*ABEC*]. *ABDEFC*. [*ABGDHELMC*]. tertii area, c^2 , ex praecedentium duorum, primi numero, $2n$, medii area $b^2 \sqcap r\sqrt{2n^2r^2 - 2n\sqrt{r^4n^2 - a^4}}$. habebitur. Ergo in aeq. \odot pro b^2 . ponendo c^2 , pro a^2 . ponendo b^2 , fiet: $r\sqrt{8n^2[r^2] - 4n\sqrt{4r^4n^2 - b^4}}$ $\mathbb{D} c^2$. Ope alterius ae-

10

quationum \odot et \mathbb{D} tollatur incognita *n*. In residua sola restabit quantitas incognita *r*. et habebitur aequatio seu formula secundum quam radius componitur ex a^2 . b^2 . c^2 . sive ex areis trium polygonorum quorumcunque. Habetur ergo formula eodem modo composita ex tribus polygonis datis, quo ex tribus polygonis proxime sequentibus. Iam calculavit Gregorius in serie *A. B. C. D. E.* etc. *Z.* polygonorum sectori inscriptorum, primo positio

15

a^2 . secundo b^2 . tertium fore $\frac{2b^6}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.



[Fig. 4]

2 BEC *L* ändert Hrsg. 4 dimidium (1) recta(rum) (2) ipsius | BDEF ändert Hrsg. |, quod *L*
5 b^2 . (1) Et eodem plane modo (2) Et *L* 7 BDEF *L* ändert Hrsg. dreimal 8 BGDFELMGC
L ändert Hrsg. 10 b^2 , (1) vel eius valorem, sive pro a^4 . ponendo $2r^4n^2 - 2nr^2\sqrt{r^4n^2 - a^4}$ (2) fiet *L*
10 r^2 erg. Hrsg. 13 ergo (1) | quantitas streicht Hrsg. | (2) formula *L* 14 Iam (1) si polygonorum
(2) calculavit *L* 15 *Z.* (1) si (2) polygonorum *L*

14 f. calculavit Gregorius: vgl. J. GREGORY, *Vera quadratura circuli et hyperbolae*, 1668, Scholium nach prop. V, S. 15.

Ergo quantitas habebitur eodem modo composita ex $a^2 \cdot b^2 \cdot \frac{2b^6}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. quo componitur

$$\text{ex } b^2 \cdot \frac{2b^6}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cdot \frac{2 \sqrt[6]{\frac{2b^6}{\sqrt{a^2 + b^2}}}}{b^2 + \frac{2b^6}{\sqrt{a^2 + b^2}}} \text{ seu ex } A. B. C. \text{ quo ex } B. C. D. \text{ aut } C. D. E. \text{ Ergo}$$

et quantitas habebitur eodem modo composita ex $Z. Z. Z.$ quo ex $A. B. C.$ Unde sequitur inveniri posse ipsam $Z.$ Idque dupli ex principio: Uno[,] quod illa
5 quantitas ex $Z. Z. Z.$ eodem modo composita iam cognita est (: Ubi tamen hoc manifestum est obstaculum, quod tunc sector ex solo determinaretur radio, quod absurdum et impossibile foret: nullae enim supererunt literae, nisi tria ultima polygona aequalia (seu in ultimis ipsa $Z.$) ex aeq. \circlearrowleft et \odot et litera $r.$ non ergo possunt poni aequales. Cui difficultati nullum aliud remedium video, quam non posse forte literam $n.$ tolli ex ae-
10 quationibus \odot et \circlearrowleft ope alterius, sed relinqu forte identicas aliaque id genus obstacula subtilia debent esse a natura parata :). Altero, quod aequando inter se quantitatem eodem modo compositam ex $A. B. C.$ quo ex $Z. Z. Z.$ invenietur $Z.$ (: Sed necesse est idem obstaculum reperiri, scilicet ut litera $n.$ non possit tolli, aut ut nihil possit reperiri nisi identicum, ponendo tres ultimas, seu $a^2 \cdot b^2 \cdot c^2$. in aeq. \odot , \circlearrowleft aequales[:]) Interim
15 hinc admiranda ducimus multa. Primo quantitatem invenire eodem modo compositam ex eiusmodi quantitatibus, modo sciamus ex qua curva sit ducta. (: Unde contra si curvam nesciamus, deturque seriei terminatio aliunde poterit hinc inveniri quantitas eodem [modo] composita, seu quasi latus rectum; et curvae forsitan aequatio: haec utilia, ad methodum tangentium inversam :) Secundo habebimus semper aequationem
20 egregiam cuius ope possit inveniri valor polygoni valde remoti, ope tantum numeri $n.$ et primorum $A. B. C.$ nempe ita ut error sit minor quam differentia eius ab alio proximo, semperque idem erit calculus, mutato tantum numero $n.$ quod est admirabile, et in hoc genere sumnum. Neque enim mente fingi potest appropinquatio perfectior. Reperietur

2 aut C. D. E. erg. $L = 7$ nisi (1) $a^2 \cdot b^2 \cdot c^2$. aequales et r. seu a. et r. (2) tria $L = 8$ aequales.
(1) Unde (2) Cui $L = 11$ natura | a streicht Hrsg. | parata $L = 16$ ducta. (1) Alteram (2) (: Unde
 $L = 18$ modo erg. Hrsg. 21 A. B. C. (1) errori (2) et ipsam (3) nempe L

765,16 tertium fore $\frac{2b^6}{\sqrt{a^2 + b^2}}$: Richtig wäre $\sqrt{\frac{2b^6}{a^2 + b^2}}$; der Fehler pflanzt sich fort bis Z. 2, wo bei der Ermittlung des dritten Terms ein weiterer Fehler hinzukommt.

scilicet aequatio simplicissima, pro area sectoris, in quam ingreditur numerus n . progressionis duplae, tanto exactior, quanto numerus maior; sine ulla alia mutatione. Hinc sectio anguli et rationis pulcherrima.

3 Darunter: Εὕρηκα

2 alia erg. L

61. DE AREIS ET CURVIS PER SERIES EXPRIMENDIS

28./29. Juni 1676 – 29. November 1678/[nach dem 29. November 1678]

Die beiden Teilstücke stehen in engem inhaltlichen und äußerem Zusammenhang. Sie wurden von Leibniz ursprünglich auf je ein Bl. 2° mit gleichem Wasserzeichenbild geschrieben und zuerst auf den 5 29. bzw. den 27., dann auf den 28. bzw. 29. Juni 1676 datiert. Unter den Haupttext von N. 61₁ schrieb Leibniz *Quadratura ex summis ordinatarum* (= Cc 2, Nr. 1449, Druck in einem späteren Band der Reihe) an, das er später aus dem Blatt herauschnitt; der am rechten Rand zunächst noch zusammenhängende Rest wurde getrennt (= LH 35 XII 1 Bl. 24 u. Bl. 25). Der ursprünglich unter Cc 2, Nr. 1449 geschriebene Zusatz 1 (= S. 772 Z. 2–8) stammt möglicherweise erst aus Hannoverscher Zeit; eine Ergänzung dazu (vgl. 10 S. 772 Z. 8) ist erst nach dem auf den 29. November 1678 datierten Zusatz 2 (S. 773 Z. 2–7) entstanden. Leibniz schrieb letzteren in die Lücke zwischen dem Haupttext und Cc 2, Nr. 1449 sowie unter den Zusatz 1. Zusatz 2 enthält einen Verweis auf N. 61₂; nach Tinte und Duktus dürfte der Zusatz 1 von N. 61₂ (= S. 778 Z. 9 – S. 780 Z. 6) zur selben Zeit entstanden sein. Nach der Abfassung von Zusatz 2 zu N. 61₂ (= S. 780 Z. 8 – S. 781 Z. 5) bemerkte Leibniz einen Fehler im Haupttext von N. 61₁, markierte ihn 15 am Rande des Blattes, korrigierte punktuell im Text und strich den Zusatz 2 zu N. 61₂. Zuletzt schrieb er den Zusatz 3 zu N. 61₂ (= S. 781 Z. 7 – S. 782 Z. 9) auf den freigebliebenen Rest des ersten Blattes unter die Zusätze zu N. 61₁.

61₁. DE FIGURARUM AREIS PER INFINITAS SERIES EXPRIMENDIS

28. Juni 1676 – 29. November 1678


20 Überlieferung: *L* Konzept: LH 35 XII 1 Bl. 24–25. Bl. 24: 1 Bl. ca 4°. 2 S. — Bl. 25: 1 Bl. ca 4°. 10 Zeilen auf Bl. 25 r°. oben. Darunter Zusatz 3 von N. 61₂. Bl. 25 v° leer. — Bl. 24 u. 25 bildeten ursprünglich mit LH 35 XIII 1 Bl. 433 (Cc 2, Nr. 1449), einem Zettel von max. 21,5 x 5,5 cm, ein vollständiges Bl. 2°.
Cc 2, Nr. 1458, 1459 C tlw.

25 28. I u n. 1 6 7 6.

De figurarum areis per infinitas series exprimendis regula generalis.

Inveni methodum generalem cuius ope obtineri semper poterit figura rationalis datae homologa; adeoque expressio curvae propositae per seriem infinitam.

25 (1) 29. (2) 28. *L* 26 De (1) curvarum (2) figurarum *L* 27 Inveni | tandem
gestr. | methodum *L* 27f. poterit (1) series rati (2) figura *L*



[Fig. 1]

Quae ut intelligatur sit curva $1C_2C_3C$. Axis $A_1B_2B_3B$. Ordinatae, $y \sqcap 1B_1C$, vel $2B_2C$, vel $3B_3C$. Et abscissae sint $x \sqcap A_1B$, vel A_2B , vel A_3B . Aequatio curvae quaelibet, ut $2ax - x^2 \stackrel{(1)}{\sqcap} y^2$. Area figurae: $\int y d\bar{x}$. Sumatur 1^o alia litera quaelibet, z , eique talis tribuatur relatio, ut $y d\bar{x}$. sit quantitas rationalis quod fiet si tum y , tum x , sint rationales ex data z . Ut exempli causa, ponatur $x \stackrel{(2)}{\sqcap} \frac{2az^2}{a^2 + z^2}$. eumque valorem substi-

5

tuendo in aequatione 1, $\frac{4a^2z^2}{a^2 + z^2} - \frac{4a^2z^4}{a^4 + 2a^2z^2 + z^4} \stackrel{(3)}{\sqcap} y^2$. et reducendo:

$$\frac{4a^4z^2(+4a^2z^4)(-4a^2z^4)}{a^4 + 2a^2z^2 + z^4} \stackrel{(4)}{\sqcap} y^2. \text{ et } \frac{2a^2z}{a^2 + z^2} \stackrel{(5)}{\sqcap} y. \text{ Iam } d\bar{x} \text{ ita investigabitur:}$$

10

$$d\bar{x} \stackrel{(6)}{\sqcap} \frac{2az^2}{a^2 + z} \stackrel{(7)}{\sqcap} \frac{\frac{(2az^2)}{(a^2 + z^2)} + 4a\beta z(+2a\beta^2)}{\frac{(a^2 + z^2)}{(a^2 + z^2)} + 2\beta z(+\beta^2)} \stackrel{(8)}{\sqcap} \frac{(+4\beta az^3) + 4a^3\beta z(+4\beta az^3)}{a^4 + 2a^2z^2 + z^4}. \text{ eritque}$$

$$\stackrel{(8)}{\sqcap} - \text{ et } \stackrel{(9)}{\sqcap} + \text{ et } d\bar{x} \stackrel{(9)}{\sqcap} \frac{4a^3\beta z}{a^4 + 2a^2z^2 + z^4}. \text{ et ex 9. et 5. erit } y d\bar{x} \sqcap a^4\beta, [3] \frac{z}{a^2 + z^2}$$

seu $y d\bar{x} \sqcap \frac{a^4\beta z^3}{a^6 + 3a^4z^2 + 3a^2z^4 + z^6}$. quae est figura rationalis, ad quam summa sinuum reducitur.

17 Zur ersetzen Lesart, am Rande: Error calculi

$$L \quad \begin{array}{lll} 6 \text{ tribuatur (1) valor (2) relatio } L & 6 \text{ f. quod ... data } z \text{ erg. } L & 8 \text{ f. substituendo (1) seriei (2) in} \\ 9 \text{ f. reducendo: (1) } \frac{(4a^2z^2) + 4a^2z^4(-4a^2z^4)}{a^4 + 2a^2z^2 + z^4} & \stackrel{(4)}{\sqcap} y^2 \text{ et } \frac{2az^2}{a^2 + z^2} & \stackrel{(5)}{\sqcap} y \text{ (2) } \frac{4a^4z^2(+4a^2z^4)(-4a^2z^4)}{a^4 + 2a^2z^2 + z^4} \\ L & & \end{array}$$

12 $d\bar{x} \stackrel{(9)}{\sqcap}$: Zählung doppelt; Leibniz bezieht sich im folgendem auf diese Gleichung. 15 Error calculi: Leibniz bemerkt den Fehler erst nach der Abfassung von Zusatz 2 zu N. 61₂ (vgl. die Erl. zu S. 780 Z. 9) und korrigiert nur punktuell. Der falsche Wert geht in Z. 12 in die Berechnung von $y d\bar{x}$ ein.

Caeterum saepe idem poterit obtineri compendiosius, si neque y , neque x , adeoque nec $d\bar{x}$ sint rationales; sed tamen factum ex ipsis $y d\bar{x}$ sit quantitas rationalis. Quod contingere poterit, si per eam quantitatatem irrationalis una dividitur, per quam altera multiplicatur. Porro quod diximus de resolutione figurae in parallelogramma per ordinatas, locum habet etiam de eius resolutione per convergentes in triangula, aut truncos triangulum residuos; aliaque id genus.

Caeterum si modo ab initio posito, tam $d\bar{x}$, quam y , sive tam x , quam y rationales quaerimus, tunc problema de areis curvarum per series infinitas exprimendis redit ad problemata Diophantea; et illud generale: Datam aequationem rationaliter explicare, ut

10 sit aequatio ad curvam conicam: $\sqrt{\frac{a^2}{2ax + \frac{a}{q}x^2} + \frac{a}{q} + 1} \sqcap \frac{z}{a}$. Ergo $\frac{a^2}{2ax + \frac{a}{q}x^2} + \frac{a}{q} + 1$.

aequanda quadrato seu $\frac{z^2}{a^2}$. Sit $\frac{z}{a} \sqcap \frac{a}{x} + \sqrt{\frac{a}{q} + 1}$. fiet: $\frac{a^2}{2ax + \frac{a}{q}x^2} \left(\frac{a}{q} + 1 \right) \sqcap \frac{a^2}{x^2} +$

$\frac{2[a]}{x} \sqrt{\frac{a}{q} + 1}, \left(\frac{a}{q} + 1 \right)$. Sed sic res ut video nondum absoluta, procedamus rectius et

scribamus: $\wp \frac{\sqrt{a^2 2ax + a^2 \frac{a}{q}x^2, \frac{a}{q} + 1}, 4a^2 x^2 + 4\frac{a}{q}x^4 + \frac{a^2}{q^2}x^4}}{2ax + \frac{a}{q}x^2} \sqcap \frac{z}{a}$ ubi formulata [numerato] aequanda quadrato forte utiliter poterit prior semiabsoluta:

15 $\frac{a^2}{2a + \frac{a}{q}x} \sqcap \frac{a^2}{x} + 2[a] \sqrt{\frac{a}{q} + 1}$. Imo video ne hoc quidem sic sufficere[,] debet enim non

definite, seu in casu particulari, sed indefinite reddi rationalis. Praeterea non nisi duae restare debent literae indeterminatae in una aequatione. Itaque tertia assumta quantitate ω , explicanda per eam x , ita ut possit extrahi radix ex prima formula seu valore ipsius z , ut scribatur:

6 f. genus. (1) Tota ergo res eo redit, data aequati (2) Caeterum si (a) vulgari ratione (b) modo L 10 curvam (1) ellipsoes (2) conicam L 12 a erg. Hrsg. 13 f. nominatoris L ändert Hrsg. 15 a erg. Hrsg.

$$\frac{a^2}{2ax + \frac{a}{q}x^2} \left[\frac{a}{q} + 1 \right] \sqcap \omega^2 + 2\omega \sqrt{\frac{a}{q} + \frac{1}{1}} \left[\frac{a}{q} + 1 \right]. \frac{a}{q} + 1. \text{ vocemus } \gamma. \text{ et } \omega \sqcap$$

$\frac{v}{2a + \frac{a}{q}x}$ fiet: $\frac{a^2}{2ax + \frac{a}{q}x^2} \sqcap \frac{v^2 + 2\gamma v 2a + \frac{a}{q}x}{[2] 2a + \frac{a}{q}x}$. seu $\frac{a^2}{x} \sqcap \frac{v^2 + 2\gamma v 2a + 2\gamma v \frac{a}{q}x}{2a + \frac{a}{q}x} : 2a^3 +$

$$\frac{a^3}{q}x \sqcap v^2 x + 4\gamma v a x + 2\gamma \frac{a}{q}x^2. \text{ sive } x^2 \begin{bmatrix} \frac{a}{q}v \\ \frac{q}{2\gamma a}v^2 \\ -\frac{a^2}{2\gamma} \end{bmatrix} \bullet \bullet \bullet$$

5


deberet radix extrahi posse, ubi x^2 ascendit ad quadratoquadratum, adeoque res prorsus ut ab initio unde redordiri possemus a formula \wp . Sed id nunc non opus, sufficit methodum tenere. Imo ope formulae \wp res multo simplicior reddi potest. Scribamus $2ax + \frac{a}{q}x^2 \sqcap \xi$. fiet

$\frac{\sqrt{\xi + \gamma \xi^2}}{\xi} \sqcap \frac{z}{a}$. Extrahenda est radix ex $\xi + \gamma \xi^2 \sqcap [2]\sqrt{1 + \gamma \xi}\varphi^2$. et $\xi \sqcap \varphi^2 + \gamma \xi \varphi^2$. Aliter $\xi + \gamma \xi^2 \sqcap \psi^2 \xi^2$ seu $1 + \gamma \xi \sqcap \psi^2 \xi$. sed non est his nunc immorandum. Sufficit methodum tenere, ut tantum ad inventionem seriei rationalis pro curva, solutio problematis Diophantaei supersit.


3–7 +2a³ (1) potest (2) deberet L 7 res (1) difficilior quam (2) prorsus L 12 pro curva
erg. L

3 +2 $\gamma \frac{a}{q}x^2$: Leibniz vergibt in diesem Term den Faktor v ; der Fehler geht in die anschließende Umformung der quadratischen Gleichung ein, in der auch der Term $+2a^3$ noch umgeformt werden müßte.

[Zusatz 1]



[Fig. 2]



[Fig. 3]

$$\frac{a^2}{2ax + \frac{a}{q}x^2} \quad \boxed{\begin{array}{l} \frac{a}{q} + 1 \\ \gamma \end{array}} \quad \pi \omega^2 + 2\omega \sqrt{\gamma} (+\gamma) \text{ sive } 2ax + \frac{a}{q}x^2, \gamma \omega^2 + 2\omega \sqrt{\gamma} \pi a^2. \text{ Pro}$$

x sumatur $\frac{q}{2} + y$ pro $2ax + \frac{a}{q}x^2$, fiet $+ \frac{2aq}{2} + 2ay$, $\frac{a}{q} \frac{q^2}{4} + ay + \frac{a}{q}y^2$. $x \pi y + c$. fiet

5 $2ay + 2ac + \frac{a}{q}y^2 + \frac{2a}{q}yc + c^2$. sit $\cancel{2}\phi\psi \pi + \frac{2\phi}{q}c\psi$ seu $c \pi + q$. fiet $2ax + \frac{a}{q}x^2 \pi q^2 + 2aq + \frac{a}{q}y^2 \pi$

[bricht ab]

$$\text{Sit } \omega \pi \frac{v}{x}. \text{ fiet: } \frac{a^2}{2ax + \frac{a}{q}xx} \text{ aequ. } \frac{v^2 + 2v\sqrt{\gamma}}{x^2} \text{ seu } x \pi \frac{2avv + 4av\sqrt{\gamma}}{a^2 + \frac{a}{q}vv + \frac{2a}{q}v\sqrt{\gamma}} \text{ et } d\bar{\omega} \text{ aequ.}$$

$\frac{vd\bar{x} - xd\bar{v}}{xx}$ et pro x item pro $d\bar{x}$ substituendo valorem habetur $xd\bar{\omega}$ per v rationaliter.

7 (1) $yy \pi (a) z^2$ (b) $v^2 + a^2b^2$. Ergo $2ydy \pi 2vd\bar{v}$. Ergo $dy \pi \frac{2vd\bar{v}}{(--)^2 + b^2}$ (2) Sit $L = 8$ et ...

rationaliter erg L

[Zusatz 2]

29. Novemb. 1678.

Res non difficulter absolvitur hoc modo: $\pm \frac{a}{q} + 1$ sit *aequ.* m et fiet: $\frac{z^2}{a^2} m^2$ *aequ.*
 $\frac{a^2}{2ax \pm \frac{a}{q} x^2} \cdot (\pm) \frac{z^2}{a^2} (\pm) m, e$ *aequ.* $\frac{a}{x}$, et fiet: $\pm \frac{z}{a} \overline{(\pm) m}, \cup e$ *aequ.* $\frac{a}{2a \pm \frac{a}{q} x} + 1$. Res sic non
procedit quia incognita in nominatore, ideo sic procedemus: $z^2 2ax \pm z^2 \frac{a}{q} x^2 - m^2 2ax \pm$ 5
 $m^2 \frac{a}{q} x^2$ *aequ.* a^2 . Ponatur [bricht ab]

Vide 29. Iun. 1676. ubi pro curva conica series rationalis quaeritur.

5 in (1) numeratore (2) nominatore, ideo (a) semper pro z scribamus $\frac{q}{\langle \rightarrow \rangle}$ et $\frac{1}{\langle \rightarrow \rangle}$ *aequ.* x^2 (b)
sic L

7 Vide: N. 61₂.

61₂. PRO CURVA CONICA SERIES RATIONALIS QUAERENDA

29. Juni 1676 / [am und nach dem 29. November 1678]

Überlieferung: L Konzept: LH 35 XII 1 Bl. 25, 29. Bl. 25: 1 Bl. ca. 4°. 1/2 S. auf Bl. 25 r° unten, darüber 10 Z. von N. 61₁ (= S. 772 Z. 1–8 und S. 773 Z. 5–7). Bl. 25 v° leer. — Bl. 29: 1 Bl. 2°. 2 S. Haupttext und Zusätze 1 u. 2 auf Bl. 29. Zusatz 3 auf Bl. 25 r°. Datum u. Überschrift auf Bl. 29 r° oben ergänzt.
Cc 2, Nr. 1459 A–B, C tlw.

29. Iun. 1676.

Pro curva conica series rationalis quaerenda

$$\sqrt{\underbrace{\frac{a^2}{2ax \mp \frac{a}{q}x^2} + 1 \mp \frac{a}{q}}_{\mathfrak{D}}} \mp \frac{z}{a}. \text{ seu } a^4 + 2a^3x \mp \frac{a^3}{q}x^2, \mp 2a^3x + \frac{a^4}{q^2}x^2 \mp 2z^2ax \mp \frac{a}{q}x^2z^2.$$

Determinando ad tangentes: $2a^3t \mp \frac{2a^3}{q}xt \mp 2a^3t + \frac{2a^4}{q^2}xt - 2z^2at \mp \frac{2a}{q}xtz^2 \mp 4z^2ax \mp \frac{2a}{q}x^2z^2$ eritque $t \mp \frac{2a^3 \mp \frac{2a^3}{q}x \mp 2a^3 + \frac{2a^4}{q^2}x - 2z^2a \mp \frac{2a}{q}xz^2}{4z^2ax \mp \frac{2a}{q}x^2z^2}$. Et pro z^2 . ponendo


9 Daneben: NB. sub finem solutio vera.

8 (1) Pro c (2) 27. (3) 29. L

14 sub finem: Gemeint ist wohl ursprünglich der gestrichene Zusatz 2, sinngemäß Zusatz 3.

10–775,1 $\mp 2a^3x$: Richtig wäre $\mp \frac{2a^4}{q}x$; dieser und ein weiterer Flüchtigkeitsfehler beeinträchtigen die Berechnung der Subtangente t , die Leibniz in S. 775 Z. 1 abbricht.

$$\frac{\odot a^4 + 2a^3x + \frac{a^3}{q}x^2 + \frac{2a^3}{x} + \frac{a^4x^2}{q^2}}{2ax + \frac{a}{q}x^2} \text{ fiet } t \sqcap \frac{2 \wedge \odot}{2a^3 + \frac{2a^3}{q}x + 2a^3 + \frac{2a^4}{q}x} [\text{bricht ab}]$$



$\frac{\gamma}{\beta} \sqcap \frac{z}{t}$ et $\gamma \sqcap \frac{\beta z}{t}$ et $\gamma z \sqcap \frac{[\beta]z^2}{t \sqcap \frac{\beta z^2}{2z^2}} \sqcap \frac{[\beta]\gamma}{2\gamma}$. Unde hic rationalis

figura cuius haberi potest summa.

$2ax + \frac{a}{q}x^2$. Sit $x \sqcap y + b$ fiet $2ay + 2ab + \frac{a}{q}y^2 + \frac{2a}{q}yb + \frac{a}{q}b^2$.

et $\frac{2ab}{q} + \frac{2ab}{q}y \sqcap 0$. Ergo $b \sqcap \frac{a}{q}$ et $x \sqcap y + q$ et $2ax + \frac{a}{q}x^2 \sqcap$ 5

$\boxed{2ay} + 2aq + \frac{a}{q}y^2 \boxed{\frac{a}{q} + 2qy} + \frac{a}{q}q^2$ et fiet $+aq + \frac{a}{q}y^2$. et fiet

$\frac{a^2}{aq + \frac{a}{q}y^2} + 1 + \frac{a}{q} \sqcap \frac{z^2}{a^2}$, seu $\boxed{a^4} + a^3q + \frac{a^3}{q}y^2 \boxed{-a^4} + \frac{a^4}{q^2}y^2 \sqcap +aqz^2 + \frac{a}{q}y^2z^2$ et $y^2 \sqcap$

$\frac{+aqz^2 + a^3q}{\frac{a^3}{q} + \frac{a^4}{q^2} + \frac{a}{q}z^2}$. Ergo dividendo per $\frac{aq}{a} \sqcap q^2$ debet $\frac{+z^2 + a^2}{+a^2 + \frac{a^3}{q} + z^2} \sqcap \frac{+z^2 + a^2}{(\pm)b^2 + z^2}$ aequari

$(\pm)b^2$

$\pm a^2 + \frac{a^3}{q} \pm z^2$

quadrato. Invertendo sufficit $\frac{\pm z^2 + a^2}{\pm z^2 + a^2}$ aequari quadrato, seu: $\pm a^4 + z^4 + \frac{a^3}{q} + \frac{a^5}{q}$ 10

aequari quadrato.

2 γ L ändert Hrsg. zweimal

7-10 $y^2 \sqcap \frac{\pm aqz^2 + a^3q}{\frac{a^3}{q} + \frac{a^4}{q^2} + \frac{a}{q}z^2}$: Im letzten Term des Nenners unterläuft Leibniz ein Vorzeichenfehler,

der das Ergebnis in Z. 10 beeinträchtigt.

$$\frac{a^2}{\frac{a}{q} - \frac{a}{q}y^2} + 1 - \frac{a}{q} \sqcap \frac{z^2}{a^2} \text{ aequatio ipsarum } z. \text{ quae homogeneae sunt curvae conicae.}$$

Aequatio ad sectionem conicam $aq - \frac{a}{q}y^2 \sqcap v^2$. Compendii causa $1 - \frac{a}{q}$ vocemus $\frac{\theta}{a}$. fiet

$$\boxed{\frac{a^2}{aq - \frac{a}{q}y^2}} + \frac{\theta}{a} \sqcap \frac{z^2}{a^2} \text{ aequatio curvae conicae. Unde et } \frac{qa}{q^2 - y^2} \sqcap \frac{z^2 - \theta a}{a^2}. \text{ Ergo}$$

$$\frac{qa}{q^2 - y^2} + \frac{\theta}{a} \sqcap \frac{z^2}{a^2}$$

5 $z^2 - \theta a, \wedge q^2 - y^2 \sqcap qa^3$ aequatio generalis figurae quae curvae conicae homogenea est.

$$z + \sqrt{\theta a}, z - \sqrt{\theta a}, q + y, q - y \sqcap qa^3. [\text{Ponatur } q + y \sqcap \frac{\omega a^2}{z + \sqrt{\theta a}, z - \sqrt{\theta a}} \text{ fiet } a^2\omega, q - y \sqcap qa^3]$$

$$\text{et } q - y \sqcap \frac{qa^3}{\omega\omega}. \text{ Ergo } 2q \sqcap \frac{qa}{\omega} + \frac{\omega a^2}{z + \sqrt{\theta a}, z - \sqrt{\theta a}}.] 2q \sqcap \frac{qa, z + \sqrt{\theta a}, z - \sqrt{\theta a} + \omega^2 a^2}{z + \sqrt{\theta a}, z - \sqrt{\theta a}, \omega}$$

$$\text{seu } qa z^2 - qa\theta a + \omega^2 a^2 \sqcap 2q\omega z^2 - 2q\omega\theta a \ddot{v}.$$

Ponatur $az \sqcap ce + dv + fa$ et $\omega \sqcap ge + hv + la$ fiet

$$10 \quad \frac{q}{a}, c^2 e^2 + 2cdev + 2cfae, +d^2 v^2 + 2dfav + f^2 a^2, -qa\theta a,, \\ + [a^2,] g^2 e^2 + 2ghev + 2glae + h^2 v^2 + 2hlav + l^2 a^2$$

□

1 f. conicae. (1) | q ∙ + Q. streicht Hrsg. | Aequatio ad curvam conicam $2ax \mp \frac{a}{Q}x^2 \sqcap (2)$ Aequatio L

3 conicae (1) seu $qa + q^2 - y^2 - a^2 - \frac{a^2}{q^2}y^2$ (2). Unde $L = 5 \wedge q^2 - y^2 \sqcap (1)$ quadrato (2) qa^3

aequatio (a) ad curvam conicam (b) generalis $L = 5$ f. est. (1) Fingamus (2) Sit $q + y \sqcap \frac{\omega a}{z + \sqrt{\theta a}}$ et fiet

$y \sqcap \frac{\omega a}{z + \theta a (!)} - q$ et $q - y \sqcap 2q - \frac{\omega a}{z + \theta a (!)}$ et pro $z^2 - \theta a \wedge q^2 - y^2 \sqcap qa^3$. fiet: $z\sqrt{\theta a}, \wedge 2q\omega - \frac{\omega^2 a}{z + \sqrt{\theta a}} \sqcap qa^3$

(3) $z + \sqrt{\theta a} L = 6$ f. Ponatur ... $\frac{\omega a^2}{z + \sqrt{\theta a}, z - \sqrt{\theta a}}$. gestr. L, erg. Hrsg. 11 a², erg. Hrsg.

$$\begin{aligned}
& \left[\frac{2q}{a^2}, \right] c^2 g e^3 + 2cdg e^2 v + 2cfa g e^2 + d^2 g v^2 e + 2dfag ve + f^2 a^2 g e + d^2 h v^3 + 2dhfa v^2 \\
& + c^2 h + lac^2 + 2cdh + 2cfah + lad^2 \dots \\
& + 2lacd + 2la^2 cf. \\
& + f^2 a^2 hv + f^2 a^3 l \\
& + 2dfla^2 \\
& - 2q\theta[a], \overline{ge + hv + la}
\end{aligned}$$

5

Ubi habemus: $v^3 \cdot e^3 \cdot v^2 e \cdot e^2 v \cdot e^2 \cdot v^2 \cdot v \cdot e \dots$ Tollendi ergo termini $e^3 \cdot e^2 v \cdot e^2$. Pro e^3 tollenda: $c^2 g \sqcap 0$. Pro $e^2 v$, tollenda erit $2cdg + c^2 h \sqcap 0$. Quorum utrumque non potest praestari rectius quam ponendo $c \sqcap 0$. Sed e^2 . video hac eadem methodo non posse tolli simul enim c et g fierent $\sqcap 0$. et evanesceret e nec nisi una indeterminata v , intrat aequationem.

10

$a^2 z^2 - \theta a^3 \wedge a^2 q^2 - a^2 y^2 \sqcap qa^7$. Pone $az \sqcap ce + dv + fa$. et $ay \sqcap ge + hv + la$. erit: $qa^7 \sqcap c^2 e^2 + 2cdev + 2cfae + d^2 v^2 + 2dfav + f^2 a^2, -\theta a^3, \wedge a^2 q^2, +g^2 e^2 + 2ghev + 2glae + h^2 v^2 + 2hlav + l^2 a^2$. Video potuisse etiam denominatores dari ipsis az , et ay . in quos intrassent ipsae e . et v , nec ideo ad altiores terminos ascendissemus, habuissemusque alteram tantum arbitrariam, adeoque libertatem destruendi magnam, at in aequatione 20 potuissemus quidem etiam maiorem habere numerum arbitrariarum, licet altius non ascendendo, sed ea cautione, ut idem sit denominator ipsarum az . et aw .

15

Nimirum aequatio $qaz^2 + \omega^2 a^2 + 2q\theta a\omega \sqcap 2q\omega z^2 + qa^2\theta$. Pro z ponatur $\frac{a\varphi}{\psi}$. pro $\omega \frac{a\lambda}{\psi}$.

Unde fiet: $qa^3\varphi^2\psi + a^4\lambda^2\psi + 2q\theta a^2\lambda\psi^2 \sqcap 2qa^3\lambda\varphi^2 + qa^2\theta\psi^3$. $a\lambda \sqcap ce + dv + fa$. $a\varphi \sqcap ge + hv + la$. $a\psi \sqcap me + nv + ar$. Nuspam ascendetur ultra $v^3 \cdot e^3 \cdot v^2 e \cdot e^2 v \cdot v^2 \cdot e^2 \cdot ve \cdot v \cdot e$.

20

Quod si ergo desideramus e puram (nam par est ratio, cum eodem modo valores formentur ex e . quam v . et si unum impossibile, erit et alterum) tollenda $e^3, e^2 v, e^2$. Excerptamus

e^3 . explicando saltem animo terminos quibus opus: $qg^2 m e^3 + ac^2 m e^3 + \frac{2q\theta}{a} m^2 c e^3 \sqcap$

$2qg^2 c e^3 + \frac{q\theta}{a} m^3 e^3$. Ergo $aqg^2 m + a^2 c^2 m + 2q\theta m^2 c \sqcap 2aqg^2 c + q\theta m^3$. Et pro $e^2 v$, tollenda fiet

25

aequatio $+qg^2 n + q2ghm, +ac^2 n + a2cdm, +\frac{2q\theta}{a} m^2 d + \frac{4q\theta}{a} mnc \sqcap 2qg^2 d + 4qghc + \frac{3q\theta}{a} m^2 n$.

1 $\frac{2q}{a^2}$, erg. Hrsg. 6 a erg. Hrsg. 10 una (1) incogni (2) indeterminata L

Denique pro e^2 tollenda fiet: $qg^2ra + [q2glam] + ac^2ar + a2cfam + \frac{2q\theta}{a}m^2fa + \frac{4q\theta}{a}marc \sqcap$

$2qg^2fa + 4qglac + [\frac{q\theta}{a}3m^2ar]$. Ponendo m . et $c \sqcap 0$ satisfiet aeq. 1. Unde pro aeq. 2:

$qg^2n \sqcap 2qg^2d$ seu $n \sqcap 2d$; et ex aeq. 3. $qg^2ra \sqcap 2qg^2fa$ seu $ra \sqcap 2fa$ caeterae arbitriae, et fieri possent h . et $l \sqcap 0$.

5 Posuimus $a\lambda \sqcap ce + dv + fa$. $a\varphi \sqcap ge + hv + la$. $a\psi \sqcap me + nv + ar$. $m \sqcap c \sqcap h \sqcap l \sqcap 0$. $n \sqcap 2d$. $ar \sqcap 2fa$. erit $a\lambda \sqcap dv + fa$. $a\varphi \sqcap ge$. $a\psi \sqcap 2dv + 2fa$. $\frac{\omega}{a} \sqcap \frac{a\lambda}{a\psi}$ [\sqcap]
 $\frac{dv + fa}{2dv + 2fa} \sqcap \frac{1}{2}$ quod absurdum est. Ita enim ipsa ω fieret constans, non ergo sic licet.

[Zusatz 1]

Omnia pagina praecedenti huc reducta erant: $\frac{qa}{q^2 - y^2}$ aequ. $\frac{z^2 - \theta a}{a^2}$.

$$10 \quad \left. \begin{array}{l} +a^3q \\ +\theta aq^2 \end{array} \right\} \text{aequ. } q^2z^2 + \theta ay^2 - y^2z^2$$

10 Unter aequ.: m

18f. Zur ersetzen Stufe (2) der Lesart, gestrichen:

$$\begin{aligned} a\lambda \sqcap dv + fa & \quad a^2\lambda^2 \sqcap d^2v^2 + 2dfav + f^2a^2 \\ a\varphi \sqcap ge + 2fa & \quad a^2\varphi^2 \sqcap g^2e^2 + 4gfae + 4f^2a^2 \\ a\varphi \sqcap 2dv \text{ [bricht ab]} & \quad a^3\lambda g^2 \sqcap g^2de^2v + 4gfae + 4f^2a^2dv + g^2fae^2 + \\ & \quad 4gf^2a^2e + 4f^3a^3 \end{aligned}$$

1 $q2glac L$ ändert Hrsg. 2 $\frac{q\theta}{a}3m^2e^2ar L$ ändert Hrsg. 4f. 1 $\sqcap 0$. (1) $\frac{z}{a} \sqcap \frac{ge + hv}{2dv + 2fa}$ et
 $\frac{\omega}{a} \sqcap \frac{dv + fa}{2dv + 2fa}$. $a\lambda \sqcap dv + fa$. $a\varphi \sqcap ge + 2fa$. $2dv + 2fa \sqcap a\psi$ (2) | $qa^4\varphi^2\psi + a^5\lambda^2\psi + 2a^3q\theta\lambda\psi^2 \sqcap 2qa^4\lambda\varphi^2 +$
 $qa^2\theta\psi^3$. streicht Hrsg. | $qa2dv\sqrt{g^2e^2} + 4gfae + 4f^2a^2 + a^22dv\sqrt{d^2v^2 + 2dfav + f^2a^2} + 2q\theta4d^2v^2 \sqrt{dv + fa} \sqcap$
 $2ga\sqrt{g^2de^2v}4gfae + 4f^2a^2dv + g^2fae^2 + 4gf^2a^2e + 4f^3a^3$ (3) Inven (4) Posuimus L 6 \sqcap erg. Hrsg
9f. $\frac{z^2 - \theta a}{a^2}$. (1) Loco $\frac{z^2}{a^2}$ ponatur $\frac{b^2}{\omega^2}$ et fiet: $\frac{z}{a}$ aequ. $\frac{b}{\omega}$ et scribemus (a) $\frac{z^2}{b^2}$ (b) $\frac{b^2}{\omega^2}$ + (3) Loco $\frac{z^2 - \theta a}{a^2}$
ponatur (4) Sit $q^2 - y^2$ aequ. $\frac{1}{e^2}$ seu (5) $+a^3q L$

$$\begin{aligned} z \text{ aequ. } ce + dv + f. \quad y \text{ aequ. } ge + hv + k. \text{ fiet:} \\ q^2 z^2 \text{ aequ. } q^2, \frac{c^2 e^2 + d^2 v^2 + 2cde + 2cfe + 2dfv + f^2}{\theta ay^2 \text{ aequ. } \theta a, \frac{g^2 e^2 + h^2 v^2 + 2ghe + 2gke + 2hkv + k^2}} \end{aligned}$$

addatur valor ipsius y , et quadretur atque auferatur, summa comparetur cum aequatione ex rationali excitata.

5

$$\begin{aligned} q^2 z^2 + \theta ay^2 - y^2 z^2 - a^3 q &\text{ aequ. } 0. \quad z \text{ aequ. } \frac{de}{v} \text{ et } y \text{ aequ. } \frac{dv}{e}, \text{ fiet} \\ &- \theta aq^2 \\ q^2 \frac{d^2 e^2}{v^2} + \frac{\theta ad^2 v^2}{c^2} &- a^3 q \text{ aequ. } d^4. \text{ Unde ut extrahi possit radix, fiet:} \\ &- \theta aq^2 \\ \frac{qde}{v} + \sqrt{\theta a}, \frac{dv}{e} &- 2q\sqrt{\theta ad^2} \text{ aequ. } d^2 \\ &- a^3 q \\ &- \theta aq^2 \end{aligned}$$

10

$$q^2 z^2 + \theta ay^2 - y^2 z^2 \text{ aequ. } m. \text{ Scribatur } z^2 \text{ aequ. } ce^2 + dv^2 + r. \text{ et } y^2 \text{ aequ. } fe^2 + gv^2 + h.$$

fiet	$q^2 c e^2 + q^2 d v^2 - c f e^4 - d g v^4 - c g e^2 v^2$	$\boxed{-h c e^2 - h d v^2}$	$-h r \text{ aequ. } 0$	15
$+ \theta a f$	$+ \theta a g$	$- d f$	$-r f - r g$	
$- h c$	$- h d$		$-m$	
$- r f$	$- r g$		$[+q^2 r]$ $[+\theta ah]$	

6 Darunter: Imo hoc non licet, quia sic ex duabus incognitis fit una, non ponitur yz aequ. constanti.

1 (1) Pone z aequ. $y\omega + f$ fiet $\frac{+a^3 q}{+\theta aq^2}$ aequ. $q^2 y^2 w^2 + 2q^2 yf + q^2 f^2 + \theta ay^2, -z^2 y^2 w - 2z^2 yf + z^2 f^2$ (2)
 Loco z^2 scribe \mathfrak{z} loco y^2 scribe v fiet $a^3 q + \theta aq^2$ aeq. $q\mathfrak{z} + \theta av - v\mathfrak{z}$, fiat \mathfrak{z} aequ. $e + f$ et v aequ. $h + l$. et habebimus $a^3 q + \theta aq^2$ aequ. $qe + qf + \theta ah + \theta al - eh - le - fh - fl$ fiant $a^3 q + \theta aq^2$ aequ. $qf + \theta al - fl$. et (a) restabit qe (b) fiat: h aequ. e et (aa) faciamus (bb) fiet: $q + \theta av - el$. et restabit $qe + eah - eh - le - fh$ aequ. 0 (3) Scribatur compendii ergo $a^3 q + \theta aq^2$ aequ. m et fiet: $mz + ny$ (4) $z L = 16 + q^2 r$ erg. Hrsg. 17 $+\theta ah$ erg. Hrsg.

778,9 pagina praecedenti: s.o. S. 775 Z. 7–10. 778,11 m : In Z. 13 setzt Leibniz die rechte Seite der Formel gleich m .

At aequ. $le^2 + nv^2 + p$ ducenda in $\beta e^2 + \gamma v^2 + \delta$, fiet: aequatio comparanda priori quod fieri potest et habebimus aequationem $le^2 + nv^2 + p$. inventis *l.n.p.* item aliis literis, inde pro e^2 et v^2 restituemus y^2 et z^2 ope aequationum purarum quas habemus et res omnis facile absoluta habebitur. Multisque aliis modis in potestate est.

- 5 Tantum utile erat huiusmodi comparationes iam generaliter fuisse institutas ne opus sit calculo.

[Zusatz 2, gestrichen]

$$\text{Aliter: } \frac{zz}{aa} \stackrel{(1)}{\text{aequ.}} \frac{a^2}{aq - \frac{a}{q}yy} \boxed{+1 - \frac{a}{q}} \text{ ponatur aequ. } \frac{vv}{\sqrt{aq \pm y\sqrt{\frac{a}{q}}[2]}} + \frac{2v\sqrt{1 - \frac{a}{q}}}{\sqrt{aq \pm y\sqrt{\frac{a}{q}}}}$$

- $\boxed{+1 - \frac{a}{q}}$ ergo fiet: $\frac{aa}{\sqrt{aq \mp y\sqrt{\frac{a}{q}}}} \stackrel{(3)}{\text{aequ.}} \frac{aa}{\sqrt{aq \pm y\sqrt{\frac{a}{q}}}} + 2v\sqrt{1 - \frac{a}{q}}$. Unde in aequ. (4)
- 10 habetur valor ipsius y rationaliter per v . Iam quia ex valore 2. ipsius $\frac{zz}{aa}$ extrahi potest radix quadratica, fiet: $\frac{z}{a} \stackrel{(5)}{\text{aequ.}} \frac{v}{\sqrt{aq \pm y\sqrt{\frac{a}{q}}}} + \sqrt{1 - \frac{a}{q}}$ et pro y . substituendo valorem ex aequ. 4. habebitur in aequ. 5 ipsa z . rationaliter per v . Sed necesse est $\frac{a}{q}$ esse quantitatem

8–781,5 Zum gestrichenen Zusatz, nicht gestrichen: $\frac{a^2}{aq - \frac{a}{q}yy} + 1 - \frac{a}{q}$ revocentur

ad unum denominatorem. Is variis modis divelli poterit in duos prout prius arbitrarie compositam fractionem multiplicaverimus.

9 Zu aequ. (4): Error.

9 in aequ. (4) erg. L

9 in aequ. (4): Gemeint ist die Gleichung (4) in N. 61₁; vgl. die Erl. zu S. 769 Z. 9 f.

affirmativam et minorem quam 1. sin minus poterunt quaedam mutari, ut res tamen succedat.

Loco aequ. 1. quaerimus valorem i ψ ius yy . fiet: $z z a q - \frac{a}{q} z z y y$ aequ. $\alpha^4 + a^3 q - \frac{a^3}{q} y y -$
 $\alpha^4 + \frac{a^4}{q q} y y$. Ergo $\frac{b}{c} y y$ aequ. $\frac{b z z a q - b a^3 q}{\frac{a}{q} z z - \frac{a^3}{q} + \frac{a^4}{q q}}$ aequ. $d + e$ ubi etiam variari potest in modo
 $\frac{q}{q} z z - \frac{q}{q} + \frac{q}{q q}$

resolvendi in terminos duos.

5

[Zusatz 3]

$$\frac{\boxed{a^2} + a q \boxed{-aa} - \frac{a}{q} y y + \frac{a^2}{q^2} y y}{ay - \frac{a}{q} y y} \text{ aequ. } \frac{zz}{aa} \text{ aequ. } \frac{a^2 q^2 - 2 a^2 y y + \frac{a^2}{q^2} y^4 + \frac{a^3}{q} y y - \frac{a^3}{q^3} y^4 \odot}{\boxed{2} a q - \frac{a}{q} y y}.$$

Ut ergo numerator fiat quadratus ponatur y aequ. $\frac{b^3 + 3c^2v + dvv}{e^2 + 2ev + vv} \frac{\mathfrak{D}}{\mathfrak{v}^2}$. Sit compendio

$-2a^2 + \frac{a^3}{q}$ aequ. r^2 et $\frac{a^2}{q^2} - \frac{a^3}{q^3}$ aequ. $\frac{s}{a}$ fiet:

$\odot [\mathfrak{v}^8]$ aequ. $a^2 q^2 \mathfrak{v}^8 + r^2 \mathfrak{D}^2 \mathfrak{v}^4 + \frac{s}{a} \mathfrak{D}^4$.

\mathfrak{D}^2 aequ. $b^6 + 2b^3 c^2 v + 2b^3 d v v + c^4 v^2 + 2c^2 d v^3 + d^2 v^4$.

\mathfrak{D}^4 aequ. $b^{12} + 4b^9 c^2 v + 4b^9 d v v + 2b^6 c^4 v^2 + 4b^6 c^2 d v^3 + 2b^6 d^2 v^4, +$
 $4b^6 c^4 v^2 + 8b^6 c^2 d v^3 + 4b^3 c^6 v^3 + 8b^3 c^4 d v^4 + 4b^3 c^2 d^2 v^5, +$
 $4b^6 d^2 v^4 + 4b^3 c^4 d v^4 + c^8 v^4 + [8]b^3 c^2 d^2 v^5 + [4]c^6 d v^5 + 4b^3 d^3 v^6 +$
 $2c^4 d^2 v^6, + 4c^4 d^2 v^6 + 4c^2 d^3 v^7 + d^4 v^8$.

\mathfrak{v}^4 aequ. $e^4 + 4e^3 v + 6e^2 v^2 + 4ev^3 + v^4$. et

\mathfrak{v}^8 aequ. $e^8 + 8e^7 v + 28e^6 v^2 + 56e^5 v^3 + 70e^4 v^4 + 56e^3 v^5 + 28e^2 v^6 +$
 $8ev^7 + v^8$.

10

15

10 \mathfrak{v}^8 erg. Hrsg. 14 4 L ändert Hrsg. 14 2 L ändert Hrsg.

Quibus substitutis debet \odot comparari cum quadrato ipsius: $f + gv + hvv + kv^3 + lv^4$, seu
cum $f^2 + 2fgv + 2fhvv + 2fkv^3 + 2flv^4$
 $+ ggvv + 2ghv^3 + 2gkv^4 + 2glv^5$
 $+ hhv^4 + 2hkv^5 + 2hlv^6$
 $+ kkv^6 + 2klv^7$
 $+ l^2v^8.$

5

Sed hinc apparent terminos comparandos esse novem, arbitrarios vero tantum 8 quod non sufficit. Ergo ascendendum ad v^4 , sed tunc rursus 17 termini comparandi et 16 arbitrarii tantum.

8 v^4 , (1) seu facienda (2) sed L

62. EXTRACTIO RADICUM PER INFINITAM SERIEM

Juni 1676

Überlieferung: L Konzept: LH 35 XIV 1 Bl. 102–103. 1 Bog. 2°. 4 S. Randbrechung außen ca 5 cm. Überschrift ergänzt.
Cc 2, Nr. 1468

5

Extractio radic. per infinitam seriem

Data aequatione aliqua ut $y^3 + by^2 + c^2y + d^3 \sqcap 0$ invenire valorem ipsius y saltem per infinitam seriem, res maximi foret momenti, posset enim ita omnis aequatio resolvi per solam tabulam logarithmorum.

$$\begin{aligned} \text{Ut si fieret } y \sqcap &+ \frac{b}{1} - \frac{b^2}{2} + b^3 \text{ etc. in infinitum certo modo; utique fieret numeri} \\ &- c + c^4 \\ &+ d^3 \end{aligned}$$

b^3, c^4 . aliaeque id genus ab his numeris, qui cogniti supponuntur altissimae potestates sine multiplicatione per solos logarithmos inveniri possunt. Mihi diu super eo negotio successu irrito meditanti, praeclera tandem analytica incidit via.

15

Nimirum opus esse, ut duae habeantur aequationes, quarum una saltem infinita sit, eandem habentes incognitam. Tametsi enim reapse sint identicae, id tamen non potest apparere; et tum minime, cum pro arbitrio finimus. Necesse est autem aequationem infinitam esse talem, ut, potentiae ipsius y sint decrescentes, unitate nimirum assumta longe maiore quam y (: quanquam videndum sit, an non res eodem modo succedat, etsi non decrescant :). Habitum iam duabus aequationibus eandem includentibus incognitam; (tametsi identicas) quarum alterutra (vel etiam utraque) sit infinita. Excerpamus finitam ex

20

6 Invenitum mense Iunio 1676. Haec aliter longe melius iam habuimus.

14 possunt. (1) Videndum autem (2) Mihi L 16 aequationes, (1) una infinita, altera (2) quarum L 17 non | statim *gestr.* | potest L 20 quam y *erg.* L 22 infinita. (1) Eius ope (2) Excerpamus (a) inde (b) finitam L

23 aliter: Andere Methoden, Wurzeln in Reihen zu entwickeln, behandelt Leibniz in N. 32, 33, 38₁₅ S. 518 Z. 6 – S. 523 Z. 18, sowie in *Schediasma de extractione radicum*, dat. September 1674, *LSB VII*, 1 N. 125.

infinita, subsistendo alicubi, cum error futurus sit exiguus. Et ita habebimus duas finitas aequationes, vel potius determinationes, aut saltem aequationem et determinationem; unam includentes incognitam, et earum ope ex altera alterius potentias tollemus, et habebimus denique determinationem, quae ipsam incognitam pure contineat seu habebimus 5 valorem ipsius y . purum prope verum. Quem notemus. Et resumta aequatione infinita, ex ea rursus determinationem excerptamus priore propiore, magisque exactam. Hanc rursus finitae aequationi coniungendo, et ope duarum aequationum vel aequationis et determinationis omnes praeter infimam dignitates tollendo, habebitur rursus determinatio nova, seu propior adhuc valor ipsius y .

10 Et ita porro in infinitum propiores semper ac propiores habebuntur determinationes, quarum novissima sed quae scribi nequit ipsi y . perfecte aequabitur; tametsi autem omnes scribi non possint, series tamen earum ac progressio apparebit, quod sufficit. Habita iam hac determinationum progressionem, locentur illae ordine, et quaerantur earum differentiae, series differentiarum in infinitum aequabitur perfecte quantitati incognitae quae sitae.

15 Habemus ergo valorem ipsius y . purum infinitum.

Superest tantum, ut modos explicemus quibus data aequatione aliqua finita possit aliqua inveniri infinita ipsi identica: Tales autem modi sunt infiniti. Illum primo, qui cogitandi materiam dedit, explicabo. Versabar in logarithmorum meditatione, cogitabamque aequatione in analogias resoluta, an non possit res absolvii per logarithmos. Ostendit 20 sese via quaedam, sed quam velut nimis operosam omisi; interea videbam, quid consequeretur, si pro logarithmis eorum valores ex supposita hyperbolae quadratura inventi, adhicerentur.

Sit aequatio: $y^3 + by^2 + c^2y \sqcap d^3$. Haec variis utique modis resolvi potest in analogiam, sed nos uno simplicissimo utamur, qui talis est: $\frac{y^2 + by + c^2}{d^2} \stackrel{(1)}{\sqcap} \frac{d}{y}$. Iam logarithmus ab 25 $y^2 + by + c^2$ sit λ . Logarithmus ab y sit l . Logarithmus a d sit $l\bar{d}$. et logarithmus a: d^2 , erit $2l\bar{d}$. Ex aequationis vi necesse est esse: $\lambda - 2l\bar{d} \sqcap l\bar{d} - l$ vel $\lambda + l \stackrel{(2)}{\sqcap} 3l\bar{d}$. ubi $l\bar{d}$ cum sit logarithmus cognitae quantitatis d , potest pro cognito haberi. Incognitae autem huius aequationis sunt λ et l .

4 denique erg. L 4 quae (1) valorem ipsius y (2) ipsam L 4 contineat (1). (a) Hanc determinationem notemus. Et iam (aa) reassumis duabus (bb) reassumta prima aequatione infinita ex ea (b) Ha (2) seu L 10 f. determinationes, (1) quarum differentiae (2) quarum novissima (a) ipsi (b) sed L 24 $\frac{d}{y}$. (1) id est (2) Iam L 26 $l\bar{d} - 1$ (1) ipse autem (2) vel L

Generaliter autem ex hyperbolae quadratura constat, quantitate aliqua existente A , logarithmum eius assumta quaedam unitate constante, (maiore quam A .) fore $\frac{A}{1} -$

$\frac{A^2}{2} + \frac{A^3}{3} - \frac{A^4}{4}$ etc. Ergo huius ope valores ipsarum λ et l inveniemus: nam quia l est

logarithmus ab y . erit $l \stackrel{(3)}{\equiv} \frac{y}{1} - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} - \frac{y^4}{4}$ etc. et eodem modo λ erit $\stackrel{(4)}{\equiv} \frac{y^2 + by + c^2}{1} -$

$\frac{[2]y^2 + by + c^2}{2} + \frac{[3]y^2 + by + c^2}{3}$, etc. Modo ut dixi unitas assumta sit maior, quam y . 5

item maior quam $y^2 + by + c^2$. Hos valores literarum λ et l inventos in aeq. 3. et 4. inserendo in aeq. 2. habebitur aequatio in qua y assurgit ad dimensiones infinitas, fiet enim:

$$\frac{y}{1} - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} - \frac{y^4}{4} \text{ etc.} + \frac{y^2 + by + c^2}{1} - \frac{[2]y^2 + by + c^2}{2} + \frac{[3]y^2 + by + c^2}{3} \text{ etc.}$$

(5) $\stackrel{(5)}{\equiv} 3\bar{l}\bar{d}$. Digeratur illa in ordinem, secundum potentiarum gradus ab infimis incipiendo, apparebit nihilominus progressio in infinitum. Compendii autem causa aequationem hanc semel digestam ita scribemus: $e - fy + gy^2 - hy^3$ etc. ita ut numeri 1. 2. 3. 4. pro quantitatibus sive literis quales calculus daret, habeantur, et fiet aequatio aequivalens

ipsi 5: $e - fy + gy^2 - hy^3$ etc. $\stackrel{(6)}{\equiv} 3\bar{l}\bar{d}$.

Habemus ergo aequationes duas alteram finitam ab initio propositam; $y^3 + by^2 +$ 15
 $c^2y \stackrel{(7)}{\equiv} d^3$. alteram infinitam 5 vel 6. Quae tamen duae aequationes plane coincidunt, tametsi ea congruentia infiniti larva tecta, menti humanae, nisi re ad origines revocata, clare apparere non possit. Necesse est tamen coincidere, sive idem inventum iri, sive per priorem sive per posteriorem inveniatur y , quia ipsa 6, ipsius 7. vel 1. non nisi consequentia est, nec quicquam extrinsecus est assumptum. Unde si ope unius y . perfecte 20
ex altera tolleretur, quod tentari non inutile foret, et fieri utique est, saltem observato in

2 eius (1) fore: (2) assumta $L = 2$ constante, (| multo *gestr.* | maiore $L = 5$ sit | multo *gestr.* |
maiior $L = 6$ valores | ipsarum *gestr.* | literarum $L = 12$ scribemus: (1) $ey - fy^2 + gy^3 - hy^4$ (2)
 $e - fy + gy^2 - hy^3$ $L = 13-15$ aequatio | aequivalens ipsi 5 *erg.* |: (1) $ey - fy^2 + gy^3 - hy^4$ (2)
 $e - fy + gy^2 - hy^3$ etc. $\stackrel{(6)}{\equiv} (a)$ (3) $\bar{l}\bar{d}$. Nam 3, quippe verum numerum, ut a numeris literas valentibus,
distinguatur, parenthesi includo. Aequatio autem data (aa) est (aaa) huic novae infinitae (bbb) 1, (bb)
1, est (b) $3\bar{l}\bar{d}$. | aequivalens ipsi *erg. u. gestr.* | Habemus $L = 20$ si (1) posset ope unius y tolli ex altera
(2) ope $L = 21$ fore, (1) tametsi en (2) pro (3) et L 20

infinitum progressu, fieret aequatio plane identica, quippe non nisi inter cognitas quantitates. Aequationes autem identicas invenire seu quae sint inter cognitas quantitates idem est quod invenire compendia sive summas, ut alibi animadverti. Quare nec ista inquisitio suo fructu careret. Sed nos ad nostram regrediemur.

Habitis duabus aequationibus finitis eandem incognitam includentibus constat semper valorem illius incognitae posse inveniri pure. Sed in infinitis, singulari opus est arte, quam generatim ab initio expositam nunc exemplo declarabo: Ac primum ex aequatione 6. possumus excerpere determinationes, easque tanto magis exactas, quanto longius progredimur. Ponamus nunc facilitatis causa, rem ita comparatam esse, ut sit e maior vera y , et $e - fy$ minor vera y ; $e - fy + gy^2$ maior vera, et ita porro alternando in infinitum. Nam praeterquam quod id fortasse semper certis artibus obtineri potest; poterit simile quiddam praestari, tametsi id non succederet, hoc modo. Quoniam enim literae $e. f. g.$ etc. aliaeque infinitae in paucas tantum, nempe $b. c. d.$ resolvuntur; et posteriores potentias harum trium constantium continent, quae potentiae (posita unitate ipsis $b. c. d. y. y^2 + by + c^2$. maiore) sunt semper decrescentes, hinc determinationes ita excipi scribique poterunt formulae; quarum prima sit maior vera; prima demta secunda minor, prima demta secunda addita tertia maior, tametsi illae formulae non sint unius tantum potestatis ipsius y , sed plures semper tamen finitas, contineant.

Nos vero ut dixi facilitatis causa et in exemplum ponamus esse: e maiorem quam y ; at $e - fy$ minorem quam y ; et $e - fy + gy^2$, maiorem: erit prima determinatio haec: $e \sqcap y$.⁽⁸⁾ seu determinatio $y \sqcap e$. Aequatio haec: $y^3 + by^2 + c^2y \sqcap d^3$. Ubi in aequatione pro y^3 et y^2 , substituendo determinationem fiet $e^3 + be^2 + c^2y \sqcap d^3$, et $y \sqcap \frac{d^3 - e^3 - be^2}{c^2}$.

2 seu ... sint erg. L 5 Habitis | ergo gestr. | duabus L 7 quam (1) paulo ante (2) generatim L 8 excerpere (1) partem quae sit maior vera (2) determinationem, eamque tanto magis exactam (3) determinationes L 9 sit (1) ey maior vera, ey - fy² (a) maio (b) minor vera; ey - fy² + gy³ (2) e maior L 11 Nam (1) etsi id non (2) praeterquam L 13f. posteriores (1) priorum, (2) potentias L 16 secunda (1), tertia (2) minor L 19 esse: (1) ey maiorem quam y; ut ey - fy² minorem quam y; et ey - fy² + gy³ (2) e maiorem L 21 seu ... y \sqcap e erg. L

3 alibi: N. 48. 21 $y \sqcap e$: Die Ungleichung (8) fügt Leibniz erst nach der Numerierung der Gleichung (7) in den Text ein.

Rursus ex infinita excerptendo: $e - fy \sqcap y$ fiet: $y \stackrel{(10)}{\sqcap} \frac{e}{1+f}$ et $y^2 \sqcap \frac{e^2}{1+2f+f^2}$
et $y^3 \sqcap \frac{e^3}{1+3f+3f^2+f^3}$. Quos valores ipsarum y^2 . et y^3 . inserendo in aeq. 7. fiet:
 $\frac{e^3}{1+3f+3f^2+f^3} + \frac{be^2}{1+2f+f^2} + c^2y \sqcap d^3$ et $y \stackrel{(11)}{\sqcap} d^3 - \frac{be^2}{\boxed{2}\overline{1+f}} - \frac{e^3}{\boxed{3}\overline{1+f}}$.

Rursus excerptendo: $e - fy + gy^2 \stackrel{\ddagger}{\sqcap} y$ vel $ey - fy^2 + gy^3 \sqcap y^2$, et pro aeq. 7. scribendo
 $gy^3 + gby^2 + gc^2y \sqcap gd^3$ fiet: aequationem determinationi coniungendo: $ey - fy^2 \boxed{+gy^3} +$ 5
 $gd^3 \sqcap y^2 \boxed{+gy^3} + gby^2 + gc^2y$. Unde $y^2 \sqcap gd^3 + e y \sim 1 + gb + f$ et $y^2 \sqcap +1 y - e \sim g$.

$$\underbrace{-gc^2}_{\odot} \quad \underbrace{+f}_{\mathbb{D}}$$

Ergo \odot maior quam y^2 , erit etiam maior quam id quod est minus quam y^2 , nempe
maior quam \mathbb{D} . Ergo fiet: $gd^3 + e y \sim 1 + gb + f \sqcap +1 y - e \sim g$. Unde rursus 10
 $-gc^2 . \quad +f .$

haberi poterit valor ipsius y . prope verus: ut si $1+f$ vocemus h , et $e-g^2c$ vocemus m . fiet
 $\frac{gd^3 + my}{h+gb} \sqcap \frac{hy - e}{g}$, sive $g^2d^3 + gmy \sqcap +h^2 y - eh$. et $y \stackrel{(12)}{\sqcap} \frac{eh + gbe + g^2d^3}{gbh + h^2 - gm}$.
 $+gbh . - gbe$

Et ita porro in infinitum continuando semper habebuntur determinationes magis 15
magisque exactae seu valores maiores minoresque veris in infinitum. Atque hic duo ex-
aminanda sunt, primum an ex una determinatione artis ut \ddagger atque aequatione ut 7. inter
se iunctis, una tantum determinatio pura nempe 12. proditura sit etsi aliis atque aliis
modis in potentissimis altioribus ipsius y . ope huius coniunctionis tollendis procedas. Quod
si varia vario tractandi modo provenire possunt, examinandum [quid] sit simplicissimum;
deinde videndum, an semper certa sit determinationis ratio, per \sqcap vel \sqcap , ut quemadmo- 20
dum ex excerpta $e \sqcap y$ ex aequatione 7. prodiit determinatio $y \sqcap \dots$ ita in determinatione

1 ex infinita erg. L 10 fiet: (1) semper (2) y (3) gd^3 L 16 valores (1) maioresque veris
infiniti (2) magis magisque proposi (3) maiores L 17 artis ut \ddagger erg. L 18 pura (1) prodeat, etsi
variis modis in poten (2) nempe L 20 possunt, (1) examinandus quis (2) examinandum | quis ändert
Hrsg. | sit L 21 semper (1) si determinatio sit per \sqcap (2) assumta sit per \sqcap etiam certo modo ut in
(3) certa L

ꝝ excerptendo $1 - fy + gy^2 \sqcap y$. debent fieri $y \sqcap \frac{eh \text{ etc.}}{gbh \text{ etc.}}$ et in 12. sive an valor ille in 12.
sit affirmativus.

Quae omnia discutienda sunt ut appareat an determinationes purae iusto maiores
ac minores se sequantur alternis; uti excerptae non purae maiores minoresque veris se
5 alternis sequuntur.

Illud vero cavendum in primis ut sequentes sint semper praecedentibus accuratiores,
alioqui nihil ageretur. Porro quoniam haec sublatio ad altiores potentias haud dubie calcu-
lum valde attolleret, ideo forte posset in locum aequationis 7. uti duabus primis determi-
nationibus ex ea factis quarum una est $y \sqcap \frac{d^3 - e^3 - be^2}{c^2}$ et $y \sqcap d^3 - \frac{be^2}{\boxed{2}1+f} - \frac{e^3}{\boxed{3}1+f}$.

10 Atque ita habebuntur facilissimo negotio determinationes magis magisque accedentes in
infinity; in excerptis pro y . hos valores substituendo verum quoniam non est certum,
ultimam harum infinitarum determinationum aequari incognitae; ideo istud quidem com-
pendium non est aptum ad rem nostram.

Inventis iam determinationibus earumque progressionе excedentes separatim; defi-
15 cientes separatim, ordine collocemus; modo magis magisque accedant verae, et ultimae,
veram quantitatem attingant. Nunquam autem, credo, excerptae adhibendae, sed semper
ex illis et aequatione factae:

Valores veris

$\frac{\text{minores}}{c^2} = \frac{d^3 - e^3 - be^2}{c^2}$ $\frac{eh + gbe + g^2d^3}{gbh + h^2 - gm}$ <p style="margin-top: 10px;">etc.</p>	$\frac{\text{maiores}}{\boxed{2}1+f} = \frac{be^2}{\boxed{2}1+f} - \frac{e^3}{\boxed{3}1+f}$ <p style="margin-top: 10px;">etc.</p>
--	--

y

4 se (1) ordine sequantur; (2) sequantur L 5 f. sequuntur. (1) Ponamus (2) Inventis iam
determinationibus earumque progressionе; (a) erit (b) eas (c) ex (d) excedentes separatim, ac deficienes
separatim ordine collocemus; modo quo ordine inveniuntur magis magisque (3) Illud L 7 ageretur.
(1) Poterit etia (2) Porro L 8 f. determinationibus (1) nempe (a) $y \sqcap$ (b) $y \sqcap e$. et (aa) $y \sqcap \frac{d^3 -}{}$
(bb) $y \sqcap$ (cc) $y \sqcap \frac{e}{1+f}$. Una (2) ex L 11 in excerptis ... substituendo erg. L 16 attingant. (1)
Et hinc iam (2) Ponamus ita stare: (3) Nunquam autem |, credo, erg. | excerptae L

Ubi notandum haec series etsi convenient in novissima, tamen in eo differre a Gregorianis, quod ipsi necessarium est, ut eodem modo componantur duae tertiae ex duabus secundis, quo duae secundae ex duabus primis. Nobis vero nulla hoc loco cura huiusmodi compositionum, quaerimus enim tantum series infinitas rationales cognitas incognitae aequales. Nullus tamen dubito quin plerumque etiam Gregorianus componendi modus ad alias contemplationes utilis, accedere possit.

5

Nunc ut ostendam, quomodo hinc inveniri possit valor infinitus incognitae, idque duobus semper modis. Nempe sive iusto minorum:

Series crescentium $A \quad B \quad C \quad D \quad E \quad$ etc.

 y

10

Series decrescentium $\aleph \quad \beth \quad \daleth \quad V \quad W \quad$ etc.

Hinc duas ducemus series infinitas ipsi y aequales.

Series crescentium $A \quad B \quad C \quad D \quad E \quad$ etc. y

Differentiae $\beta \quad \gamma \quad \delta \quad \eta \quad$ etc.

erit y aeq: $A + \beta + \gamma + \delta + \eta$ etc.

15

Series decrescentium: $\aleph \quad \beth \quad \daleth \quad V \quad W \quad$ etc. y

Differentiae: $\theta \quad \psi \quad \mu \quad \xi$

et $\aleph - \theta + \psi + \mu + \xi + y$, et fiet y aeq. $\aleph - \theta - \psi - \mu - \xi$ etc.

Rem ergo succedere nullum dubium est, idque infinitis modis: Tantum de sim-
pli cissimis rationibus cogitandum.

20

Tum, quo ad modum inveniendae aequationis infinitae,
tum quo ad modum, inde eliciendarum determinationum.

1 Si in aequatione infinita inventa non reperiatur alternis + et −; tunc non nisi semel series in quaesitam incognitam desinens habetur, quod nobis sufficit, neque enim convergentibus opus habemus.

7 possit (1) series (2) valor L 8 Nempe (1) sint series crescentium in infinitum (2) sit (3) sive L
20f. cogitandum. (1) Et si quidem per logarithmos procedere placeat: forte non erit inutile resolvare (2)
Tum $L = 22\cdot790,1$ determinatum (1), quoad modum (2). (a) Quoad modum (b) Ad
inveniendam aequationem infinitam procedere possumus vel per logarithmos; (c) Aequationem L
23 aequatione erg. L

1 f. Gregorianis: J. GREGORY, *Vera circuli et hyperbolae quadratura*, 1668, Def. 9 S. 10 [Marg.].

A e q u a t i o n e m i n f i n i t a m , vel iam habemus, vel quaerimus: iam h a b e -
 m u s ut in problematis tetragonisticis de quibus postea. Q u a e r i m u s in aequatio-
 nibus resolvendis, vel ordinatis rationalibus curvarum inveniendis: quod fit radice ex
 aequatione curvae naturam explicante, per seriem infinitam extracta. I n v e n i e m u s
 5 vel per logarithmos, vel sine logarithmis. P e r l o g a r i t h m o s , tum quo dixi modo,
 tum vero fortasse meliore, si aequatio data resoluta sit in analogias simplices, ut si
 sit $\frac{y+b}{y+c} \sqcap \frac{y+e}{y+f}$. Analogia facta ex aequatione. Et videtur quaevis aequatio data re-
 solvi posse in eiusmodi analogias, quotcunque sit graduum, nam idem erit ac si dicas:
 $y+b, y+f, \sqcap y+c, y+e$. Nec video quid prohibeat generaliter scribi: $1y+b, 2y+c,$
 10 $3y+d, \text{ etc. } \sqcap 4y+e, 5y+f, 6y+g \text{ etc. continuando quantum satis est, pro gradu resolven-}$
 $\text{dae aequationis, inde ducendo in se invicem, poterit aequatio inde proveniens ordinari,}$
 $\text{et cum data eiusdem gradus conferri.}$

Et hac methodo quaevis aequatio data optime resolvetur in analogias. Iam loga-
 rithmus ab $y+b$. erit $\frac{y+b}{1} - \frac{y^2 + 2by + b^2}{2}, + \frac{y^3 + 3y^2b + 3yb^2 + b^3}{3} \text{ etc. eodemque}$
 15 modo logarithmus ab $y+f$. tantum pro b . ponendo f . Unde postea logarithmi illi plu-
 res ordine additi aut subtracti aequationem dabunt novam eamque infinitam. S i n e
 $\text{lo g a r i t h m i s}$ videtur aequatio infinita ex data fieri posse dividendo, ut si sit

9f. NB. 1. 2. 3. numeri sunt hic pro literis.

1 f. quaerimus: iam (1) inf (2) h a b e m u s (a) tunc au (b) ut L 2 f. in (1) problematis (2)
 aequationibus L 3 inveniendis: (1) nam ex hac aequatione (2) quod fit radice (a) infin (b) ex L
 6 vero (1) simplicior (2) fortasse L

17–791,2 sit (1) | aequatio streicht Hrsg. | $y^2 + by + c^2 \not\mid y$ (2) $\boxed{y^2} L$
 | divisor $y + v$ streicht Hrsg. |

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c}
 \boxed{y^2} \quad \boxed{+by} \quad \boxed{+c^2} \\
 \hline
 y \quad +b \quad \frac{+c^2 - bv - v^2}{y} \quad \frac{-c^2 + bv^2 + v^3}{y^2}
 \end{array}
 \quad \left\{ \begin{array}{l} + c^2 v \\ - bv^3 \\ \frac{+ v^4}{y^3} \end{array} \right. \text{ etc.}
 \end{array}$$

5

$$\begin{array}{c}
 \boxed{y+v} \\
 \boxed{-y^2} \quad \boxed{-vy} \\
 \hline
 \boxed{y+v}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \boxed{-by} \quad \boxed{-bv} \\
 \boxed{+vy} \quad \boxed{-v^2} \\
 \hline
 \boxed{y+v}
 \end{array}$$

10

$$\begin{array}{c}
 \boxed{-c^2 + bv^2 + v^3} \\
 \hline
 y
 \end{array}$$

10

$$\boxed{y+v}$$

1–11 *Randbemerkungen:*

Nota non tota aequatio sed una tantum pars sic dividi debet.

Alium etiam appropinquandi modum excogitavi. Aequatio v. g. $y^2 + by + c^2$, multiplicetur verbi gratia per y , fiet: $y^3 + by^2 + c^2y$. Explicetur y per $x + e$, fiet aequatio alia, quae forte utilius dividetur tentando quam prima, praesertim cum tunc tam e , quam dividens $x + v$, sit arbitraria.

14 (1) Alium mihi modum proposueram ut si aequatio $y^2 + by + c^2 \neq 0$. dividatur per $y + 1$. vel aliam et restat fractio (a) haec negli (b) affirma (2) Alium L 14 excogitavi. (1) Dividatur aequatio per aliquam quantitatem et notetur fractio. Et rursus per aliam; (2) Aequatio L

8 $-v^2$: Richtig wäre $+v^2$. Der Vorzeichenfehler sowie ein weiterer Flüchtigkeitsfehler — der erste Term im Zähler des Bruches Z. 10 müßte c^2v lauten — beeinträchtigen das Ergebnis der Division, jedoch nicht die grundsätzliche Überlegung.

Sed haec dividendi ratio habet difficultates multas ob causas, nam si v non est iam una ex radicibus divisione in infinitum quidem producta, procedit, si vero est una [ex] radicibus, ipsamet incognita est adeoque inutilis. Remedium vero succurrit: Sit aequatio:

$$y^2 - c^2 \sqcap by, \text{ poterit scribi: } y - c \sqcap \frac{by}{c+y} \text{ et dividendo fiet: } y - c \sqcap \frac{by}{c} - \frac{by^2}{c^2} + \frac{by^3}{c^3} - \frac{by^4}{c^4}$$

- 5 etc. in infinitum, modo sit c maior quam y seu modo series sit decrescens: et haec videtur simplicissima ratio esse aequationem propositam finitam convertendi in infinitam. Ex qua determinationes eliciendo, easque cum ipsa aequatione coniungendo valores puri invenientur appropinquantes; quorum differentiae dabunt seriem infinitam.

Ex generali invento: Quod data serie infinita appropinquantium ad differentiam infinite parvam, habetur etiam series infinita aequalis, nimirum series differentiarum: ista pendent omnia. Unde iam olim notavi etiam ex Wallisii invento inveniri posse seriem aequalem circulo ex dato radio; et contra radium ex data circumferentia, sed illud incommode in Wallisii methodo, quod non datur applicatio commoda ad partes.


Incident hic aliis appropinquandi modus, quem experiri operae pretium est. Dividatur aequatio proposita $y^2 + by + c^2 \sqcap 0$. per quantitatem $y - v$ arbitriam, fiet fractio, quae alia atque alia erit, prout explicabitur v . Explicetur v , pro arbitrio, ut per 1. erit fractio vel quantitas affirmativa vel negativa, si affirmativa, erit minor iusto divisor; sin sit negativa, erit maior iusto (+ vel contra pro signis +). Qualiscunque sit sumatur alia ipsius v . explicatio, tunc ut fractio sit contraria, cum antea fuerit negativa, nunc fiat affirmativa, et tunc consistet radix intra duos valores ipsius v . Et ita porro sumendo aliquem medium inter hos duos valorem novum, iterum dividemus, eodemque modo experiemur. Et ut certae cuidam regulae hanc appropinquationem attingemus, poterimus semper differentiam inter duas inter quas consistitur novissime bisecare; vel etiam trisecare. Sed naturalior est bisectio.

1 ratio (1) mihi displicet (2) habet L 2 ex erg. Hrsg. 3 f. aequatio: (1) $y^2 - byc^2 \sqcap c^2$
poterit scribi: $y \sqcap \frac{c^2}{y+c}$ (2) $y^2 - c^2 \sqcap by$, poterit scribi: (a) $y + c \sqcap \frac{by}{y-c}$ (b) $y - c \sqcap \frac{by}{y+c}$ (aa) $\frac{by}{y+c}$ (bb)

$\frac{by}{c+y} L$ 7 puri erg. L 10 differentiarum: (1) Varios alias modos dari posse arbitror (2) ista L

16 Explicetur v , (1) primum ita, ut fra (2) pro L 18 sit (1) quaeratur alius di (2) sumatur L
19 tunc (1) vel ex fract (2) ut L 23 bisecare (1). (a) Poterit (b) Posset aliud eligi sed ingen
(2); vel L

11 olim notavi: nicht ermittelt; ähnlich N. 69; ex Wallisii invento: *Arithmetica infinitorum*, 1656, prop. 191 S. 178–182 (WO I S. 467–469).



[Fig. 1]

Est tamen hoc in eo incommodum, quod ita bisecando AD differentiam inter duos valores ad inveniendum punctum C , aliquando eveniet, ut ipsum C incognitum punctum transsiliamus. Nempe bisecando ipsam AB , in D , transsiliemus C , quaesitum et postea non amplius inter D et B , ut in prioribus forte fiebat, sed inter A et D consistet quae-
5 situm, ubi rursus bisecando $[AD]$ in F , consistet punctum C , adhuc inter F et D . Sed rursus FD bisecando in E , contrarium iterum eveniet nec erit punctum C inter E et D , sed inter F et E .

Cumque ista methodus non fere nisi in numeris procedat, nec constanti quadam ratione progrediatur; nec denique sit revera appropinquans ad distantiam infinite parvam; ac denique plane non serviat ad aequationes illas in quibus ipsae pro cognitis assumtae sunt indefinitae, ut fit in aequationibus curvarum; ideo ad nostrum scopum nihil servit. Et redeundum est ad viam illam sane pulcherrimam, hic apertam, ut praeter datam aequationem adhuc alia, infinita, inveniatur.
10

Aequatio $a^2 - x^2 \overset{\odot}{\equiv} y^2$. seu $a - x \sqcap \frac{y^2}{a+x}$ fietque:

$$a - x \overset{\odot}{\equiv} \frac{y^2}{a} - \frac{y^2x}{a^2} + \frac{y^2x^2}{a^2} - \frac{y^2x^3}{a^4} + \frac{y^2x^4}{a^5} \text{ etc. vel } x \sqcap a - \frac{y^2}{a} + \frac{y^2x}{a^2} - \frac{y^2x^2}{a^3} + \frac{y^2x^3}{a^4} \text{ etc.}$$

Ponendum est autem esse a maiorem quam x . nam si minor foret, possemus nihilominus idem praestare, ita aliter dividendo, y^2 non per $a+x$ sed per $x+a$, ut semper sit a in summo, x in imo. Hinc patet esse

$$\begin{aligned} x &\overset{(1)}{\sqcap} a - \frac{y^2}{a} & x &\overset{(2)}{\sqcap} a - \frac{y^2}{a} + \frac{y^2x}{a^2} - \frac{y^2x^2}{a^3} \\ x &\overset{(3)}{\sqcap} a - \frac{y^2}{a} + \frac{y^2x}{a^2} - \frac{y^2x^2}{a^3} + \frac{y^2x^3}{a^4} - \frac{y^2x^4}{a^5} \end{aligned}$$

3 punctum C, (1) et mox (2) aliquando L
(a) in C, (b) ipsam L

4 transsiliamus (1); cum sat (2). Nempe bisecando

6 AC L ändert Hrsg.

15 Aequatio: vgl. N. 48 S. 679 Z. 10.


$$\begin{aligned} x \sqcap \boxed{1} a - \frac{y^2}{a} + \frac{y^2 x}{a^2} & \quad x \sqcap \boxed{2} a - \frac{y^2}{a} + \frac{y^2 x}{a^2} - \frac{y^2 x^2}{a^3} + \frac{y^2 x^3}{a^4} \\ x \sqcap \boxed{3} a - \frac{y^2}{a} + \frac{y^2 x}{a^2} - \frac{y^2 x^2}{a^3} + \frac{y^2 x^3}{a^4} - \frac{y^2 x^4}{a^5} + \frac{y^2 x^5}{a^6} \end{aligned}$$

Ubi ex \odot et (1) fiet $x^2 \sqcap ax - \frac{y^2 x}{a}$. et $x \sqcap a$. Ex (2) et \odot fiet $x \sqcap a - \frac{y^2}{a} + \frac{y^2 x}{a^2}$

$$5 \quad \text{et } \frac{-y^2 a^2 + y^4}{a^3} \text{ vel } x \sqcap \frac{a - \frac{y^2}{a}, \dots, \frac{-y^2 a^2 + y^4}{a^3}}{[1] - \frac{y^2}{[a^2]}} \text{ vel } \frac{a^4 - y^2 a^2, \dots, -a^2 y^2 + y^4 \cup a^3}{a^2 - y^2, \cup [a^2]}, \text{ et divi-}$$

793,15–20 Nebenbetrachtungen:


793, 15



$$1 - \sqrt{1 - \frac{1}{4}} \sqcap \frac{1}{4} \text{ seu } \frac{3}{4} \sqcap \sqrt{1 - \frac{1}{4}}$$

$$\begin{aligned} \frac{3}{\sqrt{4}} &\sqcap \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \\ \frac{3}{2} &\sqcap \sqrt{3} \\ \sqrt{3} &\sqcap 2 \end{aligned}$$

793, 20



$$\begin{aligned} BC \text{ seu } x \sqcap BE \\ BC \text{ seu } x \sqcap BD \end{aligned}$$

³ Ubi (1) antequam ill (2) lo (3) ex (a) 1 et \odot fiet: (b) (1) fiet (4) ex | \odot et erg. | (1) fiet L
⁵ a L ändert Hrsg. dreimal

dendo per $a^2 - y^2$, fiet $\frac{a^2 - y^2}{a}$. Ergo $x \sqcap a - \frac{y^2}{a}$. (Credibile non alias habitum iri determinaciones puras ex excerptis excedentibus quam ex deficientibus, saltem hic.)

Ex (3) et \odot fiet: $\frac{a^2x - y^2x}{a}, + \frac{y^2}{a^4} \sim a^2 - y^2, x, \sqcap \frac{a^2 - y^2}{a}, - \frac{y^2}{a^3} \frac{a^2 - y^2}{a^2}, - \frac{y^2}{a^5}$
 $\sqrt{a^2 - y^2}^4$ et $ax \sim a^2 - y^2 \sqcap a^4 - y^2 \sqrt{a^2 - y^2} - \frac{y^2 \sqrt{a^2 - y^2}^3}{a^5}$ etc. Et ita porro.

$$\frac{2}{1+y^2} \sqcap 2 - 2y^2 + 2y^4 - 2y^6 + 2y^8 \text{ etc. Iam } \frac{2}{2+y^2-1} \sqcap 1 \frac{-y^2+1}{2} + \frac{\sqrt{y^2-1}}{4}^{[2]} \quad 5$$

$$\frac{a}{b+c} \sqcap \frac{a}{b} - \frac{ac}{b^2} + \frac{ac^2}{b^3} - \frac{ac^3}{b^4} \text{ etc. vel } \frac{1}{b+c} \sqcap \frac{1}{b} - \frac{c}{b^2} + \frac{c^2}{b^3} - \frac{c^3}{b^4} \text{ etc.}$$

$$\text{Ergo } \frac{2y^2}{1+y^2} \sqcap 2y^2 - 2y^4 + 2y^6 - 2y^8 \text{ etc.}$$

$$\frac{2y^2}{2,+y^2-1} \sqcap \frac{2y^2}{2} - \frac{2y^2, y^2-1}{4} + \frac{2y^2, \sqrt{y^2-1}^2}{8} - \frac{2y^2, \sqrt{y^2-1}^3}{16} \text{ et} \\ \omega \stackrel{\odot}{\sqcap} \text{ omn. } \frac{2y^2}{1+y^2} \sqcap \frac{2y^3}{3} - \frac{2y^5}{5} + \frac{2y^7}{7} - \frac{2y^9}{9}.$$

6 *Nebenrechnung:*

$$\begin{aligned} & \frac{a}{b+c} \sqcap \frac{a}{b} - \frac{\frac{ac}{b}}{\overline{b+c}} \\ & - \frac{ac^2}{b^2} + \frac{\overline{b^2}}{b+c} \\ & + \frac{ac^3}{b^3} - \frac{\overline{b^3}}{b+c} \end{aligned}$$

1 f. (Credibile ... hic.) erg. L 5 4 L ändert Hrsg. 9 $\omega \sqcap$ (1) s^{umma} (2) omn. L

3 f. fiet: Die folgende Ungleichung weist im Ansatz mehrere Fehler auf und wird nicht konsequent umgeformt. Richtig gerechnet würde sich $ax(a^2 - y^2) > (a^2 - y^2)^2$ ergeben.

$$\begin{aligned}
 & \text{Et quia etiam } \frac{2y^2}{2+y^2-1} \text{ seu } \frac{2y^2}{1+y^2} \text{ est } \sqcap \frac{2y^2}{2}, -\frac{2}{2} \cdot \frac{y^4-y^2}{4}, +\frac{y^6-2y^4+y^2}{8} \\
 & +\frac{y^8-3y^6+3y^4+y^2}{16} \text{ etc. fiet rursus } \int \frac{y^2}{1+y^2} \sqcap \omega \sqcap \frac{\frac{y^3}{2}}{\frac{3}{2}} -\frac{y^5}{5} -\frac{y^3}{4} +\frac{y^7}{7} -\frac{2y^5}{5} +\frac{y^3}{3} \\
 & -\frac{y^9}{9} -\frac{3y^7}{7} +\frac{3y^5}{5} -\frac{y^3}{3} \text{ etc.}
 \end{aligned}$$

Habemus ergo duos ipsius ω valores infinitos; et possemus habere adhuc plures. Porro
 5 ope harum duarum aequationum \odot et \oslash valorem ipsius ω exhibentium poterit vicissim
 ipsa y . inveniri ex data ω . Quod ita fiet: Si duas diversarum aequationum infinitarum
 determinationes, ordine assumtas coniungamus, eo tantum observato, ut ex una exacerbatur
 valor iusto maior, ex altera valor iusto minor, ita enim semper obtineri poterit valor
 purus; iusto maior vel iusto minor, semperque accedetur magis magisque ad verum, et
 10 seriei finis in ipsam quantitatem desinet.

Sit exemplum $\omega \sqcap b - cy + dy^2 - ey^3$ etc. et rursus $\omega \sqcap ny - py^2 + qy^3 - ry^4$ etc.
 erit $\omega \sqcap b - cy$. et $\omega \sqcap ny$. et $y \sqcap \frac{\omega}{n}$, itemque $y \sqcap \frac{\omega - b}{c}$.

Rursus $\omega \sqcap b - cy + dy^2$. et $\omega \sqcap ny - py^2$. fietque $y^2 \sqcap \frac{ny - \omega}{p}$ et $y^2 \sqcap \frac{\omega - b + cy}{d}$.
 Ergo $\frac{\omega - b + cy}{d} \sqcap \frac{ny - \omega}{p}$. seu $\omega p - bp + cyp \sqcap dny - d\omega$. et fiet $y \sqcap \frac{p\omega + d\omega - bp}{dn - cp}$ quem
 15 valorem certis modis in duabus valoris y^2 , determinationibus inserendo duae possent
 haberi determinationes purae, sufficit tamen haec una. Et ita continue pergendo.

Incidit hic compendium egregium in tollendis potestatibus excerptarum determinationum; quod alioqui difficile admodum et molestum. Compendium autem in ea consistit:
 ut ubique valorem purum prope verum proxime praecedentem, nunc excedentem nunc

4 ergo (1) duas aequationes infinitas (2) duos L 4f. Porro (1) duae aequationes ipsius (2)
 ope L 6 fiet: (1) Si (a) fiunt d (b) ex una (c) unam ex aequalat (d) ex qualibet aequatione unam
 exacerbamus (aa) aequalat (bb) determinationem, semper a minus (2) Si (3) Si ex duabus aequationibus
 duas semper determinationes conferamus (4) Si L 7 coniungamus, (1) primam maius (2) eo L
 10f. desinet. (1) | Sit streicht Hrsg. | $\omega \sqcap by$ (a) + (b) $-cy^2 + dy$ (2) Sit L 15 in (1) aequatione
 (2) aequationibus (3) duabus L 16 haberi (1) aeq (2) determinationes L 16f. pergendo. (1) Ut
 iam in usu unius aequatio (2) Incidit L 19 ubique (1) determinationem proxime praecedentem (2)
 pr (3) valorem (a) prope (b) purum L

deficientem substituamus, ita enim nihilominus ultima determinatio desinet in quantitatem quaesitam. [Imo error est, ita enim omnes errores a primo ad ultimum usque in unum confundentur. Coptae ergo viae est insistendum.]

2 f. [Imo . . . insistendum]: Die erste eckige Klammer stammt von Leibniz, die zweite ist vom Herausgeber ergänzt.

63. DE SERIEBUS CONVERGENTIBUS

[Juni 1676?]

Überlieferung: *L* Notiz: LH 35 II 1 Bl. 179. 1 Ausschnitt ca 20,5 x 1,8 cm. 2 1/2 Z. auf
Bl. 179 r°. Bl. 179 v° leer. — An der unteren Schnittkante Reste fremden Textes.
5 Cc 2, Nr. 00

Datierungsgründe: Die schwer zu datierende Notiz ist offenbar während des Parisaufenthalts entstanden; mit den konvergenten Folgen von J. Gregory befaßt sich Leibniz gehäuft im Juni 1676.

Si fingatur valor sectoris seu polygonorum seriei convergentis in numeris dari, nemo mortalium scire potest, an non eodem modo componatur ex terminis 10 convergentibus. Ideo ne ad $\chi\rho\iota\tau\chi\rho\iota\sigma$ quidem servit.

8 polygonorum erg. *L*

64. SERIES CONVERGENTES DUAE

[Juni? 1676]

Überlieferung: L Konzept: LH 35 XII 1 Bl. 311. 1 Bl. 2°. Ca 3/5 S. auf Bl. 311 v°. Von dem Blatt ist oben ein Streifen von ca 3 cm abgeschnitten worden. Auf Bl. 311 r° stehen zusätzlich Cc 2, Nr. 1456 (Druck in einem späteren Band der Reihe) und *De angulo contactus*, *LSB VII*, 1 N. 32.
Cc 2, Nr. 1455

5

Datierungsgründe: Das Wasserzeichen des Papiers ist von März bis August 1676 belegt. Mit den konvergenten Folgen von Gregory befaßt sich Leibniz gehäuft im Juni 1676.

$$\begin{array}{ll}
 a. & b. \\
 A \sqcap \frac{2ab}{a+b} & B \sqcap \frac{a+b}{2} \\
 (A) \sqcap \frac{2AB}{A+B} & (B) \sqcap \frac{A+B}{2}
 \end{array}
 \quad \text{10}$$

Serier convergentes duae una a. A. (A) etc. altera b. B. (B) etc. Factum ex ipsis semper est ab. Nam AB \sqcap ab. et (A)(B) \sqcap AB. ergo (A)(B) \sqcap ab. Haec series est convergens seu differentia inter duos terminos tandem minor quavis quantitate data: Nam refert eam Gregorius in responso ad Hugenium *Transact. Iul. 1668.* et summam invenit. Sit ultimus terminus unius convergentium z, alterius etiam z, erit $z^2 \sqcap ab$. et $z \sqcap \sqrt{ab}$.

15

Similiter quandocunque quantitas habetur eodem modo composita ex terminis primis a. b. quo ex secundis A. B., inveniri potest terminus ultimus. Ego id addo, si esset una tantum series a. A. (A). et quantitas daretur eodem modo composita ex a. et A. quo ex A. et (A). haberetur etiam terminatio. Quia in seriebus replicatis suppono terminos ultimum penultimum et antepenultimum differre quantitate minore quam quae

20

18 f. \sqrt{ab} . (1) Eodem modo (2) Similiter L 22 seriebus (1) convergentibus (2) replicatis L

16 Gregorius: J. GREGORY, *Answer to the animadversions of Mr. Hugenius, Philosophical Transactions III*, 1668/69, Nr. 37 vom 13./23. Juli 1668 S. 733.

assignari possit, nempe differentiam terminorum a . A . etc. tandem fieri minorem qualibet assignabili quantitate. Serierum replicatarum consideratio longe maioris est usus quam convergentium^[,] patet ex illis quae duxi aliquando ex methodo tangentium inversa. Potest adiungi convergentia, cum consideramus duas curvas hoc modo expressas, serie 5 replicata, se intersecare alicubi. Quaeratur hoc modo punctum intersectionis. Observo series convergentes Gregorianas plerasque omnes hoc habere, ut si ponantur a . b .

a a a a
aequales sint et A . B . aequales. Si $a \sqcap b$. erit seu .

$$\frac{2a^2}{a+a} \quad \frac{a+a}{2} \quad a \quad a$$

10 Videndum an idem semper in caeteris, non puto esse necesse.

Porro ex regula de compositione simili; exhibente terminationem, videtur semper aequatio transcendens inveniri posse, ut Gregorius exprimit hoc modo seriem pro circulo

a b

et hyperbola convergentem. a. triangulum, b. trapezium,

$$A \sqcap \sqrt{ab} \quad \frac{2ab}{a+\sqrt{ab}} \sqcap B$$

finis seriei sector, termini seu membra polygona inscripta et circumscripta, quaeritur quantitas eodem modo composita ex a . b . quo ex A . B . Sit verbi gratia $a^\omega + b \sqcap A^\omega + B$.

fiet aequatio haec: $a^\omega + b \stackrel{(1)}{\sqcap} \sqrt{ab}^\omega + \frac{2ab}{a+\sqrt{ab}}$. Cuius aequationis ope si inveniatur ω .

poterit etiam ultimus terminus seriei, seu sector inveniri, nam inventa ω . utique erit nota

20 $a^\omega + b$. Sit sector ignotus z . erit $z^\omega + z \sqcap \underbrace{a^\omega + b}_{cognitae}$. Adeoque inventa ω . habebitur et z . quod

erat faciendum. Ecce ergo analyseos genus pro circulo et hyperbola. Porro: hinc videtur sequi ex data circuli quadratura, dari et quadraturam hyperbolae; eodem enim prorsus

2 quantitate (1) Observo series eiusm (2) Serierum L 12 ut (1) invenit (2) Gregorius L
14+16 trapezium, (1) terminus (2) finis L 17 composita ex (1) utroque, (a) trans (b) sit (2) a. b.
 L 21 erat (1) demonstrandum (2) faciendum L 22 circuli (1) et hyperbol (2) quadratura, L

3 duxi aliquando: vgl. N. 39. 12 Gregorius exprimit: Vgl. J. GREGORY, *Vera circuli et hyperbolae quadratura*, 1668, Scholium zu prop. V, S. 15. 15 $\frac{2ab}{a+\sqrt{ab}}$: Richtig wäre $\frac{2b\sqrt{ab}}{b+\sqrt{ab}}$; vgl. die Erl. zu S. 758 Z. 7.

modo componitur sector circularis quo hyperbolicus. Saltem illud certum, eandem z . aliter inveniri posse, in hyperbola ex eo quod scimus logarithmos simpliciter ad eam rem servire. Sed ut verum fatear non video quomodo hinc sequatur eodem modo componi in circulo. Potuissemus aliter assumere infinitis modis. Sit v. g.

$$a^{\omega\nu} + b^\nu + r \sqcap ab^{\frac{\omega\nu}{\nu}} + B^\nu + r.$$

5

Et talia possunt fieri infinitis modis. Et divelli posset etiam talis aequatio in duas.

Tota difficultas in his absolvendis in eo est, ut datis $a^\omega + A^\omega \sqcap e$. inveniamus ω . Hoc ita tento dividamus e . in duas: $e - y$. et $+ y$. fiatque: $a^\omega + A^\omega \sqcap e - y + y$. et dividatur in duas: $a^\omega \sqcap e - y$. et $A^\omega \sqcap y$. Sed iam video id, si y . incognita esse inutile.

$x^2 + y^2 \sqcap \varphi$. Quaeritur relatio ad 2. Si aequatio $a^\omega + A^\omega \sqcap e$. reduci potest ad aequationem $b^\omega \sqcap e$. poterit quadratura circuli reduci ad quadraturam hyperbolae; et aliae omnes.

Si $a^\omega + A^\omega \sqcap b$. donne $C^\omega \sqcap d$. sitque rursus aliunde $e^\omega \sqcap f$. et ω . et f . inveniri possunt ex quad. hyp. Poterunt omnes quadraturae solvi per quadraturam hyperbolae.

2 hyperbola (1), et generaliter quidem ope (2) ex L 3 servire. (1) Quod si fiat ope ipsarum, a. b. (2) Sed ut (a) mirum video (b) verum L 4 circulo. (1) Caeterum aequatio 1. poterit dividi in duas, hoc modo: (2) Potuissemus L 12 f. omnes. (1) Imo hinc sequetur aliquam hyperbolae portionem posse quadrari, seu aliquem logarithmum posse inveniri; si scilicet series convergens sit summabilis aliunde, hac tamen methodo reduci poterit ad duas eiusmodi aequationes ubi bis idem logarithmus in diversis, unde, si haec reducibles ad unam (2) Si L 13 $e^\omega \sqcap f$. (1) quadratura (2) et L

65. THEOREMA ANALYTICUM DE MAXIMIS ET MINIMIS

[April – Juli 1676]

Überlieferung: L Konzept: LH 35 V 14 Bl. 15. 1 Streifen 20,7 x 4,7 cm. Unterkante stark geschnitten. 2 S. — Auf LH 4 V 10 Bl. 63 v° Teil der Stufe (1) der Lesart zu S. 803 Z. 4. Auf Bl. 63 r° *Extensio interminata*, LSB VI, 3 N. 66. Die beiden Streifen bildeten ursprünglich zwei zusammenhängende Teile eines Blattes. Vor dem Zerschneiden schrieb Leibniz den Text der Rückseite darunter noch einmal an, danach strich er die so entstandenen Fragmente durch.
 Cc 2, Nr. 1139, 00 tlw.

- 10 Datierungsgründe: Das Wasserzeichen des Papiers ist für die Monate April bis Juli 1676 belegt.

Theorema analyticum pulcherrimum de maximis et minimis:

$$\begin{array}{ccccccc} d & & d \\ b & & & b \\ \hline & b-d & & c & c \\ A & D & & B & C \end{array}$$

15

$AD \sqcap d$. $AC \sqcap b + c$. Sit $\frac{AB}{b}$ ad $\frac{BC}{c}$ ut z . ad v . erit $b^z c^v \sqcap d^z, \overline{b+c-d}^{\frac{v}{z}}$ si modo supponatur d . differre a b . et esse minor quam $b + c$. Ergo $\frac{b^z}{d} \sqcap \frac{b+c-d}{c}^{\frac{v}{z}}$. Ergo $\frac{b^z - d^z}{d^z} \sqcap \frac{b-d}{c}^{\frac{v}{z}}$ quoniam a posteriore nimium aufero. Ergo divisus omnibus per $b - d$ si ponatur $b \sqcap d$ erit:

16 AD... b + c. Am Rande erg. L 18 quoniam... aufero erg. L 19 si... b \sqcap d erg. L

11 Theorema: M. RICCI, *Exercitatio geometrica de maximis et minimis*, 1668 [Marg.], Problema primum S. 9; vgl. LQK, prop. XV S. 56–58.

$$\frac{b^{z-1} + b^{z-2}d^1 + b^{z-3}d^2 \text{ etc... } b^1d^{z-2} + d^{z-1}\odot}{d^z} \sqcap \frac{b^{v-1} + b^{v-2}d^1 \text{ etc. } + b^1d^{v-2} + d^{v-1}\triangleright}{c^v}$$

et $\frac{\odot}{\triangleright} \sqcap \frac{dz}{c^v}$.

Nota termini componentes \odot pariter et componentes \triangleright sunt progressionis geometriæ. Et haec redibit ad theorema Slusianum, qui in *Miscellaneis* cap. [4.] ita ait: Notum est (ait Slusius) in serie trium arithmeticæ proportionalium maximam ad medium habere minorem rationem quam habet media ad minimam. Ideo quadratum mediae esse maius facta sub extremis, sed non aequa nota est propositio universalis $A b^r c D^q F$ arithmeticæ crescentes. A minima. Numerus excessus inter A et D est r . inter D et F est q . Aio fore $\frac{A^{[r]}}{D} \sqcap \frac{D^q}{F}$.

5

2 f. $\sqcap \frac{dz}{c^v}$. (1) Si b. non poneretur maior d. idem contingeret tamen ab altera (a) parte (b) parte, versus C seu pro b. (aa) substi (bb) semper intelligenda ea quae maior pon (2) Nota L 4 Miscellaneis | cap. 9. erg L, ändert Hrsg. | ita ait: (1) Notum est | ait Slusius erg. | in serie trium arithmeticæ proportionalium maximam ad medium minorem habere rationem quam habet media ad minimam. Ideo quadratum mediae maius esse facta sub extremis, sed non aequa nota est (a) ut (b) propositio universalis $A b^r c D^q F$ arithmeticæ crescentes. A minima. Numerus excessum inter A et D esto r . inter D et F esto q . Aio fore $\frac{A^z}{D} \sqcap \frac{D^q}{F}$. Unde etiam demonstrat (aa) esse (bb) si magnitudo quaelibet dividatur in ratione numeri ad numerum fore productum ex dignitatibus partium, quarum exponentes sunt iidem numeri, erit omnium similium maximum. Sive postremum de maximo producto etiam sic enuntio

$$\frac{\overbrace{a-b}^r}{\overbrace{a-b}^q} \sqcap \frac{b^b, \overbrace{b-a}^{b-a}}{c^b, \overbrace{a-c}^{b-a}} \quad (2) \text{ Notum L 9 } \underline{z} L \text{ ändert Hrsg.}$$

1 \triangleright : Der richtige Wert von \triangleright ist $\sum_{k=0}^{v-1} \binom{v-1}{k} b^{v-1-k} (-d)^k$. 3 Nota: vgl. M. RICCI, a. a. O.,

Corollarium S. 8 f. 4–804,3 theorema Slusianum: *Mesolabum*, 1668 [Marg.], S. 114–117. — Bereits 1673 hat Leibniz eine englische Übersetzung des Theorems aus der Besprechung in den *Philosophical Transactions* IV Nr. 45 vom 25. März/4. April 1669, S. 906 kennengelernt (s. Cc 2, Nr. 500).

Unde etiam demonstrat si magnitudo quaelibet dividatur in ratione numeri ad numerum fore productum ex dignitatibus partium, quarum exponentes iidem numeri, omnium [similium] maximum.

Hoc postremum etiam ita enuntio:

$$\frac{a-b}{a \underbrace{\hspace{1cm}}_b a} = b^b, \frac{b-a}{b-a} \sqcap c^b, \frac{b-a}{a-c}$$

3 possibilium *L ändert Hrsg.*


66. DE SERIE AD CIRCULUM PER DETERMINATIONES

[März – August 1676]

Überlieferung: L Konzept: LH 35 XIV 1 Bl. 122. 1 Bl. 4°. 1 S. auf Bl. 122 r°. Bl. 122 v° leer.
Cc 2, Nr. 1207

Datierungsgründe: Das Wasserzeichen des Papiers ist von März bis August 1676 belegt.

5



[Fig. 1]

In circulo $ax - x^2 \sqcap y^2$. a . diameter. x . sinus versus. y . rectus. Hinc $x \sqcap \frac{y^2}{a - x}$. et
dividendo:

6 seu $x^2 \sqcap x - y^2$ erg. L

7 Fig. 1: Leibniz verwechselt bei der Beschriftung der Figur x und y ; der Irrtum beeinträchtigt die Überlegung S. 807 Z. 14 – S. 808 Z. 2.

$$\begin{array}{l}
x \vdash \frac{y^2}{a} + \frac{y^2 x}{a^2} \left| + \frac{y^2 x^2}{a^3} \right| + \frac{y^2 x^3}{a^4} \left| + \frac{y^2 x^4}{a^5} \right. \\
x \vdash y^2 + \frac{y^2 x}{a} \left| + \underbrace{\frac{y^2 x^2}{a}}_{y^2 x - y^4} \right. \\
x \vdash y^2 + \frac{y^2 x}{a} \left| + \underbrace{\frac{y^2 x^2}{a}}_{y^2 x - y^4} \right. \\
5 \quad x \vdash y^2 + 2y^2 x \left| - \frac{y^2 x - y^4}{y^4} \right. \left| + \underbrace{\frac{y^2 x^3}{a}}_{y^2 x^2 - y^4 x} \right. \\
x \vdash y^2 + 3y^2 x \left| - 2y^4 \right. \left| + \underbrace{\frac{y^2 x^4}{a}}_{y^2 x^2 - 2y^4 x + y^6} \right. \\
10 \quad x \vdash y^2 + 4y^2 x \left| - 3y^4 \right. \left| + \underbrace{\frac{y^2 x - y^4}{a}}_{y^2 x^3 - 2x^2 y^4 + y^6 x} \right. \\
x \vdash y^2 + 5y^2 x \left| - 4y^4 \right. \left| + \underbrace{\frac{y^2 x^5}{a}}_{y^2 x - y^4 - y^4 x - 2y^4 x + 2y^6} \right. \\
15 \quad x \vdash y^2 + 6y^2 x \left| - 5y^4 \right. \left| + \underbrace{\frac{y^2 x^6}{a}}_{y^2 x^3 - 3y^4 x^2 + 3y^6 x - y^8} \right. \\
x \vdash y^2 + 7y^2 x \left| - 6y^4 \right. \left| + \underbrace{\frac{y^2 x^7}{a}}_{y^2 x - y^4 - y^4 x - 3y^4 x + 3y^6} \right.
\end{array}$$

8–14 Leibniz übernimmt absichtlich nicht alle bei der Umformung auftretenden Terme in die folgenden Zeilen, wie aus S. 808 Z. 4 ersichtlich ist.

Ponamus $a \sqcap 1$.

$$\begin{array}{ll}
 x \sqcap y^2 & 1 - x \sqcap 1 \\
 x \sqcap \frac{y^2}{1 - y^2} & 1 - x \sqcap \frac{1 - y^2}{1} \\
 x \sqcap \frac{y^2 - 1y^4}{1 - 2y^2} & 1 - x \sqcap \frac{1 - 2y^2}{1 - y^2} \\
 x \sqcap \frac{y^2 - 2y^4}{1 - 3y^2} & 1 - x \sqcap \frac{1 - 3y^2}{1 - 2y^2} \\
 x \sqcap \frac{y^2 - 3y^4 + 1y^6}{1 - 4y^2 + 2y^4} & 1 - x \sqcap \frac{1 - 4y^2 + 2y^4}{1 - 3y^2 + 1y^4} \\
 x \sqcap \frac{y^2 - 4y^4 + 3y^6}{1 - 5y^2 + 2y^4} & 1 - x \sqcap \frac{1 - 5y^2 + 2y^4}{1 - 4y^2 + 3y^4} \\
 x \sqcap \frac{y^2 - 5y^4 + 6y^6 - 1y^8}{1 - 6y^2 + 5y^4 - 3y^6} & 1 - x \sqcap \frac{1 - 6y^2 + 5y^4 - 3y^6}{1 - 5y^2 + 6y^4 - 1y^6}
 \end{array}$$

5

[Zusätze]

[Zu S. 806 Z. 2:]

10

Notanda ac solvenda difficultas; cum dicitur:

$x \sqcap y^2 + y^2x$, seu $x - y^2x \sqcap y^2$. seu $x \sqcap \frac{y^2}{1 - y^2}$ potuisse et dici:
 $y^2x \sqcap x - y^2$. et $y^2x - x \sqcap -y^2$. et $x \sqcap \frac{y^2}{1 - y^2}$.

Ne ergo contraria simul concludantur, considerandum hoc est, quia scimus $x \sqcap y^2 + y^2x$, tunc si y et x sint minores unitate fore $x \sqcap y^2x$. Ergo $x - y^2x \sqcap y^2$. et $x \sqcap \frac{y^2}{1 - y^2}$. 15

Posteriore autem modo ratiocinari non licet, nec detrahere, nisi quod constet esse minus.

2–8 Darunter: Semper x in $1 - x[,] \sqcap y^2$

2–8 In der Vorlage stehen die Z. 2–8 neben S. 806 Z. 1–14. 13–808,2 $x \sqcap \frac{y^2}{1 - y^2}$: Leibniz über sieht, daß sich durch den Vorzeichenwechsel die Ungleichung umkehrt. Beim folgenden Versuch, die vermeintliche Schwierigkeit zu beheben, wird er durch die falsche Beschriftung der Figur irritiert.

Posset tamen sumi $y \sqcap 1.$ modo x sit minor, et tunc omnia fient contraria x , autem necessario maior, alioqui tota series infinita non esset vera.

[*Zu S. 806 Z. 6–16:*]

- Forte re recte expensa additiones et negationes alternantur. Videndum et cuinam
5 ex duabus aequationis radicibus satisfiat. Videtur quin etiam appropinquationes, (ac per consequens ex appropinquationibus series[]) in meritis integris obtineri posse. Si tali scilicet modo misceantur quantitates, sive aequationes et determinationes, ut divisio fieri possit, residuis semper commode suppletis, poterunt scilicet ascribi aequationes in certas quantitates aut formulas ductae, aliaque id genus. Sed cavendum ne pro quaesitis radicibus
10 alias immisceamus.

[*Zu S. 807 Z. 2–8 :*]

Ex his iam satis apparent quomodo sine ulteriore calculo propiores semper ac propiores ipsius x valores inveniri possunt.

13 possunt. | Quarum differentiae ipsi x streicht Hrsg. | L

67. SERIES DIFFERENTIARUM GENERALIS

[März – August 1676]

Überlieferung: *LuT* Gesprächsaufzeichnung (Leibniz u. Tschirnhaus): LH 35 VIII 30 Bl. 146.

1 Bl. 2°. 1 S. auf Bl. 146 r°. Bl. 146 v° leer. Überschrift von Leibniz ergänzt.

Cc 2, Nr. 1513

5

Datierungsgründe: Das Wasserzeichen des Papiers ist von März bis August 1676 belegt.

Series differentiarum generalis

[Tschirnhaus]

$$\frac{n}{t} \quad \frac{o}{u} \quad \frac{p}{w} \quad \frac{q}{x} \quad \frac{r}{y} \quad \frac{s}{z} \quad \frac{s}{z} \not\propto 0$$

$$\frac{nu - ot}{ut} \quad \frac{wo - pu}{wu} \quad \frac{px - qw}{wx} \quad \frac{qy - rx}{xy} \quad \frac{zr - sy}{yz}$$

$$\frac{1}{f} \quad \frac{1}{g} \quad \frac{1}{h} \quad \frac{1}{i} \quad \frac{1}{k}$$

$$un - ot \not\propto 1 \quad ut \not\propto f \quad t \not\propto \frac{f}{u} \quad t \not\propto \frac{fw}{g}$$

$$n \not\propto \frac{ot + 1}{u}$$

$$t \not\propto \frac{f}{u}$$

$$n \not\propto \frac{of + u}{uu}$$

$$t \not\propto \frac{f}{u}$$

$$t \not\propto \frac{fhk \text{ etc. in inf.}}{gi \text{ etc. in } z}$$

$$o \not\propto \frac{pg + w}{ww}$$

$$u \not\propto \frac{g}{w}$$

$$p \not\propto \frac{gh + x}{xx}$$

$$w \not\propto \frac{h}{x}$$

$$q \not\propto \frac{ri + y}{yy}$$

$$x \not\propto \frac{i}{y}$$

10

15

7 (1) Quadratura per series differentiarum (2) Series L

[Leibniz]

r	y	z	ω	γ	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	
p	a	b	c	d	e	f		
q	g	h	i	k	l			
5	s	m	n	s	t			
	t	v	w	x				
	v							
	w							

[Fig. 1]

[Tschirnhaus]

$$\begin{array}{ll}
 10 \quad \frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{5} & \frac{1}{2} \frac{1}{6} \frac{1}{12} \frac{1}{20} \\
 \frac{3}{2} \left| \frac{11}{6} \right| \frac{50}{24} & \frac{2}{3} \frac{3}{4} \frac{4}{5} \frac{5}{6} \\
 \frac{n}{t} \not\propto \frac{s}{z} + \frac{1}{k} + \dots & \\
 \frac{n}{t} \not\propto \frac{fghik \text{ in } s + fghiz + ghikz + hikfz + ikfgz + kfghz}{fghikz} & t \not\propto \frac{fhk \text{ etc.}}{gil \text{ etc. in } z} \\
 n \not\propto \frac{fghik \text{ in } s \text{ etc.} + \text{omnibus productis una dimensione minoribus in } z}{ggiiill \text{ in infinitum in } zz}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
 15 \quad n \not\propto \frac{ot+1}{\mu} & f \not\propto & n \not\propto \frac{ot+u}{u\mu} \quad t \not\propto \frac{f}{\mu} \\
 \frac{n}{t} \not\propto \frac{ot+1}{f} & \left[\frac{n}{t} \right] \not\propto \frac{of+u}{fu} & \\
 \frac{n}{t} \not\propto \frac{ot}{f} + \frac{1}{f} & \left[\frac{n}{t} \right] \not\propto \frac{o}{u} + \frac{1}{f}
 \end{array}$$

16 f. n T ändert Hrsg. zweimal

$$\frac{1}{f} + \frac{1}{g} + \frac{1}{h} + \frac{1}{i} + \frac{1}{k} \\ \frac{f+g}{fg} + 1 [bricht ab] \frac{f}{fghik} [bricht ab]$$

[Leibniz, Schrägzeile von Tschirnhaus]

1 Nebenrechnung, Tschirnhaus: $\frac{f \ g \ h \ i}{fgh} \ fg \ gh \ [hf]$


13 hg T ändert Hrsg.

[Tschirnhaus]

10 [Figuren ohne direkten Bezug zum Haupttext]
[Leibniz oder Tschirnhaus]




[Fig. 2]




[Fig. 3]

2-4 Tschirnhaus rechnet im Schema rechts von unten nach oben und schreibt das Ergebnis links auf den Strich.

[*Tschirnhaus, quer zur Schreibrichtung*]



[Fig. 4]



[Fig. 5]

68. DE SUMMIS SERIERUM GENERALISSIMA

August 1676

- Die beiden Teilstücke stehen in engem inneren und äußerem Zusammenhang. Auf zwei Seiten eines Bogens haben Leibniz und Tschirnhaus während eines Gesprächs Aufzeichnungen notiert. Vermutlich 5 unmittelbar danach hat Leibniz den Inhalt weiter ausgearbeitet und schließlich eine gemeinsame Überschrift (= Z. 12 f.) und das Datum (= S. 818 Z. 10) ergänzt.

68₁. NOTAE

Überlieferung: *LuT* Gesprächsaufzeichnung (Leibniz u. Tschirnhaus): LH 35 VIII 30 Bl. 144 bis 145. 1 Bog. 2°. 2 S. auf B. 144 r° u. 145 v°. Textfolge Bl. 145 v°, Bl. 144 r°. Überschrift von Leibniz auf Bl. 144 r° ergänzt. Auf dem Rest des Bogens N. 68₂.
10 Cc 2, Nr. 1512

D e s u m m i s s e r i e r u m g e n e r a l i s s i m a i t e m u t r u m t e r m i n o -
r u m r a t i o n a l i u m s u m m a e p o s s i n t e s s e i r r a t i o n a l e s

[Teil 1]

15 [Tschirnhaus]

$$\begin{array}{lll}
 \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + \frac{1}{t} & y - x \not\propto 1 & xy \not\propto a \\
 \frac{y-x}{xy} + \frac{z-y}{yz} + \frac{t-z}{tz} & x \not\propto y - 1 & yy - y \not\propto a \\
 \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} & x \not\propto -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + a} & y \not\propto +\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + a} \\
 \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} & y \not\propto -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + b} & z \not\propto +\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + b} \\
 20 & a & z \not\propto -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + c} \\
 -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + b} & \not\propto \sqrt{\frac{1}{4} + a + \frac{1}{2}} & \frac{bb - 2ab + aa - 2b + 2a + 1}{4} \not\propto \frac{1 + 24a}{4}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 \sqrt{\frac{1}{4} + b} \rightsquigarrow \sqrt{\frac{1}{4} + a} + 1 & bb \rightsquigarrow 2ab + 2b - aa + 2a \\
 \frac{y}{4} + b \rightsquigarrow \frac{y}{4} + a + 2\sqrt{\frac{1}{4} + a} + 1 & b \rightsquigarrow a + 1 + \sqrt{4a + 1} \\
 \frac{b-a-1}{2} \rightsquigarrow \sqrt{\frac{1}{4} + a} & c \rightsquigarrow b + 1 + \sqrt{4b + 1} \\
 \frac{f}{x} + \frac{f}{y} + \frac{f}{z} + \frac{f}{t} & \frac{1}{1} \frac{1}{3} \frac{1}{6} \\
 \frac{f}{x} \frac{g}{y} \frac{f}{z} \frac{g}{t} \frac{f}{u} & \\
 \frac{f}{x} \frac{g}{y} \frac{f}{z} \frac{i}{t} \frac{f}{u} & \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{x}{3} \frac{1}{4} \frac{xx}{5} \frac{1}{6} \quad x \rightsquigarrow x - xx \mid xx - x^2 \mid x^2 - x^4 \mid \\
 & \frac{1}{3} \frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{4} \frac{4}{8} \frac{5}{16}
 \end{array}$$

5

[Tschirnhaus, auf der Gegenseite]

$$\frac{1}{a} \frac{1}{b} \frac{1}{c}$$

[Leibniz]

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}. \text{ Formula unde per comparationem seriei datae summa inveniri potest.} \\
 \frac{fy - xg}{xy} \sqcap \frac{1}{a}. \quad fy - xg \sqcap 1. \quad x \sqcap \frac{fy - 1}{g}. \quad x \sqcap \frac{a}{y}. \quad y^2 - y \sqcap \frac{ga}{f}.$$

2 f. Zahlenbeispiele, Tschirnhaus:


$$\text{zu } \sqrt{4a+1} : 3 \quad \text{zu } \sqrt{4b+1} : 5$$

$$12 \sqcap \frac{1}{a}. \mid xy \sqcap fay - xag. \quad x \sqcap \frac{fay}{y + ag} \text{ gestr.} \mid fy - xg \sqcap 1 \ L \quad 12 \ y^2 - (1) yf \ (2) y \sqcap \frac{ga}{f} \ L$$


6 Zur linken Folge: vgl. N. 68₂ S. 818 Z. 17 f. 11 f. Leibniz nimmt diesen Ansatz in Teil 1 von N. 68₂ wieder auf; $y^2 - y \sqcap \frac{ga}{f}$: Richtig wäre $y^2 - \frac{y}{f} \sqcap \frac{ga}{f}$. Leibniz führt die Rechnung auf S. 818 Z. 13 nochmals durch, wobei ihm ein anderer Flüchtigkeitsfehler unterläuft. 14 3 ... 5: Wie auf S. 814 Z. 18–20, linke Spalte, angedeutet wählt Tschirnhaus $a = 2, b = 6$ und berechnet die Wurzeln.

[Teil 2]


[Tschirnhaus oder Leibniz]



[Fig. 1, Tschirnhaus]




[Fig. 2]




[Fig. 3]




[Fig. 4]



[Fig. 5, Leibniz]



[Fig. 6, Leibniz]



[Fig. 7]

5 [Leibniz]

$$\begin{aligned}
 y &\sqcap x^2 & \boxed{y^2 \quad x^2 \quad yx \quad x \quad y \quad d} & y \sqcap + \sqrt{\sqrt{x \dots} - \sqrt{(y)} - \sqrt{\sqrt{x + \beta}}} \\
 &&& \sqrt{\sqrt{x + \beta}} \quad \sqrt{\dots} \\
 \underbrace{\frac{1}{1} - \frac{1}{3}}_{\frac{2}{3}} &+ \underbrace{\frac{1}{5} - \frac{1}{7}}_{\frac{2}{35}} \text{ etc.} & \frac{1}{16y^2 + 16y + 3} \text{ series invenienda pro magnitudine circuli}
 \end{aligned}$$

6 $\boxed{y^2 \quad x^2 \quad yx \quad x \quad y \quad d}$: vgl. S. 821 Z. 17.

1	3	5	$2y + 1$ impar
2	6	10	$4y + 2$ impar duplus
			$16y^2 + 16y + 4$ eius quad.

$$\begin{array}{cccccc} \frac{1}{1} & y & & & & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{y} - \frac{1}{y+\beta} & \frac{[y] + \beta[-y]}{y^2 [+\beta y]} & & \frac{1}{y^2 + y} \\ \frac{1}{3} & & & \frac{\beta}{y^2} & & \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{y} & & \frac{1}{1} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} & & \end{array}$$

[Tschirnhaus]

$$\frac{\sqrt{2}}{-2\sqrt{2} + \sqrt{2+}} \quad \frac{\sqrt{\dots}}{\sqrt{\dots}} \quad \sqrt{+x+} \quad [bricht ab]$$

[Leibniz]

[Leibniz]

$$z \in \frac{y^2 \dots}{\dots} \quad \frac{y^2 + y + b}{cy^2 + ey + d} \times \dagger \frac{y^2 + 2y\beta + \beta^2, +y + \beta\langle +b \rangle}{cy^2 + 2cy\beta + c\beta^2, +ey + e\beta + d}$$

10

816,9 Unter der linken Spalte, Tschirnhaus mit Ergänzung durch Leibniz:

$$\frac{-1}{\cancel{1}+1} \not\sim 1 - 1 + 1 - 1 + \frac{1}{\cancel{1}+1}$$

$$816,9 \quad \text{Über } \frac{1}{16y^2 + 16y + 3}; \quad [Leibniz] \quad [Tschirnhaus]$$

$$y^2 \quad \frac{1}{y^2 + 1} \quad 2y + 1$$

$$14 - 1 + \frac{1}{1+1} \ erg. \ L$$

$$(z) \sqcap \frac{y + \beta}{\dots}$$

$$y^y - \overline{y + \beta}^{y+\beta}$$

Semper fieri potest, si y ponatur esse arithmeticæ progressionis rationalis, sive β sit infinitesima sive non.

5 68₂. INQUISITIONES DUAE

Überlieferung: L Konzept: LH 35 VIII 30 Bl. 144–145. 1 Bog. 2^o. 2 S. auf B. 144 v^o u. 145 r^o. Textfolge Bl. 145 r^o, Bl. 144 v^o. Datum auf Bl. 145 r^o oben ergänzt. Auf dem Rest des Bogens N. 68₁.
Cc 2, Nr. 1511

10 Aug. 1676

[Teil 1]

$\frac{f}{x}, \frac{g}{y}, \frac{h}{z}, \frac{i}{t}$ series quaesita. $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}, \frac{1}{d}$ series summanda.

$\frac{fy - gx \sqcap 1}{xy \sqcap a}$. Ergo $x \sqcap \frac{fy - 1}{g} \sqcap \frac{a}{y}$. et $fy^2 - y \sqcap ga$. et $y^2 - \frac{1}{f}y + \frac{1}{4f^2} \sqcap ga + \frac{1}{4f^2}$.

Eodem modo et $y \sqcap \frac{+1 + \sqrt{4gaf^2 + 1}}{2f}$ et $x \sqcap \frac{\bar{+}1 + \sqrt{4gaf^2 + 1} \bar{-} 2}{2g}$

15 et $z \sqcap \frac{+1 + \sqrt{4hbg^2 + 1}}{2g}$ et $y \sqcap \frac{-1 + \sqrt{4hbg^2 + 1}}{2h}$

et $t \sqcap \frac{+1 + \sqrt{4ich^2 + 1}}{2h}$ et $z \sqcap \frac{-1 + \sqrt{4ich^2 + 1}}{2i}$.

12–16 *Dazu am Rande:* (Si f.h. per saltus idem, et tantum varient g.i. etc. nihilo minus res erit determinata.)

11 Teil 1: Leibniz nimmt im folgendem den Ansatz von S. 815 Z. 11 f. wieder auf. 13 $\sqcap ga + \frac{1}{4f^2} \dots$

Richtig wäre $\frac{ga}{f} + \frac{1}{4f^2}$; Leibniz rechnet konsequent weiter bis S. 819 Z. 6, wo ihm ein weiterer Fehler unterläuft, der die Gleichung für f^2 in S. 819 Z. 7 zusätzlich beeinträchtigt. 17 Si ... etc.: vgl. N. 68₁ S. 815 Z. 6.

Ponatur iam $\frac{1}{a} \frac{1}{b} \frac{1}{c}$ esse series decrescens in infinitum tandemque evanescens, quaeritur eius summa $\frac{f}{x}$. Quaeritur ergo x . Sed ad x . habendum, opus est f . et g . Habetur autem f . ex datis g . et h . et prorsus ut g . ex datis h . et i . et ita porro, nempe aequando duos ipsius y . valores fiet:

$$\begin{aligned} h + h\sqrt{4gaf^2 + 1} &\sqcap -f + f\sqrt{4hbg^2 + 1} \text{ et} \\ h^2 4gaf^2 + h^2 &\sqcap f^2 - 2f^2\sqrt{4hbg^2 + 1} + f^2 4hbg^2 + f^2 \text{ fietque} \\ \frac{h^2}{2 - 2\sqrt{4hbg^2 + 1}, +4hbg^2 - 4gah^2} &\sqcap f^2. \end{aligned}$$

Eodem modo invenietur g . ex datis h . i. b. c.

ut f . ex datis g . h. a. b. et ita ad inventionem summae $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ etc. opus erit re adhuc difficiliore, terminatione scilicet summae replicatae modo quo dixi, nam et h . ex i . etc. eodem modo invenietur. Et ad unam inveniendam opus est sequentibus omnibus.

Hinc ergo potius illud lucrum habebimus ut serierum eiusmodi replicatarum terminaciones et expressiones aliaque id genus problemata irregularia possimus revocare ad quadraturas et inventiones summarum. Si vero inter comparandum in aequatione qua f . quaeritur destrui potuissent h . et g . et eodem modo in caeteris, tunc habuissemus methodum perfectam inveniendi summam datam.

Quod ut hac methodo facere tentemus, res de integro resumenda: $\frac{fy - gx}{xy} \sqcap \frac{1}{a}$. Pro $\frac{1}{a}$ potuit scribi $\frac{v}{va}$ et divelli haec aequatio in duas $fy - gx \sqcap v$. et $xy \sqcap va$. et habebimus novam arbitriam, sed ut generalius procedamus; est $\frac{fy - gx}{xy} \sqcap \frac{1}{a}$. seu $fya - gxa \sqcap xy$. Haec aequatio infinitis modis in duas divelli potest; novis etiam adhibitis arbitrariis ut si ponamus $vfy a + \mathfrak{v} - \mathfrak{v} - gxa v \sqcap xyv$ et divellamus in duas ut $vfy a \sqcap \mathfrak{v} + xyv$ et $\mathfrak{v} \sqcap gxa v$. Ita duas habebimus arbitrarias, sed et plures licebit facere; ipsis scilicet

³ prorsus ut erg. L 9 inventionem (1) seriei (2) summae L 13 ut (1) seriei (2) serierum eiusmodi (a) hoc modo ad (b) replicatarum L 14 expressiones (1) | possimus streicht Hrsg. | rev (2) aliaque L 20 procedamus; (1) quoniam est aeq (2) est L 23 plures (1) quaerere (2) licebit L

incognitis, $x.y.f.g.h.$ plures earum ascribendo potentias; arbitrariis quantitatibus affectis; undeque aequationes evolvendo novissima aequatio qua $f.$ ex datis $a.b.$ et $g.h.$ invenitur, debet esse talis, ut destruantur in ea ipsae $g.$ et $h;$ et inventa erit summa seriei datae. Imo maior difficultas subnascitur in aequationes comparatias quibus arbitrariae assumtae 5 invenientur nec ingredi debent $a.$ et $b.$ Ergo debent totidem aequationes collatitiae quot sunt diversi modi quibus in aequatione ultima pro $f.$ $a.b.g.h.$ combinantur. Alioquin enim arbitrariae quae sunt constantes explicarentur per $a.b.$ etc. inconstantes, nisi forte ipsas arbitrarias quoque reddere velimus inconstantes quod non simplici explicatione ipsarum $x.y.f.g.h.$ per formulas, sed divulgione fieri debet, ut si in aequatione $fya - gxa \sqcap xy$ 10 scribas $fya + \mathbf{Ny} + \mathbf{D} + \mathbf{Ly}^2$ idemque facias de $x.$ et $f.g.$ separatim; imo et de $xy.xg.xyf.$
 $- \mathbf{Ny} - \mathbf{D} - \mathbf{Ly}^2$

aliisque omnibus terminis ex quatuor literarum combinatione factis, atque inde divellas aequationem in duas. Tunc fecisti quicquid hac quidem methodo ab homine fieri potest:

Idemque aliis adhibitis literis fieri potest in sequenti $\frac{gz - yh}{yz} \sqcap \left[\frac{1}{b} \right]$ et ita porro. Inventis

15 ita $x.y.$ et tandem termino ultimo $f.$ explicandae sunt novae assumtae hoc modo, ut destruantur in illis $f.$ et $g.$ et $h.$ Et haec est pulcherrima et generalissima methodus divulgionum; quae etiam in methodo Diophanti utilis.

Loco quod terminos quaesitae seriei $\frac{f}{x} \cdot \frac{g}{y}.$ assumsimus ut fractiones potuissemus as-

sumere ut radices irrationales, item ut radices aequationum, unde adhuc maior complica-

20 tio. Quid si simplicissime series quaesita fuisset: $x.y.z.t.$ data $a.b.c.d.$ et $x-y \sqcap a.$ $y-z \sqcap b.$ sed sic nullae literae supernumerariae, unde et nullae divulgiones; varianda ergo enuntia-

tiones, ut fecimus. Caeterum hic credo omnes methodos inveniendi series in se replicatas,

et proinde problemata methodi tangentium inversae reducere credo poterimus ad quadra-

25 turas; quod foret pulcherrimum. Ita enim semper curvas eiusmodi possemus describere modo quem ego introduco, et scire an sint curvae analyticae satisfacientes problemati,

4 subnascitur (1) in valores (2) in L 6 pro f. erg. L 9 si | pro streicht Hrsg. | in L 14 $\frac{1}{a}$


L ändert Hrsg. 17 f. utilis. (1) Caeterum (2) Loco L 20 a.b.c.d. (1) et modus (2) et L

25 modo quem ego introduco: Gemeint ist die von Leibniz seit Herbst 1675 entwickelte Differential- und Integralrechnung.

quia semper quadraturas omnes possumus dare analytice. In methodi divulsionum successu debet esse difficultas, quia si succederet aequa facile pro qualibet serie summandam succederet quia ipsae a . et b . non variant calculum. Sed et bene video istam methodum non esse naturalissimam, quia non dat impossibilitatem.

[Teil 2]

5



[Fig. 1]

Demonstravi seriei rationalis utcunque infinitae differentias esse rationales, tum ex eo quod supra dixi de differentiis infinite parvis, tum vero etiam methodo generali hoc modo[:] sit figura ABC[,] summatrix ABF. Si ea est irrationalis, non poterit generaliter evenire, ut duarum ordinatarum quarumcunque, ut BF, MG differentia sit rationalis. Quod ita ostendo. Poterit aliqua ex ordinatis quadraticis esse rationalis (nam potest haec curva alicubi secari a recta aut hyperbola, ita ordinata sit utriusque communis, et ea erit rationalis), ut si a recta PG secetur in G . sitque AP, PM , rationalis ratioque laterum trianguli ut numeri ad numerum, utique erit MG rationalis. Differentia autem inter MG rationalem, et BF irrationalem utique irrationalis contra hypothesin.

10

15

Non ita facile applicatur hoc ad series numerorum[,] poterit tamen.

Sit aequatio $y^2 + by + xy + x^2 + cx + d \sqcap 0$ et rursus

$(y)^2 + b(y) + (x)(y) + (x)^2 + c(x) + d \sqcap 0$ sintque x . et (x) rationales[,]

7 Demonstravi (1) summae ratio (2) serierum rationalium utcunque infinitarum (3) seriei L
12 secari (1) aut a triangulo (2) a recta aut (a) parabola (b) hyperbola, ita | ut eius *gestr.* | ordinata L
13 rationalis (1) vel etiam assumi potest rationalis ordinata (2), ut L 13 ratioque (1) lineae (2)
laterum L 15 f. hypothesin. (1) Eodem enim (2) Non L

8 supra dixi: s. o. S. 818 Z. 3f.

$\dagger y \neq (y) \sqcap z$. Quaeritur an z . possibile sit esse rationalem quacunque posita relatione inter y . et (y) . Hoc patet esse impossibile. Potest enim talis utique poni ut sit differentia irrationalis.

+ y^2 + by + xy + x^2 + cx $+ d$ $- d$ $\sqcap 0$.

5 Componantur aequationes

$- (y)^2 - b(y) - (x)(y) - (x)^2 - c(x)$


$y - (y) \sqcap z$. et $x - (x) \sqcap \omega$ fiet $z, + y + bz +$

$+ (y)$ [bricht ab]

$\boxed{y^2} \boxed{-y^2} + 2zy - z^2$

10 $y - (y)$ [bricht ab]

$a \quad b \quad c \quad d \quad e$ irrationales pleraeque



 $a - b \quad a - c \quad a - d \quad a - e$
 $b - c \quad b - d \quad b - e$
 $c - d \quad c - e$
 $d - e$
rationales

15 [Fig. 2]

Patet hoc fore impossibile si vel una ex ipsis $a.b.c.d.e.$ sit rationalis. Hinc etiam $a-b, -b+c$ rationalis seu $a+c-2b$, item $a+b+c, -3d$.

$$a + b - 2c$$

Ut differentia inter a et c sit rationalis; debet nulla esse litera [bricht ab]

$$\sqrt{1-\sqrt{1-\sqrt{\dots}}}$$
 [bricht ab]

4–6 *Darunter:* (Hinc ut obiter dicam, derivari poterit regula Slusii tangentium.)

19 sit (1) irrationalis (2) rationalis L

21 derivari ... tangentium: Leibniz bezieht sich vermutlich darauf, daß die Tangentenregel von Sluse für eine Kurve $F(x, y) = 0$ mit $t = \frac{y}{y'}$ auf der Gleichung $|t \cdot F'_x(x, y)| - |y \cdot F'_y(x, y)| = 0$ beruht; vgl. auch die Erl. zu N. 385 S. 415 Z. 25. — Ähnlich äußert sich Leibniz in *Calculus tangentium differentialis* (s. H.-J. HESS, *Zur Vorgeschichte*, 1986, S. 87 u. LBG S. 230) vom November 1676.

Demonstrandum superest quod impossibile sit circulum esse quantitatem rationalem ad quadratum seu esse numerum vel rationem quae semper satisfaciat huic $\frac{314159}{100000}$.

Ponatur esse fractio $\frac{c}{b}$, reducatur ad decimalem $\frac{f}{10^y}$ fiet $f \sqcap \frac{10^y c}{b} \sqcap 314159$ etc.

Sit numerus quicunque multiplicans 10^y infinitae potentiae modo ipse sit finitus qui si dividatur per finitum, tandem post certam periodum non producat semper numeros priores. Examinandum, stabit ita. 5

Pro 10 scribamus v , fiet $\frac{v^y \wedge d + ev + fv^2 + \text{etc.}}{[l] + mv + nv^2 + \text{etc.}}$

Pro v^y ponetur $0 + 0v + 0v^2 + 0v^3$ etc. + v^y ponendo y infinitam.

2 huic (1) 341589 utcunque continuataqe (2) 3,1459 ad (3) $\frac{314159}{100000} L$ 5 non (1) relinquat (2)
producat L 7 m L ändert Hrsg.

69. DE SERIE WALLISIANA

[Spätsommer 1676?]

Überlieferung: L Konzept: LH 35 XII 1 Bl. 7. 1 Ausschnitt ca 16 x 21 cm. Untere Schnittkante geschwungen. 1 S. auf Bl. 7r°. Bl. 7v° leer.

5 Cc 2, Nr. 00

Datierungsgründe: Das schwer zu datierende Stück stammt, worauf die durchgehende Verwendung von *aeq.* als Gleichheitszeichen hindeutet, wohl frühestens aus den letzten Wochen von Leibniz' Parisaufenthalt.

Secundum Wallisium ratio quadrati diametri ad circulum est

$$10 \quad \frac{1.3.3.5.5.7.7.9.9.11.11 \text{ etc.}}{2.4.4.6.6.8.8.10.10.12.12 \text{ etc.}} \text{ *aequ.* } \square.$$

$$\text{Ergo fiet } 2 \square \text{ *aeq.* } \frac{3.3.5.5.7.7.9.9.11.11 \text{ etc.}}{4.4.6.6.8.8.10.10.12.12 \text{ etc.}} \text{ et } \sqrt{2\square} \text{ *aeq.* } \frac{3.5.7.9.11 \text{ etc.}}{4.6.8.10.12 \text{ etc.}}.$$

Sed hinc colligo expressionem Wallisianam posse quidem haberi pro appropinquatione, cuius appareret continuabilitas in infinitum, sed non pro exacta expressione per infinitam seriem consideratam semel in universum, nam exprimendo per suppositam continuationem in infinitum, oritur absurdum, nam omnes numeri numeratoris tolli possunt, quia habentur eorum multipli in nominatore, si uterque in infinitum continuatus intelligitur, et ita staret $\sqrt{2\square}$ *aeq.* $\frac{1}{4.2.8.2.12.2 \text{ etc.}}$ vel $\frac{1}{8.16.24 \text{ etc.}}$ quod est absurdum, fieret enim $\sqrt{2\square}$ quantitas infinite parva. Similiter fieret $2\square$ *aeq.* $\frac{1}{64.256.576 \text{ etc.}}$ seu $2\square$ *aeq.*

$$\frac{1}{64.1.64.4.64.9. \text{ etc.}}.$$

9 f. est (1) 1.3.5. (2) $\frac{3.5.7.9.11.13}{4.6.10.12.1}$ (3) $\frac{1.3.3.5.5.7.7.9.9.11.11. \text{ etc.}}{2.4.4.6.6.8.8.10.10.12.12. \text{ etc.}}$ L 14 universum, (1) cum enim hoc (2) nam L 15 absurdum, (1) dividendo enim omnes (2) nam L
 19–825,1 $\frac{1}{64.1.64.4.64.9. \text{ etc.}}$. | Itaque *streicht Hrsg.* | Itaque (1) sic (2) potius (a) dicendum est (b)
 exprimendum est, (aa) $\frac{3.3.}{(bb)} \square$ esse (cc) ad L

9 Secundum Wallisium: *Arithmetica infinitorum*, 1656, prop. 191 S. 178–182 (WO I S. 467–469).

Itaque potius exprimendum est, ad \square continue appropinquari per hos valores

$$\begin{aligned} & \frac{3.3}{2.4} \text{ vel } \frac{3.3.5.5.}{2.4.4.6} \text{ vel } \frac{3.3.5.5.7.7.}{2.4.4.6.6.8} \text{ vel } \frac{3.3.5.5.7.7.9.9.}{2.4.4.6.6.8.8.10} \\ & \text{seu } 2\sqrt{\square} \sqcap \frac{3}{\sqrt{2}} \text{ vel } \frac{3.5}{4\sqrt{3}} \text{ vel } \frac{3.5.7}{4.6.\sqrt{4}} \text{ vel } \frac{3.5.7.9}{4.6.8.\sqrt{5}} \text{ vel } \frac{3.5.7.9.11}{4.6.8.10.\sqrt{6}} \text{ vel } \\ & \frac{3.5.7.9.11.13}{4.6.8.10.12.\sqrt{7}} \\ & \text{vel } 2\sqrt{\square} \sqcap \frac{3}{\sqrt{2}} \text{ vel } \frac{3.5}{4\sqrt{3}} \text{ vel } \frac{5.7}{8\sqrt{4}} \text{ vel } \frac{5.7.9}{8.8.\sqrt{5}} \text{ vel } \frac{7.9.11}{8.16.\sqrt{6}} \text{ vel } \frac{7.9.11.13}{8.16.12.\sqrt{7}} \text{ vel } 5 \\ & \frac{9.11.13.15}{8.16.24.\sqrt{8}} \text{ vel } \frac{9.11.13.15.17}{8.16.24.16\sqrt{9}} \text{ vel } \frac{11.13.15.17.19}{8.16.24.32\sqrt{10}} \text{ vel } \frac{11.13.15.17.19.21}{8.16.24.32.20\sqrt{11}} \text{ vel } \\ & \frac{13.15.17.19.21.23}{8.16.24.32.40\sqrt{12}} \text{ et ita porro.} \end{aligned}$$

Et proinde series Wallisiana est proprie appellanda finita indefinita, seu quae alicubi finienda concipi debet, licet non exprimatur ubi.

Ex istis appropinq. fit

10

\square diam. ad circul.

9	—	8	—	9	—	8	A		
225	—	192	—	vel in numeris	—	225	—	192	B
11025	—	9216	—	minoribus	—	1225	—	1024	C
893025	—	737280	—		—	19845	—	16384	D
108056025	—	88473600	—		—	160083	—	131072	E

15

$$5 \text{ vel } 2\sqrt{\square} \sqcap (1) \frac{3.5}{8.16.24.32.48} (2) \frac{1}{8.16.24.32.48} (3) \frac{3}{\sqrt{2}} L \quad 9 \text{ concipi (1) potest, licet (2) debet } L$$

$$9 \text{ f. ubi. (1) } \square \text{ diam. } \quad 9 \quad \left| \begin{array}{c|c|c} 225 & 1225 & 19845 \\ \hline 192 & 1024 & 16384 \end{array} \right| \text{ Dazu gestr. Nebenrechnung: } \frac{9}{8} \neq 1 + \frac{1}{8} \text{ (2) Ex } L$$

ad ut circ.

$$\begin{array}{c} \text{Ratio } A \text{ dat quotientes } 1, 8 \Big| B, 1, 5, 1, 4, 2 \Big| C, 1, 5, 10, 1, 1, 2, 1, 2 \Big| D, 1, 4, 1, 2 + \frac{698}{921} \\ E, 1, 4, 1, 1, 13 + \frac{398}{1045} \end{array}$$

825,12–14

Nebenrechnung:

9	
<u>25</u>	
225	
<u>49</u>	
2025	
<u>900</u>	
11025	
81	

1 B, 1, 5, (1) 10, 1, 1, 2, 1 (2) 1, 4, 2 |, 1 streicht Hrsg. | C L

1 quotientes: Es handelt sich um die Quotienten der Kettenbruchentwicklung.

70. DE SUMMA NUMERORUM QUADRATORUM RECIPROCORUM

[Juni 1674 – Anfang Oktober 1676]

Überlieferung: *LuX* Gesprächsaufzeichnung (Leibniz und Unbekannter mit zusätzlichen Bemerkungen von Leibniz): LH 35 VIII 30 Bl. 100. 1 Ausschnitt ca. 16 x 20 cm. Links oben ein Stück ca. 7 x 11 cm unregelmäßig herausgeschnitten. Darunter am linken Rand unregelmäßige, am unteren Rand schräge Schnittkante. 1. S. auf Bl. 100 r°. Bl. 100 v° leer.
 Überschrift und Text Z. 16 f. ergänzt.
 Cc 2, Nr. 1210

5

Datierungsgründe: Die schwer zu datierende Gesprächsaufzeichnung ist offenbar während des Parisaufenthalts entstanden; die Verwendung des Waagebalkens als Gleichheitszeichen deutet auf eine Entstehung nicht vor Juni 1674 hin.

10

[Leibniz]

S u m m a f r a c t i o n u m q u a r u m [n o m i n a t o r e s]
 s u n t q u a d r a t i o r d i n e . I d q u e p e r a p p r o p i n q u a t i o n e m ,
 m e t h o d o i u v e n i s G a l l i .

15

Inventum iuvenis per-ingenuosi, natione Galli, qui mihi communicavit coram, et quem ab eo tempore non vidi.

[Fremde Hand]

C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
A	1	.	1	.	1	.	1	.	1	.
	1		9		25		49		81	
B	.	1	.	1	.	1	.	1	.	1
		4		16		36		64		100

20

13 (1) Series (2) S u m m a L 13 n u m e r a t o r e s L ändert Hrsg.

15 i u v e n i s G a l l i : Nach einer Vermutung von J. E. HOFMANN, *Leibniz in Paris*, 1974, S. 177 f. handelt es sich bei dem Unbekannten um dieselbe Person, deren Identität Leibniz 1695 im Briefwechsel mit G.-F.-A. de L'Hospital und 1697 mit Johann Bernoulli zu ermitteln versuchte (s. *LMG* II S. 276 f. u. 280 sowie *LMG* III S. 362 f.).

$$\begin{array}{lll}
 B \sqcap \frac{1}{4} C. & A - \frac{1}{1} \sqcap B. & \text{Rursus } A - \frac{1}{1} \sqcap B - \frac{1}{4}. \\
 \text{Ergo } A \sqcap \frac{3}{4} C. & \text{Ergo } \frac{3}{4} C - \frac{1}{1} \sqcap \frac{1}{4} C. & \text{Ergo } \frac{3}{4} C - \frac{1}{1} \sqcap \frac{1}{4} C - \frac{1}{4}. \\
 & \text{Ergo } \frac{1}{2} C \sqcap \frac{1}{1}. & \text{Ergo } \frac{1}{2} C \sqcap \frac{1}{1} - \frac{1}{4}. \\
 \\
 \frac{2}{4} C \sqcap \frac{1}{1} - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \frac{1}{25} \left[-\frac{1}{36} + \frac{1}{49} \right]
 \end{array}$$

5 [Leibniz]

$$\frac{6}{8} C \sqcap \frac{1}{1} - \frac{1}{8} + \frac{1}{27} - \frac{1}{64} \text{ etc.}$$

4 Leibniz, quer zur Schreibrichtung, der letzte Bruch von fremder Hand:

La somme de la progression des fractions des puissances tombe entre: $\frac{820}{1000}$ et $\frac{821}{1000}$.

4 $-\frac{1}{49} X$ ändert Hrsg.

6 $\frac{6}{8} C : C$ steht hier für die Summe der reziproken Kubikzahlen, nicht wie zuvor für die Summe der reziproken Quadratzahlen. 8 La somme: Es handelt sich um eine nicht ganz korrekte Näherung für den Wert der alternierenden Reihe der reziproken Quadratzahlen, der zwischen 0,822 und 0,823 liegt.

71. LOGARITHMI COMPARATI CUM PROGRESSIONIS HARMONICAE
SUMMA

[Juni 1674 – Anfang Oktober 1676]

Überlieferung: L Konzept: LH 35 V 14 Bl. 16. 1 Zettel ca 18 x 6 cm. Oberkante geschwungen mit Spuren fremden Textes. 1 S. auf Bl. 16 r°. Bl. 16 v° leer. Überschrift ergänzt.
Cc 2, Nr. 1140

5

Datierungsgründe: Die schwer zu datierende Aufzeichnung dürfte während des Parisaufenthalts geschrieben sein; die Verwendung des Waagebalkens als Gleichheitszeichen deutet auf eine Entstehung nicht vor Juni 1674 hin.

Logarithmi comparati cum progress. harm. summ.

10

$$\frac{1}{1+z} \sqcap 1 - z + z^2 - z^3 + z^4 \text{ etc.}$$

Quemadmodum $\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ etc. reciprocorum hyperbolae summae logarithmis proportionales; ita reciprocorum hyperbolae cubicae summae altiori cuidam proportionales; nempe $\frac{1}{1}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{10}, \frac{1}{15}$, (: sive $\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{16}$, nam haec in lineis coincidunt :) ex $\frac{1}{1}, \frac{1}{-1+4}, \frac{1}{+1-4+9}, \frac{1}{-1+4-9+16}, \frac{1}{+1-4+9-16+25}$ etc. Quae ut in unum addas, et ad unum reducas nomen seriem eiusmodi infinitam non est difficile in lineis, quia quadratura hyperbolae cubicae habetur, videndum quae sit eius analogia ad logarithmos seu summam hyperbolae quadraticae.

15

18 Darunter: Error

11 (1) $\frac{1}{y^2 -}$ (2) $\frac{1}{a^2 + y^2 + 2ya}$ (3) $\frac{1}{1 + \underbrace{y^2 - 2y}_{}}$ (4) $\frac{1}{1 + z^2}$ (5) $\frac{1}{1 + z}$ L 12 Quemadmodum

(1) $\frac{1}{y^2}$ reciproca (2) $\frac{1}{2}$ (3) $\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ etc. (a) reciproca | hyperbolae streicht Hrsg. | (b) reciprocorum L
17 videndum | tantum gestr. | quae L

12 f. summae logarithmis proportionales: Leibniz vermengt in unzulässiger Weise Reihensummierung und Kurvenquadratur. Er erkennt schließlich die Fragwürdigkeit seiner Argumentation, schwächt die Schlußbemerkung ab, indem er in Z. 17 tantum streicht, und markiert den Text mit Error.

72. DE SERIERUM DIVISIONE ET SUMMATIONE

[Mitte Oktober – November 1676?]

Überlieferung: L Konzept: LH 35 XIII 3 Bl. 265. 1 Bl. 2°. 1 1/2 S.
Cc 2, Nr. 1542

5 Datierungsgründe: Das vorliegende Stück ist auf Pariser Papier unsicherer Datierung geschrieben. Die Verwendung der Symbolik von Differential- und Integralrechnung zeigt, daß N. 72 nicht vor November 1675 entstanden ist. Der Gebrauch von = als Gleichheitszeichen spricht hier eher für einen Zeitpunkt nach der Abreise aus Paris. Bei seinem Londonaufenthalt in der zweiten Oktoberhälfte 1676 hat sich Leibniz z. B. mit der Division von Reihen bei Newton auseinandergesetzt (vgl. *LSB* III, 1 N. 98 S. 666 u. 10 675).

[Teil 1]

[Der Text beginnt mit dem Divisionsschema S. 831]

$$\begin{array}{ccccccccc}
 1) & 11a + 12a^2 + 13a^3 + 14a^4 + 15a^5 + 16a^6 + 17a^7 + 18a^8 + 19a^9 + 20a^{10} & 21a^{11} & 22a^{12} \\
 a^2 & 11a^3 + 12a^4 + 13a^5 + 14a^6 + 15a^7 + 16a^8 + 17a^9 + 18a^{10} & 19 & 20 \\
 15 & a^3 & 11a^4 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 \\
 & & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 \\
 & & & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 \\
 & & & & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\
 & & & & & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\
 & & & & & & 11 & 12 & & \\
 & & & & & & & & 11 & 12 \\
 20 & & 11 = 1 & 12 = 0 & 13 + 11 = 0 & 14 + 12 + 11 = 1 & 15 + 13 + 12 = 1 \\
 & & 16 + 14 + 13 + 11 = 0 & 17 + 15 + 14 + 12 + 11 = 0 & 18 + 16 + 15 + 13 + 12 + 11 = 0 \\
 & & 19 + 17 + 16 + 14 + 13 + 12 = 1 & 20 + 18 + 17 + 15 + 14 + 13 = 1 \\
 & & 21 + 19 + 18 + 16 + 15 + 14 = 1 \\
 & & 11 = 1 & 12 = 0 & 13 = -1 & 14 = 0 & 15 = 2 & 16 = 0 & 17 = -3 \\
 25 & & 18 = -2 & 19 = 5 & 20 = 5 & 21 = -4
 \end{array}$$

13 Die Zahlen 11–22 stehen für die Koeffizienten der Potenzen von a ; vgl. KNOBLOCH, *Übersicht*, S. 29–39. 16–19 Die Zeilen müßten im Schema um eine Spalte weiter rechts stehen. Der Fehler beeinträchtigt den folgenden Koeffizientenvergleich ab Z. 21.

divisor	dividendus	quotiens	$a - a^3 + 2a^5$	
1				
	a			
a^2				
a^3		$-a^3$		5
a^4				
a^5	$+a^5$	$+ a^5$		
a^6		$+ a^6$	$+ a^6$	
a^7	$-a^7$	$- a^7$	$-3a^7$	
a^8	$-a^8$	$- a^8$	$-3a^8$	10
a^9		$+ a^9$	$+ a^9$	
a^{10}	$+a^{10}$	$+ 2a^{10}$	$+2a^{10}$	
a^{11}	$+a^{11}$	$+ 2a^{11}$		
a^{12}			$-2a^{12}$	
a^{13}	$-a^{13}$	$- a^{13}$	$-3a^{13}$	15
a^{14}	$-a^{14}$	$- a^{14}$	$- a^{14}$	
a^{15}	$-a^{15}$			
a^{16}		$+ a^{16}$	$+ a^{16}$	
a^{17}	$+a^{17}$	$+2a^{17}$		
a^{18}	$+a^{18}$	$+2a^{18}$		20
a^{19}	$+a^{19}$	$+ a^{19}$	$- a^{19}$	
a^{20}				
a^{21}	$-a^{21}$	$- a^{21}$	$[bricht ab]$	
a^{22}	$-a^{22}$	$- a^{22}$		
a^{23}	$-a^{23}$			25
a^{24}	$-a^{24}$			
a^{25}		$+ a^{25}$		
a^{26}	$+a^{26}$	$+2a^{26}$		
a^{27}	$+a^{27}$	$+2a^{27}$		
a^{28}	$+a^{28}$	$+ a^{28}$		30
a^{29}	$+a^{29}$	$+ a^{29}$		
divisor	dividendus 1 ^{mus}	dividendus 2 ^{dus}	dividendus 3 ^{tius}	

1–32 In der Vorlage sind die Spalten als Zeilen angeordnet.

[Teil 2]

$$\begin{aligned}
 y &= a^0 + a^1 + a^3 + a^6 + a^{10} \text{ etc.} \\
 ad\bar{y} &= 0 + 1 a^1 + 3 a^3 + 6 a^6 + 10 a^{10} \text{ etc.} \\
 a^2 ddy &= 1 a^1 + 9 a^3 + 36 a^6 + 100 a^{10} \text{ etc.} \\
 5 \quad \frac{1}{a} \int yda &= \frac{a^1}{1} + \frac{1}{3} a^3 + \frac{1}{6} a^6 + \frac{1}{10} a^{10} \text{ etc.} \\
 \frac{1}{aa} \int \overline{\int yda da} &= \frac{a^1}{1} + \frac{1}{9} a^3 + \frac{1}{36} a^6 + \frac{1}{100} a^{10} \text{ etc.} \\
 y &= a^0 + a^1 + a^2 + a^3 + a^4 + a^5 \\
 \int yda &= \frac{a^1}{1} + \frac{a^2}{2} + \frac{a^3}{3} + \frac{a^4}{4} + \frac{a^5}{5} \\
 \int \overline{\int yda da} \frac{1}{a} &= \frac{a^1}{1} + \frac{a^2}{4} + \frac{a^3}{9} + \frac{a^4}{16} \text{ etc.}
 \end{aligned}$$

10 Hinc cum $a = 1$. prodit $\frac{1}{1} + \frac{1}{4} + \frac{1}{9}$ etc. Itaque in lineis haberi credo potest huius seriei summa, sed supposita hyperbolae \square tura. Methodus autem haec probe notanda est.

4 $a^2 ddy$: Die Bezeichnungsweise ist irreführend: Leibniz berechnet $ad(ady)$, anschließend die Integrale $\int \frac{y}{a} da$ und $\int \frac{1}{a} \left(\int \frac{y}{a} da \right) da$; bei letzteren fehlen im Ergebnis die ersten Terme der Reihen. In Z. 9 verwendet Leibniz die korrekte Bezeichnungsweise.

[Teil 3]

$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5$ etc. Rursus si $1 + a^l + a^m + a^n$ etc. = x . patet fore $\int \bar{x} = \frac{1}{2}x^2$. Ergo fiet: $\frac{1}{2}x^2 = \frac{1}{l}x^{l+1} + \frac{1}{m}x^{m+1}$ etc. seu $x^2 = \frac{2}{l+1}x^{l+1} + \frac{2}{m}x^{m+1}$. Similiter $x^3 = 3 \int x^2$. Ergo $x^3 = \frac{2.3}{l.l+1}x^{l+2} + \frac{2.3}{m.m+1}x^{m+2}$ etc.

Ergo fiet $1 - x + x^2 - x^3$ etc. = 1

$$\begin{aligned} & -\frac{2}{l+1}x^{l+1} & -\frac{2}{m+1}x^{m+1} & \text{etc.} \\ & +\frac{2.3}{l+1.l+2}x^{l+2} & +\frac{2.3}{m+1.m+2}x^{m+2} & \text{etc.} \\ & -\frac{2.3.4}{l+1.l+2.l+3}x^{l+3} & -\frac{2.3.4}{m+1.m+2.m+3}x^{m+3} \end{aligned}$$

Ergo si $x = 1 + a^4 + a^9 + a^{16}$ erit

$$\begin{aligned} 1 - y = \frac{1}{1+x} = 1 - \frac{2}{1}a + \frac{2.3}{1.2}a^2 - \frac{2.3.4}{1.2.3}a^3 + \frac{2.3.4.5}{1.2.3.4}a^4 - \frac{2.3.4.5.6}{1.2.3.4.5}a^5 + \frac{2.3.4.5.6.7}{1.2.3.4.5.6}a^6 \text{ etc.} \\ + \frac{2}{5}a^5 + \frac{2.3}{5.6}a^6 + \frac{2.3.4}{5.6.7}a^7 \end{aligned}$$

$$a^2y = a^2 - \frac{2}{1}a^3 + \frac{2.3}{1.2}a^4 \text{ etc.}$$

$$a^6y = a^6 - \frac{2}{1}a^7 \text{ etc.}$$

$$\text{Quae tandem faciunt: } \frac{1 + a^2 + a^6 + a^{12} + a^{20}}{1 + a^4 + a^9 + a^{16} \text{ etc.}}$$

$$\begin{aligned} 2 \quad (1) \quad \frac{1}{1+a^4+a^9+a^{16}} &= 1 - |1 + \text{gestr.}| a^4 + a^9 + a^{16} \quad (2) \quad \frac{1}{1+x} L \quad 3 \quad \frac{1}{2}x^2 = |\frac{1}{1}x + \text{gestr.}| \frac{1}{1} \\ x^{1+1} L \quad 3 \text{ seu } x^2 &= |\frac{2}{1}x + \text{gestr.}| \frac{2}{1+1}x^{1+1} L \quad 4 \text{ Ergo } x^3 = |\frac{2.3}{1.2}x + \text{gestr.}| \frac{2.3}{1.1+1}x^{1+1} L \end{aligned}$$

$$10 \quad 1 - y = \text{erg. } L \quad 13 \quad a^6y \dots \text{ etc. erg. } L$$

2–13 Leibniz dividiert die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a^{n(n+1)}$ durch $\sum_{n=0}^{\infty} a^{n^2}$, indem er zuerst den ersten Term des

Zählers dividiert und dann das Ergebnis für die folgenden Terme verwendet. Dabei unterläuft ihm eine Reihe von Fehlern und Versehenen, die er nur punktuell korrigiert.

73. EXPRESSIO SERIEI PER NUMERUM PRIMUM ET ULTIMUM

[Oktober – Dezember 1676]

Überlieferung: L Konzept: LH 35 XII 2 Bl. 150. 1 Bl. 2°. Ca 1/2 S. auf Bl. 150 r° oben u. eine isolierte Zeile auf dem gegenläufig beschriebenen Bl. 150 v°. Überschrift ergänzt.

Auf dem Rest von Bl. 150 r° Cc 2, Nr. 1516 (Druck in Reihe VIII), von Bl. 150 v° Cc 2, Nr. 1515 B (Druck im Nachtrag zur Algebra in einem späteren Band der Reihe VII). Cc 2, Nr. 1515 A

Datierungsgründe: Das Wasserzeichen des Papiers ist bisher für die Monate März bis August 1676 belegt. Dem Duktus nach ist die folgende Aufzeichnung Cc 2, Nr. 1516 direkt im Anschluß an das vorliegende Stück geschrieben. In dieser Aufzeichnung bezieht sich Leibniz auf J. B. TAVERNIER, *Les six voyages*, 2 Bde, Paris, 1676 („achevé d'imprimer“ 1. Oktober 1676). Wie aus seinem Brief an Ferdinand von Fürstenberg vom Dezember 1676 hervorgeht (*LSB I*, 2 N. 209 S. 239), hat Leibniz das Erscheinen des Werkes noch vor seiner Abreise aus Paris (4. Oktober 1676) registriert.

Expressio seriei per numerum primum et ultimum et
ita inventio summae facilis dum omnes per eandem quantitatem
constantem exprimuntur

Variis modis series exprimi possunt utiliter: ex caeteris unus est in quo omnes ope termini primi et ultimi, ubi semper variat expressio pro alio atque alio simul sumtorum numero. Talis autem expressio semper ex proprietate essentiali derivari potest, ut in
arithmetica: a. b. c. et $c - b$ aequ. $b - a$. $\frac{c+a}{2} \sqcap b$.

$$d \quad a \quad b \quad c \quad e. \quad a \sqcap \frac{d+b}{2}. \quad c \sqcap \frac{b+e}{2}. \quad a+c \sqcap \frac{d+2b+e}{2}. \quad \frac{2b}{2} \sqcap \frac{d+2b+e}{42}. \text{ et}$$

$$b \sqcap \frac{d+e}{2}. \text{ et } 2b \sqcap d+e. \text{ et } a+c \sqcap \frac{d+d+e+e}{2} \sqcap d+e.$$

$$\text{Ergo } a \sqcap \frac{d}{2} \left(+ \frac{b}{2} \right) + \frac{d+e}{4}. \text{ et } a \sqcap \frac{3d+1e}{4}. \quad c \sqcap \frac{1d+3e}{4}$$

$$\begin{array}{ccc} a & b & c \\ \frac{2a}{2} & \frac{a+c}{2} & \frac{2c}{2} \end{array} \left. \right\} \sqcap \frac{3a+3c}{2}$$

$$20 \quad a. \quad b. \quad c. \quad (1) \quad \text{et } b \sqcap \frac{a+c}{2}. \quad \text{Iam } a. \quad b. \quad c. \quad d. \quad \text{et } c \text{ aequ. } \frac{b+d}{2}. \quad \text{Ergo } (2) \text{ et } L$$

$$\left. \begin{array}{ccccc} d & a & b & c & e \\ \frac{4d}{4} & \frac{3d+1e}{4} & \frac{2d+2e}{4} & \frac{1d+3e}{4} & \frac{4e}{4} \end{array} \right\} \sqcap \frac{\overbrace{4+3+2+1}^d, + \overbrace{1+2+3+4}^e}{4}$$

Ergo quaesita summa progressionis arithmeticæ redit iterum ad summam progressionis arithmeticæ, et quidem simplicissimæ, nempe summam progressionis arithmeticæ 1. 2. 3. 4. 5. ab unitate incipientis et per unitates ascendentis. Haec vero ad inventionem sui supponit se ipsam, id est habetur aequatio.

Naturalis admodum haec est inquisitio, quaerimus enim modum quo summa omnium ex dato primo et ultimo, (vel primo posito 0 ex ultimo) haberi possit. Quare singuli ex ultimo explicabuntur, ut summa ex eo possit explicari.

5

10

[Isolierte Zeilen]

[Am oberen Rand] 1 $\frac{a}{a + \sqrt{ab + \sqrt[3]{a^2c - \sqrt{}}}}$

[Auf der Rückseite, gegenläufig] $\frac{1}{b+c} \sqcap \frac{1}{b} - \frac{c}{b^2} + \frac{c^2}{b^3} - \frac{c^3}{b^4} + \frac{c^4}{b^5} - \frac{1}{150+1}$

2–4 Nebenrechnung zur Streichung, nicht gestrichen:

$$a+c \sqcap \frac{f+g}{2} \quad a \sqcap \frac{3d+1e}{2} \quad \frac{a}{2} \sqcap d + \frac{f}{2} + \frac{g}{2}$$

$$2-4 \frac{\overbrace{4+3+2+1}^d, + \overbrace{1+2+3+4}^e}{4} \mid f \ d \ a \quad b \quad c \ e \ g \ gestr. \mid \text{Ergo } L \quad 5 \text{ arithmeticæ, (1)}$$

$$\frac{f+g}{2}$$

unde (2) et quidem omnis alia (3) et L 7f. aequatio. (1) Nam ponendo (2) Naturalis L 12 1

$$\mid a+b+c+gestr. \mid \frac{a}{a + \sqrt{ab + \sqrt[3]{a^2c - \sqrt{}}}} L$$

15 $a+c \sqcap \frac{f+g}{2}$: Richtig wäre $a+c \sqcap f+g$. Der Fehler beeinträchtigt die restlichen Rechnungen.

V E R Z E I C H N I S S E

PERSONENVERZEICHNIS

Verfasser bzw. Mitverfasser von hier abgedruckten Stücken werden mit der betreffenden Stücknummer genannt, ebenso Personen, auf die sich ein ganzes Stück bezieht. Diese Nummerneintragungen sind zur Unterscheidung von den Seitenangaben mit einem Stern versehen. Im übrigen wird nach Seiten zitiert. Bei Autoren ist zusätzlich das Schriftenverzeichnis heranzuziehen. Variierende Namensformen werden nur genannt, wenn sie stärker voneinander abweichen. Kursivdruck weist auf den Petitteil hin.

- | | |
|---|---|
| <p>A pollo n ius v. Perga 3./2. Jh. v. Chr.: S. 126.
 A r c h i m e d e s † 212 v. Chr.: S. 105. 126. 228.
 246. 559.
 A r n a u l d , Antoine † 1694: S. 44.
 B a r o z z i (Barocius), Francesco † 1604: S. 97.
 B e a u l i e u , Augustin de † 1637: S. 253.
 B e r n o u l l i , Johann † 1748: S. 827.
 B l a n c h a r d (Freund von Rochas) 17. Jh.:
 S. 347.
 B o n d , Henry † 1678: S. 252.
 B r e s s i e u (Bressius), Maurice † 1617: S. 600.
 B r o u n c k e r , William, Viscount † 1684: S. 458.
 C a r d a n o (Cardanus), Girolamo † 1576: S. 523.
 C e u l e n s . L u d o l p h van Ceulen
 C o l l i n s , John † 1683: S. 249. 252.
 D e s c a r t e s (Cartesius), René † 1650:
 Ansichten zu in der Geometrie zulässigen Kurven: S. 484. 485–486. 492.
 <i>constructio aequationum</i>: S. 483. 484. 504.
 Fadenkonstruktion der Ellipse: S. 488.
 Tangentenmethode: S. 424. 427. 573.
 — Cartesianer: S. 486. 488.
 D i o p h a n t 3. Jh.: S. 600. 771. 820.
 E u k l i d 3. Jh. v. Chr.: S. 103. 126.
 F a b r i , Honoré S. J. † 1688: S. 225. 228.
 F e r m a t , Pierre de † 1665: S. 25.
 F r é n i c l e de Bessy, Bernard † 1675: S. 25.
 F ü r s t e n b e r g , Ferdinand v., Bischof von Paderborn † 1683: S. 834.
 G a l i l e i , Galileo † 1642: S. 25. 70. 228. 246
 bis 247.</p> | <p>G i r a r d , Albert † 1632: S. 524.
 G o s s e l i n , Guillaume † um 1590: N. 41*.
 S. 649.
 G r e g o r i u s a s. Vincentio s. Saint-Vincent.
 G r e g o r y (Gregorius), James † 1675:
 Inverse Tangentenmethode: S. 696.
 Kontroverse mit Huygens: S. 759. 799.
 Konvergente Doppelfolgen: S. 65. 249. 558. 697.
 789. 798. 799–800.
 Kreisapproximation: S. 105.
 Logarithmuskurve: S. 492.
 Schwerpunkt der Parabel: S. 495.
 G u e r i c k e , Otto v. † 1686: S. 346.
 H e u r a e t , Hendrik van † 1660: S. 194–196. 487.
 488. 559.
 H i p p o k r a t e s v. Chios 5. Jh. v. Chr.: S. 228.
 250.
 H o b b e s , Thomas † 1679: S. 253.
 H u d d e , Jan † 1704: S. 207.
 H u y g e n s (Hugenius), Christiaan † 1695:
 S. 193.
 Kontroverse mit J. Gregory: S. 759. 799.
 Kreismessung: S. 105. 225.
 Summe der reziproken Dreieckszahlen: S. 3. 365.
 431. 712.
 Zykloide: S. 486. 558.
 i u v e n i s Gallus 17. Jh.: N. 70*.
 K e p l e r , Johannes † 1630: S. 524.
 L e T e l l i e r (Steuermann von A. de Beaulieu)
 17. Jh.: S. 253.
 L ' H o s p i t a l , Guillaume-François-Antoine de
 † 1704: S. 827.</p> |
|---|---|

- L u d o l p h van Ceulen † 1610: S. 105. 726.
- M a i n z , Kurf. Lothar Friedrich v. Metternich † 1675: S. 271.
- M e n g o l i , Pietro † 1686: N. 57*.
- M e r c a t o r , Nicolaus † 1687:
Hyperbelquadratur: S. 207.
infinitesimale Teilung: S. 128.
Logarithmus: S. 703.
Reihenentwicklung durch fortgesetzte Division:
S. 107. 111. 124. 127. 386. 403. 723.
- M i c h e l e t de La Chevallerye, Jacobus 17. Jh.:
S. 598.
- M o n c o n y s , Balthazar de † 1665: S. 253.
- M y d o r g e , Claude † 1647: S. 249.
- N e w t o n , Sir Isaac † 1727: S. 830.
- O l d e n b u r g , Heinrich † 1677: S. 139. 249.
251. 252.
- O z a n a m , Jacques † 1717: S. 127.
- P a p p u s 4. Jh.: S. 126.
- P a r d i e s , Ignace Gaston S.J. † 1673: S. 76.
302. 484. 492.
- P a s c a l , Blaise † 1662:
arithmetisches Dreieck: N. 532*. S. 25. 30–31.
43. 44. 320. 323. 324. 332. 363.
- P e l l , John † 1685: Tangenssatz: S. 342. 588.
- R e n a l d i n i , Carlo † 1698: S. 492.
- R i c c i , Michelangelo † 1682: N. 65*.
- R o c h a s (Freund von Blanchard) 17. Jh.: S. 347.
Vater: S. 347.
- R ø m e r , Ole Christensen † 1710: S. 486.
- R o u c y de Sainte-Preuve, Charles-Emmanuel de
† 1722: S. 44.
- S a i n t - V i n c e n t , Grégoire de S. J. † 1667:
- Hyperbelquadratur: S. 251. 505. 558. 559.
reguläre Polygone: S. 757.
Summe der geometrischen Reihe: S. 72.
- V e r h ä l t n i s l e h r e : N. 7*. S. 30. 49. 61.
- S a r a s a , Alphonse Antoine de S. J. † 1667:
S. 251.
- S c h o o t e n (Schotenius), Frans van d. J. † 1660:
S. 342. 486. 588. 697.
- S l u s e (Slusius), René François Walter de † 1685:
N. 65*. S. 391.
Satz über Extrema: S. 803–804.
Tangentenmethode: S. 415. 416. 419. 822.
- S n e l l (Snellius) van Royen, Willebrord † 1625:
S. 105. 726.
- S t e v i n , Simon † 1620: S. 524.
- T a v e r n i e r d ’ A u b o n n e , Jean Baptiste † 1689:
S. 834.
- T h é v e n o t , Melchisédech, † 1692: S. 253.
- T s c h i r n h a u s , Ehrenfried Walter v. † 1708:
N. 49*. 55*. 67*. 681*. S. 755.
- V i è t e (Vieta), François † 1603: S. 486. 510.
- W a l l i s , John † 1703: S. 306. 307.
Arithmetik des Unendlichen: S. 102.
Chiffrier- und Dechiffrierkunst: S. 253.
Induktion: S. 183. 751.
Interpolation: S. 558.
Kontroverse zwischen J. Gregory und Huygens:
S. 759.
Quadratrix: S. 492.
Reihenentwicklung durch fortgesetzte Division:
S. 107. 124. 127.
Schwerpunkt der Parabel: S. 495.
Wallissches Produkt: N. 69*. S. 792.
- W e i g e l , Erhard † 1699: S. 676.

SCHRIFTENVERZEICHNIS

Das Schriftenverzeichnis (SV.) enthält die im Text und in den Apparaten angeführte Literatur; es ist zweigeteilt. Autoren, die Leibniz grundsätzlich zugänglich waren, sind einschließlich ihrer modernen Ausgaben im ersten Teil verzeichnet. Neuere Literatur erscheint im zweiten Teil. Unter LEIBNIZ wird neben seinen eigenen Schriften zusätzlich die für diesen Band relevante Leibniz-Korrespondenz erfaßt. Noch nicht edierte Leibniz-Stücke sind im Handschriftenverzeichnis Teil 3 zu finden. — Jeder Autor und Sachtitel erhält eine Leitnummer, die Reihenfolge der Einzelwerke ist chronologisch. Verzeichnet wird nach Nummern und Seiten, wobei erstere zur Unterscheidung zusätzlich mit einem Stern ausgezeichnet sind. Nummernangaben erfolgen dann, wenn ein ganzes Stück einen bestimmten Titel zuzuordnen ist. Werke mit eigenhändigen Eintragungen von Leibniz sind mit dem Zusatz [Marg.] versehen. Für die Erwähnung von Autorennamen ist auch das Personenverzeichnis mitheranzuziehen. Kursiv gedruckte Seitenangaben weisen auf den Petitteil hin.

SCHRIFTEN DER LEIBNIZZEIT

1. APOLLONIUS v. Perga, *Conica*: S. 126.
2. ARCHIMEDES
1. *De sphaera et cylindro I*: S. 228.
2. *De lineis spiralibus*: S. 246. 246. 559.
3. *Dimensio circuli*: S. 105. 105.
4. *Opera*: S. 126. 126.
3. BAROZZI, Fr., *Admirandum illud geometri-
cum problema tredecim modis demonstratum,
quod docet duas lineas in eodem plano de-
signare, quae nunquam invicem coincidunt,
etiam si in infinitum protrahantur*. Venedig
1586; Nachdr.: Bologna 1993: S. 97.
4. BEAULIEU, A. de, *Mémoires du voyage aux In-
des orientales*. In: *Relations de divers voyages
curieux, qui n'ont point été publiées; ou qui
n'ont été traduites ...* Hrsg. M. Thévenot.
4 Tle. Paris 1663–1672 [Marg.], Tl II 1666:
S. 253.
5. BOND, H., *The variations of the magnetick
needle predicted for many yeares following*.
In: *Philosophical Transactions*, vol. III, 1668,
S. 789 f.: S. 252.
6. BROUNCKER, W., *The squaring of the hy-
perbola, by an infinite series of rational
numbers, together with its demonstration*.
In: *Philosophical Transactions*, vol. 3, 1668,
S. 645–649: S. 458. 458.
7. CICERO, *De officiis*: S. 87.
- CLERSELIER, Cl. de [Hrsg.] s. SV. N. 8,5.
- DEPREZ, G. [Hrsg.] s. SV. N. 31.
8. DESCARTES, R.
 1. *Discours de la Methode ... Plus La Di-
optrique. Les Métaores. Et La Géométrie.
Qui sont des essais de cette Methode*. Leiden
1637 [auch in DO VI S. 1–515.]; Nachdr.
Osnabrück 1973. [Darin: SV. N. 8,2. 8,3.]
 2. *La Dioptrique*. In SV. N. 8,1 S. 1–153
(2. Zählung) [auch in DO VI S. 79–228];
lat. Fassung u. d. T. *Dioptrice* in SV. N. 8,4
S. 71–206 [auch in DO VI S. 584–650]: S. 488.
 3. *La Géométrie*. In SV. N. 8,1 S. 297–413
(2. Zählung) u. ö. [auch in DO VI S. 367–485];
lat. Fassung u. d. T. *Geometria* hrsg. v. Fr.
v. Schooten in SV. N. 13,1 S. 1–118.; 2. Ausg.
in SV. N. 13,2 Tl I S. 1–106 [Marg.]: S. 424.
427. 483. 484–486. 492. 504. 573.
 4. *Specimina philosophiae*. Amsterdam, 1644
u. ö. [Darin: SV. N. 8,2.]

5. *Lettres*. [Hrsg. Cl. de Clerselier]. 3 Bde. Paris 1657–67; lat. Fassung u. d. T. *Epistolae*. Amsterdam 1668–82: S. 485.
9. DIOPHANT, *De multangulis numeris*: S. 600.
10. EUKLID, *Elemente*: S. 103. 103. 126. 126.
- EYCKE, S. van der [Hrsg.] s. SV. N. 24.
11. FABRI, H., *Synopsis geometrica cui accessere tria opuscula, nimirum; De linea sinuum et cycloide; De maximis et minimis, centuria; et Synopsis trigonometriae planae*. Lyon 1669 [Marg.]: S. 225. 228.
12. GALILEI, G., *Discorsi e dimostrazioni matematiche*. Leiden 1638; Nachdr. Brüssel 1966; [auch in *Opere*, 2 Bde. Bologna 1656 u. in *GO VIII* S. 39–318 u. *GO I* S. 187–208]: S. 25. 69. 228. 246–247. 246–247.
13. *Geometria*
1. *Geometria*, a Renato Des Cartes anno 1637 gallice edita; nunc autem cum notis Florimondi de Beaune ... in linguam latinam versa et commentariis illustrata, opera atque studio Francisci a Schooten. Leiden 1649. [Darin: DESCARTES, R., SV. N. 8,3; DEBEAUNE, Fl., *In geometriam Renati des Cartes notae breves*, S. 119–161; SCHOOTEN, Fr. v., SV. N. 38,1; ders., *Additamentum*. S. 295 bis 336.]
 2. *Geometria*, a Renato Des Cartes anno 1637 gallice edita, postea autem una cum notis Florimondi de Beaune ... in latinam linguam versa et commentariis illustrata opera atque studio Francisci a Schooten ... Nunc denum ab eodem diligenter recognita, locupletioribus commentariis instructa, multisque egregiis accessionibus ... exornata. 2 Tle. Amsterdam 1659–61 [Marg.]. [In Tl I: DESCARTES, R., SV. N. 8,3; DEBEAUNE, Fl., *In geometriam Renati des Cartes notae breves*; SCHOOTEN, Fr. v., SV. N. 38,1; ders., *Appendix de cubicarum aequationum resolutione*. 2. Aufl.; ders., *Additamentum*; HUDDE, J., SV. N. 19; HEURAET, H. v., SV. N. 17. In Tl II: Schooten, Fr. v., *Principia matheseos universalis, seu introductio ad geometriae methodum Renati des Cartes*. Hrsg. E. Bartholinus. 2. Aufl.; ders., SV. N. 38,2; DEBEAUNE, Fl., *De aequationum natura, constitutione et limitibus, opuscula duo*. Hrsg. E. Bartholinus, S. 49–152; WITT, J. de, *Elementa curvarum linearum*. Hrsg. Fr.v. Schooten.]
- GIRARD, A. [Hrsg.] s. SV. N. 40.
14. GOSELIN, G., *De arte magna, seu de occulta parte numerorum, quae et algebra, et almucabala vulgo dicitur, libri quatuor*. Paris 1577 [Marg.]: N. 41*. S. 649.
15. GREGORY, J.
1. *Vera circuli et hyperbolae quadratura*. Padua 1667; Nachdr. ebd. 1668 [Marg.]: S. 65. 105. 249. 495. 558. 696. 697. 758. 763. 765. 789. 800.
 - Rez.: *Philosophical Transactions* vol. 3, 1668/69, S. 640–644: S. 759. — *Journal des Scavans*, 2. Juli 1668, S. 353–368 [Auszug (Stellungnahme von Huygens) in *HO VI* Nr. 1647 S. 228–230]: S. 759.
 2. *Geometriae pars universalis*. Padua 1668 [Marg.]: S. 105. 492.
 - Rez.: *Philosophical Transactions* vol. 3, 1668/69, S. 685–688: S. 492.
 3. *Answer to the animadversions of Mr. Hugens*. In: *Philosophical Transactions* vol. 3, 1668/69, S. 732–735; [auch in *HO VI* Nr. 1653 S. 240–243]: S. 759. 799.
 4. *Exercitationes geometricae*. London 1668 [Marg.]: S. 697. 759.
 5. *An extract of a letter ... to the Publisher, containing some considerations ... upon M. Hugens his letter*. In: *Philosophical Transactions* vol. 3, 1668/69, S. 882–886; [auch in *HO VI* Nr. 1682 S. 306–311]: S. 759.
16. GUERICKE, O. v., *Experimenta nova (ut vocantur) Magdeburgica de vacuo spatio*. Amsterdam 1672; Nachdr. Aalen 1962: S. 346.
17. HEURAET, H. v., *Epistola de transmutatione curvarum linearum in rectas*. In SV. N. 13,2 Tl I S. 517–520 [Marg.]: S. 193. 487. 559.

18. HOBBES, T.
1. *Examinatio et emendatio mathematicae hodiernae*. London 1660 [auch in SV. N. 18,3 pars II u. in *HOL* IV S. 1–232]: S. 253.
 2. *Dialogus physicus, sive de natura aeris*. London 1661 [auch in SV. N. 18,3 pars VI und in *HOL* IV S. 233–296]: S. 253.
 3. *Opera philosophica*. Amsterdam 1668: S. 253.
19. HUDE, J., *Epistolae duae, quarum altera de aequationum reductione, altera de maximis et minimis agit*. In SV. N. 13,2 Tl I S. 401–516 [Marg.]: S. 207. 207.
20. HUYGENS, Chr.
1. *De circuli magnitudine inventa*. Leiden 1654 [auch in *HO* XII S. 113–181]: S. 105. 225.
 2. Vierter Zusatz zu *De ratiociniis in ludo aleae*. 1665. Ms. [Gedr.: *HO* XIV S. 144–150]: S. 3. 431. 712.
 3. Stellungnahme zu James Gregory, *Vera circuli et hyperbolae quadratura* s. SV. N. 15,1.
 4. Brief an Gallois. In: *Journal des Sçavans*, 12. Nov. 1668 S. 437–444 [auch in *HO* VI Nr. 1669 S. 272–276]: S. 759.
 5. *Horologium oscillatorium sive de motu pendulorum ad horologia aptato demonstrationes geometricae*. Paris 1673 [Marg.]; Nachdr. London 1966; [auch in *HO* XVIII S. 69–365 u. XVI S. 315–318]: S. 193. 486. 558
21. *Journal des Sçavans*. Paris (Amsterdam) 1665 ff.:
 - Juli 1668: S. 759.
 - November 1668: S. 759.
 - Juli 1672: S. 30.
 - Dezember 1672: S. 30.
22. KEPLER, J.
1. *Strena seu de nive sexangula*. Frankfurt/Main 1611; [auch in *KW* IV S. 259–280]: S. 524.
 2. *Harmonices mundi libri V*. Linz 1619; [auch in *KW* VI S. 1–377]: S. 524.
23. LEIBNIZ, G. W.
Schriften:
1. *Dissertatio de arte combinatoria*. Leipzig 1666 [auch in *LSB* VI, 1 S. 163–228]: S. 28. 252. 252.
 2. *Propositiones quaedam physicae*. Zweiter Entwurf. Frühjahr – Herbst 1672 (?). Ms. [Gedr.: *LSB* VI, 3 N. 2₂ S. 6–10]: S. 17.
 3. *Aus und zu Galileis Discorsi*. Herbst 1672 bis Winter 1672/73. Ms. [Gedr.: *LSB* VI, 3 N. 11 S. 163–168]: S. 25. 69. 228.
 4. *Accessio ad arithmeticam infinitorum*. Ende 1672. Ms. [Gedr. u. a. in: *LSB* III, 1 N. 2 S. 1–20]: S. 30. 52. 61. 69. 72. 76. 111. 141. 150. 369. 431.
 5. *In subsectione polygonorum regularium circulo inscriptorum*. Ende 1672 – Anfang 1673 (?). Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 1 N. 3 S. 5 bis 30]: S. 61. 125.
 6. *Mathematica*. Ende 1672 – Frühjahr 1673. Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 1 N. 106 S. 653–674]: S. 225.
 7. *De figuris similibus*. Frühjahr 1673. Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 1 N. 6₁ S. 60–70]: S. 229.
 8. *Approximatio ad mensuram circularem geometrica*. Frühjahr 1673. Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 1 N. 6₂ S. 70–74]: S. 588.
 9. *De bipartitionibus numerorum eorumque geometricis interpretationibus*. 1. Halbjahr 1673 (?). Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 1 N. 36 S. 217–228]: S. 193. 228. 242. 246.
 10. *De geometria seu potius algebra mechanica*. Frühjahr – Sommer 1673. Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 1 N. 8 S. 104–108]: S. 249.
 11. *De problematis Geometriae Cartesii. De compositione rationum*. Frühjahr bis Sommer (?) 1673. Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 1 N. 110 S. 679–689]: S. 342.
 12. *Tentamen primum pertinens ad problema quod dicitur sex quadratorum*. Juni – August 1674. Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 1 N. 42 S. 246 bis 253]: S. 127.
 13. *Inventa aliquot mea geometrica*. Sommer 1674. Ms. [Gedr.: *LSB* III, 1 N. 29 S. 114–117]:

- S. **251.** **566.**
14. *Schediasma de extractione radicum*. Sept. 1674. Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 1 N. 125 S. 783 bis 804]: S. **783**.
15. *De aequationibus ad circulum inveniendis*. Sept. 1674. Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 1 N. 130 S. 835–846]: S. **370**.
16. *Schediasma de constructione per curvam et lineam rectam*. Okt. 1674. Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 1 N. 138 S. 884–888]: S. **370**.
17. *Arithmetische Kreisquadratur*. Okt. 1674. Ms. [Gedr.: *LSB* III, 1 N. 39 S. 141–169]: S. **314.** **386.** **388.** **632.**
18. *Schediasma de divisionibus aequationum ope diversarum literarum*. Dez. 1674. Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 1 N. 143 S. 906–910]: S. **567**.
19. *Problema Davenantii*. Kurz nach dem 22. April 1675. Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 1 N. 77 S. 535–538]: S. **664**.
20. *Analysis tetragonistica ex centrobarycis*. 25./26. Okt. 1675. Ms. [Gedr. u. a. in: *LBG* S. 147–151]: S. **695**.
21. *Analyseos tetragonisticae pars secunda*. 29. Okt. 1675. Ms. [Gedr. u. a. in: *LBG* S. 151 bis 156]: S. **668**.
22. *Methodi tangentium inversae exempla*. 11. Nov. 1675. Ms. [Gedr. u. a. in: *LBG* S. 161 bis 167]: S. **668.** **676**.
23. *Wallisi series interpolanda pro circulo. Fractionum resolutio dividendo per fractiones*. Dez. 1675. Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 1 N. 851 S. 569–572]: S. **661**.
24. *Data basi, angulo ad basin, rectangulo sub lateribus invenire triangulum. Tentamen tertium*. Ende 1675 (?). Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 1 N. 143 S. 141–146]: S. **360**.
25. *Praefatio opusculi de quadratura circuli arithmeticæ*. ca Ende 1675. Ms. [Gedr.: *LMG* V S. 93–98]: S. **559**.
26. *De quadratura arithmeticæ circuli ellipseos et hyperbolæ cuius corollarium est trigonometria sine tabulis*. Ende 1675 bis Herbst 1676. Ms. [Gedr.: Hrsg. E. Knobloch. Göttingen 1993 = Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Mathematisch-physikalische Klasse. Dritte Folge Nr. 43]: S. **271.** **288.** **318.** **345.** **386.** **388.** **393.** **566.** **572.** **632.** **701.** **726.** **726.** **758.** **802.**
27. *Extensio interminata*. April 1676 (?). Ms. [Gedr. u. a. in: *LSB* VI, 3 N. 66 S. 489 f.]: S. **802**.
28. *De angulo contactus*. April – Juli 1676. [Gedr.: *LSB* VII, 1 N. 32 S. 205]: S. **799**.
29. *Auszüge aus den mathematischen Papieren der Royal Society*. 18.–29. Okt. 1676. Ms. [Gedr. u. a. in: *LSB* III, 1 N. 98 S. 663–681]: S. **830**.
30. *Calculus tangentium differentialis*. Nov. 1676. Ms. [Gedr.: *LBG* S. 229–231 u. SV. N. 48 S. 86–92]: S. **822**.
31. *Historia et origo calculi differentialis*. 1714. Ms. [Gedr.: *LMG* V S. 392–410]: S. **712**.
- B r i e f e :
32. Leibniz für die Royal Society, 13. Feb. 1673. [Gedr. u. a. in: *LSB* III, 1 N. 4 S. 22–29; mit engl. Übers. in *OC* IX S. 438–448]: S. **30.** **50.** **61.** **167.** **245.**
33. Leibniz an Oldenburg, 8. März 1673. [Gedr. u. a. in: *LSB* III, 1 N. 9 S. 38–45; mit engl. Übers. in *OC* IX S. 488–498]: S. **484**.
34. Oldenburg an Leibniz, Sendung vom 20. April 1673; Auszug von Leibniz, Frühjahr 1675. [Gedr. u. a. in: *LSB* III, 1 N. 13 S. 49 bis 79; ohne Auszug mit engl. Übers. in: *OC* IX S. 549–570]: S. **249.** **251.** **252.**
35. Leibniz an Oldenburg, 26. April 1673. [Gedr. u. a. in: *LSB* III, 1 N. 17 S. 83–89; mit engl. Übers. in *OC* IX S. 593–601]: S. **249**.
36. Leibniz an Oldenburg, 24. Mai 1673. [Gedr. u. a. in: *LSB* III, 1 N. 20 S. 92–95; mit engl. Übers. in *OC* IX S. 648–652]: S. **139**.
37. Leibniz an Ferdinand von Fürstenberg, Dez. 1676. [Gedr.: *LSB* I, 2 N. 209 S. 238 bis 240]: S. **834**.
38. Leibniz an Weigel, Sept. 1679. [Gedr.:

- LSB* II, 1 N. 212 S. 485–487 u. III, 2 N. 345 S. 836–840]: S. 676.
39. Leibniz an L'Hospital, April (?) 1695. [Gedr. u. a. in: *LMG* II S. 274–277]: S. 827.
40. L'Hospital an Leibniz, 25. April 1695. [Gedr. u. a. in: *LMG* II S. 277–281]: S. 827.
41. Leibniz an Joh. Bernoulli, 29. Januar 1697. [Gedr. u. a. in: *LMG* III S. 360–364]: S. 827.
24. Ludolph van Ceulen, *Vanden circkel. Daer in gheleert werdt te vinden de naeste proportie des circkels-diameter tegen synen omloop ... Item aller figueren-syden in den circkel beschreven ... Noch de tafelen sinuum, tangentium ende secantium ... Een laetsten van interest ...* Delft 1596; 2. Aufl. Leiden 1615. Hrsg. S. van der Eycce; lat. Fassung u. d. T. *De circulo et adscriptis liber. In quo plurimorum latera ... secundum algebraicarum aequationum leges explicantur.* Leiden 1619. Hrsg. W. Snell: S. 105. 723.
25. Mengoli, P., *Circolo*, Bologna, 1672: N. 57*.
26. Mercator, N., *Logarithmotechnia: sive methodus construendi logarithmos nova, accurata, et facilis ... cui nunc accedit vera quadratura hyperbolae, et inventio summae logarithmorum ... Huic etiam jungitur Michaelis Angeli Ricci Exercitatio geometrica de maximis et minimis ...* London 1668 [Marg.]; Nachdr. Hildesheim 1975: S. 107. 107. 125. 127. 127. 128. 207. 386. 403. 703. 723. Rez. in SV. N. 44,5.
27. Monconys, B. de, *Journal des voyages*. Hrsg. G. de Monconys. P. 1–2. Lyon 1655–1666: S. 253.
- MONCONYS, G. de [Hrsg.] s. SV. N. 27.
28. Mydorge, Cl., *Prodromi catoptricorum et dioptricorum sive conicorum operis ... libri primus et secundus*, Paris 1631. — *Libri quatuor priores*, ebd. 1639 u. ö.: S. 249.
29. Pappus, *Mathematica collectio*: S. 126.
30. Pardies, I. G., *Élémens de géométrie*, Paris 1671 u. ö.: S. 76. 302. 484. 492.
31. Pascal, Bl., *Traité du triangle arithmétique avec quelques autres petits traitez sur la mesme matière*. Hrsg. G. Deprez. Paris 1665 [Marg.]; [auch in *PO* III S. 433–593, 341–67, 311–39]: S. 25. 25. 30–31. 44. 320. 323–324. 332. 363. 708.
32. Pell, J., *Controversiae de vera circuli mensura anno 1644 exortae inter Christianum Severini, Longomontanum ... et Ioannem Pellium ... pars prima* [mehr nicht ersch.]. Amsterdam 1647: S. 342. 588.
33. Philosophical Transactions. London 1665 ff. — 16./26. März 1667/1668: S. 759. — 13./23. April 1668: S. 458. 458. — 18./28. Mai 1668: S. 492. — 13./23. Juli 1668: S. 759. 799. 799. — 17./27. August 1668: S. 107. 107. — 15./25. Februar 1668/1669: S. 759. — 25. März/4. April 1669: S. 803.
34. Renaldini, C., *Geometra promotus*. Padua 1670: S. 492.
35. Ricci, M., *Exercitatio geometrica de maximis et minimis*. Rom 1666. Nachdr. London 1668 zus. mit SV. N. 26 [Marg.]: N. 65*.
36. Saint-Vincent, Gr. de, *Opus geometricum quadraturae circuli et sectionum coni decem libris comprehensum*. Antwerpen 1647 [Marg.]: N. 7*. S. 30. 49. 61. 72. 251. 505. 558. 757.
37. Sarasa, A. A. de, *Solutio problematis a R. P. Marino Mersenneo Minimo propositi*. Antwerpen 1649 [Marg.]: S. 251.
38. Schooten, Fr. v. 1. *In geometriam Renati Des Cartes commentarii*. In SV. N. 13,1 S. 162–294. 2. Aufl. in SV. N. 13,2 Tl I S. 143–344 [Marg.]: S. 486. 2. *Tractatus de concinnandis demonstrationibus geometricis ex calculo algebraico*. Hrsg. P. v. Schooten. In SV N. 13,2 Tl II S. 341–420: S. 342. 588. 697. 3. [Hrsg.] s. SV. N. 13,1. 13,2. – Schooten, P. v. [Hrsg.] s. SV. N. 38,2.

39. SLUSE, R. Fr. W. de
 1. *Mesolabum seu duae mediae proportionales inter extremas datas ... exhibitae*. Lüttich 1659. 2. Aufl. ebd. 1668 [Marg.]: S. 65*.
 Rez.: *Philosophical Transactions* vol. 4, 1669, S. 903–909; S. 803.
 2. *An extract of a letter from the excellent Renatus Franciscus Slusius ... to the Publisher ... concerning his new and easie method of drawing tangents to all geometrical curves*. In: *Philosophical Transactions* vol. 7, 1672, S. 5143–45; Nachtrag a. a. O. vol. 8, 1673, S. 6059; S. 391. 416. 419. 822.
40. SNELL van Royen, W.
 1. *Cyclometricus, de circuli dimensione secundum logistarum abacos, et ad mechanicem accuratissima; atque omnium parabilissima*. Leiden 1621; S. 105. 723.
 2. [Hrsg.] s. SV. N. 24.
41. STEVIN, S., *L'arithmetique*. Leiden 1585;
 2. Aufl. ebd. 1625; [auch in: *Les oeuvres mathematiques de Simon Stevin*. Hrsg. A. Girard. Leiden 1634]; S. 524.
42. TAVERNIER, J. B., *Les six voyages ... en Turquie, en Perse, et aux Indes*. 2 Tle. Paris 1676 u. ö.: S. 834.
 – THÉVENOT, M. [Hrsg.] s. SV. N. 4.
43. VIÈTE, Fr., *Opera mathematica, opera atque studio Fr. a Schooten*. Leiden 1646 [Marg.]; Nachdr. Hildesheim 1970.
- [Darin:] (S. 162–228) *De numerosa potestatum purarum, adque affectarum ad exegesin resolutione tractatus* [zuerst ersch. Paris 1600]; S. 510. — (S. 240–257) *Supplementum geometriae* [zuerst ersch. Tours 1593]; S. 486.
44. WALLIS, J.
 1. *Arithmetica infinitorum*. Oxford 1656. In: *Operum mathematicorum pars altera*; [auch in WO I S. 355–478; Marg.]: S. 102. 102. 127. 127. 183. 183. 492. 558. 751. 792. 824.
 2. *Mathesis universalis sive arithmeticum opus integrum*. Oxford 1657. In: *Operum mathematicorum pars prima*; [auch in WO I S. 11–228; Marg.]: S. 127. 253.
 3. *Commercium epistolicum, de quaestionibus quibusdam mathematicis nuper habitum*. Oxford 1658; [auch in WO II S. 757–860; Marg.]: S. 558.
 4. *Tractatus duo, prior de cycloide ... Posterior ... de cисsoide*. Oxford 1659 [Marg.]; [auch in WO I S. 489–569; Marg.]: S. 495.
 5. *Logarithmotechnia Nicolai Mercatoris: discoursed of in a letter ... to the Lord Viscount Brouncker ...* In: *Philosophical Transactions* vol. 3, 1668, S. 753–759; S. 107. 125. 127. 127. 306. 307.
 6. *Mechanica: sive, de motu, tractatus geometricus*. 3 Tle. London 1670–71; [auch in WO I S. 570–1063; Marg.]: S. 495.

NEUERE LITERATUR

45. COSTABEL, P., *Leibniz et les séries numériques*. In: SV. N. 50 S. 81–101: S. 712.
46. GREGORY, J., *James Gregory tercentenary memorial volume*. Hrsg. H.W. Turnbull. London 1939: S. 759.
47. HESS, H.J., *Zur Vorgeschichte der „Nova Methodus“ (1676–1684)*. In: 300 Jahre „Nova Methodus“ von G.W. Leibniz (1684–1984): Symposium in Nordwijkerhout, 28.–30. August 1984, S. 64–102 = *Studia Leibnitiana* Sonderheft. Nr. 14. Stuttgart 1984: S. 822.
48. HOFMANN, J. E.
1. *Die Differenzenrechnung bei Leibniz*. Zus. m. H. Wieleitner und Zusätzen von D. Mahnke. In: *Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften*. Phys.-math. Klasse. Nr. 26. Berlin 1931, S. 560–600. [Darin: MAHNKE, D., SV. N. 51,2.]
 2. *Leibniz in Paris. 1672–1676. His Growth to Mathematical Maturity*. Cambridge 1974: S. 827.
49. KNOBLOCH, E.
1. *Die mathematischen Studien von G.W. Leibniz zur Kombinatorik*. Abhandlungsband. Textband = *Studia Leibnitiana Supplémenta*. Bd. XI. XVI. Wiesbaden 1973. 1976: S. 17.
2. *Übersicht über die unveröffentlichten mathematischen Arbeiten von Leibniz (1672 bis 1676)*. In SV. N. 50 S. 3–43; russ. u. d. T. *Rukopisi Lejbnica 1672–1676 gg*. In: *Istoriko-matematičeskie Issledovaniya* 24 (1979) S. 258 bis 309: S. 606. 830.
50. *Leibniz à Paris (1672–1676)*. Symposium à Chantilly du 14 au 18 Nov. 1976., T. 1: *Les sciences = Studia Leibnitiana Supplémenta*. Bd. XVII. Wiesbaden 1978. [Darin: COSTABEL, P., SV. N. 45; KNOBLOCH, E., SV. N. 49,2.]
51. MAHNKE, D.
1. *Neue Einblicke in die Entdeckungsgeschichte der höheren Analysis*. In: *Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften*. Jahrgang 1925. Phys.-math. Klasse. Nr. 1. Berlin 1926: S. 250. 251. 566.
 2. *Zusätze aus den ungedruckten Handschriften*. In SV. N. 48,1 S. 590–600: S. 712.
52. PALUMBO, M., *Leibniz e i geographica*, Rom 1996: S. 253.
53. SCRIBA, C. J., *Gregory's converging double sequence*. In: *Historia Mathematica* 10 (1983) S. 274–285: S. 759.

SACHVERZEICHNIS

Die Grundsprache des vorliegenden Sachverzeichnisses ist deutsch. Leibniz' termini technici erscheinen in Kursivschrift. Zu Leibniz' Terminologie s. a. die Einleitung, insbesondere S. XXII–XXV. Die Sachworte sind alphabetisch geordnet, die Untergliederung in Einzelfällen auch systematisch. Verzeichnet wird nach Nummern und Seiten, wobei erstere zur besseren Unterscheidung zusätzlich mit einem Stern versehen sind. Nummernangaben erfolgen dann, wenn ein ganzes Stück einem bestimmten Sachwort zuzuordnen ist. Kursiv gedruckte Seitenangaben beziehen sich auf Herausgebertext.

<i>acceleratio</i> : S. 563.	Eliminierung von irrationalen Termen aus Gleichungen: S. 240.
Addition: N. 19*. S. 9. 24. 33. 35–37. 41–42. 45. 86. 127. 133. 155. 239. 265. 313. 325. 331. 343–344. 344. 403. 436. 450. 511. 615. 703. 726. 728–729. 808.	Lösung von Gleichungen durch Koeffizientenvergleich: S. 531. 638.
<i>aequatio</i>	Reduktion des Grades von Gleichungen: S. 207.
<i>absurda</i> : S. 649.	von Descartes: S. 504.
<i>affecta</i> : S. 103. 421. 507. 520.	von Diophant: S. 820.
<i>analytica</i> : S. 507.	Zerlegung von Gleichungen: S. 801. 820.
<i>collatitia</i> : S. 531–532. 534. 546–547. 617–618. 628. 631. 636. 646–647. 655. 820.	s. a. Gleichung.
<i>comparatitia</i> : S. 820.	Algorithmus
<i>elementalis</i> : S. 110.	der Potenzen: S. 42.
<i>factitia</i> : S. 372. 509.	euklidischer: S. 662.
<i>finita</i> : S. 784–786. 792.	s. a. Reihenentwicklung durch Wurzelziehen.
<i>fundamentalis</i> : S. 108. 110. 129.	<i>analogia</i> (Proportionalität): S. 508. 679. 784. 790.
<i>generalis</i> : S. 565. 570.	Analogie: S. 40. 46. 829.
<i>identica</i> : S. 215. 376. 380–381. 565. 569. 752 bis 753. 766. 783–784. 786.	<i>analysis</i> : S. 4. 6. 9. 76. 125. 150. 219. 236. 239. 559. 568. 573. 800.
<i>impossibilis</i> : S. 554. 618. 636. 651.	<i>characteristica</i> : S. 708.
<i>infinita</i> : N. 48*. S. 783–786. 789–790. 792–793. 796.	<i>transcendens</i> : S. 759.
<i>intractabilis</i> : 587.	analytisch: N. 65*. S. 366. 462. 485–488. 493. 500. 504. 507–508. 543. 557. 559. 563. 570–574. 588. 601. 632–634. 649. 662. 696. 729. 751. 758–761. 783. 820–821.
<i>irreducibilis</i> : S. 219.	<i>angulus contactus</i> : S. 197.
<i>plana</i> : S. 207. 214.	<i>animus</i> : S. 125. 475. 777.
<i>pura</i> : S. 103. 618. 780.	<i>applicata</i> : N. 16*. S. 45. 105. 106. 209–211. 219 bis 221. 223–225. 229. 250. 251–252. 254. 291. 314. 405. 468. 480. 484. 492. 498. 507. 514–515. 527. 557. 566. 579.
<i>solida</i> : S. 207. 214.	Approximationen s. Näherungen.
<i>transcendens</i> : S. 800.	<i>arithmetica</i>
s. a. Folge, Bildungsgesetz. Gleichung.	<i>finitorum</i> : S. 105.
Algebra: S. 109. 125. 207. 708. 715. 834.	
Methode	
analytische zur Gleichungslösung: S. 783.	

- infinitorum*: N. 35*. 57₂*. S. 69. 72. 76. 102. 196. 229. 236.
s. auch *arithmétique des infinis*.
- interpolationum*: N. 57₂*.
- universalis*: S. 252.
- Arithmetik: N. 35*. 57₂*. S. 32. 43. 48. 69. 72. 76. 102. 105. 196. 229. 236. 239. 252. 696. 726.
s. a. *arithmetica. arithmétique*.
- arithmétique des infinis*: S. 368–369.
s. a. *arithmetica infinitorum*.
- ars, artes*
- analytica*: S. 634.
 - decyphrandi*: S. 406.
 - divina*: S. 484.
 - faciendi hypotheses*: S. 406.
 - algebraicae*: S. 207.
- ascensus*: S. 36. 43. 100.
- Astronomie: S. 285.
- Aufgaben s. Probleme.
- Ausdruck
- analytischer: S. 500. 557. 572. 751.
 - in endlich vielen Termen: N. 73*. S. 679.
 - in unendlich vielen Termen: N. 56*. N. 61₁*. S. 52. 751. 754. 824.
 - bzw. relativer Wert (*expressio seu valor relativus*): S. 277.
 - transzendenter: S. 762.
- Axiom, Axiome
- geometrische: S. 96–97.
 - vom Teil und Ganzen: S. 69. 229. 468.
- axis librationis*: S. 291.
- Basis: S. 194. 196. 199. 225. 226. 249. 279. 292. 335. 426. 475. 496. 581. 606. 757.
basis fulcri: S. 279.
s. a. Differenzenschema.
- Beschleunigung (*acceleratio*): S. 563.
- Bewegung (*motus*): S. 69. 91. 99. 485–487. 509 bis 510. 555–561.
geradlinige: S. 559.
kreisförmige: S. 559.
stetige: S. 267. 486. 555–558. 561.
zusammengesetzte: S. 559.
- Beweis, Beweise: S. 20. 33–34. 37–38. 41. 69. 70. 72. 73. 76. 78. 81. 82. 84. 87. 89. 92. 94. 97. 100. 120.
125. 126. 132. 149. 150. 151. 204. 218. 228. 228. 229. 244. 246. 251. 271. 272. 275. 277. 278. 280. 286. 287. 288. 313. 314. 361–362. 363. 367. 392. 393. 435. 439–441. 462–463. 468. 476. 478. 523. 559. 562. 565. 566. 569. 572. 583. 588. 588. 610. 623. 671. 674. 708. 729. 758. 789. 800. 803–804. 821. 823.
- direkter: S. 76.
- Divergenz der harmonischen Reihe: S. 468.
- Erfindung: N. 51*.
- der euklidischen *Elemente*: S. 126.
- geometrischer: S. 342. 584.
- indirekter: S. 76. 446.
- Lemma über reziproke Dreieckszahlen: S. 363. 367.
- Methode: S. 218. 476.
- Regel für Polygonalzahlen: S. 600. 600.
- Satz über 3. Differenzen der Kubikzahlen: S. 378 bis 379.
- Summe der arithmetischen Reihe: S. 20.
- Summe der geometrischen Reihe: S. 72. 218.
- Summe der reziproken Dreieckszahlen: N. 35*. 53₃*. S. 367.
- Summe der reziproken figurierten Zahlen: N. 36*. 53₃*.
- Unmöglichkeit der Kreisquadratur: N. 60*.
- Binome: N. 32*. 33*. S. 42. 48. 127. 207. 214–219.
- Division durch s. Reihenentwicklung.
- Wurzelziehen aus s. Reihenentwicklung.
- s. a. Formel, binomische.
- Binomialkoeffizienten s. Zahlen, figurierte, Kombinationszahlen.
- Bogen
- Spannung (*tensio*): S. 558. 560.
- Bogenlänge s. Kurven.
- Bogenteilung: S. 91. 111. 283. 559.
- brachylogia*: S. 542. 643.
- Bruch, Brüche: N. 1*. 2*. 5*. 10*. 11*. 12*. 15*. 35*. 36*. 40*. 41₂*. 43*. 44*. 48*. 53₃*. 59*. 69*. 70*. S. 42. 57. 75. 76. 78. 81–85. 87–88. 93. 123. 124. 159. 170. 207. 216. 219. 233–238. 276. 283–284. 285. 291–292. 305. 313. 323. 343. 386. 401. 403. 413. 431. 433. 436. 438–439. 458. 519. 520. 525. 526. 532–534. 536–538. 552. 677. 698.

711. 716–717. 722. 723–730. 738–739. 743. 780.
 791. 792. 820.
- Dezimalbrüche: S. 310. 823.
- unendliche: N. 69*. S. 85–86. 184. 823. 833.
- s. a. Dezimalsystem. Folgen, spezielle, harmonische. Kettenbruch. Zahlen, reziproke.
- Bruchrechnung: N. 10*. S. 42.
- Addition: S. 343–345.
- calcul*: S. 366.
- calculus*: N. 42*. S. 32. 33. 40. 44. 127. 173. 199. 209. 211. 212. 216–219. 223. 232. 252. 253. 277. 286–287. 289. 373. 395. 400. 403. 407–408. 411. 413. 419. 421. 424. 426. 432. 443. 444. 449–450. 461. 471. 475. 487. 492–493. 499. 501. 503. 504. 508. 516. 521. 527. 529. 535. 536. 537. 538. 540. 549. 552. 553. 557. 558. 562. 563. 564–566. 567 bis 569. 571. 573. 608–609. 610. 613. 616–619. 623. 626. 628–629. 632. 633. 638. 641. 643. 645. 648. 649. 667. 695. 722. 729–730. 752. 759–762. 765–767. 769. 780. 785. 808. 821.
- analyticus*: S. 543.
- decimalis*: S. 730.
- universalis*: S. 252.
- centrum gravitatis*: S. 246. 396. 442. 478. 480. 495. 581–582. 696.
- charactère analytique*: S. 366.
- Charaktere s. Zeichen.
- cissoeis*: S. 485. 572.
- nova*: S. 292.
- cogitatio*: S. 459. 484.
- cognitio infiniti*: S. 82.
- combinatio*
- com2natio*: S. 19–20. 22. 26.
 - con3natio*: S. 19–20. 22–23. 26.
 - con4natio*: S. 19–20. 22. 26–27.
 - con5natio*: S. 19. 26. 28.
- s. a. Kombinationen.
- conatus*: S. 99.
- conchoeis* s. Konchoide.
- constructio*
- aequationum*: S. 504. 507.
 - analytica*: S. 559.
 - exacta*: S. 484.
 - geometrica*: S. 377. 481. 484. 492. 504. 558–559.
- organica*: S. 492.
- per synthesin*: S. 76.
- s. a. Konstruktion. *unitas constructionis*.
- coordinatus*: S. 228–229.
- corpus*: S. 556. 558.
- crementa* s. Differenzen, Zunahmen.
- crus*
- inclinatum*: S. 164–165.
 - rectum*: S. 164–165.
- s. a. Differenzenschema.
- cuneus*: S. 195.
- curva*
- analytica*: S. 487. 508. 563. 820.
 - constructrix generalis*: S. 497.
 - geometrica*: S. 485. 559.
 - homogenea*: S. 479–481. 488. 493–494. 496. 511. 518.
 - mesolaba*: S. 486.
 - non involuta*: S. 491.
 - quadratrix*: S. 492.
 - syntomas*: S. 314. 314. 480–481.
 - transcendens*: S. 573.
- s. a. Kurven.
- cycloëis*: S. 199. 476. 483. 485–488. 492. 502. 557 bis 558. 571–573.
- primaria*: S. 486.
 - secundaria*: S. 486.
- s. a. Zykloide.
- cyclocissœis*: S. 636–637.
- s. a. Versiera.
- decrementa* s. Differenzen, Abnahmen. Folgen von Abnahmen.
- descensus*: S. 43. 100. 158.
- determinationes* s. Folgen von Ungleichungen.
- Dezimalsystem: S. 287. 730.
- s. a. Brüche, Dezimalbrüche.
- differentiae*
- componentes*: S. 31. 33. 34. 36. 37. 40. 42. 43. 44. 45.
 - differentiarum*: S. 39. 40. 45. 102. 158.
 - exhaustas, exhaustibiles*: S. 421. 434–435. 444. 705. 720. 722.
- generales*: N. 67*. S. 407.
- generantes, generatrices*: S. 50. 56. 89. 170.

- parallelae*: S. 9. 33. 35–41. 83. 170.
- primae, primi gradus*: S. 15. 32. 33. 34. 39. 40. 42. 45. 75. 76. 89. 102. 158. 163. 259–260. 266. 376. 379–381.
- primitivae*: S. 55–56.
- quarti gradus*: S. 32.
- radicales*: S. 35. 55.
- secundae, secundi gradus*: S. 32. 39. 42. 44. 76. 163. 259. 379–381.
- supplementum*: S. 170–171.
- tertiae, tertii gradus*: S. 32. 39. 259. 379–381.
- transversales*: S. 158. 325.
- universales*: S. 32. 35. 39. 41. 48.
- s. a. Differenzen.
- Differentialrechnung: S. 668. 673–674. 769–770. 820. 830. 832.
- partielle Differentiation: S. 822.
- Produktregel: S. 668. 673–674. 674.
- Quotientenregel: S. 772.
- Symbole: S. 668. 830.
- s. a. Tangentenrechnung.
- Differenzen, Differenzenfolgen: N. 1*. 2*. 4*. 5*. 6*. 8*. 9*. 11*. 13*. 14*. 15*. 22*. 29*. 30*. 37*. 40*. 43*. 44*. 45*. 50*. 53₁*. 53₂*. 59*. 67*. 68*. S. 136–137. 149. 152–153. 214–216. 227. 232. 233–234. 237–238. 244–245. 247–248. 250. 265–266. 293–294. 298. 301. 316. 317. 321–322. 325. 407. 409. 421. 425–426. 434–441. 444. 449. 454–456. 458. 524. 525–527. 535. 555. 557. 561 bis 565. 568. 699. 702. 715. 717–722. 727. 729. 733. 736. 737. 746–747. 750. 784. 789. 792–793. 800. 803. 835.
- Abnahmen (*decrements*): S. 31. 65–66. 127. 719 bis 720.
- beliebig kleine: S. 69.
- erzeugende (*componentes, generantes, generatrices, primae, primi gradus*): S. 15. 31. 32. 33. 34. 36. 37. 39. 40. 42–45. 50. 56. 75. 76. 89. 102. 158. 163. 170. 259–260. 266. 376. 378 bis 381. 705. 708. 711. 717–722.
- s. a. Differenzenschema.
- höherer Ordnungen (*differentiae differentiarum, differentiae ordinis secundi, tertii etc.*): S. 10. 32. 34–36. 39. 40. 42. 44. 45. 47. 74. 76. 83. 88–89. 95. 102. 105. 158. 163. 167. 259. 263. 325. 376. 379–381. 421–422. 435. 705. 708. 711. 717–722. 751.
- s. a. Differenzenschema.
- konstante: S. 507.
- von Abszissen bzw. Ordinaten: N. 38₄*. 38₅*. 387*. 3816*. 40*. 45*. 50*. 59*. S. 200. 265 bis 266. 312–314. 317. 341. 395–401. 396. 423 bis 427. 451–452. 472. 475. 476. 488. 493–494. 505–507. 514–515. 517. 525–527. 555. 557. 561 bis 565. 568. 605. 702. 751. 769–770. 772. 775. 816–818. 821–823. 832.
- Zunahmen (*crements, increments*): S. 31. 65 bis 67. 462. 555. 557. 561–565. 568. 588. 717 bis 722.
- s. a. *differentiae*.
- Differenzenmethode: N. 4*. S. 3. 7. 12. 68. 72. 76. 76. 89. 95. 102–103. 126. 523–524. 608. 633–634.
- Differenzenschema: N. 2*. 4₂*. 5*. 9*. 13*. 11*. 13*. 14*. 15*. 22*. 29*. 30*. 53*. 67*. S. 6–8. 20. 22. 25–29. 28. 42. 66. 70–73. 75. 77. 82–83. 85. 88. 91. 93. 96. 103–105. 107. 112–113. 114 bis 115. 122. 133. 136–137. 206. 217. 227. 232. 237. 247–248. 265–266. 298. 315. 316. 317. 317. 321–322. 325. 374. 378–381. 421–422. 435–437. 575–577. 579. 587. 589. 717–721. 736–737. 747. 750. 789. 814.
- Basis: S. 35–41. 165.
- Folgendreieck: N. 4₂*.
- Fundamentalregel: S. 37. 162. 163.
- in Form eines Rhombus: S. 41.
- ordo terminorum*: S. 35. 38–39.
- Spalten: S. 152. 158. 162–65. 259. 705. 707.
- Transversalfolgen: N. 13*. S. 152. 325. 435. 705.
- absteigende: S. 162–165.
- aufsteigende: S. 162–65. 167. 258–261. 325.
- s. a. *crus*. Dreieck, harmonisches. Satz. *series directa. series homologa. series parallela. series transversa*.
- dimensio*: S. 30. 228. 247. 313. 384. 457. 459. 466. 475. 476. 481. 487–488. 494. 495. 498. 511. 515. 517. 758.
- Dimensionen: S. 43. 219. 252. 266. 359. 587. 615. 617–618. 633–634. 638. 785. 810.
- imaginäre S. 69.

- Dimensionsgröße (*quantum*): S. 99.
- Division: S. 33. 36. 43. 102. 206. 391. 445–447. 511. 558. 567. 671.
durch Binome s. Reihenentwicklung.
durch Brüche: S. 93.
fortgesetzte s. Reihenentwicklung.
imaginäre: S. 40.
numerische: S. 704.
ohne Rest: S. 416–420. 433–434. 481.
Überwärtsdivision: S. 154. 339.
unendliche: S. 85–87.
s. a. Reihendivision. Teilung.
doctrina: S. 76. 250.
 de chiffris construendis solvendisque: S. 253.
 de figuris arcus tensi, de velorum, deque funium intensionibus: S. 558–559.
 de progressionibus in se replicatis: S. 560.
 de seriebus infinitis arithmeticis: S. 342.
 divinandi seu de hypothesibus: S. 253.
 indivisibilium: S. 30.
- Dreieck, Dreiecke: S. 26. 37. 194–195. 197. 199–201. 205. 210–211. 220–221. 225. 231. 273. 275. 277 bis 278. 279. 309. 371. 385. 405. 421. 425. 442. 508. 556–557. 569. 696. 758–762. 764. 770. 800. 812. 821.
ähnliche: S. 405. 428. 498. 505–506. 512.
arithmetisches (Pascalsches): N. 53₂*. S. 45–46. 48. 685. 713. 722. 733. 737. 750.
charakteristisches: S. 312. 404–405. 423–427. 489–494. 497–499. 513. 561–565. 568–569. 584–586.
Folgendreieck s. Differenzenschema.
gleichschenkliges: S. 27. 37. 363–364. 365–367. 499.
harmonisches: N. 30*. N. 49₂*. N. 53*. S. 315. 681. 686. 688. 733. 736.
 triangulum arithmeticum reciprocum: S. 713.
rechtwinkliges: S. 41. 194. 246. 250. 363–364. 365 bis 368. 405. 428.
 semirectangulum: S. 274. 282. 566.
 semiquadratum: S. 228. 280. 405. 438. 500. 737.
- Dreieckslehre: S. 757.
Beweis des Flächensatzes: S. 246.
- Satz des Pythagoras: S. 212–213. 239–240.
Dreieckszahlen s. Zahlen, figurierte.
Dreiseit s. *trilineum*.
- elaterium* s. Feder.
Ellipse: S. 31–32. 68. 91. 126. 249. 383. 420–421. 486. 488. 494–495. 502. 513–518. 758. 770. 772.
 axis minor: S. 515.
 axis maior: S. 515.
Fadenkonstruktion: S. 488.
Fläche: S. 559.
Gleichung: S. 420–421. 494. 513–517.
 latus rectum: S. 502. 513–514.
 latus transversum: S. 502. 513.
Quadratur: S. 515.
 Beweis der Unmöglichkeit: S. 758.
Rektifikation: S. 494–495. 514–518.
 Bogenelement: S. 494. 514–518.
Tangente: S. 514–516.
s. a. Kegelschnitte.
Ellipsoid: S. 68. 91.
Engel: S. 484. 486.
ens: S. 206.
evolutio s. Kurven, Evolute u. Evolvente. Reihenentwicklung.
Exhaustionsmethode: S. 105.
s. a. Quadratur.
explicatio: S. 416. 421. 451. 480–481. 494. 500. 504. 508. 529–531. 534. 536. 541–542. 544. 547–549. 552–554. 609–610. 615. 618. 621. 623–624. 626 bis 627. 636. 638. 645. 649. 657. 666. 753. 770. 777. 791–792. 820.
Exponentialgleichung: S. 678. 751–753. 800–801.
Exponentialkurve: S. 755. 755.
s. a. Logarithmus.
expressio seu valor relativus: S. 277.
Extremwerte: S. 751. 758.
 Satz von Ricci: N. 65*.
 Satz von Sluse: S. 803–804.
Fakultäten n!: S. 266. 315. 323–324. 333–334.
Kurve: S. 266–267. 492.
Feder (*elaterium*): S. 559. 563.
figura
 aequabilis: S. 527.
 aequationis affectae: S. 421.

- aequationis capax*: S. 249.
ageometrica: S. 696.
altioris gradus: S. 250.
analytica: S. 570–571.
ananalytica: S. 696.
angulorum: S. 313. 488. 527. 574. 701.
anonyma: S. 480.
arcus tensi: S. 558.
carens asymptotis: S. 709.
certae dimensionis: S. 266.
curvilinea: S. 113.
de funium intensionibus: S. 558–559.
geometriae: S. 410.
geometrica: S. 250. 399. 406–407. 415. 421. 476. 492. 526–527. 555–557. 570–571. 574. 693.
harmonica: S. 693.
homologa: S. 768.
homogenea: S. 313. 424. 426. 478. 480–481. 495. 518. 776.
inaequabilis: S. 492. 527.
irrationalis: S. 741.
logarithmica: S. 250. 751.
logarithmorum: S. 251. 527. 574.
mechanica: S. 696.
mesolaba: S. 492.
non geometrica: S. 475–476.
ordinaria: S. 679.
pantometra: S. 505.
quadrabilis: S. 266. 410. 412–413. 476. 527.
quadratrix: S. 267. 313. 411. 426. 475–476. 479. 481. 488. 572. 821.
rationalis: S. 412. 573. 738. 741. 769.
rationum: S. 488.
regularis: S. 581.
segmentorum: S. 264. 312–313. 488. 701.
summabilis: S. 578.
summatrix: S. 573. 821.
sygnota: S. 264.
symmetros: S. 476. 481.
syntomos: S. 481.
transcendens: S. 266–267. 571. 574. 696.
velorum: S. 558.
s. a. Figuren, geometrische. Kurven.
- Figuren, geometrische: S. 31–32. 105. 113. 126. 196. 199–200. 205. 210. 226–227. 246. 254. 276–279. 291–292. 299. 306. 335. 346. 399. 410. 555–556.
s. a. Dreieck. Ellipse. *figura*. Körper, geometrischer. Kreis. Kreispolygon. Kreisring. Kurven. Polygon. Quadrat. Rhombus. Trapez. *trilinum*. *zona*.
Fläche: S. 30. 31. 41. 64–65. 299. 400. 509. 566. 693. 695. 756.
asymptotische, unendlicher Länge: S. 97. 288. 305. 709.
s. a. Ellipse. Hyperbel. Kreis. Logarithmus, Kurve. Raum.
Flächenberechnung s. Quadratur.
Flächenteilung: S. 335.
flexus: S. 335. 451.
fluctuatio: S. 36.
Folge, Folgen
Auflösung und Zusammensetzung: N. 4*. S. 9. 85. 105–106. 233. 465. 634. 696. 726. 789.
s. a. *progressio complicata*.
Bildungsgesetz: N. 9*. 73*. S. 5. 30. 34–35. 43. 48. 102–103. 108–110. 117. 163. 252. 253. 366. 374. 406–407. 556. 720.
s. a. *aequatio*. *charactère analytique*. *fundamentum*. *proprietas essentialis*. *ratio*.
Definition: S. 35–36. 129.
Doppelfolgen
divergente: S. 64–65. 75.
konvergente (Gregory): N. 20*. 51*. 60*. 63*. 64*. S. 64–65. 558. 560. 789.
endliche: S. 68. 251. 394. 443. 445.
Grenzwert: S. 111. 207. 249–250. 766. 799–800. 819.
s. a. *limes*. *terminatio*.
interpolierte: N. 57*. S. 252.
irreguläre: S. 252–253. 386.
Klassen (*classes*, *genera*, *gradus*): S. 7. 9. 31. 40. 43. 81. 103. 105.
konstante: S. 31. 102.
Konstruktion: S. 48. 65. 91. 105. 163.
monoton abnehmende: N. 5*. 6*. S. 3. 32. 162 bis 163. 208–209. 214. 218. 222. 250. 283. 346. 403. 422. 444. 451. 453–454. 524. 555. 588. 607. 720. 783. 786. 789. 792. 819.
Summierbarkeit: S. 68–70. 105. 403.

- monoton wachsende: S. 22. 25. 32. 64–67. 70. 73. 75. 80–86. 89. 93. 96–97. 100. 113. 127. 194. 196. 228–229. 250. 346. 361. 422. 444. 451. 453. 458. 462. 524. 556–557. 588–589. 607. 717. 720. 748. 751. 789. 803. 835.
beschrankte: S. 113.
- Nullfolgen: S. 9. 86–87. 89. 89. 91. 98. 98. 523. 720. 819.
- Quotientenfolge: S. 67. 92–93. 95–102. 106–107. 131–132. 170. 234–235.
- Rechnen mit: N. 4₃*. S. 9.
- rekursive: N. 60*. 64*. S. 557. 560. 819–820.
s. a. *progressio replicata. series replicata. series substitutrix*.
- Tafeln: N. 11*. 12*. 13*. 14*. 38₂*. 43₃*. 49₂*. 53*. 57₂*. S. 27. 34. 47–48. 105. 242–243. 247 bis 248. 252–253. 291. 374. 377–380. 393–394. 408–410. 411. 413–415. 429–431. 524–527. 528. 670. 674. 733. 750. 810.
- harmonische: S. 717–722. 729.
s. a. Differenzenschema.
- von Abnahmen bzw. Zunahmen: S. 31. 65–66. 588. 717–720.
s. a. *series decrementalis, incrementalis*.
- von Folgen: S. 719.
- von geometrischen Größen: S. 254. 266. 325. 411. 555.
- Abstände: N. 17*. S. 200.
- Bogenstücke: S. 198.
- Dreiecke: S. 205.
- Ellipsen: S. 126.
- Kreispolygone: S. 97. 113. 588.
- Kreissegmente: S. 205.
- Ordinaten: N. 38_{5–7}*. S. 526–527. 528. 556 bis 557. 560. 563–565.
- Subnormalen: S. 438–439.
s. a. *progressio geometrica. series geometrica*.
- von Näherungen: S. 792. 808. 825.
- von Ungleichungen: N. 46*. 62*. 66*.
s. a. Differenzen. Differenzenmethode. Differenzenschema. *productio. progressio*. Regeln. Reihen. Reihenentwicklung. *series*.
- Folgen, spezielle
- arithmetische: N. 19*. 20*. 53*. 73*. S. 20–23. 26. 30. 37. 44. 44. 46–47. 124. 132–133. 194. 228. 239. 292. 325. 374–375. 415. 422. 431. 435. 450. 460. 462. 533. 607. 633. 664. 683–685. 698. 716–717. 727. 733. 734. 740. 746. 751. 755. 803. 812. 818.
s. a. *progressio arithmeticica*. Satz.
- natürliche Zahlen: S. 43. 46. 48. 52. 75. 166. 175–. 196. 199. 201. 225. 229–231. 236. 242 bis 243. 245. 247. 254. 294. 320. 365. 380. 429. 445. 577–579. 607. 684–685. 812. 815. 835.
s. a. *progressio arithmeticica naturalis*.
- ungerade Zahlen: S. 166. 187. 227. 232. 242 bis 245. 318. 405. 450. 579. 607. 684. 817.
- Fakultäten n!: S. 315. 323–324. 333–334.
- figurierte Zahlen: N. 3*. 53*. 57₂*. S. 48. 167. 729. 750.
- Dreieckszahlen: N. 53₂*. S. 3. 5. 26. 47–48. 176. 191–192. 236. 247. 320–321. 361. 365 bis 367. 377. 380. 402. 429. 438. 445–446. 445. 460–461. 527. 532. 555. 555. 601. 676. 729. 740. 750.
- Kombinationszahlen: N. 3*. S. 707. 729. 738 bis 742.
- Pyramidalzahlen: N. 53₂*. S. 292. 380. 402. 429. 729. 747–748. 750.
- Trigonotrigonalzahlen: N. 53₂*. S. 750.
s. a. Dreieck, arithmetisches (Pascalsches). Folgen, spezielle, reziproke figurierte Zahlen. Zahlen, figurierte u. reziproke figurierte.
- Folge mit $a_n \cdot a_{n+1} = b_n^2$: S. 452. 453–454.
- Folge mit $a_n = \frac{n}{2^{n-1}}$: N. 59*. S. 815.
- Folge mit $a_n = \prod_{k=1}^n 2^{-k+1}$: S. 82–84.
- geometrische: N. 7*. 59*. S. 14. 22. 26. 28. 36. 47. 55–56. 61. 63–67. 64. 69–83. 85–91. 97. 99–101. 105. 112. 113–114. 117. 127. 127. 132. 139–144. 148. 189. 205–209. 209. 214. 218. 239. 283. 292. 317. 317. 328. 346. 357. 386. 430–431. 679. 684. 702. 704–705. 803.
s. a. *progressio geometrica*. Reihenentwicklung. Satz.

harmonische: N. 8*. 9*. 12*. 14*. 22*. 27*. 29*. 29*. 30*. 38₃*. 38₁₀*. 47*. 49*. 52*. 53*. 54*. 55*. 57*. N. 68*. 71*. S. 13. 53. 57. 68. 88. 107–111. 132–137. 140–141. 145. 161. 164. 175 bis 177. 180. 184. 185. 192. 193. 233–238. 271. 271. 288. 290. 298. 344. 361–363. 366–368. 405. 435. 440. 444. 459. 464. 575. 581–584. 588 bis 590. 593–594. 596. 664. 691–693. 698–699. 810–811.
 Bildungsgesetz: N. 8*. 9*. S. 108–110. 170. 329. 717–718.
 Divergenz: S. 468. 677.
 Fortsetzung: N. 8*. 9*. S. 716–717.
 ganzzahlige endliche Folge: S. 717–722.
 Partialsummen: N. 49₂*. S. 161. 169. 172. 256 bis 257. 315–316. 330–334. 337. 340. 810.
 Produkte der Terme harmonischer Folgen: S. 457–458. 722.
 Summation: N. 14*. 27*. 28*. 52*. 55*. 57*. 71*. S. 263. 272. 715. 723–730. 735. 746–748.
 s. a. Dreieck, harmonisches. *progressio harmonica*. Satz.
 irrationale: N. 68*.
 s. a. Potenzen bzw. Wurzeln.
 konstante: N. 47*. S. 716. 811.
 Polynome: S. 385. 407. 422. 434. 520. 738. 752.
 kubisches: N. 37*.
 s. a. figurierte Zahlen.
 Potenzen bzw. Wurzeln
 allgemeine und höhere: S. 30–31. 43–44. 55. 125. 127. 195. 253. 421. 436. 444. 608. 724.
 Quadratwurzeln: N. 38₅*. 38₈*. S. 193–194. 196–198. 201. 203. 210. 223–225. 227. 230 bis 232. 382. 382. 383. 385. 407. 453–456. 480. 666–667.
 Quadratzahlen: S. 21–25. 31. 43–44. 55. 131. 166–167. 167. 187. 191–192. 197–198. 201. 225. 227. 236. 245. 265. 317–318. 324. 357. 405. 435. 555. 555. 580–581. 729. 740.
 s. a. Satz.
 Kubikwurzeln: S. 193. 195. 199. 385.
 Kubikzahlen: S. 43–44. 55. 194. 198. 201. 376 bis 379. 729.
 Potenzen n^n : S. 255.

rationale: N. 43*. 44*. 67*. 68*. S. 573–574. 789.
 mit irrationaler Summe: N. 68*. S. 102.
 reziproke figurierte Zahlen: N. 12*. 30*. 36*. 38₂*. 53*. S. 50. 52. 52. 176–177. 431. 678. 729.
 Summe: N. 36*. 53*. S. 52. 176–177. 431. 676.
 Teilfolgen: S. 387. 394. 469. 474.
 Dreieckszahlen: N. 1*. 2*. 12*. 30*. 35*. 36*. 38_{16–18}*. 43*. 45*. 53*. S. 51–52. 57. 139. 141–142. 141. 145–147. 161. 175–177. 175. 190–191. 237–238. 272. 291–292. 324. 330. 365. 383. 390. 405. 429–431. 436. 438–439. 438. 456. 459–460. 465. 575–578. 580. 582. 590. 592. 596–597. 603–605. 676. 691. 701. 729. 810. 814. 829.
 Partialsummen: S. 810.
 Summe: N. 35*. 36*. 53*. S. 52. 141. 145. 149 bis 150. 153. 175. 176–177. 431. 456. 465. 470. 590. 592. 676.
 Teilfolgen: N. 38_{16–18}*. 43*. S. 383. 470. 590–591. 594–595.
 s. a. Satz.
 Polygonalzahlen: N. 41₂*.
 Pyramidalzahlen: N. 30*. 53*. S. 10. 11. 13. 16. 51–52. 57. 145–147. 150. 161. 176. 369. 390. 592. 676. 431.
 Teilfolgen: S. 390.
 Summe: S. 52. 150. 176. 369. 431. 592. 676.
 Triangulotriangularzahlen: N. 30*. 53*. S. 52. 146–147. 150. 369. 390. 431.
 Summe: S. 52. 150. 369. 431. 676.
 Triangulopyramidalzahlen: N. 30*. 53*. S. 52.
 reziproke Kombinationszahlen s. reziproke figurierte Zahlen.
 reziproke Polynome: S. 723–730.
 $\frac{1}{y^2 - 1}$: N. 43₃*. 45*. S. 175. 181–183. 193. 272. 345. 345. 386. 388. 392. 393–395. 470. 577. 591–593. 701.
 Summe: N. 43₃*. S. 175. 181–183. 386. 388. 592–593. 665.
 Teilfolgen: N. 43₃*. S. 386–389. 470. 589 bis 592. 726.

| | |
|---|---|
| $\frac{1}{y(y+1)^2}$: S. 438–443. | Fundamentalgleichung s. <i>aequatio fundamentalis</i> .
Fundamentalregel s. Regel.
Fundamentalsatz s. Satz. |
| $\frac{1}{[y(y+1)]^2}$: S. 438–443. | |
| $\frac{1}{(y+1)y^2}$: S. 438–443. | |
| reziproke Potenzen: S. 140–141. 235. 728. | |
| Quadratzahlen: N. 15*. 70*. S. 53–54. 58
bis 59. 124. 140–141. 151–153. 154–160.
193. 235–236. 298. 324. 357. 386. 392. 395
bis 396. 401–403. 401. 437. 439–443. 528.
575. 579–582. 591. 676. 693–695. 701–702.
727–728. | |
| Partialsummen: S. 183–184. 324. | |
| Summe der alternierenden Reihe: S. 828.
828. | |
| Teilfolgen: N. 70*. | |
| Kubikzahlen: S. 54. 140. 151. 153. 189. 235.
298. 317. 701–702. 727–728. 828. 828. | |
| höhere Potenzen: S. 140. 151. 153. 695. 702. | |
| Stammbrüche: N. 67*. S. 323. 587. | |
| Wallissche Folge s. Produkt, Wallissches. | |
| Folgendreieck s. Differenzenschema | |
| Formel, Formeln: N. 51*. 60*. S. 384. 451. 453. 457
bis 460. 571. 573. 679. 770–771. 820. | |
| binomische: S. 122. 239–240. 598–599. | |
| quasi-analytische: S. 571. | |
| summierbare Reihen bzw. quadrierbare Kurven:
N. 385*. 3816–18*. 43*. 44*. S. 432. 524–527.
603–604. 723–730. 815. | |
| s. auch Gleichung, Reihen. | |
| Formelsammlungen: S. 698. | |
| <i>fractio continua</i> : S. 36. | |
| <i>fraction</i> | |
| <i>naturelle</i> : S. 362–363. 366–369. | |
| s. auch Folgen, spezielle, harmonische. | |
| <i>triangulaire</i> : S. 362–363. 366–368. | |
| s. auch Folgen, spezielle, reziproke figurierte
Zahlen, Dreieckszahlen. | |
| Frankreich: S. 347. | |
| <i>fulcrum</i> : N. 24*. S. 288. 309. 310. 761–762. | |
| <i>functio</i> : S. 251. 252. 426. | |
| <i>fundamentum</i> : S. 5. 30. 34–35. 43. 48. 102–103.
117. 163. | |
| | Gleichung: S. 371. 419.
s. a. <i>linea recta</i> . |
| | Gleichung: N. 8*. 9*. 36*. 385*. 386*. 3811*. 3814*.
3816*. 3817*. 3818*. 39*. 48*. 62*. S. 5–6. 103.
108–109. 133. 135. 159. 206. 207–208. 209. 214
bis 215. 219. 225. 240. 249–250. 252–253. 265.
269. 279. 285–287. 289–290. 294. 313. 342. 352.
387. 406. 408. 434. 441. 443. 444. 446. 461. 461.
487. 492. 492. 494. 495. 498. 500. 502. 504. 514.
516–517. 521. 522. 581. 586–587. 591. 604. 609
bis 610. 614. 616–618. 624. 628. 631. 636–637.
644. 645–647. 646. 647. 649–651. 649. 650. 651.
653. 655. 657. 659. 659. 662–663. 662. 666. 671.
673. 675. 688. 702. 715. 720. 723–724. 739–740. |

750. 751–753. 754. 757. 760. 762. 765–767. 769
 bis 770. 769. 771. 776–777. 779–780. 780. 786.
 800–801. 808. 818. 819–822. 822. 835.
 algebraische: S. 507. 723. 786. 808. 635. 664. 760
 bis 762.
 Auflösung: S. 492. 567. 790.
 durch Logarithmen: S. 783. 790.
 bestimmten Grades: S. 557. 723.
 Eliminierung von irrationalen Termen: S. 240.
 höheren Grades: S. 6. 207. 252. 380. 510. 570.
 572. 587.
 Konstruktion: S. 507.
 kubische: N. 37*. S. 207. 214.
 logarithmische: S. 507. 783–785. 790.
 Lösungen s. Wurzeln.
 quadratische: S. 207. 214. 371–372. 376–377.
 Reduktion auf reine: S. 103.
 Reduktion des Grades: S. 207. 219. 373. 418.
 615.
 Substitution: S. 59. 120. 371–373. 372. 411. 416.
 421. 425–426. 451. 461. 480–481. 494. 500. 504.
 508. 513–516. 521–522. 529–531. 534. 536. 541
 bis 542. 544. 547–549. 552–554. 565–566. 609
 bis 610. 614–615. 617–618. 621. 623–624. 626
 bis 627. 636. 638. 645–646. 649. 657. 663. 666.
 698. 753. 761. 769–770. 772. 777. 780. 782. 786.
 788. 791–792. 797. 820.
 Teilerermittlung: S. 567. 791–792.
 Umordnen der Terme: S. 567. 567.
 (mit mehreren) Unbekannten: S. 373. 376. 380.
 424–425. 427. 487. 508. 552. 569. 571–573. 587
 bis 588. 617. 628. 647. 652–653. 655. 659. 662
 bis 663. 762. 765. 779. 784. 819–820.
 unendliche: N. 48*. S. 570. 783–786. 789–790.
 792–793. 796.
 unlösbare: S. 618. 636. 649. 651.
 Zerlegung: S. 801. 819–820.
 s. a. *aequatio*. Algebra. Ellipse. Exponentialgleichung. Folgen, Bildungsgesetz. Gerade. Größe. Hyperbel. Kegelschnitte. Kreis. Logarithmus. *scientia*.
globus: S. 482.
 Größe (*magnitudo*): S. 63. 65–66. 247. 277. 486.
 555–556. 709. 757. 803–804. 816.

endliche: S. 75–76. 89. 97.
 unendliche: S. 97. 305.
 des Unendlichen: S. 69.
 Größe (*quantitas*): N. 56*. S. 15. 35–36. 47. 64–65.
 68. 74. 79. 84. 86. 89. 96–97. 99. 103. 117. 162
 bis 165. 224. 249. 278–279. 286. 351–352. 381.
 395. 401. 405. 407. 415–416. 449–451. 453. 506.
 510. 520–521. 523. 526–527. 532. 561. 583. 605.
 621. 629. 636. 643. 677. 716. 724–726. 728. 758
 bis 763. 766. 770. 785. 788. 791. 796. 799–800.
 808.
 bekannte (*cognita*): S. 33. 65. 76. 81. 89. 91. 375.
 395. 410. 416. 439–440. 457. 462. 471. 507–509.
 518. 520. 532. 541–542. 587. 627–628. 640. 642.
 653. 728. 762. 766. 783–784. 786. 789. 793. 800.
 beliebige (*arbitraria*): S. 5. 90. 286. 373. 481.
 525. 532. 542. 552. 613. 616–617. 637–638. 647.
 717. 728. 777–778. 782. 791–792. 819–820.
 bestimmte (*determinata*): S. 5. 36. 163. 521.
 666. 759–761.
 endliche: S. 64. 85. 272. 588. 677.
assignabilis: S. 212. 224–225. 342. 450. 799
 bis 800.
 konstante (*constans*, *invariabilis*, *invariatus*):
 S. 273–274. 276–277. 287. 325. 451. 456. 458.
 462. 480–481. 490. 507. 525. 532. 587. 603.
 607. 608. 636. 648. 691. 751. 778. 785. 786.
 820. 834.
 unabängige (*separata*): S. 642.
 unbekannte (*ignota*, *incognita*, *quaesita*):
 S. 250. 373. 376–377. 380. 407. 424–425. 427.
 447. 451. 487. 501. 508. 524. 552. 565. 569. 571
 bis 573. 587–588. 617. 628. 640. 647. 652–653.
 655. 659. 662–663. 762. 765. 773. 779. 783–784.
 786. 788–789. 792–793. 801. 820.
capitalis: S. 572.
interveniens: S. 572.
 unbestimmte (*arbitraria*, *indefinita*, *indeterminata*): S. 5. 90. 158. 285–286. 373. 478. 481.
 525. 532. 542. 552. 541. 556. 566. 569. 571. 573.
 607–608. 610. 613. 616–618. 634. 637–638. 647.
 717. 728. 770. 777–778. 782. 791–793. 819–20.
 variable (*inconstans*, *variabilis*, *varians*):
 S. 294. 528. 746. 751. 820.
 s. a. Binom. Dimensionsgröße. unendlich. Zahl.

- Harmonie: S. 252. 273. 342.
- helix*: S. 199. 476. 484–485. 559. 571.
s. a. *spira*. Spirale.
- Hexagon s. Polygon.
- Hyperbel: N. 382*. 38_{10–11}*. 433*. 58*. 64*. 71*. S. 31–32. 283. 288–292. 305–306. 312–314. 317. 317. 341. 382. 396. 419. 464. 488. 490–491. 493 bis 496. 502. 505–507. 510–511. 515. 517–518. 527. 583–586. 684. 700. 702. 729. 821.
- figura rationum*: S. 488.
- Fläche: N. 38₁₀*. S. 97. 288. 291–92. 306. 314. 384. 490. 505–507. 559. 583–586. 709.
- Gleichung: S. 358. 411. 418. 420–421. 434. 490. 493. 500. 515. 585. 637. 684. 702.
- höhere (*hyperboloides*): S. 266. 305. 385. 488. 752.
- Gleichung: S. 752.
- mit irrationalen Exponenten: S. 488.
- rationale: S. 709.
- Quadratur: S. 709.
- cubica* ($a^3 = xy^2$): S. 413–414. 466. 585. 829.
- Quadratur: S. 413–14. 829.
- quadratica* ($a^2 = xy$): S. 829.
- Quadratrix: S. 267. 475. 479–481. 496.
- Quadratur: N. 382*. 38_{10–11}*. 433*. 58*. 64*. S. 204. 219. 251. 288–292. 313. 411. 419. 429. 464. 493–495. 515. 517. 559. 583–584. 607. 637. 723. 726. 758. 785. 829. 832.
- Beweis der Unmöglichkeit: S. 758.
- näherungsweise: S. 283. 723.
- Zusammenhang mit Quadratur des Kreises: N. 38₁₀*. 433*. S. 288. 459. 462–464. 495. 800–801.
- Quadratur (Brouncker): S. 458.
- Quadratur (Gregory): S. 800.
- Quadratur (Heuraet): S. 559.
- Quadratur (Mercator): S. 207. 726.
- Quadratur (Saint-Vincent): S. 251. 505. 559.
- Reihe: N. 38₁₀*. 433*. S. 288. 383–384. 386. 388. 459. 464. 583. 589–590. 726. 785. 800.
- Reihenentwicklung: S. 288. 357. 702. 833.
s. a. Folgen, spezielle, harmonische.
- Rektifikation: S. 382. 383. 495. 558.
- Bogenelement: S. 313. 316. 493–495. 518.
- Subtangente: S. 585–586.
- Tangentenrechnung: S. 341. 585. 702.
s. a. Kegelschnitte.
- Identität, algebraische: S. 209. 293. 376. 380–381. 565. 569. 577. 752–753. 766. 783–784. 786.
- index*: S. 571. 751.
- Indexbezeichnung: S. 350. 830.
- incrementa* s. Differenzen, Zunahmen.
- Indivisibeln: S. 30. 69. 126. 199. 227.
- Induktion: S. 84. 183. 342. 584. 713. 717. 751.
Methode von Wallis: S. 183.
- Infinitesimalen: S. 65. 128. 212. 224. 225. 293. 724. 725. 751. 799–800. 818. 824.
s. a. *unitas constructionis*.
- infinities infinitum*: S. 9. 89. 141. 150. 151. 153. 158. 164. 677.
- Instrument: S. 492. 560.
Konstruktion des Logarithmus: N. 38_{12–13}*. S. 484–485. 729.
- Integralrechnung: S. 673–674. 738. 740. 820. 832.
Integration durch Reihenentwicklung: N. 56*. N. 58*. N. 61*. S. 795. 832.
s. a. Reihenentwicklung.
- Symbole: S. 668. 830.
s. a. Quadratur. Rektifikation.
- intelligentia*: S. 484.
- directrix*: S. 486.
- Interpolation: N. 572*.
Methode (Collins): S. 252. 252.
- Methode (Wallis): S. 792.
- Probleme (Wallis): S. 558.
- Tafeln (Mengoli): N. 572*.
- intervalla* s. Folgen von Abständen.
- inventio*: N. 51*. 533*. S. 4. 207. 251. 484. 559. 704. 748. 758. 771. 819. 835.
- isochronismus*: S. 558.
- Kalenderrechnung: S. 681.
- Kanon s. Regeln.
- Kegel: S. 228. 230–231. 481–482.
- Kegelschnitte: N. 61*. S. 485–486.
Brennpunkt: S. 250.
Gleichung: S. 421. 770. 776.
- Parameter: S. 249. 250.
- Rektifikation N. 61*.
s. a. Ellipse. Hyperbel. Kreis. Parabel.

- Kettenbruchentwicklung: S. 661–662. 661. 662. 826. 826.
- Kettenlinie: S. 491.
- s. a. Parabel, Trochoide.
- klein: S. 483. 725.
- beliebig (*quantum licet, quantumvis parvus*): S. 200. 451.
 - unangebar (*indicibiliter parvus*): S. 346.
 - s. a. unendlich.
- Körper, geometrischer: S. 32. 35. 195. 208. 247. 392. 398–399. 427. 442. 498. 556. 558. 587.
- Oberfläche: S. 427. 498.
 - s. a. *corpus cuneus*. Ellipsoid. Kegel. Kugel. Paraboloid. Prisma. Pyramide. *solidus*. Würfel.
 - Zylinder.
- Kombinationen: N. 3*. S. 587. 703. 820.
- s. a. *combinatio*.
- Kombinationszahlen s. Zahlen, figurierte.
- Kommensurabilität: S. 261. 335. 615. 698. 734.
- s. a. *mensura communis*.
- Komplanation: S. 498. 558–560.
- Konchoide: S. 31. 485.
- Konstruktion: S. 34. 36. 48. 63. 65. 73. 76. 91. 97. 103. 105. 127. 163. 481. 483. 484. 488. 492. 497. 504. 507. 558–559. 573–574. 662. 698.
- Methoden: S. 97. 483. 485.
- s. a. *constructio*. Kurven. Logarithmus. *unitas constructionis*.
- Kontrollzahlen s. Zahlen.
- Koordinatensystem
- geradliniges: S. 556.
 - krummliniges: S. 556.
- Kosekans: S. 313. 335. 488. 527. 574. 701. 701.
- s. a. *figura angulorum*.
- Kraft: S. 555. 558–561. 563.
- Elastizität: S. 558. 563.
 - Schwerkraft: S. 559–560.
 - s. a. *vis*.
- Kreis: N. 23*. 24*. 25*. 26*. 31*. 34*. 3810*. 46*. 58*. 66*. 69*. S. 31. 41. 61–68. 61. 91–92. 97. 113. 125–126. 199. 201. 205. 226–227. 228–232. 266–267. 318. 335. 347. 352. 370–373. 370. 385 bis 386. 388–389. 420. 426–427. 428. 459. 462. 479. 484–485. 492. 501. 511–512. 556. 588–591. 637. 677. 701. 737. 769. 792–796. 816.
- Evolvente: S. 485. 558.
- Fläche: S. 468. 559.
- Gleichung: S. 314. 352. 358. 370. 373. 385. 420. 428. 476. 479–481. 637. 668. 679. 757. 760. 769. 793–796. 805.
- Halbkreis: S. 205. 273. 310. 470–471. 668.
- irrational zum Durchmesser: S. 823.
- Möndchen des Hippokrates: S. 228. 250.
- Quadratur N. 24*. 25*. 26*. 34*. 3810–11*. 433*. 58*. 60*. 64*. 66*. 69*. S. 199. 205. 232. 266. 386. 389. 426. 459. 462–464. 485–488. 495–496. 511. 515. 517. 557. 559. 572–573. 588–591. 632. 726. 769. 816. 823.
- algebraische: S. 485.
 - arithmetische: S. 749.
- Beweis der Unmöglichkeit (Gregory): S. 758 bis 759.
- Kontroverse: S. 759. 759.
 - Beweis der Unmöglichkeit (Leibniz): S. 759.
 - geometrische: S. 485.
 - (Gregory): S. 800.
 - Ludolphsche: S. 726.
 - näherungsweise: N. 26*. 34*. 60*. S. 283–284. 287. 347. 352. 726.
- Zusammenhang mit Quadratur der Hyperbel: N. 3810*. 433*. S. 288. 459. 800–801.
- s. a. Produkt, Wallissches.
- Rektifikation: N. 24*. 25*. 26*. 34*. S. 485. 558. 588–589.
- Bogenelement: S. 313. 479–481. 572–573. 588. 754.
- näherungsweise: N. 46*.
- Segment: N. 23*. 24*. 25*. S. 68. 205. 318. 336.
- Sehne: S. 67. 69. 91. 279. 309–310. 760. 764.
- Sektor: N. 60*. 63*. S. 41. 279–280. 288. 309 bis 311. 345. 800–801.
- Oktant: S. 277–280. 277. 469. 671–672.
- Quadrant: N. 24*. 25*. 26*. S. 226–227. 228 bis 232. 335. 336. 336. 347. 462. 46. 469–472. 677.
- Subtangente: S. 472.
- Umfang: S. 63–64. 64. 67. 226. 229. 285. 302. 302. 311. 462. 465. 468. 485. 556. 558. 588. 792.

- s. a. Kegelschnitte. Versiera. Zykloide.
- Kreispolygon
einbeschriebenes: N. 60*. 63*. 64*. S. 61–69. 61. 64. 97. 113. 125–126. 125. 313. 588.
- Quadrat: S. 485. 588.
- 6-Eck: S. 63. 64. 65. 69. 113. 280.
- Umfang: S. 63.
- 8-Eck: S. 279. 588.
- 12-Eck: S. 113.
- 16-Eck: S. 588.
- 24-Eck: S. 113.
- 48-Eck: S. 113.
- 360-Eck: S. 311.
- umbeschriebenes: N. 60*. 63*. 64*. S. 65. 126. 313. 589.
- Quadrat: S. 589.
- 6-Eck: S. 280.
- 8-Eck: S. 277. 280.
- 360-Eck: S. 311.
- Kreisreihe: N. 24*. 25*. 26*. 34*. 38₁₀*. 43₃*. 46*. 66*. 69*. S. 251. 255. 315. 318–319. 336. 336. 342. 345. 345. 346. 386–389. 459. 462–464. 529. 589–591. 595. 726. 753–754. 792–796. 800. 816. schnell konvergierende: S. 352.
- Kreisring: S. 228–229.
- Kreisteilung
näherungsweise mittels geometrischer Reihen: S. 111.
- Kubatur: S. 247. 392. 498. 558.
- Kubikwurzel s. Wurzeln.
- Kugel: S. 226. 228–232. 482.
- Großkreis: S. 229.
- Oberfläche: S. 229. 558.
- Volumen: S. 226. 228.
- s. a. *globus. sphaera*.
- Kurven: N. 16*. 17*. 20*. 23*. 38₅*. 38_{10–18}*. 39*. 40*. 48*. 57₂*. 58*. 61*. S. 69. 74. 76. 91. 97. 99. 232. 246. 252. 255. 279. 314. 403. 423–424. 427. 723. 734. 757–758. 766. 790. 793. 800. 820–821. 829. 832.
- algebraische: S. 249–250. 266. 399. 412. 415. 421. 485–488. 492–493. 504. 508. 527. 563. 570–574. 723. 738. 741. 769. 820.
- höheren Grades: S. 250. 571.
- Anwendungen: S. 485–486. 504.
- Bildungsgesetz, Gleichung: S. 486. 555. 557. 563 bis 564. 570–573. 769.
- s. a. *aequatio. formula*. Gleichung. *regula. ratio*.
- Brennpunkt: S. 249. 250. 491. 491. 557.
- endlose: S. 31.
- endlicher Länge: S. 31.
- Evolute: S. 193–195. 199. 488.
- Quadratur: S. 195.
- Evolvente: S. 193–195. 199. 485. 487–488. 558.
- in der Geometrie zulässige: S. 476. 485–487. 492. 555–557. 570–571. 574.
- geschlossene: S. 31.
- Konstruktion: N. 38_{12–14}*. S. 476. 481–483. 555 bis 560. 820.
- analytische: S. 488. 557. 559.
- arithmetische: S. 696.
- durch Quadratur: S. 488.
- exakte: S. 484–485.
- Fadenkonstruktion: S. 488.
- geometrische: S. 485–486. 488. 557. 559.
- kontinuierliche: S. 484. 486–487. 555–556. 558. 561.
- optische: S. 560.
- physikalische: S. 558–59.
- punktweise: S. 484. 486–487. 557.
- semanalytische: S. 557.
- semigeometrische: S. 481.
- synthetische: S. 559.
- mechanische: S. 486–87. 696.
- physikalische: S. 487. 558–559.
- Pol: S. 557.
- quadrierbare: S. 251. 266. 410. 412–413. 476. 488. 527. 578. 757.
- Formeln: N. 38₅*. 38_{16–18}*. S. 525–527.
- Tafeln: N. 57₂*.
- Schnittpunktbestimmung: N. 20*.
- Segment: S. 251.
- spezielle
Abstände der Tangenten vom Scheitel bilden
summierbare Reihe: S. 200. 205.
- kubische: S. 487.
- Mediceische: S. 492.
- Ovale: S. 31.

| | |
|---|--|
| quadratische: S. 487. | <i>non geometrica</i> : S. 485. 493. |
| Zuwächse umgekehrt proportional zu Ordinaten: S. 561–562. 568. | <i>non transcendens</i> : S. 723. |
| Zuwächse umgekehrt proportional zu Quadranten der Ordinaten: S. 563–568. 570–571. 677. 677. | <i>nullius gradus</i> : S. 487. |
| s. a. Ellipse. Exponentialkurve. Fakultäten n!. Hyperbel. Kegelschnitte. Kettenlinie. Konchoide. Kosekans. Kreis. Logarithmus. Parabel. Quadratrix. Rollkurven. Sinus. Spirale. Versiera. Zissoide. Zykloide. | <i>omnium gradum</i> : S. 504. |
| Subnormale: S. 251. 423–427. 562. 564. 572. | <i>pantometra</i> : S. 504. |
| s. a. <i>reducta</i> . | <i>physica</i> : S. 487. |
| Subtangente: S. 251. 423–427. 472. 562–564. 570. 677. 677. 774–775. 774. 822. | <i>recta</i> : S. 36. 126. 371. 419. 482. 486. 560. 696. |
| s. a. <i>producta</i> . | <i>serpentina</i> : S. 491. |
| transzendenten: S. 266–267. 475–476. 485–487. 492–493. 504. 527. 571. 573–574. 696. | <i>tetragonistica</i> : S. 487. |
| Zentrum: S. 273–274. 347. 467. 490. 501. 505. 510. 557. | s. a. Gerade. Kurve. |
| s. a. <i>curva</i> . Extremwerte. <i>figura</i> . Figuren, geometrische. <i>linea</i> . Quadratur. Rektifikation. Tangenten. Tangentenmethode. Tangentenrechnung. | Lineal: S. 492. 509–510. |
| <i>latus</i> | <i>litera probatoria</i> : S. 628. |
| rectum: S. 491. 498. 502. 513–514. 766. | <i>locus</i> |
| transversum: S. 491. 502. 513. | <i>ad cycloidem</i> : S. 573. |
| Licht: S. 87. 229. 335. 527. 584. 723. | <i>ad lineam</i> : S. 556. |
| analytisches: S. 761. | <i>ad superficiem</i> : S. 556. 573. |
| Strahlen: S. 560. | <i>ad solidum</i> : S. 556. |
| <i>limes</i> : S. 207. | <i>intersectionis</i> : S. 249. |
| <i>linea</i> : S. 69. 74. 76. 97. 99. 211–212. 232. 246. 252. 279. 403. 476. 484. 504. 507. 556–557. 560. 737. 829. 832. | <i>linearis</i> : S. 485. |
| <i>analytica</i> : S. 485–488. 493. 504. | Logarithmus: N. 71*. S. 250. 251. 505. 475. 484 bis 487. 492. 496. 507–511. 527. 558–559. 574. 703. 729. 748. 751–752. 762–763. 783–785. 789 bis 790. 801. |
| <i>anonyma</i> : S. 496. | Konstruktion: S. 481. 496. 511. 558–559. 729. |
| <i>curva</i> : S. 91. 507. | Kurve: N. 71*. S. 250. 251. 267. 475. 484–487. 484. 492. 496. 507. 509–511. 527. 574. 751. |
| <i>geometrica</i> : S. 485–487. 492–493. | Ableitung: S. 527. 751. |
| <i>interminata</i> : S. 41. | Bogenlänge: S. 496. 511. |
| <i>involuta</i> : S. 491. | Gleichung: S. 751. |
| <i>logarithmica</i> : S. 484–487. 492. 507. 509–510. | Integral: S. 751. |
| <i>mechanica</i> : S. 486–487. | Quadratur: S. 251. 475. 751. |
| <i>naturalis</i> : S. 510. | Teilung: S. 251. |
| <i>non analytica</i> : S. 486–487. 493. 504. | Rechenoperationen: S. 511. 703. |
| | Reihe: S. 751. 785. 790. |
| | s. a. Hyperbel, Reihe. Hyperbel, Quadratur. |
| | Tafel: S. 783. |
| | s. a. <i>quasi logarithmus</i> . |
| | <i>logistica decimalis</i> S. 287. |
| | Luftdruck: S. 563. |
| | Magnetismus |
| | Deklinationstafeln: S. 252–253. 253. |
| | <i>magnitudo</i> s. Größe. |
| | Mechanik: S. 555. |

- mensura communis*: S. 261. 615. 698. 734.
mesolabum generale: S. 558.
 Methode, Methoden
 analytische: S. 571. 751. 783.
 Approximation: S. 105–106. 791–792.
 geometrische: S. 252. 395.
 Rechenmethoden
 Berechnung von Kubikzahlen: S. 46.
 Division: S. 391. 447.
 Rechnen mit Folgen, Produkten etc.: S. 36.
 Reduktion von Binomen in Nennern und Wurzeln: S. 218–219.
 Vermeidung von Fehlern: S. 623.
 semianalytische: S. 557. 571.
 synthetische: S. 250. 421. 587.
 von Collins s. Interpolation.
 von Descartes s. Algebra. Tangentenmethode.
 von Diophant s. Algebra.
 von Gregory: N. 20*. S. 64.
 von Heuraet s. Rektifikation.
 von Hippokrates zur Mündchenquadratur: S. 228.
 von Huygens zur Summation der reziproken Dreieckszahlen: S. 431.
 von Mercator s. Reihenentwicklung.
 von Saint-Vincent s. Hyperbel, Quadratur.
 von Sluse s. Tangentenmethode.
 von Wallis s. Induktion. Interpolation.
 s. a. Algebra. Beweis. Differenzmethode. Induktion. Interpolation. Konstruktion. *methodus. modus.* Quadratur. *ratio.* Reihen, Summation. Reihenentwicklung. Rektifikation. *scriptura universalis.* Tangentenmethode.
 Teilung. *via.* Zahlen, ganze.
methodus
 a priori sive per synthesin: S. 421.
 describendi: S. 251.
 demonstrandi: S. 218.
 determinandi: S. 65.
 dividendi: S. 447.
 divulsionum: S. 728. 820–821.
 extrahendi: S. 46.
 generalis: S. 102. 240. 251. 757. 768. 820. 821.
 geometrica: S. 252. 395.
 inquirendi: S. 102. 105. 633.
 inveniendi: S. 427.
 mirabilis: S. 46.
 purgandi: S. 240.
 revocandi: S. 386. 559.
 specialis supputationis: S. 36.
 uniformis: S. 587.
 universalis: S. 33. 36. 78. 105. 126. 250. 633.
 Mittel: S. 792.
 geometrisches: S. 697. 758.
 s. a. Proportionale, mittlere.
 harmonisches: S. 697–698. 716. 733. 758.
modus: S. 86. 91. 250. 252. 374. 391. 608. 758. 789.
 820. 835.
 analyticus: S. 571. 751.
 approquinandi: S. 792.
 componendi: S. 789.
 convergendi: S. 763.
 convertendi: S. 751.
 demonstrandi: S. 476.
 describendi: S. 557. 559.
 exprimendi: S. 733.
 extrahendi: S. 523.
 generalis: S. 763.
 inveniendi: S. 35–36. 45. 47. 90. 401. 674. 784.
 inquirendi: S. 757.
 medius inter aliquid et nihil: S. 206.
 ratiocinandi: S. 457.
 reperiendi: S. 375.
 resolvendi: S. 781.
 solvendi: S. 32.
 summandi: S. 128. 218. 421.
 tractandi: S. 787.
 Mündchen des Hippokrates s. Kreis.
 Moment: N. 38_{2–3}*. 38_{9–11}*. 40*. 42*. 45*. S. 192.
 266. 291–292. 426. 438–439. 441–442. 494–496.
 515. 517–518. 651. 651. 696. 702.
monas: S. 599. 601.
 Münzrechnung: S. 138. 138. 271. 271. 300. 300.
 Multinom: S. 207.
 Multiplikation: S. 4–5. 9. 31. 33. 36. 85–86. 93. 113.
 167. 207. 511. 538. 611. 615. 729. 783.
 fortgesetzte: S. 31. 113.
 unendliche: S. 85.
 n! s. Fakultäten.

- Näherungen: N. 26*. 32*. 34*. S. 33. 76. 105–106. 111. 283–284. 289–290. 376. 523. 723–726. 726. 730. 748. 766. 791–793. 808. 824–825. 828.
Methoden: S. 105–106. 791–792.
- Neunerprobe: S. 303. 307–309. 311. 354. 356. 543 bis 544. 544. 607. 612–614. 614. 623–624. 624. 628–630. 660.
s. a. *novenarius*.
- Notation: S. 54. 64. 151. 151. 249. 293. 315. 342. 346. 360. 361. 370. 386. 406–407. 629. 668. 724. 724. 734. 824. 827. 829. 830.
s. a. Integralrechnung, Symbole, Zeichen.
- novenarius*: S. 623. 628–629.
- Null s. Zahlen.
- numerus*
artificialis: S. 508.
integer: S. 57. 90. 445–447. 520.
invariabilis, *invariatus*: S. 274. 277. 451.
irrationalis: S. 98. 102. 240. 421. 444. 453. 504. 520.
purus: S. 98.
rationalis: S. 102. 488.
surdus: S. 98. 102. 240.
s. a. unendlich. Zahlen.
- Örter, geometrische: N. 20*. S. 485. 556–558. 573.
s. a. *locus*.
- Oktogon s. Polygon.
- omniscius*: S. 252.
- Optik: S. 486. 560.
- ordo numericus*: S. 48. 176–177. 747.
s. a. Zahlen, figurierte.
- Parabel N. 16*. 17*. 38_{12–14}*. S. 30–31. 229. 359. 421. 423–425. 479. 481–483. 555. 555. 558–560. 560–562. 568–570. 684. 738. 755. 793–794. 816. 821.
Brennpunkt: S. 491. 491. 500.
Evolute: S. 193.
Gleichung: S. 423. 424. 479. 684. 793. 816.
höhere: S. 30–31. 266. 305. 385. 407. 422. 434. 487–488. 709. 738. 752.
Cartesische: S. 483. 484.
Gleichung: S. 752.
- Heuraetsche (semikubische) Parabel: N. 16*. S. 359. 486–488.
Quadratrix: S. 488.
Rektifikation: S. 487. 487.
Trochoide: S. 486–487.
kubische: S. 193. 677.
mit irrationalen Exponenten: S. 487.
rationale: S. 709. 736–738.
Quadratur: S. 709.
Konstruktion: S. 559–560.
latus rectum: S. 491. 498.
latus transversum: S. 492.
Normale: S. 490. 498.
Subnormale: S. 423–425. 562.
Quadratur: S. 30. 194. 225. 246–247. 423–425. 709.
Rektifikation: S. 204. 219. 558–559.
Bogenlänge: S. 490–493. 495. 495. 500. 503.
Schwerpunkt: S. 495. 495.
Segment: S. 225.
Sehne: S. 482.
Streifen: S. 481–482. 504.
Tangente: N. 17*. S. 423–425. 561–562.
Subtangente: S. 423–425. 561–562.
Trochoide: N. 38_{12–14}*. S. 382. 383. 481–483. 485–489. 558–559.
Gleichung: S. 498–500.
s. a. *curva constructrix generalis*. *figura mesolaba*. *figura pantometra*. *linea pantometra*.
- Wurfparabel: S. 560–562.
s. a. Kegelschnitte.
- parabola*
cubica: S. 193. 486–488.
quadrato-cubica: S. 487.
secundi generis: S. 483. 484.
- Paraboloid
Oberfläche: S. 495.
- parameter*, *parametrum*: S. 250. 325.
- Partialsummen s. Folgen. Reihen.
- Pendelisochronismus: S. 558.
- Pentagon s. Polygon.
- Physik: S. 558.
- Pneumatik: S. 562–563.
- Polygon
ein-, umbeschriebenes: N. 50*. 60*. 63*. S. 105. 113. 126. 194. 199. 225–226. 250. 404–405. 524.

- Methode von Saint-Vincent: S. 757. 757.
 s. a. Kreispolygon.
 s. a. *polygonum*. Zahlen, figurierte.
- polygonum*
regulare: S. 757. 757.
regulatum: S. 691.
- Polynom
 Zerlegung in Faktoren: S. 391. 394. 465–466. 575. 583.
 s. a. Folgen, spezielle.
- Potenzen: S. 42. 64. 66. 76–78. 88. 100. 376. 407. 508. 725. 738. 783. 786. 796.
 s. a. Algorithmus. Folgen, spezielle. *potestas affecta*. Zahlen.
- potestas affecta*: S. 64. 738.
- Prisma: S. 195. 230–231. 398. 581.
- Probleme
 Algebra und Zahlentheorie: S. 109.
 algebraisch lösbar, nicht mit algebraischen Kurven konstruierbar: S. 504.
constructio aequationum: S. 483.
- Diophantische: S. 770–771.
 Sechsquadrateproblem: S. 10.
- Folgen und Reihen: N. 1*. 2*. 4*. 5*. 8*. 53₃*. S. 90–91. 109. 149. 252. 558. 699. 712. 712.
- Geometrie: S. 607.
 irreguläre: S. 558–559. 819.
- Komposition und Teilung von Verhältnissen: S. 504. 558.
- Kurven: N. 39*. S. 504. 676. 677.
 Quadratur: S. 252. 476. 573–574. 790.
- Rektifikation: S. 479.
- Lösung
 mittels Kreis und Gerade: S. 370. 371.
 mittels zweier Kreise: S. 370. 371.
 schwer zu konstruierende: S. 573.
 transzendent: S. 558.
 universelle: S. 126.
 zwei mittlere Proportionalen finden: S. 6.
- producta*: S. 251. 562–564. 570.
- productio*: S. 36.
- Produkt: S. 80. 100. 106. 142. 142. 673. 674. 677. 703. 739–740. 770. 803–804.
- Folgen: N. 29*. S. 31. 36. 48. 82. 86–87. 92–102. 149. 184. 184. 321. 323–324. 344. 703. 707. 810.
- Wallissches: N. 69*.
 s. a. Fakultäten.
- progressio*
affecta: S. 64.
- arithmetica*: S. 20–23. 26. 30. 37. 44. 75. 124. 132 bis 133. 239. 243–245. 292. 374–375. 415. 422. 431. 449–450. 533. 555. 607. 633. 698. 702. 708. 711. 716–717. 725. 727. 733. 734. 740. 818. 835.
- dupla*: S. 46–47.
naturalis, naturalium: S. 75. 175.
- rationalis*: S. 818.
- complicata*: S. 64. 67. 75. 81. 86. 97. 105–106. 113. 127.
- componens*: S. 37.
- crescens*: S. 66–67. 80. 89. 93. 97. 113. 127. 607.
- convergens*: S. 64.
- decrescens*: S. 50. 56. 60. 66–67. 69–70. 77–78. 80. 82. 84. 89–90. 93. 99. 106. 127. 208–209. 214. 239. 422.
- divergens*: S. 64. 75.
- evanescens*: S. 86–87. 91. 113.
- fundamentalis*: S. 48.
- geometrica*: S. 22. 26. 28. 36. 55. 63–65. 69–72. 74–78. 82–83. 85–89. 97. 99–101. 105. 113. 117. 208. 292. 328. 346. 386. 431. 492. 555. 705. 734. 757. 803.
- affecta*: S. 64.
- deformata*: S. 328.
- dupla*: S. 46–47. 65–67. 72. 89. 97. 431. 757.
- pura*: S. 64.
- quadrupla*: S. 431.
- secundaria*: S. 70. 82. 87.
- tripla*: S. 431.
- harmonica*: S. 68. 88. 107–109. 113–114. 116 bis 117. 119–120. 123–124. 129. 170. 255. 263. 271. 315. 320. 323–325. 327. 330. 336. 435. 588. 685. 691. 698–699. 700. 704. 708. 711. 715–717. 719. 722. 726–727. 731. 733. 748. 829.
- homologa*: S. 37. 45.
- interiecta*: S. 37.
- irreducta*: S. 30.
- numerica*: S. 555.
- parallela*: S. 37–38.

- perturbata*: S. 117.
primana: S. 22. 25.
primitiva: S. 699.
pura: S. 64. 84. 97.
quasi geometrica: S. 75.
reassumta: S. 70. 113.
recta: S. 117.
reducta: S. 30.
replicata: S. 557. 560.
secundana: S. 22–26.
summabilis: S. 205. 214. 219. 299. 588.
vera: S. 32.
s. a. Folgen. Reihen. *series*.
Proportion: S. 31. 66. 69. 76. 94. 221. 276. 484–485.
arithmetische: S. 599. 751. 803.
Satz von Sluse: S. 803.
geometrische: S. 218. 803.
harmonische: S. 116–117. 120. 130.
proportional: S. 31. 35. 126. 195. 559. 563. 572. 737.
829.
arithmetisch: S. 132. 803.
harmonisch: S. 119. 124.
reziprok: S. 561–563. 568.
Proportionale
dritte: S. 41.
mittlere: S. 41. 132. 194. 224. 225. 250. 251. 484.
558. 763.
zwei mittlere: S. 6. 486.
vierte: S. 41. 682.
s. a. Mesolabum.
proprietas essentialis: N. 73*.
Pyramide: S. 195. 230–231.
Quadrat: S. 21. 212. 226. 228–230. 239. 242. 280.
301. 318. 358. 365. 500. 500. 578. 737. 750. 794.
s. a. Zahlen.
Quadratfuß: S. 365.
Quadratrix: S. 264. 267. 313–314. 411. 424. 426.
475–476. 479–481. 487–488. 492–494. 496. 511.
518. 572–573. 768. 776. 821.
s. a. *curva homogenea*. *curva quadratrix*. *curva syntomas*. *figura homologa*. *figura homogenea*. *figura quadratrix*. *figura summatrix*. *figura sygnota*. *figura symmetros*. *linea tetragonistica*.
Quadratur: N. 38*. 40*. 572*. 60*. S. 30–31. 64. 91.
195. 205. 266. 313. 335. 346. 558. 572–574. 751.
757. 809. 819–821. 829.
absolute: S. 476.
algebraische: S. 485–486.
arithmetische: S. 749.
geometrische: S. 267. 485–486.
der Kreismöndchen (Hippokrates): S. 228.
Methoden: N. 21*. 61*. S. 91.
Exhaustionsmethode: S. 105–106. 250.
1. Methode von Leibniz: S. 250. 250. 251–252.
251.
2. Methode von Leibniz: S. 251–252. 251.
s. a. Transmutationssatz.
näherungsweise: S. 105–106. 283–285.
transzendent: S. 267.
Zurückführung auf Hyperbelquadratur: S. 801.
Zusammenhang mit Reihensummation: N. 38*.
40*. 50*. 71*. S. 30–31.
s. a. *dimensio*. Ellipse. Hyperbel. Kreis. Kurven.
Logarithmus. Parabel. Zyklide.
quantitas
realis: S. 645.
vera: S. 647.
s. a. Größe. Zahl, reelle.
quantum: S. 99.
quasi logarithmus: S. 508. 752.
radix
ageometrica: S. 523.
imaginaria: S. 373. 521–523.
impossibilis: S. 479. 521.
irrationalis: S. 383. 385. 820.
realis: S. 521. 523.
surda: S. 69. 253. 346.
s. a. Wurzeln.
ratio: S. 7. 12. 23. 31. 34–36. 39. 41. 45. 48–49. 55
bis 57. 59. 62–81. 83–91. 93–102. 106–107. 109.
113. 116–120. 123–128. 147. 149. 170. 173. 195.
197. 200. 206. 208–209. 211–212. 214. 216. 220
bis 222. 224. 226. 229–230. 232. 234. 236. 246.
251. 253. 259. 276. 278. 285–286. 288. 302. 324.
335. 342. 393. 462. 469. 479. 481. 485. 488. 490.
492. 499. 504. 507. 524. 527. 558. 561. 563. 565.
571. 584. 598–600. 601. 633. 671. 675. 696. 708.

715. 722. 729. 734. 740. 744. 746. 761. 767. 770.
 777. 787. 789. 793. 803–804. 821. 823. 824. 826.
autoris rerum: S. 486.
colligendi summam: S. 263.
commensurabilis: S. 335.
componendi: S. 106.
construendi: S. 97. 559.
convertendi: S. 792.
describendi: S. 486–487.
dividendi: S. 792.
eliminandi: S. 427.
enumerandi: S. 608.
faciendi: S. 46.
generalis: S. 599–600. 601.
geometrica: S. 70.
ineundi summam: S. 178. 235. 271.
inquirendi: S. 35.
inveniendi: S. 77.
probandi: S. 535.
quadrandi: S. 196.
rationis, rationum: S. 48. 66–67.
reducendi: S. 343. 558.
resolvendi: S. 520.
seu veritas de impossibilibus seu falsis: S. 69.
summandi: S. 77. 232. 344.
surda: S. 90.
vestigandi: S. 598–599. 601.
 s. a. Folge, Bildungsgesetz. Methode. Verhältnis.
 Raum: S. 427. 555. 560. 563.
 Rechteck: S. 25. 68. 92–94. 96–97. 126. 194–195.
 212. 224–225. 229. 237. 242–244. 246. 252. 273
 bis 275. 278. 311. 312. 341. 345. 358. 396–400.
 404–405. 421. 424. 441–442. 476–477. 480. 487.
 490. 497. 505–506. 513. 515. 561–563. 568–569.
 578–579. 585–587. 684. 692. 694. 696. 698. 702.
 737. 755. 775. 816. 822.
reducta: S. 251. 562. 572.
 Regeln
 Evoluten und Evolventen: S. 193. 195. 199.
 Flächenberechnung N. 61₁*. S. 30–31. 738–739.
 Kreispolygone: S. 762. 764.
 Kreissektor: S. 758.
 Folgen
 abnehmende: S. 68.
 Annäherung zweier Folgen: S. 33.
 Differenzen: S. 40. 89. 89. 91. 113. 165. 170.
 415.
 zusammengesetzte: S. 67. 127.
 konvergente (Gregory): S. 249.
 Momente: S. 396–400. 405–406. 441. 444.
 Näherungen: S. 33. 792.
 Proportionen: S. 221.
 Reihenentwicklung von Wurzeln: S. 519.
 Reihensummation
 Anwendung auf Quadraturen: S. 30–31.
 arithmetische Reihe: S. 243–44.
 geometrische Reihe: S. 64.
 harmonische Reihe: S. 729.
 reziproke figurierte Zahlen: S. 176–177. 729.
 Summation von Wurzeln: S. 450.
 Verhältnisse unendlicher Reihen: S. 584.
 von Pell s. Tangens.
 von Sluse s. Tangentenmethode.
 s. a. Folgen, Bildungsgesetz. Formeln. Kurven,
 Bildungsgesetz. Methode. Satz.
 Reihe, Reihen
 Abschätzung des Restes: S. 283–284. 283.
 alternierende: S. 65. 127. 205–209. 209. 214–216.
 272. 291–292. 305. 336. 403. 727. 730. 739
 bis 740. 789. 808. 828. 828.
 Bestimmung von Kurvenschnittpunkten:
 N. 20*.
 endliche: N. 73*. S. 68. 251. 253. 287. 289. 405
 bis 406. 405. 443. 445. 717. 720. 825.
 s. a. Satz.
 Partialsummen: S. 4. 12. 22–26. 37. 235. 250. 315
 bis 316. 323–324. 337. 389. 392. 436. 439. 445.
 528. 533. 609. 615–616. 621. 625–626. 633–634.
 810.
 s. a. Differenzenschema. *progressio secundana.*
 series summatrix.
 Rechenoperationen: N. 4*. S. 9.
 summierbare: N. 38₅*. 38_{16–18}*. 43*. 44*. S. 78.
 96. 205. 214. 219. 299. 394. 436. 438. 445. 458.
 527. 588. 801.
 s. a. *progressio summabilis. series summabilis.*
 Summation: N. 1*. 2*. 3*. 6*. 8*. 10*. 11*. 12*
 14*. 15*. 19*. 27*. 28*. 35*. 36*. 38*. 40*.
 41₂*. 42*. 43*. 44*. 45*. 48*. 50*. 53*. 53*.

- 55*. 57*. 59*. 68*. 70*. 71*. 72*. 73*. S. 30 bis 31. 33–34. 43–44.
- Divergenz: S. 52. 84. 103. 492. 511. 528.
- endliche Reihen: S. 251.
- geometrische Reihe: S. 64. 78–79. 218. Beweis der Summationsregel: S. 218.
- irrationale Reihen: S. 232. 421. 453. 456.
- Konvergenz: S. 7. 12. 65. 68. 96.
- Methoden
- Anwendung geometrischer Verfahren: N. 31*.
 - Aufzählung summierbarer Reihen: S. 608.
 - Differenzenmethode: S. 7. 12. 76. 95. 103.
 - Momentmethode: N. 38_{2–3}*. 40*. S. 404. 456–457. 466. 475–476. 578.
 - partielle: N. 38_{2–3}*. 387*.
 - rekursiv definierte Reihen: S. 819–821.
 - Summationsreihe: N. 38₂*. 43*. S. 393. 423. 432. 436. 439. 465. 471. 528–529. 533. 583. 594–595. 821.
 - unendliche Reihen: S. 128. 251. 819.
 - Zusammenhang mit inverser Tangentenmethode: N. 39*.
 - Zusammenhang mit Quadraturen: N. 38*. 39*. 40*. 50*. 71*. S. 30–31.
 - s. a. *series quadratrix. series summatrix.*
 - Umordnung: N. 4*. 12*. 15*. 38_{2–3}*. 38_{9–10}*. 40*. 43₃*. 45*. S. 120. 205. 222. 233. 271. 272. 272. 283–284. 331. 429–431. 728.
 - s. a. *doctrina. Folgen. progressio. scientia. series.*
 - Reihen, spezielle s. Folgen, spezielle.
 - Reihendivision: N. 72*. S. 36. 823.
 - Reihenentwicklung: N. 56*. 61*. 62*.
 - durch fortgesetzte Division durch Binome (Methode von Mercator): N. 38₂*. 49*. 58*. S. 111. 124. 124. 127. 127. 206–207. 214–219. 267–270. 288. 291. 294–299. 318. 327. 336. 357. 403. 464. 465. 468. 665. 702. 723–724. 817. 832–833. 835.
 - durch Umkehrung der Summenformel für geometrische Reihen: N. 38₂*. S. 464. 465. 473. 583.
 - durch Wurzelziehen aus Binomen und Polynomen: N. 32*. 33*. 62*. S. 127. 382. 382. 383. 385. 518–521. 208–209. 214–215. 518–523.
 - näherungsweise: S. 347.
 - Rektifikation: N. 16*. 24*. 25*. 26*. 34*. 46*. 61*. S. 64. 126. 204–205. 219. 226. 342. 382. 383. 479–481. 485–487. 487. 494–495. 514–518. 558 bis 560. 571–574.
 - Bogenelement: S. 199. 313–314. 316. 479–481. 493–496. 507. 511. 514–518. 572–573. 588. 754.
 - Bogenlänge: S. 195. 199. 226. 342. 479. 490–493. 495. 495. 500. 503. 754.
 - Methode: S. 126. 479. 487.
 - s. a. Ellipse. Hyperbel. Kegelschnitte. Kreis. Parabel. Zykloide.
 - relatio:* S. 251. 253–254. 325. 487. 492. 514. 555. 557. 563–566. 619. 769. 801. 822.
 - definita:* S. 32.
 - rescissa:* S. 277.
 - Rhombus: S. 41.
 - Rollkurven: S. 471. 485–488. 558. 571.
 - s. a. Parabel, Trochoid. *trochoides. volutae.* Zykloide.
 - Salpetergewinnung: S. 346. 347.
 - Satz, Sätze
 - Erfindung von N. 51*. 533*. S. 126–127. 167. 498. 564–565. 705. 751.
 - über Parabeln: S. 197. 569.
 - über Arithmetik des Unendlichen: N. 35*. 36*. S. 72. 76.
 - über binomische Formeln: S. 239.
 - über Differenzenschema: N. 4_{2–3}*. S. 67. 72. 74 bis 75. 76. 90. 157–159. 162–165. 245.
 - über Faktorisierung von Polynomen: S. 391. 391.
 - über Folgen
 - harmonische: S. 108–109. 123–124. 325.
 - Quadratzahlen: S. 245. - über Summen von Reihen
 - arithmetische: S. 20. 201. 243–246.
 - endliche: S. 405–406. 405.
 - geometrische: S. 71–72. 82–83.
 - reziproke Dreieckszahlen: N. 35*.
 - reziproke figurierte Zahlen: N. 36*. 533*

| | |
|---|---|
| <p>über Zahlen</p> <p>Kombinationszahlen: S. 739.</p> <p>natürliche Zahlen: S. 201.</p> <p>Kubikzahlen: S. 201.</p> <p>Polygonalzahlen: N. 41*.</p> <p>Quadratzahlen: S. 245.</p> <p>reziproke Dreieckszahlen: N. 35*.</p> <p>ungerade Zahlen: S. 245.</p> <p>von Apollonius: S. 126.</p> <p>von Archimedes: S. 126. 246.</p> <p>von Bressieu über Polygonalzahlen: S. 599–600.
600.</p> <p>von Fabri über Parabel und Sinus: S. 225. 225.</p> <p>von Gosselin über Kubus eines Binoms: S. 598
bis 599.</p> <p>von Pappus: S. 126.</p> <p>von Pell s. Tangens.</p> <p>von Pythagoras s. Dreieckslehre.</p> <p>von Ricci über Maxima und Minima: N. 65*.</p> <p>von Sluse über arithmetisch proportionale
Größen: S. 803. 803.</p> <p>s. a. Tafeln. Transmutationssatz. Zahlen.</p> <p>Schwerpunkt: S. 246. 360. 396. 442. 478. 480. 495.
495. 581–582. 581. 696.</p> <p>s. a. <i>centrum gravitatis</i>.</p> <p><i>scientia</i></p> <p><i>a pura ratiocinatione pendens</i>: S. 251.</p> <p><i>analyseos aequationumque</i>: S. 125.</p> <p>(Geometrie): S. 485.</p> <p><i>progressionum</i>: S. 32.</p> <p><i>scriptura universalis</i>: S. 125–126.</p> <p><i>scutella</i>: S. 228.</p> <p>Sechsseck s. Kreispolygon.</p> <p><i>sectio</i>: S. 792.</p> <p><i>anguli</i>: S. 111. 205. 251. 488. 757. 767.</p> <p><i>arcus</i>: S. 91. 111. 283.</p> <p><i>conica</i>: S. 776.</p> <p><i>curvae</i>: S. 559.</p> <p><i>in media et extrema ratione</i>: S. 524.</p> <p><i>rationis</i>: S. 251. 481. 488. 767.</p> <p><i>rectae</i>: S. 251. 524.</p> <p>s. a. Bogenteilung. Flächenteilung. Kegelschnitte. Kreisteilung. Logarithmus. Teilung. Verhältnisteilung. Winkelteilung.</p> | <p><i>series</i></p> <p><i>aequabilis</i>: S. 527.</p> <p><i>alternantes</i>: S. 214.</p> <p><i>arithmetica</i>: S. 254. 266. 325. 342. 408. 415. 435.
834.</p> <p><i>complicata</i>: S. 96. 254.</p> <p><i>confusa</i>: S. 252.</p> <p><i>convergens</i>: S. 64–65. 249. 558. 560. 757. 763.
789. 798. 799–801.</p> <p><i>crescens</i>: S. 75. 89. 93. 96. 451. 789.</p> <p><i>decrementalis, decrementorum</i>: S. 65. 719–720.</p> <p><i>decrescens</i>: S. 68. 72–73. 75. 78. 88–90. 93. 95.
98–99. 102–103. 162–163. 218. 283. 346. 403.
451. 454. 607. 789. 792. 819.</p> <p><i>differentialis</i>: S. 705.</p> <p><i>directa descendens</i>: S. 152. 162–165. 214. 259.
707.</p> <p><i>divergens</i>: S. 65.</p> <p><i>evanescens</i>: S. 9. 266. 720. 819.</p> <p><i>exhaustibilis</i>: S. 435.</p> <p><i>finita</i>: S. 68. 251. 253. 287. 289. 445. 717. 720.
825.</p> <p><i>geometrica</i>: S. 214. 254. 266. 283. 431.</p> <p><i>harmonica</i>: S. 136. 164. 258–259. 394–396. 405.
440. 444. 717–718. 720. 747.</p> <p><i>homologa</i>: S. 37. 45. 47.</p> <p><i>inaequabilis</i>: S. 492. 511. 527.</p> <p><i>incrementalis, incrementorum</i>: S. 65. 67. 588.
719–722.</p> <p><i>infinita</i>: S. 68. 75. 85. 93. 95. 150. 233. 251. 253.
342. 346. 351. 361. 383. 403. 523. 717. 748. 754.
768. 770. 783. 789–790. 792. 808. 821. 824. 829.</p> <p><i>interpolata</i>: S. 744–745.</p> <p><i>irrationalis</i>: S. 385. 608.</p> <p><i>irregularis</i>: S. 386.</p> <p><i>naturalis</i>: S. 75. 394.</p> <p><i>numerica</i>: S. 696.</p> <p><i>parallelia</i>: S. 170. 738. 744.</p> <p><i>perturbata</i>: S. 93.</p> <p><i>pura</i>: S. 98. 266. 283. 394. 608–609.</p> <p><i>quadratica</i>: S. 435.</p> <p><i>quadratrix</i>: S. 383. 387. 389. 391. 393. 423. 432.
436. 465. 471. 529. 583. 594–595. 615. 633. 821.</p> <p><i>rationalis</i>: S. 253. 608–609. 771. 773. 774. 789.
821.</p> |
|---|---|

- regularis*: S. 32. 40. 252–253.
replicata: S. 799–800. 819–820.
substitutrix: S. 757.
summabilis: S. 78. 96. 394. 436. 438. 445. 458. 588. 607–608. 615. 620. 632. 637. 801.
summatrix: S. 389. 392. 436. 439. 528. 533. 609. 615–616. 618. 621. 625–626. 633–634. 821.
transversa, transversalis: S. 152. 325. 435. 705.
ascendens: S. 162–65. 167. 258–261. 325.
descendens: S. 162–165. 259. 744–745.
triangularis: S. 395. 460–461. 532.
variabilis: S. 451.
vera: S. 808.
Wallisiana: S. 825.
s. a. Folgen. *progressio*. Reihen.
Sinus: S. 125. 225–227. 229. 252. 279. 302. 308–311. 313–314. 347. 358. 358. 480. 559. 572–573. 679. 760. 769. 793. 805–806.
Reihenentwicklung: S. 679. 793. 806.
Kurve: S. 314. 559. 760.
sinus rectus: S. 347. 805.
sinus versus: N. 66*. S. 274. 282. 306. 307. 308. 310–311. 805.
solidus: S. 32. 35. 195. 208. 247. 392. 398–399. 427. 442. 498. 556. 587.
speculatio: S. 252.
sphaera: S. 226. 228–232. 558. 737.
spira, spiralis: S. 31. 484–485. 487. 559.
s. a. *helix*. Spirale.
Spirale: S. 31. 199. 476. 484–485. 487. 559. 559. 571.
s. a. *helix*. *spira*.
Statik: S. 486.
subpotentia: S. 44.
substitutio: S. 59. 120. 371–373. 411. 425–426. 461. 504. 513–516. 521–522. 544. 547. 549. 553. 565 bis 566. 610. 614. 617–618. 621. 636. 646. 663. 698. 761. 769. 772. 780. 782. 786. 788. 797.
s. a. Gleichung.
Subtraktion: S. 5. 9. 33. 36–37. 40. 42. 50. 86. 89. 127. 206. 211. 403. 450. 511. 728.
imaginäre: S. 40.
unendliche: S. 9. 125. 206. 403.
- Summation, Summe s. Beweis. Folgen. Methode. Probleme. Reihen. Satz.
Symbol s. Notation.
synthesis: S. 76. 250. 421. 559. 562.
s. a. Methode.
- Tafeln
Interpolationen: N. 572*.
Kombinationen: N. 3*.
Logarithmen: S. 783.
magnetische Deklination: S. 252–253. 253.
quadrierbare Kurven: N. 572*. S. 408–410. 411 bis 416. 524–527. 528.
Sätze von Euklid, Archimedes, Apollonius, Pappus: S. 126.
trigonometrische: S. 310.
Ungleichungen: S. 670–675. 724.
s. a. Differenzenschema. Folgen.
- Tangens: N. 25*. 26*. 34*. S. 273–274. 671–672. 677. 760. 762.
Satz von Pell: S. 342. 342. 588–589. 588. 760.
Tangenten: N. 16*. 17*. 50*. S. 266–267. 273–274. 404. 419. 489. 490. 498. 504. 514. 516. 555. 561. 563. 567. 677.
Anwendung auf Zahlenreihen: N. 50*.
Definition: S. 200.
- Tangentenmethode: S. 427.
(Descartes): S. 424. 426–427. 485. 572–574.
Bestimmung einer Tangentialebene: S. 427.
(Sluse): S. 391. 415. 416. 419. 424–425. 822. 822.
inverse: N. 16*. 39*. 50*. S. 425. 427. 766. 800. 820. 832.
Zusammenhang mit Reihensummation: N. 39*. 50*. S. 832.
- Tangentenrechnung: S. 266–267. 293–294. 293. 312. 341. 419. 419. 423–427. 472. 514. 567. 570. 774. 774. 817–818. 832.
- Tangentialebene: S. 427.
- Teiler: S. 12. 36. 66. 125. 207. 283. 347. 396. 567. 583. 711. 790. 792. 831.
- binomischer: S. 207. 216–217. 219. 288.
gemeinsamer: S. 88. 416. 544.
rationaler: S. 567.
s. a. Maß, gemeinsames.
- Teilung: S. 76. 251. 792–793. 804. 816.

- fortgesetzte: S. 111.
 Methode: S. 111. 793.
 infinitesimal (Mercator): S. 128.
 mittels geometrischer Reihen: N. 7*.
 stetige: S. 524.
 s. a. Bogenteilung. Flächenteilung. Kreisteilung.
 Logarithmus. *sectio*. Verhältnisteilung. Winkelteilung. Zerlegung.
terminatio: S. 111. 249–250. 766. 799–800. 819.
tetragonismus: S. 288.
 s. a. Quadratur.
 Transmutationssatz: S. 251–252. 251. 566. 566.
 Trapez: S. 758–762. 800.
triangle, *triangulum* s. Dreieck.
trigonometria: S. 757.
 s. a. Dreieckslehre.
trilineum: S. 228–229. 737.
parabolicum: S. 197. 201. 405.
 Trinom: S. 207.
trochoeides: S. 481. 485–488. 571.
 s. a. Parabel, Trochoide.
- Überwärtsdivision s. Division.
 unendlich: N. 6*. 47*. S. 3. 5. 9. 31–32. 34. 36. 39.
 41. 43. 50. 111. 113. 117. 120. 124–126. 150. 158.
 162–165. 170. 196–197. 201. 206–207. 225. 229.
 236. 249. 271–272. 276. 282–283. 285. 292. 296.
 301. 351. 361–362. 377. 403. 435. 454. 468. 491.
 518. 520. 523. 527. 570. 584. 589. 607. 669. 671.
 693. 697. 714. 717. 720. 724. 729. 734. 754. 783
 bis 789. 792. 796. 810. 819. 823. 824.
 (Anzahl): S. 9. 52. 64. 65. 68. 72. 75–76. 79. 83.
 85–86. 89. 98. 101. 113. 126. 128. 141. 150–151.
 153. 158. 163–164. 184. 199. 212. 225. 231–233.
 251–253. 283. 299. 401. 450. 453. 481. 520. 556.
 588. 651. 709. 751. 763. 784. 789. 801. 819.
 s. a. *infinities infinitum*.
 (Größe): S. 52. 69. 75–76. 84. 86–87. 90. 97. 205.
 222. 228. 235. 238. 288. 305. 468. 605. 677.
 679. 709.
 $\frac{1}{0}$: N. 47*. S. 291. 684. 812.
 (klein): S. 65. 86. 252. 288. 313. 490. 528. 555.
 557. 560–561. 565. 588. 677. 761. 792–793.
 821. 824.
- s. a. Infinitesimalen.
 s. a. *aequatio infinita. arithmeticam infinitorum*.
arithmétique des infinis.
 Ungleichungen: N. 46*. 66*. S. 784. 786–789. 786.
 792–797. 825. 828.
 s. a. Folgen.
uninomium: S. 216.
unitas
constructionis: S. 252. 265. 293. 419.
repraesentatitiae: S. 381.
 Untersuchung: S. 57. 208. 280. 372. 392. 403. 560.
 563. 573. 786. 835.
 algebraische: S. 109.
 arithmetische: S. 57.
valor
absolutus: S. 285.
relativus: S. 277.
respectivus: S. 285.
 Verhältnis
 einfaches: S. 48.
 irrationales: S. 504.
 von Raum und Zeit: S. 555.
 zusammengesetztes: S. 48. 106. 128. 197.
 zwischen Endlich und Unendlich: S. 197.
 s. a. Proportion. *ratio*. *valor absolutus*. *valor respectivus*.
 Verhältnisrechnung: S. 30. 49. 111.
 Verhältnisteilung: S. 251. 481. 488. 504. 507. 524.
 767.
 s. a. *sectio*.
 Vermögen, menschliches: S. 90. 252. 571. 820.
 Versiera (Zykloziskoide): N. 23*. 58*. S. 292. 293
 bis 294. 305. 312–313. 388. 471–474. 475. 480.
 488. 496. 594. 636–637. 673–674. 701. 701. 769.
 795–796.
 s. a. *cissoeis nova*. *cyclocissoeis*. *figura anonyma*. *linea anonyma*.
 Verstand, menschlicher: S. 82. 785. 798.
via: S. 110. 229. 425. 569. 573. 581. 650. 673. 725.
 bis 726. 743. 748. 784. 793. 797.
analytica: S. 783.
 s. a. Methode.
 Vieleck s. Polygon.
vis: S. 555. 560–561. 563.

- elastica*: S. 558.
elaterii: S. 563.
 s. a. Kraft.
volutae: S. 476.
 Vorzeichen: S. 97. 108. 209. 292. 405. 413. 448–449. 523. 541. 566. 591. 637. 690. 775. 791. 792. 807.
 Doppel- und Mehrfachvorzeichen: S. 346. 360. 453.
 Währungsrechnung s. Münzrechnung.
 Wahrheitsprobe: S. 399.
 Wallissches Produkt: N. 69*. S. 792.
 Winkel: S. 197. 335. 405. 428. 498–499. 501. 510. 556–557. 559. 562. 600. 601. 649. 760.
 Kontingenzwinkel: S. 197.
 s. a. *figura angulorum*.
 Winkelfunktionen: S. 302.
 s. a. Kosekans. Kosinus. Sekans. Sinus. Tangens.
 Winkelteilung: S. 111. 205. 251. 488. 757. 767.
 näherungsweise: S. 111.
 universelle: S. 205. 488.
 Würfelverdopplung: S. 486. 520.
 Wurzeln: N. 32*. 33*. 62*. S. 4. 24–25. 30–31. 41 bis 48. 53. 66. 88. 94. 194. 196–197. 201. 211. 214–215. 218–219. 229–230. 239–240. 245. 286. 314. 324. 371. 373–376. 383. 385. 407–408. 424. 426. 427. 445–446. 448–452. 453–454. 456. 479 bis 481. 493. 510–511. 517–523. 526. 533. 544. 546–547. 553. 569. 571–573. 587. 592. 608. 611. 617. 633. 726. 740. 752. 770–771. 779–780. 808. 820.
 höhere: S. 44. 520.
 imaginäre: S. 373. 479. 521–523.
 s. a. *radix ageometrica*. *radix imaginaria*. *radix impossibilis*.
 irrationale: S. 69. 253. 346. 383. 385. 820.
 s. a. *radix irrationalis*. *radix surda*.
 kubische: S. 43. 46–48. 385. 523. 617.
 reelle: S. 521. 523.
 s. a. *radix realis*.
 Wurzelziehen: N. 32*. 33*. 62*. S. 41–46. 86. 127. 207. 214–215. 219. 382. 383. 445. 449. 456. 481. 511. 518–523. 544. 546–547. 553. 617. 653–654. 752. 770–771. 779–780.
- aus Binomen s. Reihenentwicklung.
 aus Folgen: S. 41–42.
 aus Logarithmen: S. 511.
 durch Substitution: S. 520–523.
 mittels unendlicher Reihen: N. 32*. 33*. 62*. S. 207. 382. 383. 481. 518–523.
 Kubikwurzeln: S. 46–48. 523. 617.
- Zahl, Zahlen
 Exponentialzahlen: S. 255. 511.
 figurierte: N. 3*. 30*. 36*. 53*: S. 48. 167. 176 bis 177. 685–686. 729. 736–737. 747–748.
 s. a. *ordines numerici*.
 Dreieckszahlen: N. 1*. 2*. 30*. 35*. 36*. 53*. S. 26. 47–48. 51–52. 141. 141. 175. 176. 191. 292. 321. 377. 380. 383. 390. 395. 405. 431. 436. 438–439. 445–446. 459–460. 527. 532 bis 533. 555. 593. 580–582. 601. 685–686. 729. 736–737. 740. 747.
 Kombinationszahlen: N. 3*. S. 707. 729. 738 bis 740. 742.
 Polygonalzahlen: N. 41*. S. 649–650. 649.
 Fünfeckszahlen: S. 600. 650–651. 650.
 s. a. Dreieckszahlen.
 Pyramidalzahlen: N. 30*. 53*. S. 10. 13. 51 bis 52. 141. 176. 292. 369. 380. 390. 431. 685 bis 686. 729. 736–737. 747–748.
 Triangulotriangularzahlen: N. 30*. 53*. S. 52. 369. 390. 431. 685–686. 736–737. 748.
 Triangulopyramidalzahlen: N. 30*. 53*. S. 52. 736–737.
 ganze: S. 57. 90. 170. 207. 259. 445–447. 520. 699. 708–709. 717. 722. 724–726. 729. 734. 738 bis 739. 808.
 Untersuchungsmethode: S. 446–447.
 harmonische: N. 8*. 9*. 12*. 14*. 22*. 27*. 29*. 29*. 30*. 383*. 3810*. 47*. 49*. 52*. 53*. 54*. 55*. 57*. N. 681*. 71* S. 10. 13. 68. 88. 107 bis 110. 134–137. 141. 164. 271.
 imaginäre: S. 510. 521–523. 647.
 irrationale: S. 98. 102. 240. 253. 410. 421. 444. 445. 448. 453–454. 456. 504. 520. 769–770. 820 bis 822.
 konstante: S. 274. 277. 451. 456. 607. 636. 691. 751. 778–779. 785–786. 820. 834.

- Kontrollzahlen: S. 543. 626.
 natürliche: S. 3. 22. 25. 31. 43. 46. 48. 75. 176.
 194. 196. 201. 254. 294. 361. 380. 448. 450. 456.
 507–508. 510–511. 527. 578. 580–582. 685. 719.
 726.
 gerade: S. 113. 726.
 ungerade: S. 25. 245. 405. 450. 579. 594–595.
 726. 817.
 negative: S. 40. 69. 90. 205. 403. 450. 503. 517
 bis 518. 523. 533. 536. 722. 792.
 Null: S. 69. 90. 93. 205. 357. 407. 416. 503. 523.
 528. 533. 535. 628. 677. 724. 740. 744–745.
 positive: S. 445. 450. 517. 523. 724. 780–781. 788.
 792.
 Potenzen: S. 30. 41–44. 48. 64. 66. 76–78. 88.
 100. 106. 125. 127. 276. 283. 290. 346. 352. 376.
 407. 422. 436. 444. 508. 593. 672. 679. 695. 724
 bis 725. 730. 734. 738. 748. 751. 783–786. 788.
 796. 820. 823.
 Quadratzahlen: S. 21–25. 31. 43–44. 48. 55.
 76. 131. 166–167. 167. 175. 187. 191–192.
 197–198. 201. 225. 227. 236. 245. 265. 317
 bis 318. 324. 357. 405. 435. 445–446. 452.
 555. 555. 580–581. 583. 632. 699. 729. 740.
 Kubikzahlen: S. 43–44. 55. 76. 194. 198. 201.
 376–379. 592. 598–599. 729.
 rationale: S. 98. 102. 253. 456. 488. 526. 567. 573
 bis 574. 588. 607. 651. 738. 769–771. 773. 774.
 818. 821–823.
- reelle: S. 645. 647.
 s. a. Folgen. Größen. *numerus. quantitas.* Reihen. unendlich.
 Zeichen: S. 125–126. 142. 142. 150–151. 151.
 249. 366. 406–407. 508. 572–573. 583. 634.
 715. 724. s. a. *charactère analytique.* Notation.
 Vorzeichen.
 Zeit: S. 69. 99. 484. 555.
 Zeitpunkt: S. 99. 560.
 Zeitraum: S. 560.
 Zerlegung: S. 21. 23. 283. 387–388. 520. 527. 728.
 770. 780–781. 801. 819–821.
 Methode: S. 819–820.
 s. a. Gleichung, Zerlegung. Reihen, Umordnung.
 Teilung.
 Zissoide: S. 485. 572.
 zona: S. 228–229. 481–483. 504.
 Zykloide: S. 193. 195. 199. 476. 483. 485–488. 492.
 502. 557–558. 571–573.
 Epizykloide: S. 486.
 Quadratur: S. 572.
 Zyklozissoide s. Versiera.
 Zylinder: S. 226–227. 228–231. 291–292. 384. 392.
 395. 438–439. 456–457. 460. 466. 473. 559. 563.
 Oberfläche: S. 229. 559.

HANDSCHRIFTENVERZEICHNIS

FUNDSTELLEN

Verzeichnet sind hier die im vorliegenden Band edierten Hand- und Druckschriften, geordnet nach Fundorten und Signaturen.

HANNOVER, *Niedersächsische Landesbibliothek*

| | | | | | | | |
|----------|------|-------------|---------------------|---------|-----|-------------|---------------------|
| LH 4 | V 10 | Bl. 58 | N. 47 | LH 35 | V 4 | Bl. 28–29 | N. 38 ₁₅ |
| | | Bl. 63 | N. 65 | | | Bl. 30–31 | N. 38 ₁₆ |
| LH 35 | I 17 | Bl. 16 | N. 7 | | | Bl. 32–33 | N. 38 ₁₇ |
| | II 1 | Bl. 80+124 | N. 26 | | | Bl. 34–36 | N. 38 ₁₈ |
| | | Bl. 93–94 | N. 23 | V 6 | | Bl. 12–13 | N. 22 |
| | | Bl. 125 | N. 58 | V 7 | | Bl. 1 | N. 50 |
| | | Bl. 161–162 | N. 24 | V 14 | | Bl. 15 | N. 65 |
| | | Bl. 179 | N. 63 | | | Bl. 16 | N. 71 |
| | | Bl. 205–206 | N. 5 | VIII 4 | | Bl. 1 | N. 43 ₁ |
| | | Bl. 237–238 | N. 21 | | | Bl. 2 | N. 43 ₂ |
| | | Bl. 246–247 | N. 34 | | | Bl. 3 | N. 43 ₃ |
| | | Bl. 248–249 | N. 25 | | | Bl. 4–5 | N. 44 ₁ |
| | | Bl. 291–292 | N. 19 | | | Bl. 6–7 | N. 44 ₂ |
| III B 10 | | Bl. 1 | N. 35 | | | Bl. 8 | N. 44 ₃ |
| | | Bl. 2–3 | N. 12 | VIII 27 | | Bl. 1 | N. 53 ₃ |
| | | Bl. 4 | N. 11 | | | Bl. 2 | N. 53 ₂ |
| | | Bl. 5 | N. 1 | VIII 30 | | Bl. 43 | N. 57 ₁ |
| IV 17 | | Bl. 10–11 | N. 41 ₂ | | | Bl. 100 | N. 70 |
| V 2 | | Bl. 3–4 | N. 39 | | | Bl. 144–145 | N. 68 ₁ |
| V 3 | | Bl. 5 | N. 36 | | | 144–145 | N. 68 ₂ |
| V 4 | | Bl. 1+37 | N. 38 ₁ | | | Bl. 146 | N. 67 |
| | | Bl. 2–3 | N. 38 ₂ | XII 1 | | Bl. 1 | N. 59 |
| | | Bl. 4–5 | N. 38 ₃ | | | Bl. 7 | N. 69 |
| | | Bl. 6–7 | N. 38 ₄ | | | Bl. 9–10 | N. 56 |
| | | Bl. 8–9 | N. 38 ₅ | | | Bl. 9–10 | N. 57 ₂ |
| | | Bl. 10–11 | N. 38 ₆ | | | Bl. 24 | N. 61 ₁ |
| | | Bl. 12–13 | N. 38 ₇ | | | Bl. 25 | N. 61 ₁ |
| | | Bl. 14–15 | N. 38 ₈ | | | Bl. 25 | N. 61 ₂ |
| | | Bl. 16–17 | N. 38 ₉ | | | Bl. 29 | N. 61 ₂ |
| | | Bl. 18–19 | N. 38 ₁₀ | | | Bl. 32 | N. 31 |
| | | Bl. 20–21 | N. 38 ₁₁ | | | Bl. 45–46 | N. 3 |
| | | Bl. 22–23 | N. 38 ₁₂ | | | Bl. 129–136 | N. 6 |
| | | Bl. 24–25 | N. 38 ₁₃ | | | Bl. 137 | N. 9 |
| | | Bl. 26–27 | N. 38 ₁₄ | | | Bl. 138–139 | N. 14 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------------|---------|----------|-------|-------------|--------|
| LH 35 | XII 1 | Bl. 140–143 | N. 13 | LH 35 | XII 2 | Bl. 135 | N. 45 |
| | | Bl. 144–145 | N. 44 | | | Bl. 150 | N. 73 |
| | | Bl. 146–147 | N. 43 | | | Bl. 163–164 | N. 6 |
| | | Bl. 148–149 | N. 41 | | | Bl. 165–166 | N. 8 |
| | | Bl. 150–153 | N. 42 | | | Bl. 197–198 | N. 2 |
| | | Bl. 243–244 | N. 54 | | | Bl. 206–207 | N. 18 |
| | | Bl. 245–246 | N. 28 | | | Bl. 208–209 | N. 15 |
| | | Bl. 245–246 | N. 30 | | | Bl. 210–211 | N. 172 |
| | | Bl. 247–248 | N. 27 | | | Bl. 218 | N. 171 |
| | | Bl. 250 | N. 531 | XIII 1 | | Bl. 223–224 | N. 40 |
| | | Bl. 251–252 | N. 29 | | | Bl. 228 | N. 42 |
| | | Bl. 253 | N. 55 | XIII 3 | | Bl. 227–228 | N. 16 |
| | | Bl. 254 | N. 52 | | | Bl. 265 | N. 72 |
| | | Bl. 255 | N. 492 | XIV 1 | | Bl. 102–103 | N. 62 |
| | | Bl. 256 | N. 491 | | | Bl. 117 | N. 48 |
| | | Bl. 311 | N. 64 | | | Bl. 119 | N. 32 |
| | | Bl. 328–329 | N. 8 | | | Bl. 120–121 | N. 33 |
| | | Bl. 346–347 | N. 60 | | | Bl. 122 | N. 66 |
| XII 2 | | Bl. 62 | N. 3816 | | | Bl. 258–259 | N. 37 |
| | | Bl. 88 | N. 20 | | | Bl. 305 | N. 46 |
| | | Bl. 119 | N. 51 | | | | N. 411 |
| | | Bl. 123–124 | N. 173 | Nm-A 317 | | | N. 28 |
| | | Bl. 131–132 | N. 10 | Nm-A 605 | | | |

Cc-2-KONKORDANZ

Verzeichnet sind hier die Nummern der im *Catalogue critique* 2 erfaßten Stücke mit Angabe der ihnen entsprechenden Stücke des vorliegenden Bandes. Fünf der ersten acht hier aufgeführten Schriften wurden im *Catalogue critique* 2 nicht erfaßt, drei (N. 28, 3816, 65) nur teilweise. Steht hinter einer Cc-2-Nr.: tlw., so heißt dies, daß das bezeichnete Stück in diesem Band nicht vollständig abgedruckt ist.

| Cc 2 Nr. | N. | Cc 2 Nr. | N. | Cc 2 Nr. | N. | Cc 2 Nr. | N. |
|----------|------|----------|----|----------|----|----------|-----|
| — | 9 | 437 | 10 | 517 | 35 | 615 | 18 |
| — | 20 | 510 A | 43 | 518 | 3 | 627 | 16 |
| — | 28 | 510 B | 44 | 526 | 8 | 629 | 171 |
| — | 3816 | 510 C | 41 | 527 | 6 | 630 | 173 |
| — | 411 | 510 D | 42 | 528 | 8 | 633 | 24 |
| — | 63 | 511 | 5 | 529 tlw. | 8 | 634 | 24 |
| — | 65 | 512 | 14 | 530 tlw. | 2 | 640 | 172 |
| — | 69 | 513 A, B | 13 | 554 | 25 | 694 | 21 |
| 278 | 12 | 514 | 1 | 556 | 26 | 755 | 36 |
| 279 | 11 | 515 | 19 | 557 | 23 | 756 | 412 |
| 280 | 15 | 516 | 31 | 558 | 23 | 775 A | 381 |

| Cc 2 Nr. | N. | Cc 2 Nr. | N. | Cc 2 Nr. | N. | Cc 2 Nr. | N. |
|----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| 775 A | 38 ₂ | 777 | 46 | 1186 | 50 | 1412 | 58 |
| 775 A | 38 ₃ | 778 | 34 | 1206 | 48 | 1425 tlw. | 59 |
| 775 A | 38 ₄ | 820 | 39 | 1207 | 66 | 1453 A–B | 60 |
| 775 A | 38 ₅ | 892 | 43 | 1210 | 70 | 1455 | 64 |
| 775 A | 38 ₆ | 920 A | 44 ₁ | 1239 | 22 | 1458 | 61 ₁ |
| 775 A | 38 ₇ | 920 A | 44 ₂ | 1303 | 54 | 1459 A–B | 61 ₂ |
| 775 A | 38 ₈ | 920 B | 44 ₃ | 1334 tlw. | 55 | 1459 C | 61 ₂ |
| 775 A | 38 ₉ | 929 | 45 | 1335 | 29 | 1459 C | 61 ₁ |
| 775 A | 38 ₁₀ | 1030 | 33 | 1336 | 53 ₃ | 1467 | 32 |
| 775 A | 38 ₁₁ | 1036 | 37 | 1337 | 53 ₂ | 1468 | 62 |
| 775 A | 38 ₁₂ | 1139 | 65 | 1340 | 49 ₁ | 1511 | 68 ₂ |
| 775 A | 38 ₁₃ | 1140 | 71 | 1341 | 51 | 1512 | 68 ₁ |
| 775 A | 38 ₁₄ | 1180 tlw. | 53 ₁ | 1398 | 57 ₂ | 1513 | 67 |
| 775 A | 38 ₁₅ | 1181 | 49 ₂ | 1399 | 56 | 1514 | 42 |
| 775 A | 38 ₁₆ | 1182 | 28 | 1400 | 57 ₂ | 1515 A | 73 |
| 775 A | 38 ₁₇ | 1183 | 30 | 1401 | 57 ₂ | 1542 | 72 |
| 775 B, C | 38 ₁₈ | 1184 | 27 | 1403 | 57 ₁ | 1549 | 7 |
| 776 | 40 | 1185 | 52 | 1408 | 47 | | |

Die Entsprechung von Stücknummer und Cc-2-Nummer ist in der Überlieferung des jeweiligen Stücks vermerkt.

ERWÄHNTE LEIBNIZ-HANDSCHRIFTEN

Dieses Verzeichnis erfaßt die in den Überlieferungen und Erläuterungen erwähnten nicht edierten Handschriften. Es ist nach Cc-2-Nummern und Handschriftensignaturen geordnet und verweist auf die Seiten des vorliegenden Bandes.

| Cc 2, Nr. | LH, Nr. | S. | Cc 2, Nr. | LH, Nr. | S. | | |
|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|
| 282 | 35 III A 8 | Bl. 27 | 30. | 823 | 35 V 2 | Bl. 1 | 555. 571. |
| 436 | 35 XII 2 | Bl. 131–132 | 131. | 824 | 35 V 2 | Bl. 2 | 571. |
| 484 A | 35 XV 6 | Bl. 64–65 | 30. | 827 | 35 I 17 | Bl. 11–15, 17 | 558. 559. |
| 484 B | 35 XV 6 | Bl. 66–73 | 30. | 828 | 35 V 3 | Bl. 13–14 | 498. 559. |
| 486 B | 37 III | Bl. 107–112 | 30. | 829 | 35 V 3 | Bl. 15 | 559. |
| 486 C | 37 III | Bl. 97–98 | 30. | 831 | 35 XII 1 | Bl. 226–227 | 560. |
| 486 D | 37 III | Bl. 99–103 | 30. | 832 | 35 V 3 | Bl. 1–4 | 555. 555. |
| 500 | 35 XII 2 | Bl. 113 | 225. 803. | | | | 560. 568. |
| 519 A | 35 XII 1 | Bl. 45–46 | 17. | 833 | 35 V 3 | Bl. 7 | 560. |
| 543 | 35 XII 2 | Bl. 62 | 528. | 835 | 37 V | Bl. 215 | 558. |
| 544 | 35 XV 1 | Bl. 18–23 | 250. | 839 | 35 VIII 30 | Bl. 162–163 | 571. |
| 545 A | 35 II 1 | Bl. 314 | 251. 566. | 1102 | 35 II 1 | Bl. 105–198 | 572. 758. |
| 545 B | 35 II 1 | Bl. 261–262 | 251. 566. | | | | 759. |
| 546 | 35 II 1 | Bl. 252–253 | 251. 566. | 1233 A | 35 II 1 | Bl. 87–92 | 255. 271. |
| 549 | 35 XIII 1 | Bl. 353–354 | 249. | | | | 275. 282. |
| 555 A | 35 II 1 | Bl. 257–260 | 284. 300. | | | | 283. |
| | | | 342. | 1237 | 35 V 6 | Bl. 12–13 | 255. 282. |
| 559 | 35 II 1 | Bl. 93–94 | 264. | | | | 288. |
| 563 | 35 II 1 | Bl. 240–241 | 255. 271. | 1238 | 35 V 6 | Bl. 12–13 | 255. |
| | | | 275. 282. | 1383 A, B | 35 II 1 | Bl. 74–75 | 735. 735. |
| | | | 283. | | | | |
| 575 | 35 VIII 3 | Bl. 1–8 | 251. | 1384 | 35 II 1 | Bl. 67+69 | 735. 735. |
| 608 | 35 II 1 | Bl. 284 | 293. | 1449 | 35 XIII 1 | Bl. 433 | 768. |
| 609 | 35 XII 2 | Bl. 125–126 | 193. 195. | 1456 | 35 XII 1 | Bl. 311 | 799. |
| 612 | 35 II 1 | Bl. 263–264 | 313. 495. | 1502 A, B | 35 XII 1 | Bl. 182 | 681. |
| 616 | 35 VIII 30 | Bl. 150 | 416. | 1515 B | 35 XII 2 | Bl. 150 | 834. |
| 773 | 35 V 5 | Bl. 1–2 | 420. | 1516 | 35 XII 2 | Bl. 150 | 834. |
| 822 | 35 V 2 | Bl. 5–6 | 555. 555. | — | 35 II 1 | Bl. 68–73 | 735. |
| | | | 562. | — | 35 XIII 1 | Bl. 391 | 731. |

SIGLEN, ABKÜRZUNGEN, ZEICHEN, BERICHTIGUNGEN

1. SIGLEN UND EDITORISCHE ZEICHEN

| | |
|--|--|
| <i>E, E¹</i> | Erstdruck |
| <i>E² ...</i> | weitere handschriftengestützte Drucke |
| <i>L</i> | Leibniz, eigenhändig |
| <i>LiH</i> | Leibniz' eigenhändige Bemerkungen in einem Handexemplar |
| <i>LuT</i> | Leibniz gemeinsam mit Tschirnhaus, eigenhändig |
| <i>LuX</i> | Leibniz gemeinsam mit Unbekanntem, eigenhändig |
| <i>T</i> | Tschirnhaus, eigenhändig |
| <i>X</i> | Unbekannter, eigenhändig |
| <i>[]</i> | in der Datierung: erschlossenes Datum,
im Text: Ergänzungen und Eingriffe des Herausgebers (ursprüngliche Form
im Variantenapparat). |
| <i>()</i> | Vereinzelt gebraucht Leibniz selbst eckige Klammern (Hinweise darauf
im Erläuterungsapparat). |
| <i>(-)</i> | Konjektur schwer lesbarer oder durch Beschädigung des Textzeugen
ausgefallener Wörter bzw. Wortteile. |
| <i>Kursivierung</i> | nicht entziffertes bzw. durch Beschädigung ausgefallenes Wort; die
Anzahl der Striche entspricht der Anzahl der vermuteten Wörter. |
| <i>S p e r r u n g</i> | Zitate, Buchtitel, Text in anderer als der Grundsprache des
betreffenden Stückes. |
|  | Hervorhebungen durch Leibniz |
|  | Umrahmungen durch Leibniz zur Hervorhebung eines Terms oder zur
Ausgliederung eines Textabschnittes aus dem Textzusammenhang |
|  | Umrahmungen durch Leibniz zur Kennzeichnung wegfallender Terme |

2. ABKÜRZUNGEN (allgemein)

| | | | |
|-------------|--------------------|---------------|--|
| a. | auch | ersch. | erschienen |
| a. a. O. | am angegebenen Ort | gedr. | gedruckt |
| aeq., aequ. | aequalis, aequatio | gestr. | gestrichen |
| Anm. | Anmerkung | Hrsg. (hrsg.) | Herausgeber (herausgegeben) |
| Aufl. | Auflage | i. a. | im allgemeinen |
| Bd(e) | Band (Bände) | Jh. | Jahrhundert |
| Bl. | Blatt | LBr. | HANNOVER, <i>Niedersächs.</i>
<i>Landesbibl.</i> Leibniz-Brief-
wechsel |
| Bog. | Bogen | LH | HANNOVER, <i>Niedersächs.</i>
<i>Landesbibl.</i> Leibniz-Hand-
schriften |
| bzw. | beziehungsweise | lib. | liber |
| ca | circa | | |
| cap. | capitulum | | |
| ebd. | ebenda | | |
| erg. | ergänzt | | |
| Erl. | Erläuterung | | |

| | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|--|
| Marg. | Marginalie(n) | s. u. | siehe unten |
| Ms. | Manuskript | SV. | Schriftenverzeichnis |
| N., Nr. | Nummer | Tl(e) | Teil(e) |
| Nachdr. | Nachdruck | tlw. | teilweise |
| NB. | nota bene | u. a. | und andere, unter anderem |
| P., pag. | pagina | u. d. T. | unter dem Titel |
| probl. | problema | Übers. (übers.) | Übersetzung (übersetzt) |
| prop. | propositio | u. ö. | und öfter |
| R. | responsio, respondetur | v. | von, vor |
| r ^o | recto | Var. | Variante |
| reg. | regula | vgl. | vergleiche |
| S. | Seite | v ^o | verso |
| s. | sectio, siehe | Z. | Zeile |
| s. a. | siehe auch | § | destilletur, distilletur
(noch zu bedenken); denier |
| s. o. | siehe oben | | |
| Sp. | Spalte | | |

3. ABKÜRZUNGEN (Schriften)

- Cc 2 *Catalogue critique des manuscrits de Leibniz. Fascicule II (Mars 1672 – Novembre 1676)*. Hrsg. A. Rivaud u. a. Poitiers 1914–1924.
- DGS *Geometria, a Renato Descartes anno 1637 gallice edita . . . in latinam linguam versa et commentariis illustrata opera atque studio Francisci a Schooten*. 2. Aufl. 2 Tle. Amsterdam 1659–1661 (= SV. N. 13,2).
- DO DESCARTES, R., *Oeuvres*. Hrsg. Ch. Adam u. P. Tannery. 12 Bde. Paris 1879–1910; 2. Aufl. ebd. 1964–1972.
- GO GALILEI, G., *Opere*. Edizione Nazionale. 20 Bde. Florenz 1890–1909; Nachdr. ebd. 1929–1939 u. ö.
- GT *James Gregory tercentenary memorial volume*. Hrsg. H. W. Turnbull, London 1939 (= SV. N. 46).
- HO HUYGENS, Chr., *Oeuvres complètes*. Hrsg. D. Bierens de Haan, J. Bosscha u. a. 22 Bde. Den Haag 1888–1950.
- HOL HOBbes, Th., *Opera philosophica quae latine scripsit omnia*. Hrsg. W. Molesworth. 5 Bde. London 1839–1845; Nachdr.: Aalen 1961.
- KW KEPLER, J., *Gesammelte Werke*. Hrsg. von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München. — Im Erscheinen.
- LBG *Der Briefwechsel von Gottfried Wilhelm Leibniz mit Mathematikern*. Hrsg. C. I. Gerhardt. Berlin 1899.
- LFC *Opuscules et fragments inédits de Leibniz*. Hrsg. L. Couturat. Paris 1903; Nachdr.: Hildesheim 1961 u. 1966.
- LKK *Die mathematischen Studien von G. W. Leibniz zur Kombinatorik*. Textband. Hrsg. E. Knobloch = *Studia Leibnitiana Supplementa*. Bd. XVI. Wiesbaden 1976 (= SV. N. 49,1).
- LMG *Leibnizens mathematische Schriften*. Hrsg. C. I. Gerhardt. 7 Bde. Berlin, Halle 1849–1863; Nachdr.: Hildesheim 1962 u. 1971.

- LQK* LEIBNIZ, G. W., *De quadratura arithmeticâ circuli ellipseos et hyperbolae cujus corollarium est trigonometria sine tabulis*. Hrsg.: E. Knobloch. Göttingen 1993.
- LSB* LEIBNIZ, G. W., *Sämtliche Schriften und Briefe*. Hrsg. von der Göttinger und der Berliner Akademie der Wissenschaften, Berlin — Im Erscheinen.
- OC* OLDENBURG, H., *The Correspondence*. Hrsg. A. R. Hall u. M. Boas Hall. 13 Bde. Madison [usw.] 1965–1986.
- PO* PASCAL, Bl., *Oeuvres*. Hrsg. P. Bourroux u. a. 14 Bde. Paris 1904–1914; Nachdr.: Vaduz 1965.
- VO* VIÈTE, Fr., *Opera mathematica, opera atque studio Fr. a Schooten*. Leiden 1646; Nachdr.: Hildesheim 1970 (= SV. N. 43).
- WO* WALLIS, J., *Opera mathematica*, 3 Bde, Oxford 1693–1699; Nachdr.: Hildesheim 1972.

4. MATHEMATISCHE ZEICHEN

Im folgenden werden die heute ungebräuchlichen Bezeichnungen erklärt, soweit sie nicht unmittelbar aus dem Kontext folgen bzw. im einzelnen erklärt sind. Für weitere Einzelheiten vgl. die Einleitung S. XXVIII–XXXIII.

Zahlreiche Beispiele und eine tabellarische Übersicht von Leibniz' mathematischen Bezeichnungsweisen gibt F. CAJORI, *Leibniz the master builder of mathematical notation* (in: *Isis* 7 (1925) S. 420–429) bzw. F. CAJORI, *A history of mathematical notation*, Bd. 2 S. 189–196 (La Salle, Ill. 1929 u. ö.).

| | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|----------------------|
| ~ | | Multiplikation | $a \cdot b : c \cdot d$ | Proportion |
| \times | | Überkreuzmultiplikation | | Kürzung eines Bruchs |
| ~ | | Division | f | facit |
| \propto | | Division, Proportion | Platzhalter: | |
| $\square, \boxed{2}$ | | Quadrat | * | ausfallende Terme |
| cub, $\boxed{3}$ | | Kubus | * | Vorzeichen |
| Rq, $\boxed{\frac{1}{2}}$ | | Quadratwurzel | ... | Terme |
| aeq., aequ. | | gleich | : | Terme |
| \equiv | | gleich | • | Terme |
| \equiv | | gleich (Summe) | Wiederholung: | |
| \succ, \sqsupset | | größer als | .. | Faktoren |
| \succ | | etwas größer als | \div | Brüche |
| \prec | | kleiner als | Tschirnhaus: | |
| \prec | | etwas kleiner als | \wp | gleich |
| | | | $a \overline{\parallel} b \overline{\parallel} c \overline{\parallel} d$ | Proportion |

5. BERICHTIGUNGEN

VII, 1:

S. 65 Z. 24: *Statt article 42 ... entnommen lies article 40 S. 115 entnommen*S. 78 Z. 25: *Statt 1959 lies 1659*S. 105 Z. 35: *Statt N. 106 lies N. 106 §73 sowie H. FABRI, Synopsis geometrica, 1669, S. 497 f. Die Aufgabenstellung hat Leibniz dort unterstrichen.*S. 148 Z. 24–26: *Statt Es scheint ... DGS I, S. 207 lies Geometria, DGS I, 1659, S. 66*S. 184 Z. 5: *Statt sxx + gx + r lies pxx + qx + r*S. 185 Z. 18 f.: *Statt x die des lies x die Apotome des*

$$\begin{aligned} \text{S. 224 } & \text{Ergänze Erl. zu Z. 7–9: Richtig müßte es } 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10} \text{ etc. } = 2 \text{ bzw. } a + \frac{1}{3}a + \frac{1}{6}a + \frac{1}{10}a \text{ etc.} \\ & = 2a \text{ heißen.} \end{aligned}$$
S. 246 Z. 10: *Statt quadratos ut lies quadratos (puto numeros) ut und streiche die zugehörige Lesart.*S. 246 Z. 20: *Statt l'anse lies l'ange*S. 250 Z. 17: *Statt Der Sinn ... Verweis lies s. R. DESCARTES, Geometria, DGS I, 1659, S. 43 sowie den zugehörigen Schootenschen Kommentar M, DGS I, S. 242–249*S. 527 Z. 10: *Statt z + 1 lies z + β*S. 527 Z. 29 f.: *Statt Auf ... ist lies Die Symbole ⊕ und ab Z. 9 ⊖ verwendet Leibniz, um Bildungsgesetze für Zahlenfolgen zu bezeichnen.*S. 658 *Ergänze Erl. zu Z. 16: constat: vgl. H. FABRI, Synopsis geometrica, 1669, S. 73, sowie die zugehörige Beweisfigur (Tafel I Figur 14). Leibniz hat den Satz im Text unterstrichen und zugleich mit einer Randbemerkung versehen; bei Fig. 14 hat er den Sachverhalt formelmäßig erfaßt.*S. 664 Z. 33: *Statt 1959 lies 1659*S. 675 Z. 5: *Statt 144 lies 544*S. 861 Z. 11: *Statt [+q] lies [-q]*S. 931 SV. N. 2,3: *Statt 108 lies 180*S. 932 SV. N. 11,3: *Statt 244 lies 224*S. 936 SV. N. 51,1: *Statt 67 lies 78*

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)